

D. XIX 47389 / B / 1

18 / 5

10 B. (23)

21157

SYLLEPSIOLOGIA
HISTORICO-MEDICA
HOC EST
CONCEPTIONIS
MULIEBRIS

CONSIDERATIO
PHYSICO-MEDICO-FORENSIS
QUA
EJUSDEM LOCUS, ORGANA,
MATERIA, MODUS IN ATRETIS SEU IMPERFORATIS,
ITEM SIGNA ET IMPEDIMENTA,
DEINDE

DIDYMOTOKIA SEU GEMELLATIO
SUPERFOETATIO ET EMBRYOTOKIA
ET DENIQUE
VARIA DE GRAVIDITATE VERA, FALSA,
OCCULTA ET DIUTURNA

NEC NON
DE GRAVIDARUM PRIVILEGIIS ANIMIQUE
PATHEMATIS ET IMPRESSIONE
RARIS ET CURIOSIS OBSERVATIONIBUS
TRADUNTUR

A
D. MARTINO SCHURIGIO,
PHYSICO DRESDENSI.

D R E S D Æ & L I P S I Æ,
SUMTIBUS B. CHRISTOPH. HEKELII FIL.
M DCC XXXI.

SYLLEPSIS

OF

CONCEPTIONS

MULTIPLIERS

CONSIDERED

IN

THE

THEORY

OF

THE

THEORY

OF

THE

THEORY

OF

THE

THEORY

PRÆFATIUNCULA.

Sicuti in generis humani propagatione conceptionem ordinarie coitus antecedit, ita non immerito in Gynæcologia nostra continuata, five in edendis nostris, ad muliebria pertinentibus, collectaneis post mulierum congressum ad Syllepsilogiam, five abstrusissimum conceptionis mysterium progredimur; in cujus sectione prima variæ veterum ac modernorum opiniones de mulierum semine foetusve materia, imprimis in testiculorum seu ovariorum ovulis latitante, item de conceptionis modo ac loco, an nimirum intra vel extra uterum, an in tubis Fallopiæ, vel in abdominis cavitate fiat, proponuntur. Deinde de conceptionis ætate ac voluptate, hujusque per flagra stimulatione, de atretarum item five feminarum imperforatarum sine penis feminisque virilis in uteri vaginam immisione & absque læsione virginitatis, conceptionis possibilitate, porro de marium & femellarum generatione, de conceptionis impedimento, sterilitate atque divortio dis-feritur.

Secunda Syllepseos sectio Didymotokiam, seu gemellationem proponens, de gemellorum ortu & causis, de gemellationis modo, gemellorum, trimellorum quadrimellorum, & plurium uno partu editorum foetum exemplis eorumque tunicis seu involucris atque placentis, monstroso eorundem coalitu horumque baptismo & anima, item de geminorum similitudine & jure primogenituræ agit.

PRÆFATIUNCULA.

Gemellationem in tertia sectione insequitur superfœtatio, circa quam imprimis quæstio ab autoribus moveri solet, an superfœtatio a gemellatione differat, & an revera detur? postque varias autorum responsionis gratia adductas sententias superfœtationis denominatio, descriptio, modus & partus tempus, item tam in hominibus quam in brutis observata exempla cum quæstionibus medico-forensibus adducuntur.

Sistit porro sectio quarta Embryotokiam, seu fœtum alio fœtu minimo prægnantem eumque parientem, variisque exemplis ejusmodi partum a quamplurimis autoribus pro impossibili judicatum, tam in hominibus, quam brutis, v. g. in vitula, mula, canicula, gliribus, muribus, cancris item & bombycibus, nec non ex regno vegetabili & minerali repertis confirmat.

Denique sectio quinta novem capitibus constans deque feminarum graviditate tractans primo ingravidationis signorum, pro veris habitorum, incertitudinem monstrat; deinde de quæstione, an certa fœtuum, gravidarum utero adhuc inclusorum, dentur sexus signa? item de ingravidatione falsa, occulta & diuturna; porro de gravidarum, ratione juramentorum, incarcerationis, torturæ, pœnarum & sepulturæ, privilegiis, & denique de illarum symptomatibus animique pathematis, seu potenti in fœtus impressione & variis inde exortis nævis maternis atque monstrosis fœtibus prolixè agens tractatum concludit.



GYNÆCOLOGIÆ CONTINUATÆ

SECTIO I.

De Conceptione.

CAPUT I.

De Conceptionis modo.

§. I.

Progredimur a coitu ad abstrusissimum conceptionis opus, quod juxta Theod. Craan. *Tract. de Homin. cap. 139. p. 696.* De Conce-
ptione est omnium explicatu difficillimum, ita ut summus noster artifex videatur hocce mysterium sibi soli reservasse, nec Deus voluerit, ut homo superbus respiceret ad illa tenuissima ejus operis principia. Quid itaque mirum, quod circa conceptionem foetusque formationem Physico-Medici adeo differentes fovisse legantur sententias, dum quidam, imprimis pristini Philosophi conceptionem totamque foetus materiam a solo mare ejusque semine, in uteri cavitatem injecto, alii ab utriusque, viri scilicet & feminæ, seminis commiscela, & alii, imprimis recentiores, a sola muliere ejusque vero semine, in ovarii ovulo latitante, derivant; quanquam modernorum nonnulli etiam, differenter tamen, vermicularem conceptionem defendant, de qua, tam affirmative, quam negative, in *Spermatolog. nostr. cap. IV. §. 4 5. 6. a p. 159. ad p. 170.* dissentium
Auctores. prolixè egimus.

quæ materiam seminalem præparant, & ex ejaculantibus, quæ semen elidunt. Præterea ad hoc opus habet testes, appetitum venereum, sive titillationem ad venerem; imo delectationem majorem, in emissione seminis, intra cavitatem uteri & collum: quin etiam extra orificium uteri in salacibus, quæ peperere laxamque habent vaginam, impetuose erumpit saliendo. Nonnullæ mulieres admodum libidinosæ, ad conspectum & colloquium viri formosi vel amati, semen suum effundunt cum ejaculatione: Itaque certum est, absque semine muliebri in congressu mutuo viri & mulieris nullam fieri conceptionem. Andreas Laurentius *Histor. anat. Lib. VII. cap. 9. & 10. fol. 278.* inquit: Testes construxit natura ad seminis elaborationem, emittunt enim prolificum semen feminae, ut & mares. Ibidem etiam describit, quomodo semen hoc per vasa deferentia ad uterum veniat, item quomodo gravidæ omni die coire semenque effundere possint. De seminis muliebris in testiculis elaboratione, contra Casparum Hofmannum agit Thomas Whartonus *Adenograph. cap. 33. p. 203. seqq. usque ad p. 212.* ubi allegatum caput ita claudit: Ex dictis constat, testes muliebres constructos esse non tantum ad semen proprium conficiendum, sed ad recipiendam sufficientem portionem seminis virilis; quod cum suo semine permixtum, placido lentoque motu per vasa sua ejaculatoria deponant in uteri parietes, ut ex eo formetur foetus. Nicolaus Venette *de la Generat. Part. III. cap. 4. Art. 3. p. 390. seq.* eorum sententiam refutans, qui feminis nullum semen concedunt, sed potius sanguinem menstruum pro foetus materia agnoscunt, ita scribit: La semence des femmes est bien differente de leurs regles, l'une est blanche & les autres sont rouges. Celle-là sort en petite quantité, & ne s'écoule point ordinairement sans quelque plaisir, & celles-cy s'épanchent le plus souvent en abondance. Après tout la forte imagination peut souvent contribuer à l'écoulement de la semence; Et si les femmes n'ont pas de semence propre à engendrer, comment les enfans ressemblent-ils si par-

parfaitement à leur mere dans les qualités du corps, dans les passions de l'ame, & dans les maladies, aux- quelles ils sont sujets ? Et que dira-t-on du melange de differentes bêtes, comme d'un cheval & d'une anesse, qui font un mulet, si la femme par la semence ne contribuë rien à la generation ? L'on m'avouera, que la nature ne fait rien envain, & qu'il ne fa- loit pas un si grand appareil de vaisseaux spermatiques, de testi- cules, de cornes, &c. si toutes ces parties n'estoient faites, que pour humecter la matrice. Elles ont assurément un autre of- fice, que celui, que les Peripateticiens leur donnent, elles ser- vent à faire dela semence pour formes les hommes. Et quoi- que la semence des femmes ne soit pas si cuite, que celle des hommes, elle ne laisse pas pourtant d'estre de la semence. &c. Et *Art. 6. p. 418.* de Conceptione ita pergit: La femme n'a pas plu- tost receu la matiere de l'homme par une amoureuse alli- ance, qu'elle la presse de toutes parts pour la faire passer prom- ptement dans l'un ou dans l'autre de ses vaisseaux ejaculatoi- res, afinque s'y mêlant avec la sienne, elle y cause la conce- ption. Ita etiam Johannes Baptista de Lamzweerde *Histor. Mo- lar. cap. 7. p. 71. seq.* scribit: Ipsa partium genitalium muliebrium efformatio feminarum demonstrat semen muliebre dari; Et *p. 72.* dicit, semen muliebre sequi temperamentum corporis, un- de desumptum est, adeoque minus obtinere caloris & valoris, quam virile, & esse multo tenuius & aquosius, propter majorem particularum figuræ oblongioris copiam, attamen æque ac se- men masculinum omnium partium corporis feminini rudimen- ta & virtutem feminalem complectitur. Item *p. 73.* pergit idem: Differt præcipue femininum semen a masculino, quod perfe- ctiora partium genitalium muliebrium & mammarum rudi- menta in se complectatur, &c. Feminas verum habere semen, masculino femini prorsus simile, statuit etiam Guylielmus La- my. vid. Ido Wolff. *Obs. Chir. med. Lib. I. Obs. 46. p. 146.*

§. 6.

Non est
verum se-
men,

Sed liquor
prostata-
rum.

Cum vero dictus liquor, a feminis quandoque in coitu & alia occasione profusus, atque a variis Autoribus pro vero semine muliebri habitus, minime in testibus muliebribus generetur, neque exinde profluat, sed potius ex certis vaginæ uterinæ glandulis, prostatitis dictis, secernatur, atque vel in coitu, vel ab alia titillatione per certos meatus seu lacunas, ad dictæ vaginæ cavitatem deferatur, nunquam autem ad ipsum uterum regrediatur, sicque ad foetus formationem nihil omnino conferat, propterea etiam dicto prostatarum liquori minime muliebris seminis nomen impertiri debet, uti in *Muliebr. Sect. II. cap. 4. p. 158.* de hoc liquore pluribus monstravimus. Deinde etiam ibidem de hoc & vero feminarum semine, quod in ovarii ovulis continetur, aliquot Auctores adduximus; quibus adhuc alii annecti possunt, siquidem Johanni van Horne *Microcosm. §. 67. p. 273.* videntur feminæ per duplicem meatum excernere humorem seminalem in uterum, quorum unus a testibus, alter a tubis derivatur. Imo etiam intra vaginam effluit guttatim, si premas internam membranam. De hoc liquore & vero semine muliebri ita scribit Franciscus Zypæus *Fundament. Medicin. Part. II. cap. 3. Art. 6. §. 13. seq. p. 80. seq.* Mulieres semen habent prolificum, si per illud ova intelligas, quorum ipsarum pleni sunt testiculi, & quæ ab aura seminali virili foecundata & expansa, ex alveolis suis seu calicibus, quibus magna parte continentur, erumpunt, ut in tubas Fallopianas, exinde in cavitatem uteri descendant. Humor, quem mulieres emittunt in congressu, non est verum semen, quia ille foras circa clitoridem & vulvæ orificium ejicitur, raro in vulvam, nunquam in uterum. Patet hoc idem in gravidis, quibus uteri osculum arctissime semper clauditur & flavescente mucagine præmunitur. Nec potest dici ad fundum resummi, quia natura sic luderetur opera. Deinde multæ feminæ concipiunt, humorem tamen illum, ut fatentur, non emiserunt; seminis præterea raro habet consistentiam, neque spirituosus est, quia meretrix

ces sæpius in die se polluentes illius excretionem non debilitantur; neque seminis elaborationem habet, cum in illius organis non generetur, sed in nudis glandulis. Hæc & alia ex Francisco Zy-
pæo desumpta etiam verbis Gallicis leguntur dans la Medecine
dogmat. mechanique de Louis Bellefontaine *Vol. I. Exercit. 7. p. 37.* Et Michael Ettmüllerus *Oper. Med. Tom. I. Instit. Physiol. cap. 22. fol. m. 161.* inquit: Putatum quidem hætenus fuit, feminarum testes, vasa præparantia, similemque apparatus circa genitales partes, nulli alii usui destinatum esse, quam generationi seminis sui generis, quod in mixtione cum semine virili in utero semen fœcundum faceret, quod quidem aquosius sit, quam virorum, cum ex defectu epididymidum ultimam perfectionem non accipiat, esse tamen perfectum in suo genere. Verum hæc falsissima sunt, sicut & de hujus seminis in uterum excretionem, per quas vias id contingat, & an necessario cum semine virili in coitu fœcundo sit permiscendum, ipsis veteribus semper obscura fuit controversia. Ad Johannem Jacobum Harderum ita scribit Johannes Conradus Peyerus: Mulieres in congressu semen emit-tere, virorum instar, vetus est traditio, quate non credam præoccupatum. Nos operam damus sapientiæ & veritati, ad quam firmo ratiocinio cautaque experientia paratur introitus. Decipi, qui amant, facillime possunt, humore turgentibus vel ad connubium sollicitatis ac incensis libidine femellis e vulva profuso, qui nihil aliud est, quam pituita uteri colliquata, & serum e glandulis vaginalibus excretum. Semen enim si esset, inutiliter ita profunderetur. Vidi aliquando rejectas ab equa turgente mucaginis illius plures uncias, quod suppeditare nequivisset vel uterque testiculus. vid. Pæan. & Pythagor. *Exercit. anat. Exercit. 9. p. 97.* Inquit etiam Guernerus Rolfincius *de Generat. Part. II. cap. 8. p. 138.* nihil seminale spirituosum, virtuosum in coitu emit-tere feminas, argumento est, quod hoc agentes non excipiat magna virium debilitas. Secundum Regner. de Graaf *de Mulier. Organ. cap. 13. p. 323. seq.* liquor ille, in veneris certamine aut li-
bidino-

Plagium.

bidinosi cogitationibus tanto impetu erumpere solitus, quem multi semen esse credunt, erumpit primario ex lacunis in vaginæ & meatus urinarii orificiis collocatis; secundario vero ex meatibus in uteri collo copiose existentibus, cui procul dubio aliquid etiam conferunt pori in vagina ac uteri parte interna existentes. Non itaque liquor ille, a testibus aut tubis provenit, quia testes ne quarta ex parte tantum liquoris in se continent, quantum uno quasi saltu e pudendis erumpere solet. Non prodit etiam ex tubis Fallopiæ, quia nec illæ tantam liquoris quantitatem continent, &c. vid. etiam Joh. Bohn. *Circul. anat. Progyrn. 1. pag. 5.* Guilielmus Harvæus *de Generat. Animal. Exercit. 34. p. m. 182.* maxime miratur, eos, qui emissionem hujus liquoris ad generationem necessariam putant, non animadvertisse, humorem illum foras ejici, & circa clitoridem vulvæque orificium ut plurimum profundi; raro intra vulvam, nunquam vero intra uterum, ut cum maris spermate misceatur; esseque consistentia serosum sive ichorosum, ad modum urinæ, non autem genituræ instar, lentum atque unctuosum; ut tactu facile innotescit. Quorsum autem foras ejiciatur, cujus usus necessario intus requiritur? debuitne humor ille, ceu utero valedicturus, ad limen vulvæ amandari, ut majore cum gratia ab utero retraheretur denuo? Et *Exercit. 65. p. 421.* inquit idem Harvæus: Licet salaciores quædam mulieres humorem aliquem in coitu emittant; eum tamen foecundum semen esse, aut ad conceptum necessario requiri, non arbitror: plurimæ enim sine ejusmodi effusione & nonnullæ quoque citra voluptatem aliquam concipiunt. v. Joh. Frid. Ortlob. *Histor. Part. diff. 35. p. 274.* Andreæ Ottomaro Gœlickio ob temperamenti naturæque individualis diversitatem vix possibile esse videtur, ut a masculo æque ac femella in coitu simul eodemque tempore semen excernatur in nostris præcipue septentrionalibus regionibus, in quibus ad venerem paulo languidiores sunt femellæ. v. *Exercitat. Francofurt. Tom. I. Sect. I. p. 12.* v. etiam Georg. Fr. Rallius *de Generat. Animal. Sect. II. p. 88. seqq.*

§. 7.

Cadit proinde ex adductis opinio de hoc semine feminino, ^{Conceptio} deque conceptione & foetus formatione ex utriusque seminis, ^{per semi-} virilis scilicet atque muliebris, commiscela, ad usque tempora ^{num com-} Harvæi defensa, qui Autor etiam firmo satis argumento eandem ^{miscelam} infuper infringit, quod scilicet nihil in utero de semine repere- ^{falsa.} rit unquam, licet copiosissimas, eo fine, post coitum secuerit, vid. Christian. Joh. Lang. *Physiolog. Thes. 38. Oper. Tom. I. fol. 230.* Vel juxta verba Theodori Craanen *dissert. de Homin. cap. 62. p. 708.* Harvæus Anglus aliquot diebus post coitum damarum & cervorum nihil reperiit seminis virilis, nec feminae intra ipsum uterum; exinde ruit veterum opinio existimantium, utriusque sexus semen debere commisceri inter se, intra arum genitale, priusquam conceptio fiat: experimentum hocce Harvæi docet, illa plane esse chimerica, cum nihil seminis repererit intra uterum. Ipsius autem Harvæi verba *Exercit. 67. p. 434.* sic sonant: Uteri (scilicet cornuum) cavitas & interior superficies haud aliter, quam inferior ventriculorum cerebri concameratio, aut caro glandis intra præputium, tacta mollissima & lævissima apparet. In illa vero nec sperma maris, nec aliud quippiam ad conceptum spectans (licet accuratam per Septembris & Octobris menses totos dissectionem instituerim) invenire unquam potui. Mares tamen interea quotidie coitum celebrabant, egoque femellas quamplurimas dissecabam. Estque hoc ipsum mihi multorum annorum experientia compertum. Cum proinde, periculo sæpius facto, nihil aliud intra uteri cavitatem occurreret, cœpi primum dubitare, num maris semen ullo pacto (injectione scilicet, aut attractione) conceptionis locum posset ingredi? tandemque iterata sæpius inspectio sententiam hanc mihi ratam fecit, nihil prorsus seminis ad ea loca pertingere. vid. etiam Act. Erud. Lipsiens. *An. 1715. mens. Martio p. 123.* ubi refert Joh. Ad. Gen- selius, Harvæum in dissectionibus cervarum & damarum, tum ante finitum earundem coeundi terminum, tum etiam postea in-

stitutis in uteri cavitate, nunquam seminis aut sanguinis vestigium reperiisse. Hoc experimento Harvæano permoti recentiorum plerique seminis equidem virilis cum humore dicto feminarum seminali, seu prostatarum, mixtionem in quibusdam concedunt; veterum vero mixtionem seminis utriusque, per quam hominis formationem fieri statuebant, penitus negant, unde, non fieri semen mixtionem, nec ex ipsorum coagulo efformari foetum, scribit Georgius Wolffgangus Wedelius *Physiolog. Sect. III. cap. 28. p. 199.* Ultramque sententiam scilicet de conceptione ex commiscela seminum & Harvæi ex ovulo conciliare olim nitebatur Autor quidam sub ficto Jani Orchami nomine, de quo vid. Georg. Fr. Ravius *de Generat. Animal. Sect. II. §. 1 p. 59. seq.*

§. 8.

Fœtus materia a sola femina ex ovo.

Hanc proinde veterum opinionem recentiores Physiologi pariter explodentes fœtus materiam feminæ in solidum adscribunt, eamque extra uterum, & quidem in certa testiculorum muliebrium, sive juxta modernorum denominationem, ovariorum, vesicula seu ovulo quærunt: In dictis autem ovulis verum semen muliebre, sive liquorem quendam certa stamina continentem tanquam materiam primam ad fœtum ejusque vasa & membranas idoneum atque sufficientem, imo omnes quoque embryonis partes jamjam latitare, in Muliebr. docuimus: quod insuper confirmat Johannes Gothofridus Bergerus *Physiolog. Lib. II. cap. 5. p. 456.* constat jam, inquit, & pluribus accuratioribus observationibus confectum est, verum semen muliebre extra uterum vesiculis quibusdam, vel ovulis, contineri intra testes mulierum. Quam sententiam quoque plurimi paulo post allegandi confirmant autores, quibus nihilominus alii conceptionem a certis vermiculis deducentes contradicunt. Cum vero de hoc conceptionis & generationis vermicularis modo in Spermatologia nostra egerim, & quidem vermiculos defendentium opiniones *cap. 4. §. 4. p. 159.* eosdem autem rejicientium rationes *§. 5. seqq. p. 164* adducendo, prolixitatis vitandæ gratia benevolum lectorem illuc

Conceptio ex vermiculis.

illuc remittere libet. De qua sententia insuper vid. Dan. Hoffmann. *Annotat. in Gofey de Generat. foetus p. 60. seq.*

§. 9.

Quamvis etiam, uti modo dictum, plerique modernorum Medicorum hominis generationem ex ovo defendant, non desunt tamen, pariter ex recentibus, huic opinioni variis ex causis contradicentes, e. g. quia testes muliebres pro ovariis minime agnoscunt; item quia nesciunt, unde tam copiosum, uti nonnunquam in coitu vel a titillatione venerea effluit, humorem deducerent, nisi a testiculis, quippe in quibus ille liquor, ab ipsis pro semine muliebri habitus, necessario elaborari deberet, quo dubio in principio etiam laborasse videtur Casparus Bartholinus *de ovar. mulier. p. m. 18.* inquiens: Quamvis ego clarissime ova in testiculis mulierum viderim & demonstraverim Hafniæ, Lugduni Batavorum, Parisiis, Florentiæ, Romæ alibique, nihilominus remansit mihi eadem cum aliis difficultas, quam novo invento de ovariis prætendit Diemerbrochius, qui ova in ovario mulierum admittere non ausus est, nescius, unde tam copiosum, qui in coitu profluit, humorem deduceret, nisi a testibus, qui semen suum profunderent. Nimirum ductus quidam cæci, qui substantiam urethræ perreptant, a Graafio describuntur, quos non sufficientes huic mulieri arbitratus sum. Gustavo Casimiro Gahrlied novum illud ovarii muliebris inventum, an commentum? (ut inquit) adhuc difficultatibus laborare videtur ac tricus, haud ita prompte extricandis. *vid. M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 57.* quo loco ita pergit: Nec illa in ovis illis præsuppositis, si non supposititiis, rudimenta totius foetus fidem adhuc in mente mea invenerunt: speciosi quidem sunt ingenii valde prompti partus, at nondum, ut mihi videtur, satis etiamnum maturi, ut plene adolefcant. Inter plurima argumenta, quibus ad hoc asserendum movetur dictus Autor, non postremum est, prolis in utero, ut nutriendi & augendi, sic efformandi officium matri debere, & quidem præcipue vi imaginaria mentis, phantasiæ nimirum ma-

*Generatio
ex ovo are-
centioribus
rejicitur.*

ternæ in foetu pro lubitu agentis, qua etiam in perfecto fere jam foetu diversas operatur quasi metamorphoses, addit, detrahit, auget, minuit, figuram, colorem, aliaque accidentia mutat, mutilat, adstruit, destruit, imo annihilat membra, omni procul dubio ante jam efformata & perfecta. Et Michael Bernhardus Valentini in *Epistola ad Job. VViditium* testes muliebres famosum nuper, nunc tamen in dubium rursus tractum recentiorum ovarium nominat. *vid. ejusdem Polychrest. exot. Dissert. 9. p. 207. & M. N. C. Dec. II. An. 2. App. p. 461.* Inquit etiam Johannes Baptista Lamzweerde *Histor. natur. Molar. Uter. cap. 13. p. 125.* ex variis rationibus concludit, semen nullibi, nisi in utero, commodam reperire matricem, uterumque esse solum & unicum seminis humani receptaculum, a Deo in naturæ libro præscriptum, in quo si semen effundatur, prolificum & perfectum, foetus, si imperfectum, mola generabitur, nam corporalis utriusque seminis substantiæ complicatio requiritur ad conceptionem, quidquid Harvæana experimenta contrarium suadere videantur. Item *p. 124. seq.* inquit idem Autor, historia foetus Musipontani extra uterum in abdomine inventi ibidemque putrefacti, non concludit, quod foetus ille sit extra uterum conceptus, quidquid Deusingius & alii nugentur de possibilitate conceptionis extra matricem, ac si spiritus seminis masculini relicta corpulentia non solum tubas Fallopianas, sed & uteri poros in muliebri ovarium ibidemque cum spiritu spermatis foeminini conjunctus testiumque membranis excussus non modo in cavitate abdominis foetus humani architecturam aggredi, sed etiam intestinorum ventriculique poros penetrare, & intra illorum viscerum ambitum idem artificium efficere valeat. Et *cap. 18. p. 168.* scribit Lamzweerde: Conceptio est utriusque seminis complicatio, si hoc sanum, verus, si morbosum, falsus oritur conceptus.

§. 10.

du Verney
sententia.

Prolixe etiam contra generationem ex ovo disputat, & perquam validis, uti inquit, rationum argumentis & demonstra-
tioni-

tionibus palam facere, erroneam esse conceptionis per ova doctrinam, conatur Chirurgus Parisiensis, du Verney, in Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. II. Mart. obs. 1. p. 57. seqq.* Rationes autem ipsius sunt, quod ovariorum patroni, qui testiculos muliebres illorumque globulos aut vesiculas falso pro ovariis & ovulis venditant, feminisque universam materiam ad generationem adscribunt, male statuant, discrimen, quod inter testes utriusque sexus intercedit, conceptam de illis opinionem fulcire, cum tamen cum antiquorum sententia multo minus congruat, ex quorum mente conceptio nihil aliud sit, quam exacta commistio seminum masculini ac feminini in uteri capacitate, & in diversis animalibus partes iisdem usibus dicatæ non semper eandem conformationem obtineant, uti ex volucrum testiculis, insectorum cordibus, animalium renibus atque pulmonibus probat. Deinde negat dictus Autor, quod globuli & vesiculæ, ab adversariis ovariorum nomine donati, a testiculis secedant ac divellantur, ut inde integra ad tubas uterinas deferantur: Si enim propositio hæc vera foret, non solum necesse esset, tubas immediate annecti testiculis, sed præterea illis inesse amplitudinem, proportionem respondentem magnitudini ovorum, quo commeatum illis concederent facilem; saltem in mulieribus pubertate donatis, vel conceptionis tempore. Quamvis enim in avibus oviductus primo pene insensibilis eo demum tempore, quo incubare gestiunt, eam amplitudinem acquirat, quæ ovis, illum commeantibus, transitum concedere valeat; id ipsum tamen in feminis animalium terrestrium non observari, neque pubertatem, neque conceptionis tempus, vi experimentorum a se hæcenus institutorum, ullam tubarum constitutioni immutationem inferre, tanquam certissimum præsupponit; quod tamen consequi necesse foret, si revera per illarum cavitatem ova deferrentur; quæ, cum multo majora sint, quam ut per illarum angustam cavitatem permeare valeant, procul dubio ab illis dilatandæ essent, non secus ac ovum gallinæ canalem, per quem illi transitus est,

ampliores reddit, etsi duritiem sub exitu tantum finem consequatur, hoc est, postquam ductum illum pene integrum trajecerit. Porro hallucinari, inquit du Verney, ovariorum patronos asserentes, phantastica illa ova idealiter continere partes omnes foetus, id enim si foret, nihil aliud in illis ovibus requireretur, quam ut irrigui a succis utero inhaerentibus fecunditatem acquirerent, (uti in seminibus plantarum observatur) sicque inutile esset adjungere seminis masculini vim, ut excludantur. Item spiritus per tubas aut vasa sanguifera ad testiculos usque, in quibus ovariorum defensores conceptionem fieri credunt, deferri ideo du Verney impugnat, quia tubae pollicis ad minimum distantia a testiculis distent ac latum ligamentum has amplectens multo amplius, quam requiritur ad exacte eas cooperiendas, necesse sit, sperma virile dissipari, antequam eo pertingere queat. &c. His tamen objectionibus respondet Lietandus *ibid. Mens. Jun. p. 158.*

§. II.

*Josephi
Mariae Vi-
dussi.*

Ex recentioribus etiam Italus quidam, nomine Josephus Maria Vidussi negat, recentiorum observationes circa generationem hominis sufficere ad demonstrandam hujus generationem ex ovo, hominemque ex mixto parentis utriusque semine oriri fuisse contendit. Sequi enim alias, dicit, liberos non esse de substantia patris, cum hic tantum, ut causa efficiens, non ut materialis concurreret. Sicque nec dari morborum haereditariorum rationem posse. Dein in codice sacro semen audit principium conceptionis, quae locutio locum apud recentiores non habet, qui foetum in ovo, ad minimum initiative ante conceptionem delineatum tradant, atque ita improprie dicant: Filius est de vel ex patre, perinde ac statua est ex artifice. Quinimo conceptio nequidem in utero fieret, si ad Nigrisoli mentem eadem jam perfecta esset, antequam ovulum descendat ad uterum. Qui vero ita stabit allocutio angeli ad B. Mariam: concipies in utero? Quapropter dictus Autor semen mulieribus adstruit, quoniam scili-

scilicet emitterent semen in coitu, tuncque venerem sentirent, pollutionibus etiam nocturnis laborarent. Præparando huic semini testes & vasa certa destinat, ovula ergo incerti adhuc usus, forte & præter naturam esse concludit. Verbo animalia vivipara ex commixtione feminis, ovipara ex ovis, insecta mediante generatione spontanea produci asserit. *vid. Act. Erud. Lips. An. 1718. mens. April. pag. 187. seq.* Varias difficultates contra conceptionem in ovulo adducit etiam Nicolaus Venette *de la Generat. de l'homme p. m. 432. seqq.* Sententiam eorum, qui generationem ex ovo fieri statuunt, in dissertatione Gallica Anonymus quidam impugnat, *vid. Laurent. Heister. Orat. de increm. anatom. p. m. 48.* Titulus dictæ dissertationis est: *Dissertation anatomique sur la generation de l'homme, dans la quelle on combatte le systéme des Ovaristes, 12. Paris.* Autori Belgico S. J. sive Samueli Jansoni *de Generat. Homin. cap. 2. edit. German. p. m. 6.* Generatio per commiscelam seminum, virilis ac muliebris, præ conceptione ovali ideo veritati magis consona videtur, quod, si post actum venereum genitales partes mulierum permaneant siccæ, tunc viri semen in uterum pro foetus formatione receptum & per consequens femina imprægnata sit; econtra verò, si dictæ partes pudendæ post coitum deprehendantur humidæ, certum sit signum, viri semen non fuisse receptum. Mulierem enim imprægnari nequaquam compertum est, si semen viri in ea non remanserit. Contra genesin oviformem, inquit Johannes Ludovicus Hannemannus *M. N. C. Dec. II. An. 2. obs. 55. p. 92.* de qua tot extant scripta, & quædam ego ante annos octo circa eam materiam meditatus sum, urgeo hæc dubia: (1) an quolibet coitu ex ovario muliebri ovum aliquod eliciatur, quod si tunc coitus sæpius una reiteretur nocte, ubi tunc maneant illa ova? & qui fiat, quod solum ex uno educatur proles, & non æque ex aliis vel omnibus? (2) quid dicendum de iis feminis, quæ 10. 11. 12. imo 16. 17. & 20. annos in conjugio vivunt, & licet millies virum expertæ sint, tamen nullum edunt foetum, nisi post tot elapsos annos?

Vel

Vel ova non habuerunt in ovario, vel successu temporis in ovario nascuntur illa ova: (3) quædam feminæ, postquam semel vel bis pepererunt, aut etiam sæpius, tunc parere desinunt 10. 11. 12. 13. 14. 16. annos, iis elapsis, rursus parere incipiunt. Quæ hujus causæ? vel (1) ova deficiunt, vel (2) nondum elaborata sunt; vel (3) tot annorum spatio de novo elaborantur. Tamdiu enim ova sine partu vel conceptione in ovario esse non possunt, quin corrumpantur: Hæc & alia si expendam dubia, oviformis generatio, cui antea tantum tribui, mihi multis nominibus suspecta & inter non-entia referenda est. Viviparorum generationem ex ovo in dubium vocare allaboravit etiam Sparaglia, item Bonanni & Triumfetti, quibus tamen respondet Franciscus Maria Nigrifoli: Act. Erudit. An. 1714. Novembr. p. 522. seqq. Plura ejusmodi argumenta a Christiano Johanne Langio *Physiolog. thes. 3. fol. 230.* adducuntur, simul tamen foliis sequentibus, eadem refutantur. vid. etiam Carl Drelinck. *de conception. advers. Cl. 4. p. 49. seq.* item Dan. Hoffmann. *Annotat. ad Hypoth. Goveyan. p. 58. seq.*

§. 12.

Conceptio
extra ute-
rum quomo-
do fiat?

His tamen & aliis rationibus nondum contenti plerique recentiorum Autorum conceptionem & generationem, validioribus argumentis, extra uterum, nimirum ex ovulis in ovariis muliebribus & quidem hoc modo fieri defendunt: quod, licet maritus cum uxore congregiendi semen suum in uteri vaginam seu arum muliebrem injiciat, raro tamen illud materialiter ad uteri cavitatem perveniat, sed ut plurimum paulo post coitum ex matrice iterum profluat; spiritus nihilominus genitalis, quo in coitu imprimis fœcundo, virile sperma turget, sive secundum Andr. Ottomar. Goëlicke *Medicin. Forens. Specim. I. p. 10.* portio feminis masculini halituoso-orgastica per tubas Fallopianas, aut alias vias, ad testiculos muliebres, seu potius ovaria penetret; ibidemque ovulum unum aut plura peculiari actuet motu, ut hoc modo imprægnatio seu conceptio non in utero, sed in ovario fiat, in eoque prima fœtus stamina formentur, vel potius jamjam formata ovulis-

ovulisque ab initio inclusa ad motum & incrementum excitentur; Quod ovulum foecundatum post aliquot, a coitu foecundo, dies, a tubæ Fallopianæ, quæ ab œstro venereo successive ovario appropinquat, fimbriis exceptum seu apprehensum pedetentim per eandem ad cavitatem uteri detrudatur; & postmodum huic mediante placenta uterina annectatur, inque suis membranis ad certum partus tempus commoretur; quibus demum in partu disruptis foetus hætenus iisdem inclusus in lucem prodeat. Unde apparet, materiam foetui solam matrem; formam vero & principium motus patrem suggerere. Hanc de conceptione ovali sententiam plurimi quoque recentiorum autorum defendunt, quamvis variis adhuc modis inter se differant; quorum verba, cum non modo conceptionis opus melius exponant, sed etiam modo adductis objectionibus respondeant, hoc loco inferere liceat.

§. 13.

Antequam autem dissentientium autorum verba allegemus, præmonendum erit, nonnullos, conceptionem in ovulo defendentes, ejusdem foecundationem statim in testiculo seu ovario, alios in tuba Fallopiana, alios demum in ipso utero fieri, statuere. Ratione seminis virilis, ovulum foecundantis, alii genituram viri materialiter illud attingere judicant, alii tantummodo spiritualiter, sive per vim plasticam & irradiativam, in semine virili latentem. Viæ, quibus vel semen virile, vel aura genitalis, ad ovulum foecundandum ex utero ad ovarium ascendat, aliis sunt tubæ Fallopianæ earumque cavitas, (quam alii negant,) aliis porosa uteri substantia, aliis sanguinis circulatio. Porro dissentiunt etiam autores, an ovulum foecundatum ex ovario integrum per dictas tubas ad uterum descendat, an vero in testiculo vel tuba disruptatur, ipseque ovuli liquor, sive verum semen muliebre hoc modo ad uteri cavitatem deferatur, vel etiam in abdominis cavitatem effluat &c. Uti ex ipsorum verbis benevolus lector elicere poterit.

*Autorum
dissensus.*

§. 14.

Auctorum
verba.

Bohnii.

Inchoari conceptionem seu generationem non in utero, sed in testiculis muliebribus, sive ovariis, semenque virile in coitu profusum in ovula ibidem contenta potentiam suam exerere, ob sequentes rationes probabile videtur Johanni Bohnio *Circul. anat. physiolog. Progymn. I. p. II.* cum primo non tantum per Harvæi, sed aliorum quoque inspectiones frequentiores constet, statim a fecundo coitu nihil conceptus vel ovuli intra uterum reperiri; secundo prima & sensibilibior ab eodem mutatio circa testiculum observetur; tertio ova pennatorum intra ovarium actuantur; ac quarto ovula motore opus habeant, quo ex profundioribus & strictioribus testiculorum lacunis protrudantur, verosimile fit, intra hos formationis negotium inchoari, i. e. conceptionem contingere. Quartum hoc nihilominus argumentum, quia facile impugnari posset per illa, quæ ab uno alterove supponuntur, quasi ovula muliebria maturiora vinculis, strictioribus hætenus, laxatis, partim a tunica testiculorum fibroso-carnea, partim a laciniis tubarum musculosis, elidantur atque exprimantur, & quidem antequam seminis masculini contactum experta fuerunt. Hypothesi huic vel ideo absolute subscribere se nequire, pergit Bohnius, quod tubarum extrema fimbriata exturbationi huic insufficientia, fibrositatum vero testiculi stricturam & impulsus illarum turgescentiæ ac complexui haud semper synchronicam, hinc ovulorum plurium, ad abdominis cavum elabentium, perditionem vereatur, ne repetat notabilem illam alterationem, quam a coitu testiculo contingere autopsia evincit. Conceptum & primam Embryonis delineationem ita describit Christianus Johannes Langius *Physiolog. Thes. 38. Oper. Tom. I. f. 226.* dum virile semen per patens in coitu uteri ostium, ipsius cavo injicitur, fertur pars ejus spirituosæ in instanti per tubas Fallopianas ad ovaria muliebria. Inibi impingens in ovulum unum vel alterum statim ejus ingreditur interiora, hocque momento incipit perficere opus, quod ex benedictione divina jussa est: Nimirum ovulum spatio aliquot dierum

Langii.

dierum ad uterum per Fallopianam tubam devolutum ita disponit, ut ex minima intus conclusa cicatricula, quæ totius hominis rudimenta sub stupenda exiguitate in se continet, successive partes omnes emergant, & tandem perfecti, sexu aut virili aut fœmineo ornati infantes in aprium veniant. vid. etiam *ejusd. Tom. III. disp. 41. fol. 542. seq.*

§. 15.

Quomodo ovula imprægnentur, juxta Georg. Philipp. Nenter. *Physiolog. med. cap. II. membr. 1. p. m. 329.* nondum adeo liquet. *Sententia Nenteri.*

Plerique affirmant conceptionem fieri in ipso ovario, & ovulum fœcundatum postmodum descendere per tubas Fallopianas ad uterum. Pro hacce sententia pugnat imprimis avtopsia anatomica, qua constat, ovula imprægnata in ipsis tubis deprehensa fuisse? Dantur tamen nihilominus alii, qui existimant, in coitu fœcundo ovulum ferri ad uterum, & in ejus cavitate imprægnari, ad probandam suam sententiam dicunt, ova interdum matura absque ullo prægresso coitu, in salacibus, ob nefandam genitalium frictionem, ad uterum devolvi: quod an veritati consonum sit, me nescire, lubens fateor. Dum ergo in coitu ob continuam attritionem membri virilis in vagina, semen magno impetu per vaginam in uterum injicitur, subtilior ejus & maxime spirituosâ portio ovulum instar fulguris penetrat, ac primum principium agens ipsi communicat: crassior vero feminis pars annotante Harvæo in brutis, ex utero iterum effluit. Bernardus Connor *Evangel. med. Connor.*

Art. 10. p. m. 62. Semen virile vulgo dictum fermentum tantum viri feminale vocat, quia non in ipso, sed in femina tantum semen seu germen continetur; Et *pag. 64.* ita de generatione loquitur: Post elapsos quosdam ætatis annos vir & femina ab aucto nativo calore & humorum fermentatione venereo quodam æstro perciti ad oscula & mutuos amplexus libidinem satiaturi ruunt. Hoc in congressu vir, non sine voluptate, in uteri muliebris cavitatem feminale illud fermentum seu succum illum fermentaceum

emittit, qui in testibus elaboratur. Hic succus partim cum circumeunte sanguine, partim recta via per tubas Fallopianas ad seminaria fertur, & semina in illis, tanquam in totidem diversis nidulis latentia, auræ instar prolificæ subit & penetrat, & prout unum vel alterum ex seminibus erit naturum, nempe prout debitam dispositionem seu magnitudinem acquisiverit, fermenti instar illud rarefaciet, intestinum inquam & expansivum motum cum limpido & lymphatico feminis latice, in quo delineata fluctuant corporis stamina, inibit, eundem attenuabit, stamina ipsa expandet & distendit, porulos eorundem aperiet, sicque attenuatus ambiens liquor dilatatos staminum porulos subibit, ipsos ampliabit & largius nutriet, donec crescente indies feminis mole, membraneum domicilium tandem præ magnitudine disrumpet, & per annexas tubas in uteri cavitatem semen delabatur; ibique uteri parietibus media placenta leviter alligatum, ab appellente matris sanguine per umbilici vasa sine ulla respiratione alimentum constanter recipiet. Scribit etiam Michael Alberti *introducť in univers. medic. cap. II. §. 78. p. 37.* ovulum tale imprægnatur in ovario, ex quo ad uterum transfertur, quicquid enim de oculis in utero inter recentiores differitur, non sufficienter rationi consonat. Et *System. Jurisprud. Medic. Cap. IV. §. 9. p. 84.* inquit: Conceptio est principii formantis sive generantis combinatio cum ovulo materno, postquam ipse formationis actus inchoat & continuat. Juxta Georg. Wolffg. Wedel. *Physiolog. Sect. III. cap. 28. p. 200.* inspiratur feminale virus & contagium vesiculis & ovario, ita ut in coitu fœcundo illud ad testes muliebres, ceu verum & genuinum ovarium deferatur pro irrorandis & fœcundandis ovis seu vesiculis.

§. 16.

Elsholtzii.

Johannes Sigismundus Elsholtius *M.N.C. Dec. I. An. 6. & 7. Obs. 196. p. 287. seq.* hominis conceptionem ex ovario sequentibus verbis ad mentem recentiorum describit: In coitu prolifico semen virile irrigat non tantum uteri fundum, sed & pars ipsius spirituosa sive

aura feminalis per vas deferens, sive ductum brevem ad ovarium usque penetrat, adeoque, ovum cæteris maturius aut magis dispositum ac porosum virtute sua (ut loquuntur Autores) fermentativa foecundat. Intumescit inde per modum velut inflammationis ovum, rubescit & distenditur tuba, suamque proboscidem ad ovarium digitis quasi arctius amplectendo contorquet; quemadmodum illam tubarum rubescentiam, distensionem ac contorsionem in recens gravida Amstelodami Ruyschius Anno 1673. publice ostendit. Labentibus hinc tribus aut quatuor diebus ovum illud adeo crescit, ut ovarium suum ad exclusionem stimulet: & quamvis in non gravidis ex ovario in tubas nullum foramen manifesto compareat, in recens gravida tamen idem Ruyschius observavit aperturam, quæ pisum majus admittebat: quinimo vidit illum ovarii locum, in quo ovulum olim federat, post exclusionem densa spongiositate villisque rubicundis obfessum, perinde ut in uteris recentium puerperarum conspici etiam assolet: Porro vero, ubi ovum a proboscide tubæ exceptum est, facilius omnino & innocuus delapsus in uteri cavitatem ut plurimum datur. Eodem loco etiam dictus autor ad aliquot obiectiones contra conceptionem ex ovario ita respondet. 1) Cum nihil a seipso moveri constet, quidnam illud sit, quod ovum ex ovario in uterum propellit? Atqui facilis est responsio, ovum scilicet semel foecundatum non moveri a se ipso, sed excludi ab ovario stimulado, sicut idem in gallinis accidit, dum ova grandescunt. 2) Obj. quod metus sit, ne ovum per tubæ angustias penetrans rumpatur. At tubæ etiam in non gravidis tam sint perviæ semper, ut flatum & aquam per canaliculum admittant; in gravidis vero multo magis distenduntur. Etiam si etiam interdum fortassis ovum aliquod frangi contingat, nihil inde damni, nisi quod conceptionis hac vice spes pereat. &c. Systema de generatione hominis ex ovo statumina etiam Daniel Taury. vid. *Histor. Acad. Reg. Scient. An. 1699 p. 44.*

§. 17.

Nuck.

Item animal ex ovo generari, experimento probat Antonius Nuckius *Adenograph. Cur. Cap. 7. p. m. 63. seq.* inquit : Occasione ovulorum incidit, in iisdem latitare foetus primordia : quam opinionem eousque defendimus, donec quispiam aliis ratiociniis & experimentis certioribus contrarium demonstraverit. Experimentum interim, nuper institutum, egregie hic pro eo militare videtur. Cani feminæ, tertio post congressum institutum die, extraxi per vulnus abdomini inflicto, sinistri lateris cornu (cujus ovarium jam duobus ovulis majusculis notabiliter conspicuum) inter vaginam & ovarium, medio loco, ligatura arctiori confictum, reposui, vulnusque intra octiduum ad cicatricem perduxi. Vigesimo primo post ligaturam injectam die canem, cultro anatomico examinandam, inspicio, &, quod ante hariolatus eram, etiam plene perspexi. Sinistri cornu pars (inter ligaturam & ovarium) duplici foetu erat obsessum; altera vero portio (ligaturam inter & vaginam) plane vacua nobis visa: quod manifestissime probat ovula ulterius, quam ad ligaturam, propelli non potuisse, & in ipsis ovulis, aura feminali foecundatis foetus quærendos esse, non vero in semine virili. Oppositi lateris cornu itidem inspecto, tribus foetibus (sed regulariter dispositis) distentum reperi.

§. 18.

Peyeri.

Inquit etiam Johannes Conradus Peyerus *Merycolog. sive de Ruminant. Lib. I. cap. 5. p. 48. seq.* Doctrinam de generatione animalium ex ovo gnaviter demonstrarunt peritissimi viri complures, quibus ego calculum iterum iterumque adjeci, ratus gloriosum esse eorum castra sequi, qui experientiam sibi ducem præposuerunt, verumtamen præjudiciorum tenebræ & experimentorum neglectus multos impedit, ne perspicuitatem attingant, experientia tamen nos docuit femellarum testiculos ad generationem animalium tantum contribuere utilitatis, ut plane fons sint & promptuarum foetuum omnium : nam partibus istis castratione ademptis
aut

aut casu vel morbo destructis, animalia sterilesunt, nec amplius concipiunt, quia simul abolentur ova, in quibus conceptuum ideæ speciatim delitescent.

CAPUT II.

De seminis virilis ad ovarium viis.

§. 1.

Qua ratione autem & per quas vias ovulum in ovario contentum per semen fecundetur, dissentiunt autores, dum nonnulli ipsam feminis substantiam, siue semen crassum, alii vero ipsius tantummodo spiritum siue auram sic dictam genitalem, quam alii vim plasticam, contagium & virus feminale vocant, ad ovuli imprægnationem concurrere, atque vel per tubas Fallopianas, vel per vasa sanguinea, mediante circulatione vel per uteri porositatem, ad ovaria deferri statuunt.

*Via seminis
ad ovarium.*

§. 2.

Ipsam semen ex utero ad tubas ascendere, defendit Regnerus de Graaf *de Mulier. Organ. cap. 14. Op. pag. 343. seq.* Tubæ, inquit, ita efformatæ sunt, ut masculinum semen in mulieribus, vaccis, ovibus, ac aliis (dummodo ad uteri cavitatem pertingat) admittere possint: illudque revera admittere, ipsa experientia confirmare videtur: Luculenter enim cum Harvæo ostendunt plures anatomici, in uteri cavitate post coitum, licet prolificum, per aliquot dies nihil deprehendi. Cum vero mulieres in coitu feminalem materiam evidenter excipiant; neque eandem, quando fecundæ fiunt, denuo rejiciant (uti vulgaris opinio est) necesse est, eam alicubi secedere: in uteri autem fundo nulli meatus siue receptacula sunt, quæ materiam adeo crassam, ut semen, recipere possint, præterquam tubarum foramina in uteri fundo hiantia: judicabunt itaque, virile semen has tubas subire; illudque liberius, cum Fallopius testetur, se, aliis fide dignis spectatoribus præsentibus, in meatibus illis sæpius exquisitissimum semen reperisse: simile quid cum

*Semen per
tubas ad ovaria ferri.*

ab aliis quoque observatum sit; petent, unde illud alias proveniret, quandoquidem a testibus non procedat, nec in tubis generetur. Semen crassum ex utero per tubas Fallopianas ad ovarium protrudi, statuit etiam Dionis *des Accouchem. lib. 1. cap. 10. p. 86.* inquiring: La verge de l' homme ayant été introduite dans le vagina & ayant ejaculé la semence contre l' orifice interne de la matrice, cette semence en est reçue & portée dans le fond de la matrice, d' où elle est poussée par le conduits des trompes aux ovaires, où frappant l' œuf, le premier dispose à être en maturité, elle le rend fécond, & l' oblige de se détacher de l' ovaire & de tomber dans le même canal de la trompe, qui le conduit dans le fond de la matrice & dont par la suite il en sort un enfant. Inquit etiam Casparus Bartholinus *de Ovar. Mulier. p. 31.* certum est, semen viri non manere in oviductu, sed sive totum, siue præcipua sui parte, intra sanguinem penetrare, juxta Peyeri epistolam, a Johanne de Muralto *Clav. Medic. Exercit. 9. p. 412.* communicatam tubæ tam in homine, quam brutis, semen virile ab utero ad ovarium siue testiculum transmittunt, indeque vicissim, velut remunerationis loco ovum fecundatum ex ovario in uterum remittunt. Sic etiam Christianus Johannes Langius *Oper. Tom. III. Disp. 38. fol. 509.* mas semen in testiculis e sanguinis flore secretum inque vesiculis seminalibus ad tempus usque coitus asservatum, una cum liquore prostatico, utero inspergit muliebri, dum nerveo suo bipalio arum illud fodit; in quo momento mira jucunditate perfunditur femina venereo cœstro jam flagrans; ipsius namque veneranda loca turgida tum, ac vere inflata, arcte amplectendo tantorum gaudiorum autorem reciproca satisque amœna titillatione afficiunt non solum, sed semen quoque emissum avidè admodum excipiunt perque tubas Fallopianas ad ovaria mittunt, pro fecunditate unius aut plurium ovulorum inibi sub membranaceo tegmine latitantium. Semen virile per ductum Fallopiarum pertingere usque ad vesiculas seu ovula, statuit Johannes Dolæus *M. N. C. dec.*

I. An. 6. & 7. Obs. 131. p. 175. Juxta Greg. Theod. Barthold. *Oper. Part. I. p. 54.* penis vagina exceptus semen in uterum ejaculatur, quod protinus per tubas Fallopianas ad ovarium deferitur. Secundum Theodori Kerckring, *Anthropogen. Ichnogr. cap. 1. p. 2.* semen virile per tubas cæcas Fallopianas circumductum pervenit ad testes, & ibi cum ovo, eodem modo, ac in ceteris oviparis, mira quidem & hætenus non explicata, sed vera tamen ratione conjungitur, atque ovum ita foecundatum per vas ejaculatorium ad uterum transit, & intra spatium duorum vel trium dierum ad magnitudinem cereæ nigri majoris excrescit. De usu tubarum Fallopiandarum ita scribit Thomas Whartonus *Adenograph. cap. 33. p. 209.* certum esse arbitror, eas aliquid ab utero excipere. Observavimus nuper, in dissectione equæ gravidæ, tubas Fallopianas plurimis valvulis toto earum ductu muniri, ne quid seminalis materiæ per easdem versus uterum, aut in ejus cavitatem deferatur. Verum e cavitare uteri in tubas foramen stylum admittens cernebatur. Videntur ergo vasa hæc ita constructa esse, ut potius e cavitare uteri aliquid excipiant, quam quicquam in eandem effundant. Verisimile est has tubas in coitu sufficientem portionem seminis virilis ad conceptionem imbibere &c. Locus autem Gabrielis Fallopii, quo se in præsentia plurimorum fide dignorum spectatorum sæpius in tubis semen exquisitissimum deperisse ait, extat in ejusdem observationibus anatomicis *Oper. Tom. I. fol. m. 421.* Immo semen vel liquorem album seminalem quandoque in tubis gravidarum deprehendi, testatur Fridericus Ruyschius *Thesaur. anat. VI. p. 15.* inquiens: Vocatus ad mulieris cujusdam, quæ, a marito in adulterio deprehensa, occisa est, cadaveris apertionem, reperi uterum aliquanto esse tumidiorem, itaque suspicabar, illam concepisse, eoque aperto inveni ejus substantiam esse crassiolem; cavitas autem referta erat semine albo & bene cocto, aut saltem substantia, quæ semini virili, ad colorem & visum, similis erat, utraque tuba eodem liquore referta erat; cum tubas non nihil premerem, semen libere effluebat. Cum jam consideramus, pergit Ruyschius, mulieres affir-

mare, sese (si non semper, saltem ut plurimum) factas esse gravidas, aut concepisse, cum sentiunt semen maxima parte remansisse in utero, & contra in coitu improlifico semen exitum sibi quærere, percipiant: Quid hinc aliud concludendum, quam quod non solum aura feminalis, verum etiam substantia ipsa ad conceptionem sit necessaria. Dixerit forsan aliquis, reperiri mulieres, quæ dicunt, se concepisse, quamvis semen non retinuerint. Resp. credibile est, illas saltem tantum retinuisse feminis, quantum requirebatur ad conceptionem prolificam. Hoc ego contendo, auram feminalem haud sufficere, sed necesse esse, semen ipsum uterum intrare in coitu prolifico. Idem etiam observavit Ruyschius in meretricis, mox a coitu interfectæ, corpore. vid. *Exercit. subseciv. Francof. Tom. I. Sect. I p. 11. §. 3.*

§. 3.

*Dubium
contra se-
men in tu-
bis.*

Utrum vero materia albicans, semini virili non dissimilis, semper verum semen sit, dubium adhuc, cum eiusmodi liquor etiam in non gravidis reperiatur, siquidem Johannes Mauricius Hoffmannus *M. N. C. Dec. II. An. 9. Obs. 224. p. 412.* cadaveris feminei meminit, cuius tubæ Fallopiianæ siue oviductus extremitates suas foliaceas seu fimbriatas oculis usurpandas permittebant, intra canalem vero suum tortuosum humorem complectebantur album, crassum turbidumque, cui prorsus analogum uteri aperti cavitas absque ovulo, privata industria, etsi studiose perquisito, retinebat. Uterum cum testiculis & vasis deferentibus materia feminali corrupta, quæ caseo recenter coagulato haud absimilis fuit, tumidum in cadavere feminae passione hysterica extincta observavit Zacharias Mangetta. *Vid. M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 32. p. 107.* Hoc dubium etiam movet Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 14.* materia illa, inquit, in tubis post coitum reperiata, quam Graafius pro semine masculino venditat, illis etiam femellis, quæ non coierunt, inexistit, haud infallibiliter genitura masculina extrinsecus adveniens pronunciari potest: potissimum cum

cum ipsum Graafium hypotheseos suæ oblitum *Cap. 13.* offendamus, dum humorem a femine alienum tubas dictas interdum oblinire ait &c. Imo ipse Fallopius *l. a.* verbis antedaneis ait, se, quæ de tubarum conformatione & usu scriberet, in virginum & mulierum, illarum pariter, quæ coierunt & non coierunt, cadaveribus observasse; & juxta Nicol. Venett. *de la generation Part. III. p. 425.* ces vaisseaux sont presque toujours pleins de semence. Imo Gallus quidam nomine Gofey, materiam viri feminalem pro generatione foetus uterum plane non ingredi statuit. vid. Daniel Hoffmann. *de generat. p. 61. seq.*

§. 4.

Ex his & aliis rationibus (v.g. quia tubarum foramina in utero nimis sunt angusta, adeo ut nullus fere flatus penetret, ideoque etiam a veteribus pro cæcis habitæ fuerint, item, quia talia foramina circa latera fundi uteri existunt, ut adeo semen nullo impulsu directe ad tubas propellatur, imo motus tubarum peristalticus non ab utero ad fimbrias, sed ab his ad illum tendat) alii Autores semen virile non ratione crassæ materiæ, sed potius ratione spiritus sive auræ genitalis ad ovarium penetrare defendunt, talemque auram pariter vel per easdem tubas ex utero ad ovarium adscendere, vel per porosam uteri substantiam, vel per vasa sanguinea ovulis communicari statuunt. De his viis Christianus Fridericus Garmanus ad Johannem Matthiam Nesterum ita scribit: Viæ, per quas ova e testiculis ad uterum tendant, in Democriti adhuc latent puteo. Sed & hæ tandem quorundam oculatorum exercitatorum non effugient industriam. Sufficiant tubæ Fallopianæ, per quas semen prolificum ascendere ad testes coniecturamur; via angusta & invia quidem, vera tamen forsan, si corpus vivum cum mortuo componamus. v. Chr. Fr. Garmann. *Epistol. 100. p. 434.* Absque dubio autem per semen prolificum hoc loco intelligit primario partem subtilem & spirituosam, quæ crasse ipsius materiæ vim intrinsecam, *ἐνεργίαν* atque virtutem confert, v. Spermatolog. nostr.

Cap. 1. §. 13. seq. p. 14. Quod confirmat etiam Franciscus Zypæus *Fundam. Medicin. Part. II. cap. 3. Art. 6. §. 10. p. 80.* his verbis: Ad generationem, quæ fit per ovorum in muliere fœcundationem, non requiritur tam feminis copia, quam spirituositas. Et §. 13. pergit idem: Mulieres habent semen prolificum, si per illud ova intelligas, quorum ipsarum pleni sunt testiculi, & quæ ab aura feminali viri fœcundata & expansa ex alveolis suis seu calicibus, quibus magna parte continentur, erumpunt, ut in tubas Fallopianas, exinde in cavitatem uteri descendant. Item *Art. 15. §. 3. p. 229. seq.* inquit idem Autor: fit generatio hoc modo: Injicitur semen virile in vaginam uteri, ex illo motu quodam peristaltico elevatur aura quædam seu spiritus feminalis, qui per osculum uteri interius, uteri fundum, inde tubas Fallopianas, mulierum testiculos, ovaria potius dixero, involat. Tubæ enim, quando sale volatili & acris feminis irritantur & spiritibus plurimum inflantur, osculo suo excretorio fimbrias erigendo ovaria amplectuntur, & spiritum feminalem sua constrictione vermiculari per foramen testis involucri, quod naturaliter inest, in externam ovorum membranam per poros ejaculantur, quo humor in tubulis ovorum contentus exagitur & rarefcit, in qua agitatione consistit conceptio. Et *p. 231.* pergit idem: generari nos ex virilis feminis aura feminali, & non ex crassiore semine, probat superfœtatio seu nova conceptio in jam gravidis, nam talibus uteri osculum arcte clauditur, ut non possit, nisi spirituosum quid transire. Item juxta *p. 232.* exinde probatur, quod aliqui generent, qui ob penis brevitatem vel debilitatem nunquam semen in uteri fundum projiciunt, quod certe non fieret, nisi ex ejus aura solummodo generatio fieret.

§. 5.

*Spirituosæ
particulæ.*

Spirituosiores feminis masculini particulas a crassioribus moleculis, post liquoris genitalis mulierum admiscelam præcipitatis, ad ovarium elevari, per hujus aut membranarum poros aut cuniculorum aëreorum, a Bellino detectorum oscula patentia introrsum

sum ferri ac unum plerumque, rarius vero plura ovula foecundari, autumat Franciscus Maria Nigrifoli. vid. Act. Erudit. An. 1714. mens. Novembr. p. 522. Ad quaestionem, qua ratione genitura maris & ovum feminae constituat semen perfectum? respondet Michael Ettmüllerus *Institut. medic. cap. 22. oper. Tom. I. fol. m. 162.* in viviparis sub coitu foecundo in ardore venereo, vti genitura maris cum impetu irruens spiritibus animalibus turgēt, ita in mulieribus spiritus animales, affluendo ad testes, membranas eorum pungunt, & quoque liquori in istis contento se immiscent, unde spumescunt, & cum magna voluptate foras prorumpunt, sub qua actione ovulum genitura maris impraegnatum, verum dat conceptum. Et *cap. 23. fol. 166.* ita pergit: Ex modernorum experimentis anatomico-physiologicis notum est, quod, dum legitime copulantur mas & femina, iste emittat suam genituram, sub feminis nomine cognitam; haec vero ex testibus excludit ova. Illius ergo genitalis spiritus amico afflatu in ovario se insinuat ovulo muliebri, in eoque, ceu receptaculo appropriato, spiritui genitali concentrato feminae se sociat, ita ut ex utriusque copula & unione mutua fiat conceptio, hoc est, utriusque sexus feminalis virtutis, in spiritu genitali fundatae, in ovulo facta associatio ad foetificationem requiritur. Per oviductum, quem Fallopius tubam appellat, feminis virilis in uterum ejaculati partem subtiliorem (quam auram feminalem vocamus) ad testes & ova in illis contenta pervenire posse, statuit Regnerus de Graaf *de Mulier. Organ. p. 322. & p. 346.* dicit idem, necessarium non esse, quod semen ipsum ad uterum aut tubas ascendat; Sed sufficere, quod feminalis aura ad ova pertingat; ita ut necessario pro ovorum foecundatione ad auram feminalem recurrere debeamus. Porro Johannes Jacobus Harderus inquit, liquoris genitalis partem spirituosissimam, maximeque subtilem (spiritum plasticum alii dicunt) de relicta parte minus subtili, quaeque quasi vehiculi vices supplevisse potest, in ovum se insinuare, inque hoc postmodum totam foetus delineationem moliri. vid. Pæon. & Pythagor. *Exercitat. 19. p. 110.*

§. 6.

Spiritus genitalis.

Non crassam feminis substantiam, sed solam spirituosiorem, conceptioni inservire defendit Daniel Sauvry, illorumque sententiam refutat, qui spiritum seminalem in tubas & ova non agere affirmant, antequam sanguini permixtus per circulationem eo deferatur, utut hujusmodi hypotheseos patroni per eam optime explicari posse, varia feminarum concipientium symptomata, contendunt. Ipse autem Sauvry asserit, per tubas ad ovaria non per effumationem, sed infiltrationem, in uteri ac tubarum membranas deferri semen. Utut vero neget, per circulationem sanguinis ad ovarium delatum spiritum seminalem ovo foecundando sufficere, non tamen ideo negat, quandam ejus partem sanguini permisceri posse. *vid. Act. Erudit. Lips. An. 1706. mens. Novembr. p. 257.* De generatione Isbrandus de Diemberbroec *Anatom. Lib. I. cap. 29. fol. 176.* ita scribit: Semen virile ab utero comprehensum rorido uteri calore fovetur, alteratur & colliquatur, sicque ejus particulis crassioribus & magis fixis a firmiore cohaesione seu nexu dissolutis, particulae spirituosae maximeque mobiles, quae in istis crassioribus veluti sopitae & incarceratae latuerant, ab iis liberatae mox per tubas uterinas ad ovaria tendunt, ut in iis ova, quae ad sufficientem maturitatem pervenerunt, ingrediantur (per membranularum enim ea cingentium poros facile transeunt, ut notum est in avium ovis) & illa foecundent, in quibus in exili bulla concurrunt & instar tenuissimi pellucidi ac crySTALLINI liquoris, in ovo ad uterum delato apparent. In hac sola bulla totius foetus formatio perficitur. In ea enim tenui & spirituosae feminis parte vis architectonica latet, quae per uterini caloris fotum, cum suo subiecto, cui inhæret, scilicet tenuissimo ac spirituosissimo illo feminis liquore, a massa crassiore liberata, mox prorumpit in actum; nam libera esse non potest, quin agat, & liberari nequit, nisi a causa externa, nimirum uteri calore, tota feminis virilis massa coitu ejecta in cavitate uteri dissolvatur ac colliquetur, sicque ex ea separata spirituosae seu germinosae pars

tu-

tubas ad ovaria, in iisque contenta natura ova deferatur, & ovis jam inclusa rursus cum iis ad uterum redeat. Porro ova ista, quæ jam in virginibus ante conceptionem, licet adhuc infœcunda, præsto sunt, a semine virili, ejusque potissimum spirituosius ac igneis exhalationibus, per uteri tubas ad ovarium surgentibus, vitalitatis ac fœcunditatis radiis imprægnari, statuit Johannes Conradus Peyerus. Vid. Joh. de Muralt. *Vademec. Exercit. 9. p. 402.* quam sententiam etiam fovet ipse Johannes Muraltus *de Art. Obstetric. p. 62.* Juxta Petr. Linsing. *Instit. med. p. 86. seq.* fit conceptio per intimam spiritus maris genitalis associationem cum ovulo muliebri & in hoc concentrato spiritui pariter genitali, dum scilicet semen maris ad vel in cervicem uteri effusum suo spiritu uterum fœcundat, & sic per unum alterumve porum, vel potius tubam inde dilatatam ruit in ovarium, ibidemque ovulum hoc vel illud penetrat concentratoque ibi spiritui se jungit, totumque actuat, ut colliquamentum jamjam resolvi incipiat, & membranas ovuli dilatet: turgescens hoc ovulum in cavitate illa contineri amplius nequit, & sic ab ovario separatur, & a tuba ibi per ligamentum suum irritatum jam ante attracta excipitur inque uterum serius vel citius deferitur. Et Johannes Bartholomæus Adamus Beringer. *Idea Institut. Thes. 15 p. 37.* conjecturatur, genituræ maris in uterum susceptæ partem spirituosiore, spiritum genitalem, sive auram seminalem nuncupatam, ovulum in proportionem pororum maturum fœcundare, motulum intestinum ei introducendo, quo stamina tenellula modice & paulatim extendantur, & ad auctorem successive suscipiendam disponantur; partem vero ejus crassiore vel uterum ipsum fœcundare, vel ut vehiculum ab usum foris eliminari. Johanni Friderico Ortlobio *Oecon. anim. Dissert. 35. §. 14. p. 279.* probabilissima videtur sententia, subtilem portionem per tubas Fallopianas testibus adduci, quæ licet in demortuis flaccidæ & extremitatibus ab ovariis remotæ pendeant, in œstro tamen ve-

ne-

nereo percitis turgescerent erigantur, & testiculum amplexæ auræ feminali accessum faciant, ovuloque dein excipiendo & ad uterum deportando inserviant. Christianus Johannes Langius *Oper. Tom. III. Disput. 41. fol. 542.* ita sentit: Simul ac maris cum femina congressus finitur, & semen virile fœcundum utero femineo feliciter est inspersum, subtilior ac nobilissima ejus portio, quæ aura vel spiritus genitalis aut plasticus vocatur, liberata a compedibus viscidiis, quibus antea detinebatur, pergit per tubas Fallopianas ad ovaria muliebria, inibique afflatu suo vel, si mavis, irradiatione fœcundat in momento ovulum unum vel plura, non aliter (si crasso aliquo exemplo rem illustrare licet) quam scintilla e chalybe, pyritæ beneficio excussa, statim ac fomitem attingit, suam igneam virtutem simul imprimit ac communicat eidem. Et Johannes Muraltus in *Anatomisch. Colleg. Lect. II. p. m. 183* inquit: *ich glaube, daß der Saamens-Geist des Mannes die Eyer mit seinen astralischen und feurigen Strahlen oder Ausdämpffungen, die durch die Trommeten heraufsteigen zum Eyerstock, selbigen mit Leben und Fruchtbarkeit anfülle.* Juxta Andr. Ottomar. Goëlicke *Medicin. Forens. Specim. I. §. 4. p. 12.* generosior ac magis elastica feminis masculini pars, imo fortassis etiam gelatinoso-lymphatica ejusdem portio, mox ascendit per oviductus seu tubas Fallopianas. Sic Petrus Dionis *Anatom. Demonstr. IV. p. 226. seq.* Conceptionis modum ita describit: Seminis virilis portio maxime volatilis a tubis ad ovarium usque transfluit ad ova fœcundanda. Seminalis hicce spiritus tubas pervadere non potest, quin motum ipsis imprimat. Hinc fit, ut lacrum frustum ovarium undiquaque amplexum veniat, adeo ut ovum, quod seminis spiritus fermentarunt, sensim ab ovario exsolvatur, membranam dirumpendo, ut tubam subeat tandemque in uterum descendat. Ovum binis membranis obductum est, quæ primis temporibus vasis tenuissimis perspersæ sunt, quæ autem deinceps semper augentur, ex quo radices ovum in utero egit, placenta vero incipit crassescere succumque recipere alimentitium, quem

quem, ad eum deferunt uteri vasa. Et ita singulæ foetus partes crescunt ope alimenti, quod per funiculum recipit; cum autem paulo major evaserit, per os insuper nutrietur ex illo lacteo succo, qui in amnio reperitur. Idem Dionis dans le traité *des Accouchemens Lib. I. cap. 2. p. m. 35.* de ovuli imprægnatione ita scribit: le sentiment le plus probable sur l'usage des trompes est, que la partie la plus volatile de la semence de l'homme passe des trompes jusqu'à l'ovaire pour rendre les œufs feconds. Cet esprit animal ne sauroit pénétrer les trompes sans en irriter & mettre en mouvement les fibres charnuës, qui par leur contraction font, que le morceau déchiré vient embrasser l'ovaire de tous côtez, de maniere, que l'œuf, que les esprits de la semence ont fermenté, se detache insensiblement, & rompt ou écarte les fibres de la membrane, qui enveloppe l'ovaire pour entrer dans la trompe, & delà descendre dans la matrice. Et secundum Mich. Ettmüller. *Oper. Tom. II. fol. 1073.* sufficit ad conceptionem saltem spiritus genitalis maris, modo extra aerem externum possit venire in vaginam uteri. Inquit etiam Christianus Warlizius de *morbis biblicis cap. 12. p. 385.* Partes feminis crassiores juxta Antonium Everardum, nihil conferunt ad generationem, sed spiritus in femine contenti unica efformationis causa existunt, quod demonstratur in his animalibus, quibus penis non concessus, ubi saltem affricatio fit pudendorum & collisio eorumdem orificiorum utrinque. Johannes Jacobus Waldschmied *Institut. Medicin. ration. Lib. I. cap. 4. p. 33.* statuit, semen ab utroque sexu emitti, hoc tamen cum discrimine, quod spiritus genitalis maris rationem habeat actoris, feminæ vero semen modificatoris. Si enim ovarium muliebre aura seminali viri imprægnetur ipsis ovis ibidem sub forma vesiculæ vel spherulæ seminalis delitescantibus, foecunditas conciliatur, ut unum vel alterum turgescere & tandem ad uterum devolvi incipiat. Conceptionem ita describit Hermannus Fridericus Teichmeyerus *Instit. medic. forens. Cap.*

VIII. Qv. 3. p. 51. cum homo hominem generat aura feminalis, in patris femine delitescens, ovulum maternum irradiat, idque vel in ovario antiquo, vel novo, h. e. in ipso utero constitutum, eoque momento conceptio contingit, atque ab aura feminali plastica, vel elastica motus instituitur, vitæque principium nascitur. Secundum verba Joannis Munnicks *Anatom. p. 71.* spirituosam injecti in uterum virilis feminis auram fuscipiunt tubæ, & in ovarium deducunt, ut contenta in eo ovula irrorentur. Crassamentum feminis per tubas ad ovarium ascendere, moderni non statuunt, sed solum miasma feminis subtile, ac spiritum quasi genitalem eo penetrare supponunt nonnulli per hanc viam tubarum, aliis alias vias allegantibus, annotante Daniele Hoffmanno *ad Hypothes. Goveyan. p. 63.* Et Christianus Johannes Langius *Physiolog. 38. Tom. I. fol. 228.* inquit: cum visciditas & glutinositas feminis virilis non videatur apta ad tam celerem transitum per tubæ cavitatem, verosimile videtur, tantum subtiliorem ac spirituosam ejus portionem illuc ferri, quæ vi suæ activitatis facillime se liberans a compedibus hujus visciditatis afflatu solo, aut si mavis, irradiatione foecundat ovulum, non aliter ac scintilla e chalybe ope pyritis excussa ignem excitat in momento, dum fomitem attingit.

S. 7.

Vermiculos per tubas ascendere.

Denique qui conceptionem vermicularem defendunt, ex semine virili certum fermentum cum vermiculis per tubas ad ovaria ascendere statuunt. v. Louis Bellefontaine *de la Medec. dogmat. Exerc. 20. p. 82.* ubi inquit: La semence virile est jettée dans le vagin de la matrice, & par un certain mouvement peristaltique de cette partie, elle est conduite dans la cavité de l' uterus. Cependant il s' eleve de cette semence un certain ferment avec les petits vermisseaux, qu'elle contient aux trompes de Fallope, & par la aux ovaires. Lorsque les trompes sont irritées par les fels volatiles de la semence, il y afflue beaucoup d'esprits animaux par les nerfs, à l' occasion de quoi elles dilatent leur conduit,

duit, principalement l' extrémité, qui touche l' ovaire, appelée fimbria, en sorte qu'elles embrassent l' ovaire par la plus grande partie, & le ferment seminal avec les petits animaux entrent à l' aide d' un certain mouvement vermiculaire dans les œufs par un pore, qui est dans leur envelope &c.

§. 8.

Sicuti autem illorum sententia, qui viri semen materialiter ad ^{alii negant.} tubas & ovaria ascendere, & ovula foecundare dicunt, ab aliis in dubium vocatur; ita etiam spiritum sive auram genitalem per tubas ad ovaria abire nonnulli negant, & quidem 1) quia in cuniculis tubæ tertio demum a coitu die testiculos amplectantur, cum tamen paulo post coitum, v. g. hora dimidia secunda & sexta, testiculorum ova jamjam immutata & pluribus sanguineis vasis turgida conspiciantur; 2) quia tubæ testiculis citius non applicentur, nisi cum ovum sit excipiendum; 3) quia valvula obstat intra tubas, impediens, quo minus ex utero quicquam ad oviductus deferatur. 4) Huc facit etiam observatio de cane gravida, cujus foetus in visceribus adhuc hærentes a percussione vehementi moriebantur & tempore in tabum abibant, a quo cornua uteri infarcta fuerant. Quo non obstante eadem canis denuo imprægnabatur, ante partum tamen moriebatur, inque ejusdem dissecto cadavere posteriores catuli abdomini inhærentes cernebantur. Unde concludere licet, auram genitalem per uteri cornua a putridis catulis obstructa minime ad ovaria penetrare potuisse. vid. Joh. Bohn. *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 15.* Casp. Bartholin. *de Ovar. mulier. p. 33.* Christ. Joh. Lang. *Oper. Tom. I. fol. 229.* (qui autor tamen f. 233. his rationibus contradicit,) Carolus Drelincurtius *de Concept. advers. p. 63.* quærit: quo pacto masculinum semen genitiva virtute prægnans per tot mucosos tubarum flexus ad femineum ovarium adiret? Spiritus enim suos in itinere profunderet, nam ubique mucosis tubarum illis tot anfractibus ipsos demergi necessum est.

est. Spiritus ergo genitales nulli sufficientes unquam in ovarium foecundandum evehantur.

§. 9.

*Per vasa
sanguinea*

Alii feminis virilis potius mediante sanguinis circulatione per vasa uteri sanguinea ad ovarium delatum ibidem efficaciam suam exferere judicant; Inquit scilicet Casp. Bartholinus *l. a. p. 31. seq.* certum est, semen viri non manere in oviductu, sed sive totum, sive præcipua sui parte, intra sanguinem penetrare, id quod constat & per Haræi experimenta, nihil in utero reperientis, & communi experimento fere omnium mulierum percipientium illico a conceptione symptomata universalia non aliunde oriunda, nisi a mutata proportionem humorum in fluido universali seu sanguine. Nimirum quemadmodum vires medicamentorum externe adhibitorum sanguini communicari videmus, ita & possibile credidi, assumptorum subtiliorem partem in toto alimentorum ductu statim sanguini communicari, cum idem de spiritibus ad refocillandas vires in ore assumptis experiamur, & clysteribus nutrientibus, atq; mercurialibus exterius illinitis sua vis a plerisque non denegetur. Eodem principio inductus credidi, imprægnationem similiter fieri per subtiliorem feminis partem, sanguini statim eodem modo communicatam per vasa sanguinea. Idem Bartholinus etiam *Specim. Histor. anat. cap. 5. p. 86.* scribit: foecundatio seu conceptio a subtiliore feminis virilis parte ad ovarium delata, non quidem per tubas uteri, sed potius per vasa uteri sanguinea, quæ pars subtilior feminis in utero communicatur sanguini, forte haud abfimili modo, ac videmus vires medicamentorum, quæ externe adhibentur, & eorum etiam, quæ intus assumpta sunt, subtiliorem partem in toto alimentorum ductu statim in sanguinem transire. Sanguis autem, hac vi feminali imbutus, ad ovarium lege circulationis perveniens, ovorum vel unum vel plura eo modo alterat, ut foecunda fiant. Juxta Nicolai Stenonis opinionem feminis viri pars subtilior vasis sanguineis uteri, imo & generi nervoso communi-

municatur, & per totum corpus prius circulata ad ovaria tandem defertur. v. Chr. Joh. Lang. *l. a.*

10.

Contra hunc tamen seminis virilis per vasa sanguinea ad ovarium progressum alii militant autores, v.g. Georgius Wolffgangus Wedelius *Physiol. Sect. III. cap. 28. p. 201.* communia, inquit, si eligamus vasa venosa, ita ut foecundum illud virus, praeterveclum quasi locum debitum per ambages illuc tendat, prius ad cor delatum, hinc ad partes reliquas tandemque ad uterum redeat, nimis illud remotum & longius quaesitum est. Quis enim fidem dabit, vel alias non esse vias, vel non alterari illam vim πλαστικὴν in minimo consistentem, tot viscerum culinis, tot congrassationibus, vel huc illam appellere, nec alicubi in via haerere, vel remanere seu perdi, seu ibi foetum locare? Et utut quam maxime concedendum sit, alterari a conceptu sanguinem, nihilominus tamen inde nondum certum satis argumentum peti potest, illum primario & primitus quasi suscipere deportandum hunc thesaurum, haec elementa hominis. Sic Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 15.* scribit illorum amplecterer sententiam, qui cum in animalium, post coitum apertorum nec uteris, nec horum antennis semen cernerent, hoc, aut ejus auram spirituosiore, interveniente uteri substantia a venis & massa sanguinea abforberi, hujusque demum fermentatione peculiari ovula feminea incompleta actuari & foecundari asserunt, pari circiter modo, ac medicamentorum sive topicorum, sive haustorum, item alimentorum, primis viis adhuc inexistentium partes energeticas immediate magis implicari, constet: nisi me ab hac diverteret, per hanc commiscelam necessario aut sanguinis massae ingenti tantillum seminis plane & ita demergi, vt ab hac praeter modum discontinuatum ac dilutum omnem in ovula energiam perdat, aut illum a fermentativis hujus particulis in motus efferos & individuo exitiosos cieri: Johannes Fridericus Ortlob *Histor. Part. Dissert. 35. §. 14.*

Alii negant.

p.279 ait; quidam activam feminis masculini portionem a vagina per sanguinea vasa absorptam testibus adduci autumant, cum tamen hoc circulationis legi & vasorum distributioni repugnet, quoniam secundum illam per venas minores non ad partes, sed ab illis ad truncos majores confluit, secundum hanc testes præcipue vasa præparantia, vagina & uterus hypogastrica suscipiunt. Francisco Zypæo *Fundam. medic. cap. 7. Art. 15. p. 230.* ex hac hypothese difficile videtur, quomodo non omnia simul ova foecundentur, cum sanguis materia feminali intime commixtus in arteriis spermaticis feratur ad singula ova, in quæ dicta vasa penitus insinuant & perreptant. Et juxta Christ. Joh. Lang. *Physiol. Th. 38. fol. 233.* non caret difficultatibus, iisque haud exiguis, hoc dogma, propter viæ prolixitatem. Etenim cum venæ uterinæ non connectantur cum testibus, sed revehant sanguinem ad venas crurales, postmodum ad cavam & cor, ex quo, ope systoles æque cito ad caput trudi potest portiuncula illa spirituoſa, ac forſan fertur ad arterias spermaticas. Quodſi dicant, infici ab hac ſubſtantia totam maſſam ſanguineam, adeoque præteriri ovaria non poſſe: Reſpondeo, hanc infectionem minime ſine deſtructione aliqualis energiæ feminis concipi poſſe. &c.

§. II.

Per poroſi-
tatem uteri.

Tertio adhuc alii feminis virilis ſpiritum genitalem per breviores vias, nimirum per poroſitatem uteri, vim ſuam ovalis in ovario communicare, differenter tamen judicant, putat enim Theodorus Craan *de Homin. cap. 162. p. 710.* ſpiritum feminis masculini penetrare intra uteri cavum, & ſic ingredi poros ipſius fungoſæ ſubſtantiæ uteri, humoribus illac circulantibus admifceri, eosque alterare, & ſic ſanguinis maſſam cum tempore ingredi, illicque alterationem inſtituere. Deinde aliquam hujus ſpiritus partem ire per ductus Fallopianos, cujus tunicam penetrat, & ſic ad testes & ovaria devenit, ibique ovum foecundat, & tunc facta eſt conceptio; Si autem non penetrat hanc membranam, tunc conceptus non fiet. Johannes Bohnius *l. a.* priores vias per tubas & vasa ſanguinea ideo in dubium vocat, cum breviori tractu fieri

fieri poterat penetrantissimæ hujus, & instar fulguris cuncta per-
rumpentis substantiæ translatio, scilicet per porositates & spongi-
osam uteri hujusque appendicum quarumvis testiculis continua-
rum substantiam; hæc enim est, quæ a spiritu hoc genitali infuso
mox turgescit & sensibilibiter fatis ad testiculum usque alteratur.
Imo ab hujus trajectu sine dubio contingit, flaccidas & languentes
hactenus tubas tendi & ad ovarium pro excipiendo ovulo deciduo
exporrigi. Sic juxta Joh. Jac. Franc. Vicar. *Bas. univ. Medicin. Lib. I.
cap. 3. p. 30. seq.* dum genitura virilis aura prolifica uteri porosam
substantiam in generationis actu pervadit, ovum muliebri in
ipso ovario ab illa quasi accenditur & sic fœcundatur: Juxta Jo-
hannem Alphonsum Borellum breviori via activa hæc substantia
ex utero abit ad ovaria, nempe immediate per poros ejus. Sunt
enim tam uterus, quam testes, corpora summe spongiosa, cumque
proxime adstent ovaria utero, facili negotio penetrans hæc aura
afflare potest ovula, non aliter ac alias videmus medicamenta vo-
latilia exterioribus applicata penetrare ad interiora. vid. Christ.
Joh. Lang. *Op. Tom. I. fol. 230.* Hanc sententiam quoque defen-
dit Georgius Wolffgangus Wedelius *Physiolog. Sect. III. cap. 28. p.
202. seq.* præsupponendo 1) in fœcunde coeuntibus omnia hiare,
poros magis patulos esse ab affricu, succussatione, calore, affluxu
longiori spirituum. 2) Conceptionem non contingere, nisi men-
ses præcesserint. 3) Uterum copiosis gaudere glandulis ipsosque
adeo testes seu ovaria. 4) Locis tenerioribus glandosis & porosi-
oribus applicata citius penetrare & cum corpore communicari
exterius plura, v. g. inunctio mercurialis sub axillis, in articulis &c.
ubi pori ipsi cutis (qui tamen minus longe hiant, quam uterini in
coitu) recipiunt in se & mediantibus glandulis cutaneis cum san-
guine jungunt effluvia. Unde concludit Wedelius, in fœcundo
coitu affricari seminale virus ipsius uteri vaginæ extremis parieti-
bus, seu anticameræ quasi uteri ipsius ac orificio interno, haurire
poros apertos patulosque & turgidos spirituosum illud seminis

contagium, quod in minimo quasi consistit, ipsam exhalationem, ipsa effluvia salina vitalia, alterari inde lympham & secum ad testes muliebres deferre novam ideam, informare ovulum & virtute plastica imbuere. Viarum hunc ambitum autem quod spectat, putat Wedelius, sufficere posse illud commercium pororum & vasorum lymphaticorum cum glandulis, quod indubitatum est, licet ob subtilitatem & subsidentiam pororum in cadaveribus non æque possint videri, nihilominus tamen credibile esse, inspirationem & communicationem hanc fieri infra tubarum exortum &c.

§. 12.

Negatur.

Quamvis autem hæc hypothesis satis probabilis sit, nihilominus tamen Christiano Johanni Langio *l. a. fol. 234.* pariter in summo discrimine videtur versari spirituosæ hæc substantia poros uteri permeans. Quid enim, quæso, inquit Langius, determinat aut cogit illam, ut ad ovaria præcise abeat, non ad alia viscera abdominis? Nec quicquam juvat, proxime omnium adstare ovaria, reliquis visceribus nimis remotis. Quodsi enim tanta inest energia huic principio, ut uteri poros sine ullo impedimento permeare possit, metuendum erit, ne ulterius adhuc per musculos abdominis reliquaque integumenta penetratura sit. Sequenti modo conceptionem describit Petrus Stalpart van der Wiel *Exercit. de Nutrit. Fœtus §. 2. p. 5.* Mutuo congressu mare fermentum genitale æstu venereo cum impetu in uteri vaginam ejaculante, subtilior ejus portio qua data via, abit, partim scilicet cum vasorum sanguiniferorum, copiose tortuoso ductu vaginæ inferiorum, tum lymphæducum poros ingreditur, partim internum uteri orificium penetrat, quod plerumque exacte clausum dicitur in non gravidis, verum sufficienter coitus tempore aperitur titillatione virilis fermenti, quam ingens & copiosus spirituum in partes vicinas & præsertim uteri sequitur influxus, quo partes ejus diducuntur; illo namque uterus, tubulis brevioribus redditus, fit rotundior, unde & ejus osculum dehiscit, fermentumque virile arum genitale ingre-

greditur, quod simulac ingressum est, ulterius penetrat illius fungosæ substantiæ poros humoribusque illic circulantibus admiscetur, ac per vasa lymphatica cum sanguine venoso tandem ad cor deducitur, atque ita toti massæ sanguinæ, circulationibus tamen nonnullis intercedentibus, permiscetur. Massæ sanguinæ hoc fermento imprægnatæ necessario etiam portio quædam lege circulationis pervenit ad testes muliebres, ovaria dictos, & illuc delata intrat vasa per ova horum ovariorum disseminata, & tandem per poros illorum particulæ quædam hujus fermenti ovi ingrediuntur substantiam & fermentationem in ea excitant.

§. 13.

De tanto autem circa vias, per quas semen virile ejusve aura genitalis ex utero ad ovaria & ovula ascendat, autorum hætenus ad ducto dissensu, ut meam mentem explicem, ultima hæc sententia præ reliquis probabilis mihi videtur, neque per solas tubas, neque per sola vasa sanguinea, neque per solos uteri poros, hanc feminis virtutem prolificam immediate ad solum ovarium pertingere, sed in coitu fœcundo non modo testiculos, sed totam humorum massam totumque corpus a tali spiritu seminali certum quendam motum & alterationem experiri, a quo etiam unum vel alterum ovulum in ovariis, in quibus solis verum semen femineum & embryonis materia latitat, tunc temporis imprægnetur seu fœcundetur. In tota autem feminarum massa humorum, totoque corpore, a coitu fœcundo, alterationem oriri, fatentur non modo mulieres, huic rei attentæ, dum statim post ejusmodi fœcundam cohabitationem, licet etiam nihil liquoris excernant, debilitatas seu delassatas atque somnolentas se fatentur, verum etiam altero die ab aliis personis taliter constitutæ & quoad faciem omnesque ipsarum actiones penitus mutatæ seu alteratæ deprehenduntur. Hæc de conceptione in ovariis sufficiant.

§. 14.

Liceat tamen adhuc aliam de conceptione opinionem an-
F
necte. *Vis plastica.*

nectere; quamvis scilicet juxta plerosq; hætenus allegatos autores ad conceptionem feminis virilis tantum pars subtilissima vel spirituosæ, aliis aura seminalis, vel spiritus genialis dicta maximam conferat ἐνέργειαν, nonnulli tamen ex recentioribus aliud generationis principium formans defendunt. Inquit enim Michael Albert. *Introd. in univ. medic. Cap. 2. p. 29.* multi asseverarunt, quod vis plastica sit principium illud formans seu generans, in qua declaratione vero aperta hæret petitio principii. Hæc sententia circa explicationem principii formantis occupata varie mutata fuit. Inter alia defectum continet sententia de aura genitali, qualis partim supponitur, partim cum prædicatis ad negotium generationis spectantibus exornatur; sed quæ, cum in materiali tantum causa consistat & obscurum per æque obscurum contineat, haud supplet defectum desiderii in aliis sententiis. Proinde spiritus genitales ad figmenta & phantasias pertinent, quorum existentia nulla, & licet tales spiritus in rerum natura essent, ardua erit demonstratio, quod illi facultate formandi & generandi polleant. Tandem asserit dictus Autor *p. 31.* quod principium formans debeat esse rationale, quale in homine non aliud deprehendatur, nisi anima rationalis, cur capacitatem struendi & formandi corpus, in quo hæret & operatur, adscribit. Quam sententiam *l. a.* prolixius variis rationibus defendit, quarum examen atque censuram benevolo lectori committo: Bone Deus! quantum est, quod in hoc mysterio scimus?

CAPUT III.

De conceptionis loco.

§. I.

*Conceptio
in tubis
Fallopianis.*

QUIDAM autores, pariter in ovulis foetus materiam atque conceptionem quærentes, eadem in foecundo equidem coitu, in motum quendam, eque ovario secessum, atque per tubas Fallopianas ad uterum, progressum, impelli, minime vero statim in ovario,

rio, uti haftenus dictum, sed vel in tubis Fallopiianis, vel in ipso demum utero a feminis virilis adventu imprægnari statuunt. In genere enim de animalium conceptione scribit Jacobus de Sandris, *de natural. sanguin. stat. cap. 4. p. 150.* Ovum brevi claustro cujuslibet animantis lineamenta, stamina & rudimenta occludit, cum ad justam decreverit molem in mulieribus, ovarii fibris contractis intra uteri tubas, quæ item partium connexionem contracte aperiuntur, decedit. In congressu pars subtilis & spirituosâ masculei feminis per vaginam immissa a glutinoso & terebinthinoso humore Malpighianorum ductuum, ne avolet intercepta, detinetur, quæ ovulo descendentem occurrens, singulis circumjacentibus humoribus & vesiculis fecunditatem impertitur, (sicuti tota oviparorum in eorum fecundatione, substantia fecundatur) cum omnes ovulo adjacentes partes nomine mulierum ovi veniant &c. Ovum inquam fecundum maris semen, quod cum fermentum summe activum sit, partes in ovo contentas ad proprias & determinatas expansiones dirigit, & in motum non cito desitutum expurgiscitur. Et Nicolaus Venette *de la Generat. Part. III. cap. 4. Art. 6. p. m. 418.* de feminarum conceptione ita scribit: La femme n'a pas plu tost receu la matiere de l'homme par l'amoureuse alliance, qu'elle la presse de toutes parts pour la faire passer promptement dans l'un ou dans l'autre de ses vaisseaux ejaculatoires, afin que s'y melant avec la sienne, elle y cause la conception. C'est dans un de ces conduits, que les principes de nostre corps & de nostre ame s'unissent, & se meslent pour ne faire qu'un composé &c. De foetu extra uterum in medio tubæ concepto vid. *M. N. C. Dec. I. An. 6. & 7. Obs. 197. p. 292.* Sic Carolus Drelincurtius *de conception. adversar. Dogmat. 12. p. 59.* inquit: Virile semen in tubas assurgere & ovulum quandoque inibi fecundare, nusquam reclamo: Sed tunc embryonem in tubis procreari contendo. At istud profecto usque adeo insolens est, ut muliebrium ovorum hostis Diemerbrœckius id eventui reponat inter insom-

nia apocrypha. Idem autor etiam *de conceptu conceptus Perioch. 22. p. 22. seq.* quandoque ovuli in tubis imprægnationem fieri concedit his verbis: Mascula virtus est tanta, ut spiritu suo genitali fortiori atque generosiori impetum quandoque faciat in uteri prurientis ostia lateralia & sese in oviductus evehat. Exinde est certe, ut ovum inibi præoccupet, nec in uteri fundum prolabi permittat, sed obvium illud media in via, in oviductu scilicet, prole imprægnat, sibi haud minus, quam matri perniciosus. Illinc quippe, via ad partum nulla, misellus infans peccati nescius, peccati fit reus, dum cæde nefaria sese suamque matrem misere cruentat. An vero talismodi ovuli foecundatio in tubis, an vero in ovariis fiat, paulo infra de conceptu tubario videbimus.

§. 2.

*Conceptio
in utero.*

Alii conceptionem in ipsa uteri cavitate fieri, defendunt autores, nimirum juxta allegati Drelincurtii *Perioch. 21. p. 21. seq.* reputandum venit, ovum omne salubre, quod conjugio sorpsit uterus, quodque feminali spiritu masculo sufficienter imprægnatum est, foecundum semper atque prolificum esse. Etenim protinus ac uteri fundo ovum aliquod conjugio sorptum est, & nostrum insimul semen in idem fundum sumus ejaculati, totus præ libidinis æstro gestit uterus, totusque contrahitur atque conglobatur. Exinde est, ut feminis masculi virtus intemerata intra suum illud ovum tamdiu sponte sua fermentetur atque foecundetur, donec uterina vasa novo spirituum impulsu fermentum istud atque foecunditatem illam diutius atque plenius promoverint. *Perioch. 22 pag. 23. seq.* ait: Ex naturæ legibus masculum semen tunc demum in ovis fermentatur atque vivificatur, quum istæc ejus ova in matricis fundum provoluta atque propulsa sunt. Liquet igitur, ovum in matricem compulsus masculi duntaxat feminis ingressu prolificum fieri; idque ab Adamo creato ad novissimam usque diem tam irrevocabili lege, ut mortalium nemo sit aliter vel conceptus vel concipiendus unquam; nam in animali mortali istud
est

est immortale. Idem autor etiam *tr. de Conception. advers. p. 55.* ait: Ova vera non prius perfecta dicenda veniunt, quam in uterum propulsa masculo semine compleantur atque foecundentur. Ibi-
dem etiam dictus Drelincurtius & quidem *p. 61. seq.* contra conce-
ptionem in ovario sequentibus verbis militat: Quodsi femina-
rum ovula foecunditatem illam in ovario suo, tepido semper ac ir-
rigo, nanciscerentur, in illo certe foetus perinde conciperetur,
ac in ipsis earundem feminarum tubis, in quibus ovula earum non
modo foecundata atque fota, sed & in foetus novimestres evasisse
visa sunt. At in feminarum ovario id ipsum accidisse nulla con-
stat hominum memoria. Gratis ergo asseritur, in ovario femi-
narum ovula foecundari. Nam si genitalis spiritus ille paternus
ovula inibi afflaret atque virtute sua genitali perfunderet, nihil
prorsus obstaret, quin sicut in tubis, sufficienter ibi fota atque nu-
trita, in embryones tandem converterentur. At istud omnino
seculorum experientiae repugnat. Non ergo foecundantur ova
in feminarum ovario, etsi largiter inibi foveantur ac etiam ple-
nissime nutriantur. De ovuli in utero foecundatione ita scribit
Johannes Gothofridus Bergerus *de Natur. hum. Lib. II. cap. II. p. 463.*
In ovulo mulieris delitescit rudimentum futuri foetus, quod nul-
lo quidem fotu, nec suapte vi viget, sed cum recepto demum li-
quoris masculi elaterio vitam & germinationem inchoat. Cui
proinde fini tam sapienter omnia a Deo facta & ordinata sunt, ut
femina ovum maturum, & ad egressum paratum, gignat: mas ve-
ro liquorem praeparet & custodiat generosum & elasticum, &
complexu conjuncti venereo, femina praedicto modo ovum ex o-
vario promat, & per oviductum in uterum emittat, mas vero li-
quorem affundat, eoque totum intus uterum & hoc comprehen-
sum undique ovum conspergat & foecundet. Sic enim porro fit,
ut hujus pelliculas quaversum permeans vividior & elastica illius
portio seseque in totam diffundens crySTALLINAM lympham; eadem
contenti quiescentis adhuc germinis torpens veluti liquidum ex-

solvat, & cuncta ejus tenerrima flamina excitet, ac vitæ choream inchoet. Statuit etiam Johannes Bartholomæus Adamus Beringer *Id. Institut. medicin. Thes. 15. p. 37.* ovula muliebria non humorem aliquem feminalem ex se in uteri cavitatem depluere, sed integra duabus circumdata membranulis decidere & in uterum deponi, in quibus jam prima totius corporis flamina sint jacta; deinde arbitratur, genituræ maris in uterum susceptæ partem spirituosiores ovulum in proportionem pororum maturum fœcundare, motulum intestinum ei introducendo, quo flamina tenellula modice & paulatim extendantur, & ad auctiorem successive suscipiendam disponantur, partem vero ejus crassiorem vel uterum ipsum fœcundare, vel ut vehiculum ab usum foris eliminari. Et juxta sententiam cujusdam medici, nomine Gofey, in momento illo, quo liquor seminalis masculi prodit, contingitque uterum, ovaria graviter percelluntur moventurque, atque tunc temporis etiam a tubis quasi fuguntur, ut ovula in canales illos dimittant, atque mediante eorum motu peristaltico eadem celeritate in uterum deferantur, qua ex ovariis egressa sunt, specie nempe aliqua ejaculationis, ut eo momento ibi reperiantur, quo materia seminalis in orificium uteri internum totamque vicinam uteri superficiem effunditur. Ovula enim fœcundari nequeunt, nisi prius in ipsam matricis cavitatem fuerint promota, quam liquor ille genitalis viri in partes externas & inferiores illius matricis sit effusus, per transversum texturæ spongiosæ, per quam spiritus liquoris seminalis ovis recenter ab ovario separatis virtutem communicant suam. v. Dan. Hoffmann. *Annotat. ad Hypoth. Goveyan. p. 69. seq. & p. 86.* Nonnulli ad probandam suam sententiam dicunt, ova interdum matura, absque ullo prægresso coitu, in salacibus obnefariam genitalium frictionem ad uterum devolvi: quod an veritati consonum sit, se nescire lubens fatetur Georgius Philippus Nenterus *Physiolog. med. cap. II. membr. 1. p. 329. seq.*

§. 3.

Binis tamen his de ovuli in tubis & uteri cavitate foecundatione *Conceptio in ovario præfertur.* five conceptione, opinionibus prima, superius adducta de conceptione in ovario præferenda videtur, quia proxime, & primis a conceptione diebus neque in tubarum neque uteri cavitate ovulum, vel aliud imprægnationis signum, bene tamen in ovariis ipsisque ovulis maturis alteratio, statusque ordinarii mutatioprehenditur. Siquidem in ovariis ovula post imprægnationem mutata, majorem in molem aucta, indies crescentia, rubicunda vel striata, ex testiculis demum prominentia, postque aliquot dies, & quidem in canibus tertio, quarto & quinto, in mulieribus autem septimo & octavo die secessum ex ovario minitancia, observantur. Eodem tempore quoque tubarum Fallopianarum extremitates seu fimbriæ, ovariis propinquiores, vel penitus annexæ & ovulum excipientes, quandoque etiam ovula imprægnata, in tubarum cavitate reperiuntur; imo foetus interdum, jam formatos, modo in ovariis, modo in tubis, modo etiam in abdominis cavitate, ab anatomicis deprehensi leguntur.

§. 4.

Contra hanc in ovulis ovariorum five testiculorum muliebrium *Sententia Nabothi.* conceptionem ante aliquot annos infurgebat Martinus Nabothius, Calensis, aliud ovarium, in quo conceptio fieret, in uteri cavitate invenisse ratus; de quo tamen invento ejusque refutatione *in Spermatolog. nostr. cap. 4. §. 12. p. 181. sq.* paucis egimus. Miror autem, Fridericum Hoffmannum, qui *Fundament. medicin. cap. 8. p. 52. seq.* generationem ex ovo in testiculis muliebribus imprægnato, per tubam Fallopianam ad uterum delato, cum recentioribus autoribus defendit, postmodum *Medicin. rational. Systemat. Tom. I. cap. 12. thes. 14. p. 341. seq.* sententiam mutasse, dictique Nabothi ovarium his verbis defendere, vulgo habitum ovarium an vera ovula generationi apta contineat, nondum res satis plana ac perspicua est. In scholio hæc addit: Corpora globosa & membranacea

cea vasis dictis spermaticis, necnon vesiculis plurimis turgida & ad latera uteri posita, secundum receptam sententiam usque eo pro testibus & ovariis feminarum habita sunt: hæc tamen assertio plurimis adhuc difficultatibus premitur. Primo utut concedendum sit, vesiculas quasdam humore lymphatico refertas in dictis ovariis contineri, quæ etiam aquæ calidæ injectæ coagulum induant, neutiquam tamen ratio adsequi poterit, quomodo hæ ipsæ fœcundatæ a firmo membranarum involucro, cui altius insident, sine insigni læsione & erosione ovarii & extravasatione humorum se liberare possint. Secundo, nullo modo concipi potest, quomodo ovulum ab ovario liberatum per canales Fallopianos ultra duos transversos digitos ab ovulo distantes recipi & ad uterum provolvi possit. Tertio, non intelligitur, quomodo genitura virilis per solidum uteri corpus vel tubas clausas commode ad ovarium & ovulum salva sua textura pervenire idque fœcundare possit. Deinde *Thesi 15.* ita pergit: Verisimilior eorum apparet sententia, qui ovarium intra uterum & circa internum ejus orificium ac cervicem constituunt, ubi utique racemus innumerorum ovulorum semper conspicitur, quæ & facilius virili semine fœcundari & a compedibus liberari possunt. Scholion. Recentiorum quorundam anatomicorum industriæ & dexteritati detectio novi ovarii debetur, inter quos merito ego numerare possum anatomicum peritissimum Lipsiensem professorem Naboth, qui ovarium hoc novum invenit & in *Dissertat. de sterilitate* egregiis argumentis stabilivit, & jam ante viginti annos in anatomia publica cadaveris feminini, in nostra academia dissecti, nobis illud monstravit, quod etiam postea ego semper, quoties occasio tulerat, femininum corpus disseccandi, inveni aliisque monstravi. Equidem harum vesicularum jam alii etiam mentionem fecerunt, sed plurimi pro hydatidibus eas habuerunt, vel earum usum nesciverunt: uti Graafius, item Novesius in *Zodiaco Medico Gallico*, item Litrius dans les memo-

Memoires de l'Academie Royale des sciences, & Mortagni in *adversariis anatomicis* abunde confirmarunt. Fatemur vero, contra hanc sententiam pugnare, quod foetus humanus quandoque intra tubam Fallopianam inclusus repertus fuerit; deinde quod nullus appareat testium muliebrium hactenus pro iis habitorum alius usus, cum tamen in iis ovula, calore in coagulum abeuntia reperiantur. Ut vero ad has dubitationes paucis respondeamus, dicimus, longe facilius ovulum ex uteri cavitate ad tubam Fallopianam, in foecundo coitu, quam ex testibus sic dictis muliebribus ad tubam pervenire posse. Ad secundum reponimus, corpora, quæ hucusque pro ovariis habita sunt, potius esse fulcimenta vasorum sanguineorum, quæ inflata ad uteri substantiam copiosissima abeunt. Tum capsulæ vesiculares, quarum humor inclusus a calore coagulatur non modo in testibus vulgo habitis, sed & in uteri ligamentis inque externa uteri superficie copiose conspiciuntur, quas utique, quoniam dispersæ sunt, longe meliori jure pro vasorum lymphaticorum expansionibus, quæ copiosissima sunt circa uterum, quam eas, quæ in cervice hærent, & quæ semper prostant, ut acervatim collectæ limitibus suis inclusæ sunt, haberi posse adserimus. Hæc Hoffmannus. Quam tamen Nabothi sententiam non modo ea, quæ in *Spermatologia l. a.* adduximus, sed etiam tam antecedentia quam sequentia impugnant, variisque rationibus inter alios refutat Andreas Ottomarus Gœlicke *Medicin. Forens. Specim. I. §. 6. seqq. a p. 15. ad 24.*

§. 5.

Feminarum enim testiculos seu ovaria a coitu foecundo affici atq; immutari, cuivis ex canum femellarum tertio vel quarto post coitum die instituta sectione observare licet, quia mihi ipsi, ob indagandam conceptionis in ovario veritatem, plurimas canes femellas post coitum secanti, in dictis ovariis aliquot ova, dicto modo mutata, rubicunda, successive incrementum sumentia, porro ova-

*Ovariorum
post coitum
mutatio.*

rii membranam perrumpentia, a tubis applicatis excepta, tandemque per earundem cavitatem five canalem ad uteri cornua descendentia, & quidem nonnunquam in una eademque cane, dum, pro meliori mutationis ovulorum cognitione, ipsius abdomen singulis diebus modo iterum consuebam, modo denuo aperiebam, Lipsiæ olim videre cum contubernali & aliis studiosis contigit. Idem annotavit etiam Andreas Ottomarus Gœlicke *Medicin. Forens. Specim. I. p. 13.* sequentibus verbis: Cum in gymnasio Anhaltinorum patrio studiorum causa versarer, observarunt mecum multi alii præsentibus in cane femella, cultro anatomico subiecta, aliquos ovariorum folliculos membranofos ruptos, ex quibus ovula jam erant egressa: Nonnulla etiam ovulorum imprægnatorum superficiei ovariorum adhuc cohærebant, & cornua præterea uterina curioso admodum spectaculo manifeste aperta cernebantur, ita ut majorem calami scriptorium haud difficulter admitterent, iisque adhærebat ovulum, simile prorsus quoad omnes proprietates illis, quæ ovario affixa cernebamur, tandemque intra tubas aliquot ovula prioribus simillima contineri observabantur. Deinde feminarum testiculos a coitu affici ac immutari palam indicant pullulantia tubercula fibrosa & glandulosa, quibus ovum quodlibet fœcundum admirando naturæ ingenio liberatur atque fecernitur. De hac ovariorum immutatione ita inquit Johannes Conradus Peyerus *Merycolog. sive de Ruminant. Lib. I. cap. 5. p. 49.* Vidimus hæc & palpavimus aliquoties, cum in vaccis, ovibus & capris, tum præcipue etiam in damis vulgaribus cervini generis, quarum copiam indultu regis Christianissimi, Ludovici Magni, Lutetiæ habui, apud magnæ famæ & dexteritatis virum hospitemque mihi amicissimum, Josephum du-Vernium. Exigui quidem, fateor, sunt damarum testiculi, sed post coitum fœcundum in alterutro eorum papilla five tuberculum fibrosum semper succrescit, quo ovum seu conceptus ab ovario liberatur, ut per tubam postea descendat ad uterum. Scrofis autem prægnantibus tanta accidit testiculo-

rum

rum mutatio, ut mediocrem quoque attentionem fugere nequeat: globuli enim velut in ovario gallinaceo undique extuberant &c. Huc etiam pertinet experimentum, ab Antonio Nuck *Adenograph. curios. cap. 7. p. 69.* communicatum: Cani scilicet feminae, tertio post congressum institutum die, extraxit, per vulnus abdomini inflatum, sinistri lateris cornu (cujus ovarium jam duobus ovulis majusculis notabiliter conspicuum) inter vaginam & ovarium, medio loco ligatura arctiori constrictum, reposuit, vulnusque intra octiduum ad cicatricem perduxit. Vigesimo primo, post ligaturam injectam, die, cultro anatomico examinandam inspicit, & quod ante hariolatus erat, etiam plene perspexit. Sinistri cornu pars (inter ligaturam & ovarium) duplici foetu erat obsessum; altera vero portio (ligaturam inter & vaginam) plane vacua ipsi visa: quod manifestissime probat, ovula ulterius, quam ad ligaturam, propelli non potuisse, & in ipsis ovulis, aura seminali foecundatis, foetus quaerendos &c. Ovulum muliebri, maturum auroque genitali turgidum ex ovario muliebri, quasi petiolo pendulum in anatomia publica cadaveris feminini infanticidae repertum in theatro anatomico academiae Viadrinae die 7. Aprilis 1717. seq. demonstravit Andreas Ottomar. Goelickius. vid. Exercit. Francof. Tom. I. Sect. 1. p. 1. & 29. Fridericus Ruyschius *Thesaur. anat. 6. n. 5. p. 4.* sistit unum ex ovibus foecundatum, quod magnam subiit mutationem, scilicet magnitudine non solum caetera ova antecellens, verum etiam post apertionem coagulatum liquorem continens, cum e contra caetera ova ab incisione transversali laesa fuerint inanita.

§. 6.

Interdum etiam in ovariis & ab domine ova & ipsi foetus formati reperiuntur, e. g. anno 1682. Parisiis in feminae cujusdam, alias octo liberorum matris, testiculo dextro foetum plenarie formatum inventum fuisse de S. Mauritio publicavit, vid. Joh. Frid. Ortlob. *Histor. Part. Diss. 35. §. 5. p. 275.* Hanc observationem pau-

Foetus in testiculo.

lo aliter refert Johannes Bohnius *circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 12. seq.* quam infra *cap. VI. §. 1.* recensēbimus. In mulieris jam undecim liberorum matris cadavere non tantum extra testiculum finistrum ovum aliquod hæsit, membranis singularibus involutum, verum etiam ex ipso testiculo ovorum par non unum fuit separatum, quæ arcte sibi cohærebant, testante Gerardo Blasio *observ. med. Part. V. obs. 4. p. 66. seq.* Rationem cur conceptus quandoque in abdomine fieri possit, hanc reddit Theodorus Craan *Dissert. de Homin. cap. 62. p. 709.* Observarunt, inquit, conceptum fuisse factum intra abdominis cavitatem; quod ipsum accidere potuit, quatenus spiritus feminis masculini penetraverit ad testes muliebres, illicque ovum foecundum fecerit; quod non fuerit apprehensum a foliis tubæ Fallopiianæ, atque sic exciderit in abdominis cavitatem illicque postmodum conceptio fuit facta. Mea tamen sententia conceptio seu imprægnatio hujusmodi ovuli jam antea in ovario facta videtur, quam in abdomen prolapsum est. Sic etiam ex ovario per tubas Fallopianas ad uterum deferri ovulum foecundatum, probat Daniel Sauvry, per foetus interdum extra uterum conceptos, casum sui temporis commemorans de foetu intra abdomen concepto. *v. Act. Erudit. Lips. an. 1706. mens. Novembr. p. 527.* Plura vide alibi, ubi de foetu agemus.

§. 7.

*Autorum
consensus.*

Ex his & aliis rationibus proinde alii adhuc, præter supra allegatos, autores, unicum & verum conceptionis locum in ovariis quærun, e. g. ovula in ovario foecundationem accipere & postea secessum exinde moliri, scribit Joh. Mauric. Hoffmann, *Physiol. anat. Sect. XII. §. 3. p. 93.* Et Michael Albert. *Introduct. in univers. medicin. Physiol. cap. 2. §. 77. p. 37.* inquit: Ovulum tale imprægnatur in ovario, ex quo ad uterum postea transfertur; quicquid enim de ovulis in utero inter recentiores differitur, non sufficienter rationi consonat. Quibus verbis absque dubio dictus autor Nabothi stringit opinionem de novo ovario, cujus hætenus mentionem feci.

fecimus. Daniel Hoffmannus *Annot. in Hypothes. Goveyan. de Generat. p. 86.* scribit : Ovula in ipso ovario foecundantur, non vero postquam in uterum devoluta sunt, nec fieri potest, ut ante virilis feminis immisionem seu asperisionem ovulum jam sit delatum ad cavitatem uteri, reclamante universalī anatomicorum experientia; & quid obstat, quo minus miasma seu spiritus feminis virilis penetrans per spongiosam uteri substantiam in ejus cavitatem porro penetret & se extendat per tubas apertas ad ipsum ovarium ejusque ovula, sisque ea ibi foecunda reddat. Cum intra tubas Fallopianas non tantum ova, sed etiam foetus fuerint reperti, exinde concludit Theodorus Craan *l. a.* hoc signum esse, ova ire ex ovario per has tubas ad uterum. Juxta Gulielm. Cockburn. *Oeconom. animal. p. 96. seq.* liquoris spermatici parte spirituosiore ova feminina hoc fere modo foecundantur : Partes spirituosæ feminis virilis penetrant per poros tunicarum ovuli feminei, plerumque in earum testibus, aliquando, raro licet, in tubis, siti, & in iis locis intra ovum receptæ liquores in canalibus contentos agitant, rarefaciunt, ac canales ipsos aggrandescere faciunt. Non posse solum ovulum, adhuc in ovario firmiter hærens, fieri, foecundum, primasque foecundationis suscipere impressiones, sed & ipso facto hoc semper fieri, tot experimentis persuasi convicti sumus, totque anatomicis sectionibus omnis generis animalium confirmamur, ut vix dubio ulli supersit locus, ait Daniel Hoffmannus *l. a. p. 70.* Sique ovula non statim in ovario, sed in tubis vel ipso utero foecundarentur, unde quæso oriretur ovuli motus atque secessus & unde venirent foetus in abdominis cavo, vel etiam in tubarum canalibus reperti? nisi cum Friderico Hoffmanno *Medicin. ration. Tom. I. cap. 12. §. 15. sch. p. 242.* ovulum coitu foecundo ex uteri cavitate longe facilius ad tubam Fallopiam, & ex hac ad abdominis cavitatem, quam ex testibus ad tubam pervenire posse statuamus : Cui tamen sententiæ obstat, quod tubarum opificia circa uterum magis sint angusta, quam cir-

ca testiculos; hæc enim ovulum ex ovario prompte excipere, illa autem vix magnum stilum admittere possunt. Quemadmodum etiam uteri osculum internum tempore gestationis strictissime occlusum, instante partu, integrum foetum transmittit, quidni pariter de istis tubarum angustis concipiendum sit, illas conceptionis momento, quo ovulum, ovario excussum, ingressum in uterum affectat, referari, ac quantum par est, ampliari: sunt verba Johannis Conradi Peyeri ad Muraltum perscripta. v. Muralt. *Clav. med. exercit. 9. p. 409. seq.* ubi annectit: Prudenter interim his cautum videtur, ne, qui semel sub ovi specie pertransiit conceptus, ex utero in tubas, temere recurrat; adsunt enim anfractus quidam atque tortuosæ gyrationes, at valvularum vestigium nullum. Imo juxta Carol. Drelincurt. de *Concept. concept. perioch. 21. p. 21.* protinus ac uteri fundo ovum aliquod conjugio sorptum est, & nostrum infimul semen in idem fundum sumus ejaculati, totus præ libidinis æstro gestit uterus totusque contrahitur atque conglobatur. Illa igitur contradictione atque conglobatione suam cervicem internam suaque pariter oviductus ostia duo tam arcte claudit, ut cuspidem acus nequidem admitteret. Quodsi proinde, secundum hos & alios autores, tubarum orificia post conceptionem ita occludantur, ut ovulis adhuc minoribus ex utero ad tubas regredi non liceat, multo minus postmodum, ubi ovula majora fuerint foetusque utero jam adhæreat, ex ejusdem cavitate per angustum orificium ad tubam perque ejusdem canalem in abdominis cavitatem pervenire poterit.

§. 8.

Fœcundationis modus. Qua ratione autem ipsa ovuli fœcundatio fiat, res sane mysterii plena est, atque abstrusum ænigma, cui accurate solvendo nullus fortasse Oedipus invenietur; antiqui enim eandem in coagulatione quærentes maris semen coagulo, feminæ vero lacti æquiparabant. Recentiorum alii fermentatione delectantur, alii conceptionem per certum, sed obscurum, motum describunt, uti ex ipso-

per fermentationem.

forum verbis liquet. Fermentationis paulo ante ex Drelincurtio mentionem fecimus, & Jacobus de Sandris *de natur. sanguin. stat. cap. 4. p. 150.* inquit, ovum fœcundat maris semen, quod cum fermentum summe activum sit, partes in ovo contentas ad proprias & determinatas expansiones dirigit & in motum non cito desitutum expergiscitur &c. Juxta Bern. Connor. *Evangel. medic. p. 64.* maris feminale fermentum unum vel alterum feminæ ovulum maturum rarefacit, intestinum & expansivum motum cum limpidō & lymphatico feminis latice, in quo delineata fluctuant corporis stamina, init, eundem attenuat, stamina ipsa expandit & distendit, porulos eorundem aperit, sicque attenuatus ambiens liquor dilatatos staminum porulos subit, ipsos ampliat & largius nutrit &c. Utrum vero generatio & corruptio a fermentatione & fermentis dependeat, prolixè perquirat Melchior Fridericus Geuderus *Dissert. de ort. animal. p. 271. seq.*

§. 9.

Johannes Fridericus Ortlob *Histor. Part. Diff. 35. §. 15. p. 279.* ait: *Per motum.* Semen feminarum sive ovula, staminibus futuri foetus jam imbuta materia sunt, quæ actuari & successive in foetum formari debent sola vero activitatem fœcundam non tribuere sibi possunt. Masculi feminis activa portio materiam ex se inertem actuat, & stupendo plane modo ad motum ejusmodi plasticum disponit, quo in foetum humanum transeat, ita tamen, ut solus hic generando foetui non suppar sit, nisi materia ovulum congruum invenerit, & contra hoc sine illo fœcundari nullatenus queat. Quomodo in ovariis fœcunditatem ova acquirant, ita explicat Johannes Conradus Peyerus: In congressu marium contentio fortem impressionem innuit, videturque mihi totum imprægnationis opus inchoari motu & perfici. Nihil enim in ovo maturo desideres, præter motum, qui junctis, quæ antea solutæ distabant, particulis, ideam foetus in materia designet. Sane motuum in rerum natura effectus tanto sunt majores, quanto certius rationi nostræ innotescit

fcit, a Deo cunctos cieri. Ea igitur in liquore genitali concipienda est particularum aptitudo, ut in actu venereo talem motus impressionem, accedente benedictione divina, nanciscantur & femellis communicent, qualis requiritur ad foetus ideam in ovo delineandam. Patet hinc, non tam liquoris genitalis substantiam ovis sese insinuare, aut ad foetuum compositionem proxime requiri; quam praecipue motum, qui mediante liquore femellis ac ovis imprimitur. Potest enim motus ex corpore in corpus transferri, etiamsi substantia communicantis non transeat in substantiam recipientis; superficierum quippe contactus sufficit. Cæterum constat, motu particulas materiae non solum varie disponi, sed etiam ita immutari posse, ut ex rigidis flexiles, ex mollibus duræ fiant, atque alias & alias combinationes, attritus & hinc resultantes configurationes diversimode sustineant. Non enim unius generis & naturæ particulas includit cicatricula, quæ ante imprægnationem confusum quasi chaos existit: quandoquidem observante Malpighio ea in subventaneis ovis nihil distincti, sed inordinatas ac divulsas duntaxat nubeculas ostendet, cum e contra foecundatis carina seu stamen pulli jam inesse microscopiorum opere cernatur, vid. Pæon. & Pythag. *Exercit. 19. p. 102.* Juxta Gregor. Theodor. Barthold. *Oper. med. Part. I. p. 55.* pars feminis spirituo-fa in unum vel alterum ovulum incidens statim ejus interiora ingreditur, & illis motum vitalem introducit. A motu vitali fit partium fluidarum turgescencia & pellicularum extensio, unde ovulum a fibrosis testiculorum vinculis convellitur & evellitur. Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 17.* ita scribit: Ex recentioribus quidam ipsa embryonis stamina solidiora & totam ejus corporaturam a masculino semine in ovulum muliebri derivari contendunt: sed dispicere nequeo, spissitudinem & soliditatem, quam in illius atomis volatilibus & mobilissimis conjiciunt, multo minus, quomodo hæ sibi relictæ in solidum embryonis corpus concrefcere atque coagulari queant, aut semini femineo instar staminis existent; ne repetam, quæ superius contra materialem geni-

genituræ virilis concursum producta fuerunt. Probabilius est, hoc, quicquid in generatione præstat, semen masculinum motu præstare, quatenus non tantum ex ejusmodi particulis coagmen-
tatur, quæ tenerrimæ & mobilissimæ, sed ipsi generantis quoque in congressu contentio vehementior ac totius generis nervosi seu systaseos spirituum animalium nisus extraordinarius singularem impetum imprimit. Hoc siquidem motu rapidissimo, ordinato tamen, ovulum muliebri illius atomi activissimæ seu spiritacæ ir-
ruunt, totumque hujus contentum in peculiarem spumescentiam cient, ipsi, hætenus quasi fatuo semini, germen primigenium in-
ducunt, mox tamen & simul ejusdem motum & tendentiam vita-
lem inchoant, h. e. ovulum non tantum prolificum reddunt, sed conceptum vitalem producant. Motum hunc fœcundantem seu masculini feminis cum femineo concursum, specialius & per partes determinare, vix ulli mortalium permisit Deus, cujus oculi massam nostram viderunt informem & cujus manus nos in abdito confecerunt, liceat mihi lominus de opere hoc divino ita balbutire. Nempe particulæ maxime energeticæ, a toto de-
ciduæ, postquam a proluxa organorum genitalium cribratione ac subactione diversas configurationes fortitæ fuerunt, pro di-
versitate suarum idearum, dum in liquorem ovuli spermaticum seu albumineum agunt, hujus partes a partibus divellunt, con-
gruas sibi adaptant, & quod instar molæ informis illi innata-
bant, eousque fingunt, donec per miram coordinationem ca-
rina & membrorum embryonis rudimenta prima fabrefiant, ab iisdem particulis mollibus & componentibus vim motivam pri-
mam, pariter ac automa ab artifice suscipientia seu animata. Se-
cundum Frider. Hoffman. *Fundament. Medicin. Physiol. cap. 8. p. 53.* ovi ad generationem apti fœcundatio fit subtilissimis spirituosiss
effluviis feminis masculini, quæ novum vitalem intestinum mo-
tum introducunt in ovuli contentas partes fluidas, quo motu
turgescencia & rarefactio fit vitalis, quare pelliculæ ovi disten-

duntur, fluidæ partes spumescunt, sicque a fibrosis testiculorum vinculis ovula convelluntur.

§. 10.

Per ani-
mam.

Alii conceptionem animæ adscribunt, siquidem Georgius Philippus Nenterus *Physiol. cap. 9. pag. 330. seqq.* de hac conceptionis obscuritate ita inquit: Qua ratione ovulum imprægnetur, quidnam sit, quod motum primis rudimentis imprimit, & a quonam parentum proveniat principium illud movens, admodum obscurum est. Quis enim concipere potest, quomodo liquor five lymphæ in testibus secreta & aliquali spissitudine gaudens, admirandum conceptionis opus perficere possit? captum sane hæc superant humanum: quæ enim de motu recentiores hic proferunt, parum lucis in re tantæ obscuritatis afferunt. Quidnam sit in femine, quod primum motum rudimentis in ovulo contentis imprimit, & conceptionem inchoat, quam maxime controvertitur, plerique ad spiritus varios infinitos, influos, vitales, animales, archeos, vim plasticam &c. confugiunt; sed si rem accuratius examinamus, facile deprehendimus, gravissimis fictitia hæc principia agentia premi difficultatibus: nam ut nil dicam de nondum probata horum principiorum existentia, ante omnia supponi debet, quod generatio sit res magni momenti, quæ requirit principium intelligens & sufficienti cognitione instructum, quod omnia ita dirigere, succum nutritium partibus formatis & formandis ita apponere & assimilare queat, ut iusta non solum totius corporis, sed & singularum partium, structura & conformatio ita resultet: quis autem omnibus hisce principiis, si sanæ rationis ductum sequi cupit, aliquam cognitionem tribuere potest? materialia sunt omnia hæc principia, nec major ipsis inest cognitio, quam lapidi aut trunco. Potius ergo anima humana, cujus potestas in actiones vitales & animales se exerit, causa primi motus in ovulo & conceptionis statuitur: nam propter animam in principio rerum corpus creatum est,

ut

ut ei præbeat domicilium & instrumenti loco sit, quem ob finem anima etiam corpus suum ex omnibus periculis, quantum quidem possibile est, eripere & in integritatis statu conservare conatur. Quod autem eo magis probat, animam humanam non dirigere tantum, sed & perficere conceptionis opus, est quod anima foetus in struendo corpore occupata sæpius res ad structuram corporis non pertinentes, & quidem juxta ideam istam, quam anima matris ipsi communicavit, formet. Quam sententiam rejectis omnibus hætenus recensitis opinionibus, etiam defendit Michael Alberti *Introduct. in univ. Medic. cap. 2. §. 28. p. 31.* inquit: Tale principium in homine non aliud deprehenditur, nisi anima rationalis, cui adscribimus capacitatem struendi & formandi corpus &c. qui etiam ibidem §. 96. pag. 37. inquit: in negotio generationis requiritur & observatur præterea inter animam foetus & animam matris accuratus consensus: dissente enim anima matris, neque conceptio contingit, neque foetus continetur, sed iterum per abortum ejicitur. Porro de quæstione, an ovuli fœcundatio ipsaque foetus formatio a mixtura seminum, vel spiritu feminis virilis, vel spiritibus materialibus subtilissimis cum ideis, vel ab animæ facultate ministra, vel ab anima humana sensitiva vel animali, vel a mente quadam aut intelligentia admirabili, vel a vi plastica in semine, vel a rectrice divina providentia, vel a forma substantiali, vel a microcosmotore, vel ab archeo, vel a feminali multiplicandæ fuscitandæque sobolis fœcunditate a Deo indita, vel a motu secundum variorum autorum opiniones, derivanda sit? prolixè agit Melchior Fridericus Geuderus *Dissert. de Ortu Animal. pag. 271. seq.* quo loco varia huc pertinentia benevolus lector reperiet. De efficiente formationis foetus vid. etiam Mich. Etmüller. *Oper. Vol. II. fol. 1072. seq.* De anima rationali in ipso primo conceptionis momento præsentè prolixè agit Paulus Zacchias *Quæst. Med. Leg. Lib. IX. Tit. I. Quæst. 1. seq. fol. 728. seq.*

CAPUT IV.

De ovuli ex ovario secessu.

§. I.

*Ovulum an
statim in co-
itu ad ute-
rum perve-
niat?*

Tale proinde in ovario quocunque modo imprægnatum ovulum post aliquot dies ab hac vel illa tuba Fallopiana exceptum per ejusdem canalem ad uteri cavitatem propellitur, in ea-que hætenus incepta conceptio seu generatio continuatur atque absolvitur. Statuunt equidem nonnulli, statim tempore fœcundi coitus ovulum a tubis excipi eodemque momento ad uterum deferri, ibidemque a semine virili imprægnari, uti paulo ante ex Hypothesi Goveyana adduximus, quo loco dictus Autor *p. 68.* ovuli exceptionem ita describit: Ipso conceptionis momento omnes feminarum partes generationi destinatæ fibrarum inflationem ac tensionem patiuntur, mutant etiam pristinam figuram tam internarum partium quam externarum, & ob hanc ipsam rationem situm quoque mutant quodammodo, matrix ut & tubæ inflantur notabiliter, & per consequens majus occupant spatium, quam in statu quieto, ita ut in illo actu tubæ tendantur, & in formam arcus, parte nempe ipsarum superiore flectantur, eum in modum, ut figuram situmque mutant, & tunc temporis magis eleventur, ob ipsum uteri volumen, quod eas ad reflexionem illam versus ovaria obligat, ut ibi ope fimbriarum uniantur, quarum denticuli sive incisiones sunt totidem parvi muscoli, qui se contrahunt, & earum extremitates ovariiis applicant, ut ab illis cingantur, digitorum instar comprimantur, ovulaque maturiora ad descensum prona exprimantur, & mediantibus tubis in uterum deducantur, ibique eo momento, quo materia seminalis in orificium uteri internum effunditur, fœcundentur &c.

§. 2.

Negatur.

Veritati tamen magis consonum videtur, ovula in coitu fœcundata ovario adhuc per aliquot dies inhærere atque lymphæ affluxu

affluxu majorem molem acquirere, donec attenuatis & denique disruptis testiculi seu ovarii membranis, in canibus, uti mihi sæpissime observare licuit, tertio vel quarto, in uxoribus autem septimo vel octavo a coitu die, uti paulo ante dictum, a tubarum parte fimbriata excepta per easdem ad uterum descendant; qui ovulorum ex ovariis secessus insuper etiam ab aliis causis promovetur. Quod etiam plurimi testantur autores, inquit enim Christianus Johannes Langius *l. a. fol. 228.* peracto fœcundo coitu ovum fœcundatum spatio aliquot dierum ab intumescente corpore quodam glanduloso, sub illo in ovario posito, disruptis tunicis tenuibus, tegentibus illud, protruditur intra Fallopiæ tubæ extremitatem, ovario jam jam altera vice admotam. Ad oculum hoc ipsum demonstrant extispicia hominum non minus, quam brutorum recenter imprægnatorum; hocque modo ex ovariis deciduum ovulum per tubarum cavitatem rotatur ac devolvitur ad uteri ipsius concamerationem usque, ubi aliquandiu hærens sedem sibi facit fixam. Juxta Theod. Craan *Dissert. de homin. p. m. 709.* non potest hoc in momento accidere, ut ova fœcundentur, ex testibus expellantur, a tubis Fallopiæ excipiantur, & in uterum propellantur; ad hoc quippe aliquod tempus requiritur: Imo ovula per aliquod tempus in ovario adhuc morari defendit Daniel Hoffmannus *Annot. ad Hypothes. Govey. p. 68.* ovulum, inquit, mox illo momento exsugere & extrudi ex ovario per ejaculationis quendam modum, ac per tubæ quoque cavum ejaculando quasi dejici mox in uterum, non credent ii, qui tubas attentius scrutando tantas earum angustias mirantur, ac difficulter concipiunt, qui tar- do motu descendat ovulum iis immissum, tantum abest, ut possint concipere, id ejaculando quasi per illas descendere ad uteri cavum, & quidem tam subito, tantaque celeritate, ut non prius virile semen ad uteri internum pertingat atque allabatur orificium, quàm ovulum jam delapsum sit in cavitatem uteri, & qui-

dem illud ipsum ovulum, quod ipso hoc venereo actu fuerit excitatum, ex ovario detrusum & per tubas subito depresso in cavitatem uteri: Reclamant tot autorum observationes, qui uteros post congressus vacuos invenere, etiam pluribus post copulam diebus, comparente adhuc in ovario ovuli prima mutatione, ac carunculæ ovulum quasi extradentis succrescentia; ut taceam, ovula in tubis diu post copulam etiam foecundam inventa; imo ipsi affixa ac foecundata &c. Labentibus a coitu foecundo tribus aut quatuor diebus ovum adeo crescit, ut ovarium suum ad exclusionem stimulet, juxta sententiam Joh. Sigism. Elsholt. *M. N. C. Dec. I. An. 6. 7. 196. p. 287.* Ova in ovariiis adhuc detenta majus incrementum agere, autopsia testatur Fridericus Ruyschius *Thesaur. anat. n. 5. p. 4.* ubi uterum mulieris sistit, quæ a paucis diebus aut horis conceperat; & præter alia unum ex ovis, quod existimat foecundatum, mutationem magnam subiisse refert; scilicet magnitudine non solum cætera ova antecellebat, verum etiam post ejus apertionem ovi contentum coagulatum reperiebatur. Juxta Stephan. Blancard. *Instit. Medic. cap. 25. Oper. Tom. I p. 273.* ovum foecundatur, hoc est, materia feminis virilis, ex mobilibus & admodum tenuibus constans particulis efficit, ut unum plurave ova sese dilatent majoraque fiant: Hoc est, quod a materia mobili, ex qua virile semen constat, etiam particulas unius aut plurium ovorum in motum concitentur, unde vascula ovum constituentia etiam ob majorem succorum affluxum dilatantur eousque donec ad magnitudinem ibi in tam arcto spatiolo contineri non possit, hinc ex membranula contenta erumpit, & a tuba hiando quasi incumbente, & ab ornamento foliaceo, tanquam tot digitis, comprehenditur; quæ, convulsione peracta, in pristinum statum redigitur, ejusque ope ovum in uterum delabatur. Ex sententia Gulielmi Cockburn. *Oecon. anim. p. 106.* partes corporis nostri cum in ovo compendiose extiterint liquores eorundem quiescentes ac nunc ab aura feminali

in motum inciti rarefiunt, ac majus spatium undiquaque capessunt, inde tumidum evadit ovum, distenditur ejus membrana ac in tubas Fallopianas eorum aliquod decedit.

§. 3.

Qua vero ratione ovula ex ovariiis secedant vel propellantur, *Ovula quomodo ex ovario protrudantur.* arduum fane est determinare, quanquam variae apud autores reperiantur causae, tam ratione ipsius ovuli, quam testiculi partiumque adjacentium; imprimis autem ovulum, secundum hactenus allegata, ob majus incrementum majus quoque spatium quærens perrumpit, vel a corpore quodam glanduloso, sub ovulo latitante, e loco suo protruditur. *A corpore glanduloso.* Inquit enim Casparus Bartholinus *Specim. Histor. anat. cap. 5. p. 86.* ovum foecundatum a membranis ovarii, quibus involvitur, ita liberatur, quatenus post conceptionem tunicæ multis sanguineis vasis opacæ conspiciuntur & sequenti tempore inter tunicas illas glandulosa quædam materia globuli figuram repræsentans & sensim accrescens, ovum undique comprimit, donec illud per foramen in medio conspicuum, rupta ovarii membrana, expellat; Ex juxta verba Regneri de Graaf *l. a. p. 348.* inter testiculorum membranas, ovum obvelantes, materia quasi glandulosa excrescit: brevi namque post coitum ovorum tunicas (quæ antea diaphanæ erant) opacas devenire conspiciamus, multisque sanguineis vasis adornari; & postero die post opacitatem illam conspectam inter dictas ejus tunicas glandulosam quandam materiam totum ovum involventem, globulique figuram repræsentantem intueberis, quæ sensim accrescens ovum undecumque comprimendo, illud tandem per foramen in ejus medio conspicuum expellit; quod in cuniculis tertio post coitum die, in ovibus, vaccis aliisque majoribus animalibus, quæ diutius uterum gerunt, tardius evenit; unde nobis veritatis scopum minus attigisse videntur ii, qui humanos foetus trium quatuor aut octo dierum se invenisse gloriantur. Johannes Gothofredus Bergerus *Physiolog. upart. II. cap. 1.*

pag. 460. de ovuli ex ovario secessione scribit, quod ovulum plene maturum & continua lymphæ accessione eousque irriguum, ut repleri amplius non possit, ad egressum ex ovario paratissimum sit, quia substantia ejus glandulosa, in cujus sinu gignitur & adolescit, debitum nacta incrementum, papilla sua magis magisque extuberat, & ambientem ovarii tunicam paulatim emollit & perfodit, retractaque sub æstu venereo fibrarum matricium contractione, sinum suum aperit & per hujus ovarii hiatum, ovulum adjuvante niduli hujus fibrosi constrictione, qua contracta avulsaque vascula, a quibus illud pendet, sine ullius effusione succi idem dimittunt illæsum & virgineum in oviductum expellit & protrudit. Et pag. 465. inquit idem: hic motus ovuli totus a maturitate ejus & fibrarum motricium, cum petioli, vel calycis ejus vasculosi, tum ipsius ovarii & corporis glandulosi, ac fimbriarum musculosarum oviductus in æstu venereo constrictione dependet. In feminæ per quatuor mensium spatium fœtum in utero gerentis atque submersæ sectione publica ejusmodi excrescentiam glandulosam in ovario sinistro leviter adhærescentem se invenisse refert Johannes Mauritius Hoffmannus *Physiol. Anatom. Sect. XII. §. 7. p. 92 seq.* Secundum sententiam Emanuelis Kœnigii *Regn. animal. Sect. I. Art. 17. p. m. 77.* tubæ Fallopiæ ovum exceptum ad uterum ducunt, quatenus semen utero injectum sanguinique communicatum hunc & spiritus immutat, ut ad ovarium fortius ac peculiariter appellentes ovum fœcundatum ad exitum disponant, dum glandulosa materia sensim ex immutatione ovulo accrescens illud ex omni parte comprimit, ac per foramen & papillam peculiarem ex ejus medio conspicuam in tubas excipiendo ovo aptas expellit. Sic Justus Schraderus *Præfat. in Guil. Harv. Obs. 2. b.* inquit: ovo ad exitum destinato circa ambitum & a postica parte accrescit corpusculum aliquod fibrosum, quod paulatim adauctum ovum sensim e suo alveolo exprimit, protrudit & foras urget, donec tandem solutis

vincu-

vinculis ac rupto ovarii involucro elabatur; haud ab simili modo, ac in majoribus pustulis videre est &c. Et Casparus Bartholinus *de Ovar. Mulier. p. m. 39. seq.* ait: quidnam sit, quod post fœcundationem ovum ad exitum disponat & quomodo in mulieribus membrana, ovarii vasis constructa, pro augmento ovorum se extendens & iis elapsis se contrahens, pro transitu ovi aperiatur, altioris est indaginis. In quo præ reliquis pene omne punctum tulisse mihi visus est Regnerus Graaf, ex cujus observatione constat, prodire ova imprægnata in testibus, quatenus post coitum tunicae multis sanguineis vasis opacæ conspiciuntur, & sequenti tempore inter tunicas illas glandulosa materia, globuli figuram repræsentans & sensim accrescens, ovum undique comprimit, illudque per foramen ex ejus medio conspicuum expellit. *Vid. etiam Act. Hassn. Vol. V. p. 49. seq.* Idem confirmat Franciscus Stockhamerus *Microcosmogr. cap. 7. p. 91.* his verbis: Excluditur seu decidit ovum ex ovario, quatenus ipsi jam maturo, ac in prolífico coitu fœcundato, a parte postica & circa totum ambitum corpusculum aliquod accrescit fibrosum, quod paulatim adauctum ovum sensim e suo alveolo exprimit aceousque protrudit urgetque, donec ovarii involucrum in papillam acuminetur tandemque rumpatur, & ovum in vicinum decidat oviductum. De hoc ovorum secessu ita judicat Johannes Conradus Peyerus: Circa ovum quodlibet imprægnatum natura carnem fibrosam rubicundam fabricat, quæ ovum istud, haud secus, ac capula glandem, ambit & involvit, tandemque, vbi satis roboris acquisivit, per hiatum sive foramen, in tubam, extremitatibus suis laciniatis atque fibrosis arcte se tunc temporis ovario circumplicantem, expellit. *vid. Joh. de Muralt. Clav. Medicin. p. 402. & p. 415.* inquit: Apparent in prima ovarii inspectione tubercula quædam rubicunda & ferme globosa, &, si dissecueris, fibrosa numero fœtuum in utero reperiundorum exacte respondentia, quibus vix alium in promptu erit usum assignare, quam quod ab iis ovum ab ovario separatum in tu-

bas cornuum uterinorum detrusum fuerit. Juxta Stephan. Blacard. *Instit. cap. 25. op. Tom. I. p. 274.* membrana, qua ovum in ovariiis includitur, glandulosa est; quæ glandulæ incrassescunt & extenduntur, qua ratione etiam ovum exprimitur usque in tubæ cavitatem: imo & color mutatur & humor contentus fit minus vividus, crassus, solidus & glandulosus. Et secundum Joh. Conr. Peyer. *Merycolog. libr. I. cap. 5. p. 49.* pullulantibus tuberculis fibrosis & glandulosis ovum quodlibet fœcundum admirando naturæ ingenio liberatur atque fecernitur.

§. 4.

Quando
hæ glandulæ
generentur?

Utrum vero tales glandulæ vel globuli omni tempore in femellarum testiculis existant, vel tantum post coitum generentur? quæstio adhuc dubia est, de qua videatur Regner. de Graaf *de mulier. Organ. cap. 12. p. 296. seq.* Marcell. Malpigh. *Epist. ad Spon. in Biblioth. anatom. Tom. I. 531. 535.* Joh. Gothofr. Berger. *l. a. p. 457. 460. seq.* Joh. Gulielm. Pauli *Annotat. in Joh. van Horne Microc. p. 239. seq.* Joh. Frid. Ortlob. *Histor. Part. Dissert. 36. p. 281. seq.* Casp. Bartholin. *Specim. histor. anat. cap. 5. p. 81.* Johann. Bohn. *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 18. seq.* qui tale corpus glandulosum sine prævio coitu, vel alio salacitatis stimulo, non generari defendit, quemadmodum, inquiens, aliorum, imprimis quorum fides optima & observandi dexteritas conspicua, avtopsiam in dubium vocare nefas duco, ita quin oculis propriis, cum attentione in materiam, quam mente volvo, directis, diffidam, nemo mihi ratio vertet; adeoque quantum quidem his in diversis, tam humanis, quam brutorum, subjectis usurpavi, nunquam nisi a coitu, me ex crescentiam illam glandulosam observasse, testor. Pauci elapsi sunt menses, cum puellæ sedecim, & paulo post alius, tredecim, annorum, his ipsis vero infanticidæ juveniculæ nona a puerperio septimana, extispicium celebrarem, in quarum neutra, ne vestigium ejus deprehendere potui: pariter, quos uteros vaccinos & ovillos hujus rei experiundæ causa hætenus lustravi, horum non impræ-

imprægnatorum testiculos glomis his glandulosis vacuos, foetorum vero illius tantum lateris, cujus cornu foetum gerebat, testiculum uno, effecto tamen, instructum vidi, hinc ordinari non nisi coitus proliferi productum, substantiam hanc auguror. Sicuti autem experientia innotescit, per petulcam nonnullarum lasciviam & nefandas frictiones ac titillationes interdum, & sine omni maris cohabitatione, aliquod ovulum ad uterum provocari, subventaneum equidem: ita nec ratio deest, quin in ejusmodi subjectis sibi relictis aliquando similis substantia generetur, quatenus vel a stimulis venereis intrinsecis, vel extraordinario sanguinis & succi genitalis orgasmo, exagitationem intestinam & secessum portionis lymphaticæ unius alteriusve ovuli, imprægnationis motui similem, contingere, non impossibile est. Licet autem *h. l.* Bohnius ovula subventanea vel ejusmodi corpus glandulosum absque cohabitatione ejici posse concedat, ovula tamen matura atque ad foecundationem apta sine præcedaneo coitu testiculos non deferere scribit *p. 11.* Georgius Philippus Nenterus *Physiolog. cap. 11. p. 329. seq.* inquit: Nonnulli existimant, in coitu foecundo ovulum ferri ad uterum & in ejus cavitate imprægnari: ad probandam suam sententiam dicunt, ova interdum matura absque ullo prægresso coitu in falacibus, ob nefariam genitalium frictionem ad uterum devolvi: quod, an veritati consonum sit, me nescire lubens fateor. Ova ab ovario per veneris ludibria, hoc est, per falacitatem fricatricum; vel per nocturnas pollutiones in uterum provoluta subventanea atque cassa esse omnia ad unum, scribit etiam Carolus Drelincurtius *de conceptu concept. Perioch. 20. p. 19.*

§. 5.

Alios insuper ovuli ex ovario secessionis vel prolapsus modos & causas alii medici adducunt, siquidem ad mentem Caroli Drelin- *Alii secessionis modi,* curtii *de conception. conceptus Perioch. 11. p. 8. seq.* imaginari est, vesiculas illas plane maturas haud secus ab ovario suo secedere, ac fructus maturissimus sejungitur a ramo. Sicut ergo fructus citra

succum profusum ullum suo pedunculo ab arbore decidit, ita sane hæ vesiculæ, succo licet turgidulæ atque distentæ, illæ sæ & intemeratæ, suis ab ovariis, naturaliter secluduntur, citra scilicet liquorem ullum ab ipsorum vel pelliculis vel vesiculis effusum. Immo, magis apposite dicam, vesiculas illas extreme maturas eodem modo ex ovario suo singulis propelli, ac ovorum vitelli e vitellario suo in infundibulum compelluntur. Hanc tamen sententiam idem autor *Periœch. 57. p. 138. seqq.* adulterinam esse fatetur. Juxta verba Michaelis Albert. *Introd. in medicin. cap. 2. p. 37. §. 78.* ovulum in ovario foecundatum avellitur, cum petiolo suo per motus strictorios a natura matris, & ab eadem mediantibus & continuantibus illis motibus per Fallopianam tubam transprimitur & transfertur intra uterum. Fimbriam tubarum Fallopianarum amplexantem in foecundo congressu ovarium compressione sua ad secessum ovuli symbolum quoque suam contribuere, forte non sine ratione suspicatur Johannes Fridericus Ortlob. *l. 1. a. 282.* contractis enim tunicis ruptura producit in testiculo, per quam ovulum exitum suum invenit. Ex fibris carneis circa ipsa ovaria feminarum reperiendis separationis causas petendas ad Casparum Bartholinum rescripsit Marcellus Malpighius; hæ enim fibræ tractu temporis comprimere possent vasa ad ovum adultum euntia, & ita impeditis quodammodo alimentis corrumpi caulem, quemadmodum in aliis fructibus. Prolixe etiam ovulorum ex ovariis secessum ita describit Isbrandus de Diemberbroec *Anatom. lib. 1. cap. 24. fol. m. 133.* multi, inquit, fructus horarii, cerasa, pruna, persica, juglandes, &c. quorum semina (quæ sunt instar ovorum) ad tantam magnitudinem & aptitudinem deducta sunt, ut foecundari possint, sponte dehiscunt, & sic ex iis semina ista, corticibus suis inclusa, excidunt, sed quousque rorida terræ humiditate, & solaris spirituosæ caloris influxu (quæ duo ipsis sunt instar seminis maris) non irradiantur ac foventur, intra lapidosos suos calices seu testas occulta quiescunt: verum ubi foecundans illa terreæ humiditatis & solaris,

laris, alteriusve caloris conveniens influxus per invisibiles calicum poros subintrans (sicut in oviparis masculini feminis spirituosa pars per invisibiles poros corticum ovorum subintrat) ea ad majorem foecunditatis maturitatem deduxit, mox sponte in suis juncturis emollescunt calices, sicque testæ, quamvis durissimæ, dehiscunt, & inclusa semina mollia magisque succulenta evadunt, ac sese dilatantia testas egrediuntur, atque ita gemmam, primum efformandi delineamentum, projiciunt: Eodem modo etiam res procedit in fabis, pis, tritico, hordeo, seminibus melonum, cucumerum aliorumque, quorumcunque sola membranula (loco testæ) obvelatis. Ita quoque ova muliebria omniumque viviparorum, atque etiam avium, in suo ovario (quod sunt testes in mulieribus) paulatim a nutrimento ipsis, per minimas arteriolas & invisibiles nervulos, allato, justam magnitudinem talemque aptitudinem consequuntur, ut a spirituosa feminis masculini influentis parte foecundari possint: quam foecundationem si per coitum consecuta & sic foecunditatis sigillo donata fuerint, mollescunt & sese dilatant & laxant, quibus in ovario includuntur, capsulæ, atque sic, cum a capsulis ovarii, quibus conclusa latent, præ magnitudinis incremento, & capsularum laxatione, amplius concludi seu contineri nequeant, sponte ex iis excidunt in oviductus seu tubas. Johanni Bohnio *l. a. p. 19. seq.* globus glandulosus, modo descriptus, minime ovulum foecundatum ex ovario protrudere videtur, quippe ejus substantia contractioni præstandæ minus adæquata, i. e. haud fibrosa est, sed quicquid compressionis in ovulum subjacens exerit, a fibroso testiculi involucro habet, non ut externo tantum, sed cujus fibræ matrices ad interiora quoque se insinuant, hinc glomum hunc undique stringunt & cogunt, potissimum vero ejus papillam magis ad circumferentiam testiculi urgent, ac hujus involucro lacerato illius hiatum manifestant, ita quidem ut eum præputii instar non raro retrahant ac revellant. Quæ fibrositatum contractura dum contingit, vasa sanguifera per glandulosam sub-

stantiam decurrentia & ovulo inserta corrugantur, comprimuntur, ut arctatis & flaccescentibus quasi radice seu pedunculo ejus connexu cum testiculo lavetur, donec a fibrosis plexibus plane ejiciatur.

§. 6.

Foramen
in ovario
remanens.

Post ovuli ex ovario ad tubas extrusionem, in testiculo observatur vel remanet foramen quoddam sive hiatus, per quem humanum ovum transierat; & quidem non solum in scrovis, vaccis, damis, & ovibus ejusmodi scrobiculos, qui sinu suo prius ova complectebantur, quam ad uterum descenderent, sæpe se conspexisse, atque palpasse, sed etiam inclytum Wepfferum talem rimam in cadavere infanticidæ decollatæ vidisse, refert Johannes Conradus Peyerus *Exercit. anat.* 16. p. 77. seq. Membrana ovulum includens, emissio ovo, totaliter coarctatur, verum stigma aliquod seu cicatricem semper relinquit, unde facile judicare possumus, quot foetus femina habuerit, juxta judicium Stephani Blancard. *Instit. cap.* 25. *oper. Tom. I. p.* 274. Reperiri autem in mulierum, proxime vel diu post partum defunctorum, ovariis ejusmodi cicatrices, foramina, cavitates, papillas & vestigia ovulorum exclusorum seu exturbatorum testantur etiam multi autores. Inquit enim Johannes Swammerdammius *Miracul. Natur. sive de uter. muliebr. fabric. cap.* 1. *Biblioth. anat. Tom. I. fol.* 498. inveniuntur quandoque in ovario mulierum, quæ pepererunt, istiusmodi cavitates & vestigia, in quibus delituisse vel per quæ transiisse videri poterunt. Fridericus Ruyfchius *in observat. de Ov. in uter. human. repert.* refert, in feminæ cujusdam testiculo sinistro fuisse aperturam, a solerte natura factam, quæ pisum majus suo cavo admittebat, extrinsece contractiorem. *vid. ibid. Tom. I. fol.* 138. In demortuis puerperis non solum cicatricem in tunica ovarii, qua ovulum exiit, sed etiam annotatam a Graafio glandulam luteam, majorem plerumque ovarii partem occupantem eamque crassam, & cicatricem versus papilla sua hiantem ac protuberantem, ductuque sinuoso intus cavam, se publi-

ce demonstrasse, scribit Johannes Gothofr. Bergerus *Physiol. l. a. p. 457.* Vestigium ovi exturbati in testiculo reperiri, atque in brutis quoque aliquoties post partum adhuc papillam hiantem sibi conspicerelicuisse, refert Johannes Bohn. *l. a. p. 20.* Talis cicatricula anno 1707. Francofurti ad Moenum in ovario cadaveris feminini publice dissecti, ab integra medicorum societate fuit observata, referente Andrea Ottomaro Gœlicke *Medicin. Forens. Specim. I. §. 11. p. 22.* quo loco etiam amici fide digni meminit, qui anno 1706. in exenteratione feminæ cujusdam honestæ & quidam gravidæ, non tantum cicatriculam in ovario sinistro, sed quod magis, ipsam cicatriculam grumulo guttulæ fangineæ repletam observavit. Foramen illud, per quod elabitur ovum, papillam vocare Graßum, inquit Casparus Bartholinus *de ovar. mulier. p. 40.* econtra Johannes Conradus Peyerus *Merycolog. lib. I. cap. 5. p. 49.* papillam vocat tuberculum fibrosum, post fœcundum coitum in alterutro testiculo succrescens, quo ovum seu conceptus ab ovario liberatur. Singula ova intra scrobiculum nerveo carnosum nidulari, hoc est, ovum quodlibet haud una pellicula atque folliculo suis, sed insuper testiculorum nucamentis atque calicibus, ceu nidis nerveo carnosus, includi, ait Carolus Drelincurtius *de concept conc. Perioch. 12. p. 10. sq.* Fridericus Ruyschius Amstelodami 1673. in recens gravidæ ovario aperturam pisum majus suo cavo admittentem publice ostendit, huiusque rei vestigia in infanticidæ ovario anno 1696. Basileæ in theatro anatomico publico demonstravit Johannes Jacobus Harderus, vid. Eman. Kœnig. *Regn. animal. Sect. I. art. 17. p. m. 78.* Id confirmat etiam Peyerus *l. a.* Ruyschium in testiculo puerperæ patulum foramen sive hiatus observasse, per quem humanum ovum transierit. Occasione exempli Ruyschiani refert etiam Michael Ettmüllerus *Instit. Physiolog. cap. 22. oper. Tom. I. fol. m. 162.* ipsum in muliere recens imprægnata, a militibus interfecta, observasse 1) in utero ovulum minutissimum, embryonem paucorum dierum; 2) in teste autem dextro

dextro foramen excavatum; & 3) tubam illius lateris incurvatam & proboscidis instar reflexam ad testem. Jacobus Vercellonus Romæ in archihospitale S. Jacobi incurabiliū in viraginis cujusdam, phrenitide ab utero laborantis, cadavere aperto invenit inter alia lævam Fallopianam tubam ad ovarium arrectam inque eiusdem pampinis seu laciniis contentum ovum figura ac magnitudine columbinum exæquans, ut & colore densaque & albida membrana obductum testæ loco. Hærebat autem istud in superiore parte adhuc, dum ipsi ovario mediantibus aliquot fibris inter utriusque substantiam excurrentibus: quibus ablatis facile fuit videre calicem ejusdem ovi (unde fuerat expromptum) etiamnum ovario insculptum, quique parvum muscæ mellificæ favum repræsentabat, ac postremo diffissa illa tunica ambiente vidit Vercellonus humorem quendam aqueum, id est limpidum ac summe fluidum erupisse, in cujus medio extabat alba illa cicatricula, veram humanam carinam repræsentant. v. *Ephemerid. acad. NC. Cent. VII & VIII. obs. 9. p. 23. seq.*

§. 7.

Observatio.

Anno 1719. die 28. Augusti hic Dresdæ Anna Charlotta Bredschneideria, quadraginta circiter annos nata, militis uxor, postquam aliquot, ex farina, cui arsenicum admixtum fuerat, a se paratos globulos, cum viro suo comederat, intra duodecim horas miserrime obibat; vir autem jam sexagenarius post largissimum lactis ejusque feri, deinde, ob hujus defectum maximamque sitim & intolerabilem ardorem, aquæ frigidæ potum, (cujus intra viginti quatuor horas ultra triginta cantharos Dresdenses potarat) tandem conservabatur, ita tamen ut totius corporis cutis, pili atque ungues intra trimestre spatium secederent atque elabarentur. In defunctæ hujus uxoris ratione officii a me dissecto corpore non modo externe, sed interne quoque in faucibus, œsophago, ventriculo & intestinis veneni signa erant conspicua; præterea etiam in dextro testiculo seu ovario tam magnum & profundum depre-

hende-

hendebam foramen, ut maximum pisum vel globulum adhuc majorem immittere potuissem: Cum vero primo adstantes uxores, deinde etiam ipsius adhuc vivum interrogarem maritum, an & quot liberos habuisset defuncta? omnes, ipsam nunquam peperisse, respondebant, quod etiam ipsius vir exinde confirmabat, quia ante ipsum nulli marito nupta fuisset. Quod si proinde ex ejusmodi foramine seu fovea ovarii, certum antecedentis partus signum desumi debet, dicta sane femina furtivi amoris indeque subsequenter & clandestini partus suspicionem evitare vix poterit. Post editos gemellos duplicem foveam in ovario sinistro annotavit Swammerdamius, uti ex ipsius epistola recenset Justus Schraderus *Præfat. obs. Harvei.* ** b. scilicet femina sex mensibus gravida postquam gemellos exanimis pepererat, vivere desiit; aperto ejusdem cadavere, occurrit uterus, magnitudine caput infantis æquans, in cujus cavitate nil nisi sanguis concretus delituit, a quo & orificium ejusdem internum propter insignem sui expansionem tres digitos junctos facile transmittens, fuit obturatum. Testiculus dexter nullam alterationem passus, sed plane integer; in sinistro vero visa est quædam quasi inflammatio, præterea notabilis cicatrix, qua divisa corpusculum heterogeneum, fibrosum, subflavum, duplici foveola præditum se obtulit &c. Quomodo autem ovum majus per foramen minus penetrare possit, per quod ipsi negandus videbatur egressus, ostendit Daniel Sauvry; ovum scilicet, dum prolongatur, crassitiem imminuit, foramen ob membranæ tenacitatem dilatatur. Hanc assertionem eleganti illustrat experimento. Nempe si ovum gallinaceum acetum immittatur, ut testa mollescat, per foramen ipso multo minus urgeri potest in vitrum, ex quo non patet per idem reditus, si assueta aqua testa rursus induretur. vid. Act. Erud. Lips. Ann. 1706. mens. Novembr. p. 526. In canibus se aliquoties deprehendisse foramina in ovariiis, quæ ovula nuper detinuerant, recordatur Christ.

Joh. Langius *oper. Tom. I. f. m. 228.* Id quod etiam in canibus sæpius observare mihi contigit.

CAPUT V.

De ovuli per tubas Fallopianas descensu.

§. I.

*Ovula per
tubas ad u-
terum de-
scendunt.*

OVulum autem in ovario fœcundatum atque post aliquot dies ab eodem dicto modo secedens a tubis Fallopianis (de quibus in Muliebribus, pluribus egimus) ordinarie excipitur perque earum canales ad uteri cavitatem defertur seu protruditur; quamquam interdum etiam extraordinarie, & antequam ad tubarum extremitatem laceratam perveniat, in abdominis cavitatem prolatur, interdum etiam in ipsis tubis adhuc hærens ac ulteriori ad uterum descensu impediatur; quod medicis conceptio tubaria vel fœtus tubarius appellari solet.

§. 2.

*Tubarum
ad ovaria
applicatio.*

Cum vero tubarum extremitates fimbriatæ extra fœcundum coitum a testiculis seu ovariis ad certum spatium distent, ut adeo fœcundatum ovulum, ex ovario prolapsurum, minime amplecti posse videantur, nonnulli autores, secundum hætenus dicta, conceptionem in ovario penitus negant, vid. Joh. Swammerdam. *Miracul. natur. in biblioth. anat. Tom. I. fol. 497.* alii vero in coitu fœcundo tubas Fallopianas pro duplici scopo, tum, secundum quosdam, pro ipsius feminis materialis, vel secundum alios, pro ejusdem tantummodo auræ genitalis seu partis spirituosæ, ex utero ad ovarium ascensu, tum etiam pro ovuli fœcundati simul ad uterum ingressu vel propulsione, per certam fibrarum vellicationem & motum, a coitu ortum, ad ovarium trahi seu applicari defendunt, & quidem illi, qui ovulum statim in coitu ex ovario ad uterum descendere credunt; Illi vero, qui ovulum demum post aliquot dies ad uterum pervenire statuunt, in duas sententias abeunt,

abeunt, dum alii talem tubarum cum ovario connexionem a coitus momento usque post ovuli descensum durare, alii vero bis, scilicet in coitu pro ovi imprægnatione, & deinde iterum post septem vel octo dies, in mulieribus, pro fœcundati ovuli ad uterum ingressu, accidere statuunt. Sicuti autem paulo ante virilis seminis ejusve auræ genitalis ex utero ad ovarium ascensum non per solas tubas earumve ad ovarium applicationem fieri, sed potius per certam totius humorum massæ, a spiritu seminali factam alterationem, unum vel alterum ovulum imprægnari statui; ita pariter hoc loco, ut mentem meam de tubarum ad testiculos applicatione paucis quoque explicem, minime tubas Fallopianas statim in momento coitus ovariis annecti, ut semen vel auram genitalem ad ovula admittant, sed post aliquot demum a coitu dies, pro excipiendo fœcundo ovulo, per fibras testiculi motrices, ad tubas excurrentes atque ab ovuli incremento lacescitas, testiculis applicari ex ea ratione judico, quod in canicidiis, ante quadraginta aliquot annos, curiositatis gratia a me tentatis, nunquam primo die vel statim post coitum, sed tertio saltem vel quarto die dictas tubas ovariis propiores, vel proximas, vel penitus etiam iisdem annexas, ovulaque jamjam in orificio continentes, primo autem & secundo die remotiores deprehenderim; Quapropter etiam tam vehementem tubarum motum earumque ad ovaria applicationem non statim in cohabitationis actu, sed potius successive intra aliquot dies tam dictam applicationem, quam ovuli ex ovario exceptionem ejusque ad uterum transportationem fieri, in hoc obscuro mysterio, non improbabiler imaginor.

§. 3.

Quid autem de hoc tubarum Fallopianarum motu earumque fibris motricibus & usu, item de ovulorum ad uterum transitu, alii autores statuunt, partim ex *Muliebr. Sectio III.* partim ex sequentibus videri potest, imprimis autem ovulorum ad uteri descensu.

*Tubarum
motus
quomodo
fiat?*

scensum illæ promovent. Inquit enim Georgius Psilippus Nenterus *Physiolog. cap. 2. p. 330.* ovuli ex ovariis per tubas in uteri cavitatem descensum promovent ipsarum tubarum extremitates, quæ, etsi cum testibus immediate non cohæreant, in coitu fecundo turgidæ redditæ testes ambiunt & constringunt, & hoc modo ovulum imprægnatum ex testibus in tubas exprimunt, unde etiam plerumque in testibus, si post conceptionem inspiciuntur, cicatrices adhuc apparent & tuba, per quam ovulum ad uterum provolutum fuit, turgida admodum deprehenditur: uti ante elapsos aliquot annos in theatro anatomico cernere mihi licuit. Casparus Bartholinus *Specim. Histor. anat. cap. 5. p. 87.* ait: quod transitum spectat & viam ovi ab ovario in uterum, cum certum sit, post conceptionem a sanguine, feminali vi imbuta, mutata quædam ova intra oviductum recipi, hoc in mulieribus & quadrupedibus per tubas uteri fieri, neutiquam negari potest, præcipue cum 1) nulla alia e testibus in uterum detur via, nam fictitia omnino sunt illa vasa, quæ nomine vasorum deferentium in mulieribus descripserunt antiqui. 3) Tubæ orificium fibris motricibus instructum esse, evidentissimum sit, & illud ipsum testiculum seu ovarium amplecti non raro observetur. 3) Non infrequens fit in tubis ova delapsa reperire, imo & in tubis ipsum foetum repertum testentur variorum observationes. 4) Denique orificium tubæ in avibus & quadrupedibus omnibus ejusdem sit figuræ. Oviductus, vigente venere, ovarium versus æstuans porrigitur, & pansis ac diductis fimbriis suis musculosis, veluti digitis, se circa idem circumjicit, atque ita illud complectendo, compressu suo venereo erupturum ex hiatu, vel rima ovarii ovulum exprimit, & patente ore suo, ac hiantibus veluti faucibus, excipit, fibrisque suis musculosis motu successivo & peristaltico ad uteri fundum usque rotat & pervolvit, secundum verba Johannis Gothofredi Bergeri *Physiolog. p. 461.* Non potest in coitus momento accidere, ut ova fecundentur, ex testi-

testibus expellantur, a tubis Fallopianis excipiantur & in uterum propellantur; ad hoc quippe aliquod tempus requiritur. Intra hanc tubam, non tantum ova, sed etiam foetus fuerunt reperti, quod signum, ova ire per has tubas ad uterum, vid. Theod. Craan *de Homin. cap. 162. p. 709.* Michael Bernhardus Valentini *Epistol. ad Joh. Dan. Dorstenium de Monstr. Hassiæ*, ita scribit: Viam, qua ovula illa, embryonum typum continentia, ex ovario in uteri conca-merationem pervenire solent, per tubæ Fallopianæ ductum successive fieri, experimentis suis & figuris jamdudum observarunt recentiores anatomici, Ruyschius, Graffius, Bartholinus, Diemerbroeckius aliique. Quin & ipsæ sæpe mulieres hos ovuli gressus & progressus sentire solent, quæ, ut sub primos imprægnationis dies horrore quodam febrili succutiuntur, ita paulo post per aliquot dierum spatium ad regionem ischiaticam titillationem quandam persentiscunt, *es kitzelt so nach dem Schoosse zu*, sicut id ex orali curiosarum matronarum confessione quivis haurire poterit. Ut enim mediante titillatione hac sensibiles admodum tubarum uterinarum extremitates ovario applicantur, illudque singulari modo exosculantur, ita fere sensus hic eousque perdurare solet, donec superato tubæ ductu anfractuoso in uterum protrudatur ovulum, & per affluentem ex arteriis pulsem nutritivam ulteriora incrementa capiat. v. *M. N. C. Dec. II. an. 3. p. 480.* Juxta Carol. Drelincurt. *de conc. concept. Perioch. 15. p. 13. sq.* non solum faucibus appendicum uteri sorbentur ova, sed & eadem in appendicum cellulas pedetentim devolvuntur. Imo e cellulis tandem ambagiosis illis & nerveo-carneis, quæ suis fibrillis sese circum ova contrahunt, in uteri fundum usque demittuntur & rotantur. Franciscus Stockhamer. *Microcosmog. cap. 7. p. 92.* Oviductus, inquit, ovaria e longinquo ambiunt, suoque fine in fimbrias lacero, ad ea accedunt, ut decidua ova recipiant deferantque ad uterum. vid. etiam Christ. Frid. Garmann. *Epistol. 100. p. 434. seq.* Joh. Frid. Ortolob. *Histor. Part. dissert. 36. p. 282. seq.*

§. 4.

*Tubarum
angustia.*

Annon tubæ circa insertionem in uteri fundum sint nimis angustæ, ut ovulum vix in uterum immittere queant? agit Johannes Conradus Peierus in Joh. Muralt. *Clav. medic. p. 409.* eo, inquit, loco, quo tubæ uteri fundo utrinque inferuntur, angustia quidem apparent, sed non tantæ, quin stylo tenuiori introitus in uteri cavitate facile patefcat; quare, sicut ureteres, alias valde angustos, a calculo transituro plurimum aperire cernimus: vel quemadmodum uteri osculum internum tempore gestationis strictissime occlusum, instante partu, integrum fœtum transmittit, quidni pariter de istis angustis concipiendum sit, illas eo conceptionis momento, quo ovulum ovario excussum ingressum in uterum affectat, referari, ac quantum par est, ampliari. Maximæ difficultatis opus esse, hunc motum ovi ex ovario per tubam in uterum debito modo demonstrare, olim putabant medici, uti pluribus demonstrat Johannes Swammerdammius *de uter. muliebr. Fabric. cap. I. v. Biblioth. anat. Tom. I. fol. 497.* Quod confirmat etiam Petrus Stalpart van der Wiel *Exercit. de Fœt. nutrit. p. 6. seq.* modumque ita explicat: Ovum e veteri sede egressum magis commodam occupet, necesse est, ad quam non nisi per viam admodum angustam pervenit, nempe per tubam Fallopianam: quo pacto autem illam subintret, diu fuit litigatum, & adhuc sub judice lis est. Qua de causa nonnulli ignorantiam suam dissimulantes qualitatibus, nescio quibus, occultis adscribere: nobis autem ad has, ignorantia totidem asyla, præsertim hic recurrendum minime est, quoniam hoc cuivis ad structuram, & situm tam ovarii, quam tubæ Fallopianæ, ac ad illa, quæ, dum fermento virili substantia ovi est infecta & turgescit, fiunt, recte attendenti satis clarum evadet. Ovario namque sensim turgescente, necesse est, ut etiam magis ac magis orificio dictæ tubæ appropinquet, aut vice versa, dum situs hujus tubæ ita se habeat, ut ejus orificium semper ovarium spectet, & quando ovarium intumescit, non solum accedit

dit ad tubam, respectu illius spatii, quod tum magis occupat, sed etiam, quatenus increfcit & intumescit, membranam inter tubam & ovarium intermediam, ob figuram alam vespertilionis dictam, reddit breviorē, ac proinde orificium tubæ quasi ad se trahit, unde tandem illud (utero insuper spirituum humorumque in ejus substantiam per feminarum ex voluptate palæstræ venereæ, ejaculationeque virilis fermenti protractam imaginationem, majore influxu nonnihil tumefacto adjuvante) ovario, vel potius ovo, jam extra ovarium, ut solet vulgo semen extra terram, propullulanti fit contiguum: quo facto data est occasio, ut ovum jamjam vinculis suis liberandum viribus propriis domicilium mutet. Ovum dictam tubam ingressum ulterius pergit, & gyris istis, qui tubæ, tanquam totidem valvulæ, ne illud repellatur, inserviunt, post idem a pressione partium circumjacentium, magis inflexis, uti & accedente majori spirituum influxu per tubam propellitur in uteri cavitatem &c.

§. 5.

Tubarum fimbrias, mentulæ ad instar languente venere languere, vigente vero vigere, id est, penis atque clitoridis ritu vel flaccescere atque collabi, vel turgere atque porrigi; earumque fimbrias sanguine spiritibusque venereis turgidulas huc & illuc attolli atque vagari, donec impetu cæco ruant in testiculorum amplexus: Nam uti profecto feminæ v. g. bombycum papiliones apertum & erectum podicem cupidine cæca tamdiu jactant atque circumferunt, quam mari copulentur; ita prorsus musculosæ fimbriæ nostræ sese primum, manus ad instar, expandunt, seseque totas deinceps in testiculorum ambitum diffundunt, quos suis veluti digitis (erectis & expansis quidem, sed nonnihil tamen reductis) comprehendant atque comprimant. Præterea fimbriæ illæ isthoc venereo suo complexu atque compressu aliquam e testiculis hydatida, seu vesiculam limpidam elidunt, inque suas fauces, hoc est, in os patulum detrudunt; uti scribit Carolus Drelincurtius
de

de conceptu conceptus Perioch. 7. 8. 9. p. 5 seq. vid. etiam Eman. Kœnig. *Regn. anim. Sect. I. p. 77.* Tubarum substantia est carnosâ, ut motum habeat, utque ovulum facilius in uterum delabatur. Seminis virilis portio maxime volatilis a tubis ad ovarium usque transfluit ad ova fœcundanda. Seminalis hicce spiritus tubas pervadere non potest, quin motum ipsis imprimat: Hinc fit ut lacerum frustrum ovarium undiquaque amplexum veniat, adeo ut ovum, quod feminis spiritus fermentarunt, sensim ab ovario exsolvatur, membranam disrumpendo, ut tubam subeat tandemque in uterum descendat, juxta Petr. Dion. *Anat. demonstr. 4 p. 226.* Exacte de ovuli ad uterum per tubas descensu agit etiam Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 20 seq.* sequentibus verbis: Ad uterum demum devolvitur conceptus per tubas, pari modo ac in oviparis per oviductum, quatenus primo ratione conformationis atque connexionis notabilis has uteri appendices & oviductum gallinaceum intercedit analogia: secundo harum extremitas fimbriata & musculosa post coitum fœcundum testiculis propinquior, imo hos arctius complecti cernitur, ut præter Ruyfchii tabulam, qua in utero recens imprægnatæ embryonem paucorum dierum, in illius testiculo dextro aperturam & tubam ejusdem lateris proboscidis instar ad ovarium reflexum testatur, aliorum anatomicorum observationes perhibent. Quibus tertio jungendum, quod in brutorum non tantum tubis, tertio, quarto &c. a coitu die ovula has permeantia, sed fœtus quoque humani intra easdem aliquoties deprehensi fuerint. Facit denique huc, quod tubis constipatis nulla in utero fiat conceptio. Cum vero tubarum extremitas patula, ratione cujus ovulum a testiculo arripit, in homine aliisque viviparis ab hoc multum distet, nova de hujus applicatione & adductore emergit difficultas, seu quæ mechanica pro ovulo immediate excipiendo testiculis admoveantur: Siquidem quam Graſius suggerit, quasi feminis masculini blanda titillatio orificium illud fimbriatum adaptet, haud omni dubio caret,

ret, potissimum cum ejusmodi stimulus & vellicatio tubas has, tanquam conformationis fibrosæ, non tam explicare, sed elongare, eorumque orificium aversum sursum reflectere ac testiculis adaptare, quam corrugare atque retrahere valeat. Pro phænomeni itaque hujus ætiologia explicanda observandum, canales hos ratione suæ substantiæ, qua uterum, cujus appendices æmulantur, fibroso-spongiosæ texturam corporibus penis nervosis similem fovere, hinc ab œstro venereo, a maris semine impresso ad turgescentiam aliquam disponi. Atque hac quidem tenentia potius a testiculo, quam ad eundem exporrigerentur, nisi a fibris motricibus a testiculis, vel immediate magis vel per ligamenta, sub diversis inclinationibus ad tubas excurrentibus, pariter a turgescentia illa genitali laceffit, tanquam totidem habenis seu loris revellerentur, & ad elapsuri ovuli exceptionem disponderentur. Quod quidem eo commodius fit, quatenus earum lacinia foliaceæ musculosæ, instar digitorum, testiculum complectuntur, moliterque comprimunt, i. e. ovuli eruptionem non minus juvant, ac elisum, apprehendunt, & per orificium angustius ac circularibus fibris firmatum ad tubæ sinus latiores protrudunt, a quorum fibris muscularibus successive & motu quodam peristaltico ad uteri cavum devolvitur. Binis vicibus tubas Fallopianas ad ovaria applicari statuit Christianus Johannes Langius *Physiolog. Th. 38. Oper. Tom. I. f. 227 seq.* & primo quidem illo tempore, quando genitalia mulieris a titillatione venerea tenduntur, & mentulæ virilis ad instar eriguntur, probabile est, has extremitates laciniatas simul expansas & rigefactas, manus ad instar arripere & comprehendere ovaria, usque donec feminis virilis subtilior seu activa portio per patentes tubæ fauces ex utero illuc transierit. Quo facto tubæ hæ, languente venere, flaccescentes ac pendulæ rursus quoque fiunt, adeo ut æque ac antea a testibus prorsus remotæ intuentibus se offerant; Deinde, quando ovulum fœcundatum spatio aliquot dierum ab intumescente corpore glanduloso, disruptis tu-

nicis, intra Fallopiæ tubæ extremitatem, ovario jamjam altera vice ad motum, protruditur.

§. 6.

Tubæ ovariiis applicatæ.

Revera autem tubas Fallopias testibus muliebribus sive ovariiis post coitum applicari testantur observationes atque icones seu figuræ ab autoribus annotatæ, qualem uteri non diu post imprægnationem e corpore dissecti iconem, in qua tuba sinistra ipsi ovario inhæret, communicat Godefridus Bidloo *Anat. hum. corp. Tab. 53.* In teste dextro foramen excavatum & tubam illius lateris incurvatam, & proboscidis instar reflexam observasse Fridericum Ruyschium, refert Michael Ettmüllerus *oper. Tom. I. fol. m. 162.* Ipse autem Ruyschius *observat. de ovo in uter. hum. repert.* inquit: pars tubæ Fallopiæ proboscidis instar, ad ovarium torta videbatur, ut ovum maturum exciperet. v. *Biblioth. anat. Tom. I. f. 738.* Hujus observationis meminit etiam Joh. Gothofr. Bergerus *Physiol. p. 456 seq.* inquit: primus & clare Ruyschius in muliere brevi ab imprægnatione interempta ovi nuper exclusi in testiculo sedem, partemque tubæ, proboscidis instar ad ovarium tortam, ut maturum exciperet ovulum, vidit & demonstravit. In utriusque sexus cohabitatione foliacea tubæ alterutrius ornamenta sæpius ad ovarium applicari, per experientiam Vallisnerii atque Littre confirmat Franciscus Maria Nigrifoli. *vid. act. erudit. Lips. an. 1714. mens. Novembr. p. 521 seq.* Inquit etiam Johannes Swammerdamus *mirac. natur. cap. 1.* Quod in gallinis nonnunquam fieri observavimus, ut infundibulum membranosis suis expansionibus ipsum ovarium amplectatur, idem in mulieribus tempore conceptionis, ubi ovum deponitur, accidere, & tubam applicatam orificio suo ipsum ovum excipere credemus, tantisper, dum meliora succurrant. v. *Biblioth. anat. Tom. I. fol. 498.* Tubam dextram insigniter dilatatam ovulum ejusdem ovarii amplexantem Bussiere deprehendit. v. *Joh. Gugl. Pauli Annot. in Joan. van Horne Microc. p. 241.* In utriusque sexus cohabitatione foliacea tubæ alterutrius ornamenta

menta sæpius ad ovarium applicari, per experientiam Vallisnerii atque Littre confirmat Franciscus Maria Nigrifoli *v. act. erudit. Lips. 1714. mens. Novembr. 522.* Tubarum extremitates ova e testibus prolabantia excipere judicamus, quia ut plurimum in brutis tubarum extremitatem testiculos tam accurate amplectentem invenimus, ut quicquid ab his prolaberetur, nec essario in tubarum capacitatem incidere deberet: quod tanto liberius asserimus, cum in variis quadrupedibus extremam tubarum expansionem ejusmodi, ut oviductus infundibulum, quod in avibus vitellos excipit, efformatam offenderimus, inquit Regnerus de Graaf *de mulier. organ. cap. 14. p. 351.* In cadavere viraginis annos duodeviginti natæ, atque Romæ phrenitide ab utero denatæ, lævam Fallopianam tubam, ad ovarium arrectam, inque ejusdem pampinis seu laciniis contentum ovum, figura & magnitudine columbinum exæquans, ut & colore, densaque & albida membrana testæ loco obductum invenit Jacobus Vercellonus. *vid. Ephemerid. acad. N. C. Cent. VII & VIII. obs. 9. p. 23. seq.* In canibus post coitum tubas ovariis applicatas vel versus eadem tensas sæpe mihi observare licuit. Puerpera juvencula pridie puellam enixa alium adhuc mortuum in utero habebat foetum; quæ cum sequenti die fatis concessisset, a Bernhardo Albino secta exhibebat testes, ovis turgidulis, pellucidis & copiosis refertos: e dextro teste pollicis latitudine, mediantibus vasis sanguiferis versus tubam Fallopianam, ovum pendebat, quod magnitudine pisum majus adæquabat. *vid. M. N. C. Dec. IV. obs. 94. p. 187.* Porro foetum in ovariis quandoque reperiri, testatur Dn. Littre in *Act. Erudit. 1706. mens. Jun. p. 265.* In-
Foetus in ovario.
credibile equidem videbitur multis, in ovulo cum ovario cohærente cerni posse foetum, quem tamen laudatus anatomicus, eumque tres lineas longum, unamque lineam cum dimidia crassum, & interveniente tenuissima chorda membranis vesiculæ annexum, in hac ipsa duabus aliis minori atque ovario feminæ sinistro majori inexistente, distincte cum aliquot ejus partibus lustravit.

§. 7.

Ova in tubis.

Nonnunquam etiam ovula in ovariis imprægnata atque per tubas Fallopianas ad uterum tendentia ab ulteriori descensu a variis causis impedita in iisdem ab anatomicis sunt deprehensa. Anno enim 1694. Dn. Buffiere, anatomicus & chirurgus Gallus, in diario eruditorum Parisiensi gallico fermone exhibuit epistolam de ovo in tuba Fallopiana cadaveris foeminini dissecti reperto. Postquam enim foeminam juvenem, quæ non multo ante pepererat, aperuit, tubam dextri lateris versus extremitatem suam præter solitum distentam, versus matricem vero paulo diminutam deprehendit. Pars vero eum in modum dilatata sese incurvabat totumque fere ovarium amplexabatur, cujus membranæ tam firmiter adhærescebat, ut non nisi vi ab ea divelli sese pateretur. Tandem tuba ab ovario separata, ovum conspectui aperte oblatum fuit. Æquabat autem magnitudine avellanam, ejusque tres quadrantes extra ovarium per foramen ibidem factum jam prodierant, ut illi non amplius adnexum videretur: Nihilominus tamen, cum auferre illud operator niteretur, per exiguum quendam, fatis tamen durum petiolum adhuc adhærere observabat, per quem vasa quædam sanguinea pertransibant, vid. Andr. Ottom. Goëlicke *Histor. chirurg.* §. 272. p. 186. In tubæ Fallopiianæ pampinis seu laciniis contentum ovum figura & magnitudine columbinum exæquans observasse Jacobum Vercellonum, paulo ante ex *Ephemerid. acad. N. Cur. Cent. VII. obs. 9. p. 24.* adduximus. Ovula in tubis diu post copulam etiam foecundam inveniri, imo ibi affigi ac foecundari, scribit Daniel Hoffmannus *Annotat. ad hypothef. Goveyan. p. 69.*

§. 8.

Conceptus tubarius.

Quandoque etiam accidit, ut ovum ita foecundatum ob varias causas, in tubis uterinis diutius persistat & foetus ibidem majus incrementum vel totam etiam perfectionem acquirat, talisque foetus vocatur tubarius vel etiam conceptus tubarius quasi con-

conceptio in tubis facta sit. Inquit enim Theodorus Craan *Dissert. de homin. cap. 162. pag. 709.* intra hanc tubam non tantum ova, sed etiam foetus fuisse repertos, quod signum, ova ire per has tubas ad uterum: Ejusmodi observationes aliquot annotavit Johannes Riolanus *Anthropogr. Lib. II. cap. 35. fol. 180.* Decem, inquit, anni sunt jam elapsi ab eo tempore, quo hæc scribo, quod chirurgus Parisiis, præsentibus medicis in mortua muliere dissecta, pusillum foetum optime conformatum in cornu dextro uteri, sive tuba, invenit. Similem foetum a sexaginta annis in iisdem vasis Parisiis visum fuisse, a chirurgis fide dignis mihi narratum est. Sed recens habemus exemplum de lotrice lintheorum cubiculi reginæ, ab aliquot annis in ejus corpore inventus foetus pollicis longitudine & crassitie bene conformatus, intra uteri cornua locatus, qui dolores adeo crudeles per quatuor menses excitavit, ut tandem vitam cum morte commutarit, mense graviditatis septimo. Id rescivi ab eruditissimis doctoribus Parisiensibus, qui apertioni cadaveris interfuere, Petro Seguino, scholæ nostræ seniore, primario reginæ medico, & P. Yvelin medico regis & reginæ, qui historiam a se descriptam mihi dedit, & foetum, quem adhuc servat, ostendit. In historia inter alia hæc habentur: Discisso abdomine post magnam sanguinis copiam in conspectum venit tuba uteri in sinistro latere, supra modum tumefacta, eaque aperta deprehensus foetus bene formatus, plusquam bimestris, involucro carneo obvolutus, quod secundinam referebat. Istud prodigium reginæ totique aulæ regiæ demonstravit. Exemplum simile Auarici Biturigum ferme ab annis triginta observatum fuit, de quo dictus Riolanus *l. a.* plura refert. Quanquam, juxta Thom. Bartholin. *anat. lib. I. cap. 17. p. 260.* testetur Guido Patinus, successor Riolani, nunquam id credidisse Riolanum, sed tantum scripsisse, ne fidem videretur derogare aulico narranti. Benedictus Vassalius equidem in muliere quadam duas matrices atque in utero adjuncto foetum se reperisse statuit, vid.

Henric. Oldenb. *Act. Philosoph. Angl. p. 814.* quod si tamen figuram ibidem communicatam intueamur, facile patet, uterum secundum, seu cavitatem, in qua foetus latuit, nihil aliud, quam tubam Fallopionam fuisse. vid. etiam Theoph. Bonet. *sepulchret. lib. III. Sect. 37. fol. 1367.* Joh. Sigism. Elsholt. *Epist. ad Volrath. Huxholt. de conceptione tubar. v. M.N.C. Dec. I. an. 4. append. p. 76 seq.* Inquit etiam Gulielmus Harveus *de generat. animal. cap. 65. p. m. 425.* quemadmodum alia animalia semper in cornibus concipiunt; ita aliquando etiam mulier reperta est, quæ foetum in cornu sive tuba gereret, ut doctissimus Riolanus ab aliis observatum meminit, & nos etiam propriis oculis conspeximus. De ejusmodi conceptione tubaria scribit etiam Nicolaus Venette *de la generat. de l'homme Part. III. art. 6. p. 428.* je trouve dans mes memoires, qu'il y a environ 23. ans, qu'un vieux medecin, appelle Jean Critier, personnage tres-savant & tres-sincere, me racconta a Paris une histoire, que Monsieur Mercier, medecin de Bourges, qui vivoit encore alors, luy avoit faite de certe sorte: La femme de Monsieur Agard Lieutenant Criminel de cette ville-la, de la santé dela quelle ce dernier avoit le soin, devint grosse, & se porta assez bien jusques au quatrieme mois, après quoy elle souffrit des foibleesses & des douleurs extrêmes aux reins & dans le ventre, principalement du côté droit. Tout cela l'épuisa tellement, qu'elle mourut sans pouvoir se delivrer. On l'ouvrit le 2) Janvier 1614. on trouva une fille longue de 7. pouces dans la corne droite dela matrice, la matrice estant alors dans sa figure & situation ordinaire, si bien qu'après cela on peut dire, que la conception se fait ailleurs, que dans la cavité de la matrice, & que le fetus, estant deja assez grand, & ne pouvant plus demeurer dans l'une de ses cornes, il faut qu'il en sorte pour se perfectionner ailleurs, ou que la mere en meure. Et Petrus Dionis *des Accouchem. lib. I. cap. 11. p. 93.* scribit: j'ai reçu de Brest, il y a peu d'années la relation d'une grosse, dont l'enfant avoit été formé dans la trompe, je ne l'ai pas en-

core

core donnée au public, mais elle confirme les autres, & prouve, que c'est un fait constant, qu'il y a eu des enfans, qui se sont formez dans la trompe, comme dans la matrice. Et Johannes de Muralto *Clav. medicin. p. 411.* hæc Johannis Conradi Peyeri verba communicat: in tubis uteri humani nunquam, nec nisi gravi quodam errore, foetus hæret, cujusmodi unicam observationem mihi legere contigit in actis philos. societ. reg. Anglic. *menfe Junio anni 1669.* Putarunt autem, qui mulierem istam difsecuerunt, eam duplici fuisse utero instructam, cum non nisi tuba effet, a foetu mihi ex ovo in transitu hærente genito, in magnam molem dilatata. Huc pertinet etiam experimentum, quod Antonius Nuck *Adenograph. cap. 7. p. 68.* circa animalis ex ovo generationem communicat: Cani feminæ, tertio post congressum institutum die, extraxit per vulnus abdomini inflictum, sinistri lateris cornu (cujus ovarium jam duobus ovulis majusculis notabiliter conspicuum) inter vaginam & ovarium, medio loco, ligatura arctiori constrictum, reposuit, vulnusque intra octiduum ad cicatricem perduxit. Vigesimo primo, post ligaturam injectam, die, canem, culto anatomico examinandam, inspicit, & quod ante hariolatus erat, etiam plene perspexit. Sinistri cornu pars (inter ligaturam & ovarium) plane vacua ipsi visa, quod manifestissime probat, ovula ulterius, quam ad ligaturam, propelli non potuisse, & in ipsis ovulis, aura feminali foecundatis, foetus quærendos esse, non vero in semine virili. Oppositi lateris cornu itidem inspecto, tribus foetibus distentum reperit.

§. 9.

Epistolam de foetu humano post unum & viginti menses ex uteri tuba, matre salva ac superstita, a se exciso ad Thomam Millington anno 1700 Lugduni Batavorum edebat Abrahamus Cyprianus. Militis scilicet uxor annos circiter triginta duos nata & cesantibus menstruis jam tertium imprægnata ad nonum usque mensem se experta est quoad omnia ingravidationis signa in eodem

Cypriani
observatio.

dem statu ac dum alias utero gereret, hoc uno excepto, quod toto illo tempore nihil lactis in mammis apparuerit. Foetus vivacis motum fortiolem & auctum sentiebat, foetumque loco non consveto, sed paulo altiori, situm esse deprehendebat; ubi vero instaret parturiendi tempus, tum magnos dolores sentiebat, tum etiam motus in foetu vehementiores, adeo ut jam partus appropinquare videretur; verum omnia irrito prorsus successu. Nam præter crebras & magnas insueto in loco motiones nullus foetum egerendi conatus aderat: Exinde omnis spes partus legitimi evanescebat, & cessante tunc omni foetus motu, ac paulatim melius sese habente ægra foetum fato cessisse non dubitabatur. Elapso mense decimo fluxerunt de novo menstrua per totam gestationem suppressa, neque jam amplius motus aliquis in foetu deprehensus, sed pondus tantum iners & incommodum. Circa Mensem decimum octavum muliercula ledò decumbere cogebatur; de dolore acuto circa umbilicum conquerebatur, quem ulcus fungosum subsequabatur. Mense a prima conceptione vigesimo primo dictus Cyprianus, cum ægram conspexisset; & omnes circumstantias ad examen revocasset, eam foetum mortuum gestare asseribat. Hinc dilatato tantisper ulceris fistulosi orificio digiti minoris apicem immisit, eoque foetus os parietale se contingere credebat. Ex iis audacior factus, & de situ etiam securus foetum in tuba dextra uterilatiere nulla mora pronunciabat, ægramque admonebat, si sectionem admittere vellet, spem adhuc aliquam salutis superesse, cum cæteroquin mors miseranda eam præstolaretur. Ipsa interim jam sese movere non poterat, aut alimenta capere, verbo morti vicina: Itaque admonitioni faciles præbebat aures, atque constanti animo se quodlibet passuram dicebat, ut quamprimum foetus eximeretur. Omnibus igitur ad excisionem paratis hoc modo operator procedebat: Introducto per ulcus stylo abdomen a latere dextro aperuit, ac indicem digitum immisit: ubi vero se intra tubæ Fallopiæ cavitatem pervenisse deprehendebat, juxta rectitudinem

tudinem lineæ albæ, forcipe supra digitum posito, deorsum versus scissuram faciebat, quantam una vice poterat. Tunc foetus illico in conspectum veniebat, isque justæ magnitudinis. Hunc ut facilius absque ulla vi eximeret, aperturam utrinque producebat ad pedalem usque longitudinem, manuque sinistra leviter premendo intestina, alias operationem turbatura, si motu diaphragmatis extruderentur, in cavitate detinebat, foetumque absque multo negotio integrum extrahebat &c. Hanc Cypriani epistolam etiam Gallice editam dans le Chirurgien d'hospital de Belloste, Amstelodami 1707. reperimus.

§. 10.

Sequentes observationes refert Daniel Meno Matthiæ *observ. 19. p. 106 seq.* Anno 1676. Koyskavolæ feminam in tertium mensem *serv.* gravidam dissectam, (quæ maligna febris interempta erat) visitabamus, & in cornu dextro materiam limpidam, in sinistro foetum femineum esse contentum vidimus. In juvenca laniatoris, violentia in mortem missa ad duodecimum diem gravida, primum foetum gerenti, inveni hic in Zelandia, anno 1681. rudimenta embryonis in cornu dextro; Et ut eo clarius ob oculus poneretur curioso, tabulam æream apposuit dictus autor, in qua locum in dextri lateris cornu, ubi embryo fuit excissus, simul notavit. Il est certain qu' on a veu à Paris deux ou trois fois des foetus formez dans le tuba uteri, dont on n' a jamais pû sauver les meres. *v. Journ. des Savans Tom. V. p. 134.* Paulus Bernhardus Calvo, chirurgus Taurinensis, cum academia scientiarum communicavit observationem raram foetus in sacco ex membrana tubæ dextræ exteriori formato conclusi. Post nonum mensem, cum mater tumorem prope umbilicum contraxisset eundem aperuit, & foetum jam putredine correptum extraxit, matre undecim ab operatione diebus elapsis mortua. Notatu dignum est, quod mater toto gestationis tempore omni prorsus lacte in mammis destituta fuerit. *v. Act. Erudit. Lips. an. 1719. mens. Aug. p. 343.* Plura exempla conceptus

Syllepsilogia. M tuba-

tubarii in *Spermatolog. nostr. cap. I V. §. 7. p. 170 seq.* adduximus. De partu conceptionem tubariam secuto sequentem observationem exhibuit Verderius in Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. an. 1. Decembr. observ. 1. p. 178. seq.* Juvencula quædam mulier, cui nomen Lataba, mihi se obtulit, tumoris duri, rotundi gratia, amborum pugnorum magnitudinem propemodum æquantis, intra nothas costas lateris dextri eminentis: Et situnc temporis vivido esset & florido vultus colore, menstruæ purgationes non prohibitæ, anorexia non adesset, nulla pica vel malacia, mammarumve intumescencia, nullumve graviditatis familiare symptoma conspicuum. Ex sententia tamen Verderii tumor ille ortum duxit a foetu in tuba uteri concepto. Opinionis fundamentum fuit, quod tumor dictus non solum doloris expers, caloris, gravitatis, febris nulla consequuta esset, in superficie nulla coloris immutatio, sed præsertim quod in dies augmentum capefferet, prægnanti nullam molestiam inferens; si quasdam concussiones exceperis, iis propemodum similes, quas foetus se commovens infert. Revera, a præscripto levi exercitio, per Verderium, ab opinione concepta non recedentem, litu præterea partis tumidæ ex oleo liliorum ad partium relaxationem, exitumque facilem foetus procurandam tribus exactis hebdomadis peperit muliercula puellam vivam, terminum naturalem propemodum adeptam. Utrum vero & quâ ratione ejusmodi foetus maturus partuique proximus ex tubis ad uterum pervenire nascique possit, maximum adhuc dubium videtur, siquidem a tali foetu tubario ille tubæ locus, in quo per tantum temporis spatium foetus hæsit, absque dubio successive ita expanditur, ut postmodum foetus per reliquam, exinde nimis coarctatam tubæ partem, ejusque angustum uteri fundum penetrans, osculum sive foramen, minime pertransire, sive ad uteri cavitatem, quæ alias a foetu primum minimo, sensimque incrementum fumente, successive tantum in foetus usque domicilium expandi solet, ingredi vel propelli possit, siquidem reliqua conceptus

ceptus tubarii exempla tam fœtui, quam matri mortem intulisse leguntur.

II.

Variatamen dubia adversus historias de fœtibus in tuba reper-
tis movet Philippus Jacobus Hartmannus *M. N. C. Dec. III. an. 9.*
& 10. obs. 191. p. 346. seqq.

C A P U T VI.

De fœtu in abdominis cavitate.

§. I.

INsuper etiam nonnunquam ovula, in ovariis fœcundata, vel ob
nimiam suam magnitudinem, vel ob nimis angustum seu par-
vum tubæ Fallopiianæ osculum, vel etiam ob tardio rem motrici-
um tubæ fibrarum motum & segniores ad ovarium applicatio-
nem, a dictis tubis excipi non possunt, quapropter ex ovario sece-
dentia in abdominis cavitate prolabuntur, ibidemque interdum
absq; dubio pereunt, atq; annihilantur, vel etiam in commodis lo-
cis radices figunt sicque sensim atque sensim ad majorem molem,
vel in perfectum fœtum excrescunt. Vel secundum verba Dionis
des Accouchemens lib. I. cap. II. p. 92. Il est arrivé quelque fois, soit
par grosseur de l'œuf, soit par l'étroitesse du passage, que l'œuf s'est
arrêté dans le conduit de la trompe, qui ne pouvant pas aller plus
loin, s'y est germe, y a jeté des racines, qui s'étant abouchées a-
vec les vaisseaux de la trompe, comme il auroit fait avec ceux de la
matrice, s'il y étoit entré, s'est nourri & aggroffi jusqu' a un cer-
tain degré; mais la membrane de la trompe n'étant pas capable
d'une aussi grande distension, que celle de la matrice, elle s'est cre-
vée, & l'enfant est tombé dans la capacité du ventre, où il a, quel-
que fois resté mort plusieurs années, & d'autres fois cause la mort
à sa mère dans le tems, qu'il a forcé sa prison. Id confirmat Theo-
dorus Craan *Dissert. de homin. cap. 162. p. 709.* observarunt, inquiens,
conceptum fuisse factum intra abdominis cavitatem; quod ipsum

*Ovula in
abdominis
cavitatem
prolapsa.*

accidere potuit, quatenus spiritus feminis masculini penetraverit ad testes muliebres, illicque ovum foecundum fecerit; quod non fuerit apprehensum a foliis tubæ Fallopiianæ, atque sic exciderit in abdominis cavitatem, illicque postmodum conceptio fuit facta.

§. 2.

Fœtus extra uterum.

Huc pertinet etiam historica relatio Petri Dionis de utero duplici in femina observato, vel potius de foetu ex ovario in cavitatem abdominis prolapso. *vid. M. N. C. Dec. II. an. 2. app. 475. qui p. 478. refert, quod, cum incidisset tegumenta, musculos & peritonæum, partes viderit contentas, & primo quidem, quod oculis se obtulerit, infans fuerit, super intestinis incumbens, annexus etiamnum chorda sua umbilicali secundinis suis &c.* De foetu extra uterum reperto elegantem observationem Venetiis a Jacobo Grandio factam, delineatam Casparo Bartholino monstravit Franc. Nazarius, in naturæ scientia versatissimus, ubi non solum foetus extra uteri cavitatem cernebatur, sed & ovum delapsum, in quo primum rudimentum foetus visum assererat, v. Casp. Bartholin. *de ovar. Mulier. p. 36.* Cujus etiam generis phænomenon *Anglorum philos. transact. 147.* insertum esse refert Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Prog. I. p. 12.* quo loco ita pergit: Canis femellæ gravidæ foetus a percussione intra ejus viscera moriuntur & in tabum abeunt, cujus etiam aliqua pars per cervicem uteri excernitur: quo non obstante eadem denuo imprægnatur & moritur. In cujus cadavere dissecto cornua uteri priorum catulorum ossibus & carnibus putrilaginosi omnimode effarcta, conceptus vero posteriores abdomini inhærentes cernebantur, sine dubio, quod intesticulis actuati cornua constipata intrare haud potuerint. Quibus addenda, quæ Dn. de S. Mauritio in femina quadam ante triennium circiter deprehendisse abbas de la Roque *Journal. de Medic. no. 1.* refert. Hæc octo olim infantum felix puerpera ex symptomatis ordinariis se gravidam credebat, post bimestre vero animi deliquio corripitur, sudore frigido & asphyxia, cum tormi-

nibus

nibus inguinis dextri, ad renalem usque regionem expansis ac parturientium tandem conatibus similibus. Sub quibus cum vita defungeretur, in abdomine ejus aperto præter cruoris abundantiam singularem masculinus fœtus perfectus, tunicis evolutus, pollicem crassus ejusque duas tertias longus, testiculus dexter sinistro quadruplo crassior, in parte a tuba averfa laceratus, cruore repletus ac procul dubio a grandescens inibi fœtus mole disruptus reperiatur, tuba ejusdem lateris naturaliter & instar sinistræ se habente, ac utero constitutionem ac magnitudinem non imprægnati exhibente. Fœtus novimestris in matris extinctæ abdomine ita locatus apparuit, ut modo denatus capite in latere sinistro juxta spinam dorsi extra tunicas perruptas deorsum propendens, pedes sursum sub ventriculo & colo protenderet, ac reliquum ejus corpus omento cooperiretur; placenta vero, quæ alias uterina dicitur, sub ventriculo & colo vasis epiploico gastricis adhæreret. Cujus extraordinariæ connexionis duæ conjiciuntur causæ, vel quoniam ovulum maternum a femine masculino fœcundatum tuba Fallopiana excipere non potuit, vel exceptum etiam paulo post demisit; utroque autem modo ovulum tale abdominis cavitationem incidere atque ventriculi & omenti vasis sanguiferis in nutritionis ac incrementi gratiam adhærescere valuit, uti ex Johannis Josephi Courtial observ. sur les os recensent Domini Collectores Actor. Erudit. Lips. 1710. mens. Mart. p. 137. Ipse autem Courtial hanc observationem describit l. a. cap. 10. p. m. 87 seq. ubi inter alia ita scribit: Je crûs, que cet enfant s'étoit échappé de la matrice ou de ses trompes, & je m'attachai à decouvrir d'où il étoit fort. J'examinay la matrice dans toute sa superficie externe, & je la trouvay par tout fortunée, sa cavité le fut de même, les trompes dans l'état naturel & les testicules aussi. Eandem observationem ex Courtialis allegato tractatu refert Jean Palsyn dans le description anatomique p. m. 99 seq. Morinus chirurgus fœtum observavit extra uterum formatum, placenta ad primam, secundam & tertiam vertebra-

lumborum adhærente. vid. act. erudit. Lips. an. 1720. mens. Mart. p. 131. Et Daniel Sauvry dans le traité de la Generat. ex ovario per tubas Fallopianas ad uterum deferri ovulum, probat per foetus interdum extra uterum conceptos, casum sui temporis commemorans de foetu intra abdomen concepto, placenta non utero, sed aliis ventris partibus alligata. Hunc vero casum rariorem pronunciat, non quod sæpius ex ovario in abdomen non cadant ovula, sed quod illuc cadentia non commodum semper reperiant locum, ubi alligentur & nutriantur. v. act. erudit. Lips. 1706. mens. Novembr. p. 526. De generatione infantum in abdomine extra uterum varia a Dominico Anel in tract. de guerir les fistules lacrym. recenseri exempla, referunt acta erudit. an. 1718. mense Januar. p. 15. Il est quasi inouy de voir le foetus tres-bien formé hors de la matrice, comme M. de Monconnys le rapporte d'une femme d'Orleans, dans la quelle on en trouva un après sa mort en 1661. dans l'espace, qui est entre la matrice & l'intestin, qu'on appelle rectum. vid. Journal des Savans Tom. V. p. 133. Vel juxta verba Cornelii Stalp. van der Wiel obs. rar. cent. post. obs. 50. Schol. pag. 320. in mulieris cujusdam, Aurelianensi in nosocomio dissectæ, quæ post multos dolores irritosque in pariendo conatus obierat, cavitate abdominis, inter uterum & intestinum rectum foetum optime se habentem, illæsa matrice, repertum fuisse, utut non diu matri superstitem, memorat de Monconnys. vid. etiam M. N. C. Dec. I. an. 1. obs. 110. p. 255 seq.

§. 3.

Fœtus Do-
Janus.

De puero nullo apparente ulcere, aut cicatrice, in civitate Burgundiæ Dolenfi extra uterum, anno 1661. reperto, discursum edidit Arnoldus Senguerdus, sub nomine de ostento Dolano; Hujus infantis involucra omnia calculosa & cartilaginosa erant, quibus dissectis humor serosus effluebat, colore subcroceus, minime foetens. Hoc humore quoad libras circiter sexdecim educto, offert

offert se fœtus femineus, firmiter adjacentibus partibus adhærens: a quibus avulsus deprehenditur omnibus suis partibus, absolutus, non majoris magnitudinis, quam ordinarius fœtus esse solet. vid. Senguerd. *l. a. p. 5.* Huc pertinet etiam fœtus lapidescere incipiens, extra uterum in abdomine mulieris Mussipontanæ, cujus uterus tam illæsus intactusque repertus est, quam qui maxime nullo prorsus obductæ cicatricis vestigio, de quo vid. Thom. Barthol. in *histor. anat. Cent. VI. obs. 92. p. 359 seqq.* item collectan. de diuturn. Gravid. *p. 30 seq.* vid. etiam M. N. C. Dec. I. an. 3. obs. 12. *p. 15. seq.* item histor. fœtus Mussipont. in Joh. Bened. Sinibald. *Geneanthrop. app. a p. 1. usque 158. seq.* Thom. Bartholin. *de insolit. Part. viis cap. 11. p. 78. seqq.* Ejusd. *Epistol. med. Cent. IV. Epist. 368.* hic fœtus in abdomine mulieris cujusdam anno 1659, illæso utero repertus est. vid. Cornel. Stalp. van der Wiel *Cent. poster. obs. 30. Sch. p. 320.*

4.

Mira etiam narratur historia de femina quadam Tolosana, quæ Fœtus To-
ab anno quinquagesimo secundo usque ad septuagesimum octa- losanus.
vum præteriti seculi, hoc est totos viginti quinque annos, gravida fuit, non autem peperit; in demortua tandem latuit infans extra matricem in cavitate abdominis, nulla putredine correptus; uti refert Johannes Conradus Peyerus *Exercitat. 16. ad Harder. p. 79.* De hac observatione Nicolaus Blegny *Zodiac. med. Gall. an. 1. Januar. obs. 9. p. 9.* ita scribit. Ultimis mensibus anni 1652. Margaretha Matthieu, uxor Johannis Pugelii, pannorum tonsoris Tolosani decem ante liberis felici partu exclusis, undecimam graviditatem patitur: sub finem ultimi imprægnationis mensis partus dolores experitur, præ quorum vehementia lectulo se committit; quæsitus est chirurgus obstetricans, qui exploratione manuum præmissa, naturam ad partum nequaquam se accingere asseruit; urgent tamen vehementissimi dolores, toto bimestri crudeliter pertinaces, grumis aliquot sanguinis ex utero secedentibus. Exacto primo illo tempore trium fere mensium curriculum elapsum est
cum

cum molestis torminibus, prioribus licet minus infestis, comite tamen continuo materie purulentæ effluxu: exinde collapsæ resurgunt vires, uterus effundere desinit, at sola supini decubitus necessitas dolorum insigne levamen afferebat, oneris enim pondus, quemcunque alium servaret situm, maxime illi erat molestum, quod de loco in locum provolvi observabat, quoties in alterutrum latus commoveretur. Sic constituta spatium octodecim aut novendecim annorum exegit. A primis illis annis usque ad an. 1675. massa illa magnitudine & pondere adeo infesta, eo minus molestiæ intulit, quod in ventre immota maneret, quodammodo suspensa, ne minimum agitationis indicium præbens: Tandem 17. Junii ejusdem anni prægnans febre continua sexagesimo secundo ætatis anno obiit, post cujus sectionem deprehensum est corpus lapideæ duritiæ &c. De hoc foetu epistolam Francisci Bayle communicat Johannes Dolæus *M. N. C. Dec. II. an. 8. obs. 134. p. 293. seq.* in qua dictam mulierem die 22. Junii 1678. fato functam scribit, nullius autem lapideæ duritiæ mentionem facit, sed frontem, aures oculos, nasum os materia quadam cartilaginosa, digitum transversum crassa, obducta fuisse, corpusque istud etiam si jam ante tres dies a matris abdomine fuerit exemptum, omni penitus foetore caruisse refert.

§. 5.

*Gemelli in
abdomine.*

Rara quoque est observatio de gemellis per conceptionem tubariam extra uterum in abdominis cavitate repertis a Francisco Mayr annotata *M. N. C. Dec. III. an. 4. obs. 78. p. 167 seqq.* Matrona scilicet illustriss. 37. annorum, ante septem jam annos post sterile octo annorum spatium matrimonium, conceperat, omnia signa habens felicitis imprægnationis; at, transacto jam legitimo temporis spatium ad parturiendum, omnis spes foetus evanescere coepit, ac mola subesse a medicis judicabatur; ab eo tempore illustrissima patiens quoad omnia melius valebat, mensibus etiam rite fluentibus, atque in tali statu per spatium septem fere annorum vixit; tandem vomitu quasi continuo materiæ biliosæ atque foetidissi-

tidissimæ superveniente animam exhalabat. In hujus matronæ cadavere sub peritonæo dissecto informis massa, totum ventrem complens comparuit, subjacentibus partibus tenaciter adhærens. In hac per septem fere annos in ventre latitante massa caput infantis, capillis undique coniectum ac foetus feminei sexus omnibus membris absolutus septemque fere annis ventre materno oclusus se in conspectum dedit. Præter hanc autem massam iterum alia trium pugnorum magnitudine, durior & priori haud ab- similis, intraque femora ac pedes, quorum genua versus umbilicum erigebantur, præfati foetus tenaciter adhærens apparuit, qua aperta alter foetus, masculus quidem, sed priori minor, membris tamen omnibus perfectus, exemptus partum gemellum, fratris scilicet & sororis, exhibuit. Hos autem gemellos extra uterum atque in ovario muliebri vel tuba Fallopiana formatos fuisse, probabile videtur, cum dissectum uteri corpus omnino integrum ac naturaliter se habens fundusque ipsius illæsus ac in magnitudine naturali nil prorsus immutatus apparuerit.

§. 6.

Dantur equidem adhuc alia foetuum extra matricem in abdomine repertorum exempla, quorum tamen causa non a conceptione, seu ovuli ex ovario in abdominis cavitatem prolapsu, sed ^{Fœtus in abdomine a ruptura uteri.} potius ab uteri, ante vel in partu difficili, ruptura vel dilaceratione dependet; de quibus, cum proprie huc non pertineant, pluribus infra agemus. Ex hætenus interim recensitis casibus elucere videtur, quod, licet uterus ob coitus feminis que recipiendi, imprimis autem foetus excludendi commoditatem ad communem generationis normam sit necessarius, ad conceptus tamen domicilium aliæ quoque corporis cavitates uteri vices supplere, ova etiam fecundata aliis extra uterum partibus annecti, foetusque sufficiens ad maturitatem nutrimentum accipere possint, quod etiam interdum in brutis observatur; curiosissimam enim Petri Romelii observationem de lepusculis extra uterum repertis communicat Christia-

Syllepsilogia.

N

Lepusculi
nus extra ute-
rum.

nus Franciscus Paullini *Lagograph. curios. Sect. I. cap. 3. §. 35. p. 81.* Nimirum venator quidam leporem fat magnum ictu sclopeti prostraverat, inque ejus penetralibus duos magnos globos, pomum arantium mediocre magnitudine fere æquantes, offendit, alterum in gyris & plicaturis intestinorum, alterum proxime ad ventriculum; de quibus unicum saltem, & quidem minorem, jussu domini sui, Romelio obtulit, qui non prorsus rotundus, at durissimus, quasi ligneum aut osseum quid intus lateret. Cultro tandem aliquali incisione per membranam facta, statim pilosi quid animadvertit, ita ut primo crediderit, nil aliud, quam ex pilis & variis fibrillis, filamentis ac staminibus compactam & conglobatam massam, seu tophum membrana obductum esse. Verum, incisione magis dilatata, lepusculum omnibus membris perfectum, pilisque longis oblitum & minime monstrosus, situ pereleganti involucri membranaceo, tanquam thecæ, inclusum, inter intestina & prope ventriculum invenit.

§. 7.

Fœtus extra abdomen.

Quamvis autem tale in ovario fœcundatum ovulum abdominis cavitationem incidens, variis omenti, ventriculi aliarumque partium vasis sanguiferis, in nutritionis & incrementi gratiam, adhærescere valeat; utrum tamen tale ovulum ad alias quoque partes extra abdomen propelli, ibidemque annecti atque in plenariam fœtus formationem abire possit, res sane dubia altiorisque indaginis adhuc videtur. Interim varia ejusmodi exempla apud autores leguntur, e. g. de fœtu extra abdominis cavum in inguine hærente, autor quidam nomine Gofey sequentem recenset observationem: Anno 1706. mense Augusto virgo quædam, annorum viginti, tumorem in dextro inguine, magnitudine ovum gallinae æquantem gerebat, quem visum Gofey statim pro bubone venereo habebat. Tumor semisim sensimque sine ullo dolore crescebat, obq; inæqualitates pro epiplocele medicus illum habuisset, nisi ob pulsus arteriarum ibi observatos suspicio nata fuisset de anev-

nevrismate interno. Virgo tumorem illum sensim sensimque majus acquirere volumen observans (cum intra duorum mensium spatium molem panis libram pondere æquantem attigisset) precibus instabat illisque tractationem curatoriam extorquebat, ut Gofey operationem bubanoceles tandem instituere decreverit. Sumtis igitur ad manus instrumentis necessariis incisionem integumentorum modo ordinario instituit, atque subjacentem faccum aperuit. Quo aperto parvulus quidam fœtus dimidium pedem longus conspectui se sistebat, quem statim, erat enim vivus, baptismi aquis Gofey conspergebat, funiculumque umbilicalem prius ligatum, modo ordinario abscindebat. Quantum dicto auctori licuit con-jicere ex signis externis oculo obviis, fœtus ille mensem secundum vel tertium attigerat, siquidem mater tumoris principium ab illo tempore sentiebat, mensiumque fluxus eodem temporis intervallo cessaverat. Verosimile etiam eidem auctori est, ovulum illud per interstitia fimbriarum excidisse, & postquam in abdomen uterique ligamenta rotunda annulos musculorum abdominis perforantia inciderit, ibidem fœcundatum atque in ipsum musculi transversum anulum locatum fuisse. vid. Daniel. Hoffmann. *Annotat. ad Hypoth. Goveyan. p. 79. seq.* qui Hoffmannus *p. 82.* de hujus observationis veritate dubitare videtur, ingeniosa, inquit, hæc sunt, nec minorem tamen difficultatem post se relinquunt, qui ovulum ad hunc præcise locum fuerit devolutum, ibique affixum, imo quomodo penetraverit, eoque nulla protrusum violentia; sed non libet indulgere conjecturis, plenior optanda esset, totius rei, quæ summam merebatur ἀνρίβειαν, enarratio, qua singulas circumstantias, eo magis hic necessaria, quod solus fuerit D. Gofey, nullumque tam raræ ac inusitata inauditæque operationis socium testemve sibi adjunxerit.

§. 8.

Conceptionem etiam in ventriculo fieri posse, quidam statuunt, in occasione enim felis per os parientis, inquit Thomas Bartholin. *Conceptio ventriculo.*

Cent. V. Histor. 98. p. m. 180 seq. utero hactenus videntur merito ejus addicti omnes. Non tamen solus foetum concipit, sed perficit, idque apta capacitate ad eum continendum & excludendum. Nihil embryoni præter locum & calorem contribuit. In femine enim generationis latet principium, quod se exerit quocunque cujuscunque loci calore adjutum. Ita femina herbarum non in terra tantum, sed etiam in tabulato, parietibus arboribusque subinde decidua germinant, sed felicius ad florem perveniunt in terræ gremio. Par in animalibus ratio, quibus uterus commodus fuit, quia commodius & recipit semen & exinde formatum foetum felicius continet & excludit. In quacunque tamen cavitate corporis, ubi vasorum confluxus, embryo efformatur. Hujus sententiæ confirmandæ gratia plerumque adduci solet observatio Philippi Salmuthi *observ. med. Cent. III. obs. 94. p. 156.* de infante per os excluso, quem etiam in ventriculo conceptum nonnulli judicant. Juvenis scilicet quædam femina infantem digiti longitudine, maximis cum doloribus summoque vitæ periculo per os enititur. Mortuum mulieres adstantes scatulæ includunt & sepeliunt. Postquam hoc loci illius fenatus rescivit, refodere infantem eumque aperire jubet, quem omnibus membris humanis tam internis, quam externis vere constare præsentis cognoscunt, & paulo longioris digiti longitudinem vix excedere deprehendunt. Puerpera ea de re interrogata & examinata constanter affirmavit, maritum semper cum illa per os coivisse, & sperma in fauces immisisse; atque se plane simplicem ita a marito delusam postmodum animadvertisse. De hujus historiæ nefandæ veritate non dubitat Bartholin. *l. a.* quia vasa ventriculi pro nutritione & aliquali augmento sufficiant &c. qui tamen autor *anat. lib. I. cap. 28. pag. 270.* inquit, illa præternaturalibus accensenda, rarissime contingentibus, siquidem vera sunt. De hac Salmuthi observatione scribit Georgius Wolffgangus Wedelius *Physiolog. Sect. 3. cap. 28. p. 203.* extra uterum non fieri conceptum, quicquid etiam referat Salmuth de uxore futo-

futoris, quæ nefando congressu prævio ejecerit vomitu conceptum, quicquid alii de abortu per vomitum rejecto referant, posse id contingere, extra sphæram suam evoluta & ad intestina delato ovo. Quærit etiam Christianus Fridericus Garmannus *M. N. C. Dec. II. An. 8. obs. 157. p. 346.* quis fabuloso aut nimium credulo Philippo Salmutho fidem habebit, fœtum per os fuisse rejectum? & ex his principiis concludet, ovulum femininum masculino semine imprægnatum eandem absorbuisset? Quamvis etiam juxta opinionem veterum, qui conceptionis seu fœtus materiam soli viro ejusque semini, feminae autem tantummodo fœtus domicilium seu incrementi locum adscribebant, talis conceptio in ventriculo concedi posse videatur, quia tamen juxta recentiorum demonstrationem conceptio ex solo ovulo in ovario per virile semen fœcundato fieri solet, sane non constat, quomodo, secundum allegatam Salmuthi observationem, in ejusmodi per os congressu ovulum in ovario imprægnari, multo minus qua ratione ovum ex ovario muliebri in ventriculum deferri vel ascendere possit, sine cujus tamen præsentia seu concursu ex solo virili, a femina absorpto, spermate nulla naturaliter fieri potest conceptio: neque mihi hoc loco testimonium Johannis Komeleri, in consulis illius civitatis, ubi hæc gesta sint, ædibus tunc temporis degentis sufficit; nisi hoc supranaturale, juxta schol. Phil. Jac. Sachs. *in observ. 109. ann. I. Misc. N. p. 254.* ad revelandum a Deo & severe puniendum a magistratu tantum scelus, factum fuerit. Licet etiam, variorum insectorum, ranarum, bufonum, araneorum &c. semina, cum alimentis vel potulentis facillime simul deglutibilia, a blando stomachi calore foveri, inque iisdem animale principium excitari atque ad debitam expansionem & augmentationem deduci posse, Lucæ Schrœckio schol. in Joh. Helwig. *obs. 80. p. 249 seq.* libenter concedam; minime tamen, neque in animalculis perfectioribus, v. g. canibus & felibus, quæ nonnunquam fœtum per os peperisse

scribuntur, multo minus in mulieribus, talis per os factæ conceptionis partusque possibilitatem, ut credam, persuaderi patiar; cum tam mulieris, quam brutorum ova, uti in quibusdam insectis fieri solet, minime extra uterum deponantur, ut iterum per os assumi vel cum assumtis absorberi inque ventriculo postmodum ad suam usque maturationem contineri demumque rejici vel pari possint; Sique illis observationibus, quæ catulorum, felium &c. partus insolitos, ex ore contingentes, exhibent, juxta Lucæ Schrœckii *l. a.* fides temere haud est deneganda, potius tales bestiolas legitimo partu antea editas, a matribus statim post partum iterum deglutitas pauloque post iterum rejectas fuisse statuo; de quo tamen sic dicto partu fortasse infra, ubi de partu sermo erit, pluribus agemus. Referri huc etiam posset exemplum cati ex ore mulieris projecti, quæ postquam aliquot felium clamores audiret, ut felem suam liberaret, accurrit, sed accedens ad locum, ubi ejulatus audiebatur, invenit felem in puteo, quam ut eriperet, urnam demisit, qua quoque eam extraxit: hoc labore lassata & sitiens ex urna aquam bibit, a quo tempore male se habuit, donec accepto vomitorio tandem catum ex ore projecit; referente Valentino Andrea Moellenbroccio *M. N. C. Dec. I. An. 1. obs. 109. p. 251.*

CAPUT VII.

De ovulis integris & subventaneis.

§. I.

An ovula
ad uterum
veniant in-
tegra?
an disru-
pta?

Alius porro inter autores circa ovula observatur dissensus & quæstio, an scilicet ovula per tubas Fallopianas ad uterum transferantur integra? an vero his in via disruptis liquor tantum in iis contentus ad uteri cavum defluat? quam ultimam sententiam aliumque conceptionis modum quidam ideo defendunt, quia ovulorum membranulæ admodum sint tenues levique attactu dilacerari possint. Inquit enim Johannes Dolæus *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. obs. 131. pag. 175.* hæc ova, quæ tamen mallet vesiculas cum

cum Fallopio nuncupare, jam diu Lugduni Batavorum vidi, nec non jam pridem ad ova hæc demonstranda uterum vaccæ aperui, in testiculis vesiculas plures inveni, quæ tamen cuspide cultri leviter solummodo tactæ humorem intus contentum in faciem explofere. Ea propter vix credere possum, cum quibusdam, ova five vesiculas tales integras pervenire posse usque in uterum, & exinde fieri conceptum, sed in eam inclino sententiam, quod ab ejaculatione seminis virilis, quod per ductum Fallopianum pertingit usque ad istas vesiculas, facile illisu seminis virilis vesiculæ tales rumpantur, & isti duo humores refluentes in uterum conjungantur. Chirurgus Parisiensis, du Verney, vesiculas seu ovula ad tubas uterinas non integra deferri statuit: si enim propositio hæc vera foret, non solum necesse esset, tubas immediate annecti testiculis, sed præterea illis inesse amplitudinem, proportionem respondentem magnitudini ovorum, quæ commeatum illis concederent facilem: ac verisimile esse, liquorem in prædictis ovis contentum solam esse materiam feminis ad generationem suppeditatam, quæ coitus tempore ab iis exprimatur, ac versus vasa deferentia detrudatur postea in uterum evehenda. vid. Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gall. An. II. mens. Mart. obs. 1. p. 60. seq.* Tempore coitus fimbriæ tubæ Fallopianæ influxu spiritus seminis masculini, vel spirituum feminæ, se expandunt, & forte testem comprehendunt, & suo amplexu tempore coitus aliquoties repetiti, premunt vesiculas in testibus locatas, & jam turgidas, ex iisque humorem lente fermentantem exprimunt, qui recipitur ab aperto & hiantе extremo tubæ Fallopianæ sicque ad uterum defertur, illicque postmodum a copiosiore spiritu seminis masculini allato magis fermentatur & alteratur, & sic foetus tandem excrescit, hoc modo conceptus fieri debet, juxta Theod. Craan. *Dissert. de homin. cap. 162. p. 711.* Hanc opinionem defendit etiam Carolus Drelincurt. *de concept. concept. Perioch. 14. p. 13.* inquiens, ova isthæc modo intensius, modo remissius ex ovario suo exprimi & elidi atque ita modo
integra

integra & illæsa, modo autem crepantia & fluxa in uteri cavas appendices impelli: Et *Perioch. seq.* pergit idem, non solum autem faucibus appendicum uteri absorbentur ova, sed & eadem in appendicum cellulas pedetentim devolvuntur; e quibus in uteri fundum usque demittuntur atque rotantur. Atqui dum isthæc fiunt, ovorum aliquot vel in ovario, vel in angustis proboscidis uterinæ, vel in ipso demum utero media crepant. Suam ergo crystallinam lympham vel in testiculorum scrobiculos, vel in proboscidem uteri, vel in ipsum uterum effundunt. Illam quippe inibi locorum varie recoctam atque coloratam & sub multiplici larva multiplices tragoedias agentem sæpius deprehendi. Ovum muliebre a femine foecundatum non tam totum, quam contentum ejus, h. e. liquor cum tenerrimis membranulis ambientibus, ab ovario secedit, ac per tubam ad uterum amandatur; uti *Collectores Act. erudit. Lips. mens. April. 1706. p. 147.* ex Friderico Ruyschio referunt. Et ipse Ruyschius *Thesaur. 6. p. 17.* inquit: an in illa actione, qua ova muliebria, a femine foecundata per tubas deferuntur, ovum totum, an vero ovi contentum ovario solummodo exeat, anceps olim hæsi, jam vero posterius verum esse credo, quia in gallinis externum ovi integumentum, ovario adhærens, simul cum vitello non extruditur, sed in calicis forma remanet &c.

§. 2.

Ovula integra ad uterum veniunt.

Quamvis autem, talem ovulorum crepaturam nonnunquam, modo in ovario, modo in tubis, accidere posse, negandum non sit, minime tamen ex illorum profuso liquore semper utriusque seminis commixtio neque conceptio speranda erit, talisque ovulorum liquor, disruptis ipsorum membranulis, ex ovario facillime in abdominis cavum prolabi ibidemq; vel alibi annihilari potest, cum econtra ovula integra & foecundata in tubis & uteri cavitatereperta fuerint; qualem observationem de ovo in utero humano a Friderico Ruyschio reperto vid. *Biblioth. anatom. Tom. I. fol. 738.*

Quan-

Quandoque etiam abortus, membranis suis adhuc inclusi, instar ovulorum, a gravidis rejiciuntur, id quod ante 20. annos in senatoris *Observatio.* Dresdensis uxore observare mihi licuit, quæ femina, aliquot septimanas gravida, post magnos satis dolores, ovulum seu vesiculam, ad digiti magnitudinem, & ultra pollicis crassitiem, tenuissimis atque pellucidis membranulis, limpidissima aqua, cui subtilis digitique articulum magnitudine æquans embryo innatabat, penitus repletis inclusum excluserat. Circa has embryonis membranas paucis adhuc referendum, quod licet tenuissimæ atque adrenitentiam usque aqua infarciæ essent, ipsæ nihilominus in quodam loco, ad unguis magnitudinem, ita a se invicem fuerint separatæ, ut inter chorion & amnium quædam limpidæ aquæ reperiatur quantitas; quæ, cum exterior membranula seu chorion a me discinderetur, equidem effluebat, ipsum autem ovulum formam suam seu oblongam rotunditatem retinebat, donec post aliquot horas superveniens quædam femina illud leviter comprimeret, a quo leni tactu dictum ovum circa locum, ubi chorion discideram, statim crepabat; Embryo autem postmodum per aliquot tempus in alio liquore a me conservabatur. Duos ejusmodi abortus humanos oviformes annotavit etiam Philippus Jacobus Hartmannus *M. N. C. Dec. III. an. 9 & 10. obs. 191. p. 350.* In his autem membranis earumque liquore omnes foetus, ex cicatricula in ovulis orti, ad partum usque vita, nutrimento & motu frui, iisque disruptis partum accelerari, imo nonnunquam foetus iisdem adhuc integris vestitos vel inclusos in lucem prodire, satis notum est. Si proinde tales membranæ statim in conceptione disrumperentur, unde quæso tanta aquæ copia, quanta ordinarie ante vel in ipso partu profundi solet, derivari poterit, nisi in istis membranis foetum adhuc involventibus, hætenus collecta fuisset.

§. 3.

Ex his proinde & aliis rationibus absque dubio etiam plerique recentiorum autorum conceptionem non in liquore ovuli in ovario vel tubis profuso, sed potius in integro ovulo quærunt. Hinc *Autorum assensus.*

Syllepsilogia.

O

non

non amplius dubitat Christianus Fridericus Garmannus, quin mulierum testes ovario analogi sint, quocunque demum modo ex testibus in uterum, sive ipsa ova, sive (quod tamen *avolvia* refutat, cum ipsa ova in utero sint deprehensa) ovis contenta materia transmittatur. v. *Garman. epist. 100. p. 435.* Secundum Petr. Dion. *Anat. Demonstr. IV. p. 226.* ovum, quod seminis spiritus fermentarunt, sensim ab ovario exsolvitur, membranam disrumpendo, ut tubam subeat tandemque in uterum descendat. Ovum binis membranis obductum est, quæ primis temporibus vasis tenuissimis perspersæ sunt, quæ autem deinceps semper augentur, ex quo radices ovum in utero agit &c. Et juxta Joh. Barthol. Adam Beringer. *Id institut. med. Thes. 15. p. 37.* ovula hæc non humorem aliquem seminalem ex se in uteri cavitatem depluunt, sed integra duabus circumdata membranulis decidunt & in uterum deponuntur. Ovum sine ullius effusione succi illæsum & virgineum in oviductum expelli & protrudi, atque dehinc motu successivo & peristaltico ad uteri fundum usque rotari & pervolvi, jam supra ex Joh. Gothofred. Berger. *Physiol. Lib. II. cap. 1. p. 461.* monstravimus. Totum conceptum seu ovulum a testiculo ad uterum devolvi, sequentibus verbis describit Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. p. 22.* conceptus extra uterum in testiculo seu ovario productus, involucro suo munitus, ac feminali genitoris aura vitalis redditus ad uterum deponitur, quo hujus fotu magis actuetur, ac ab hoc præparatam alimoniam recipiat inter ipsum fluctuans foetus. Id est pariter ac femina pedunculos & calices suos integra elabuntur, terræque horum grana, non pulpa inferuntur; sic sine crepatura suarum tunicarum succus albugineus cum sibi innatante carina uterino arvo committitur: & metuendum, ne folliculo hoc exutus embryo nutrimentum primigenium, simulque cum hoc ambiens & fulcimentum mollius ac suis staminibus tenerioribus adæquatum, perdat, sine quo hæc facile distrahi ac dilacerari contingeret. In utero ovulum istud, valde pusillum pri-

primis diebus libere fluctuat, postea vero tanquam semen telluri foecundæ commissum, terminos suos ampliare atque utero adhærere, indeque alimentum haurire incipit, juxta epist. Joh. Conrad. Peyeri in Joh. de Muralt. *Vadem. p. 403.* sive, ut scribit Johannes Fridericus Ortlobius *Histor. part. Dissert. 36. §. 6. p. 283.* ovulum imprægnatum ex ovario per tubas in uterum deportatur, ut illic ad debitam ἀκμὴν usque nutriatur.

§. 4.

Quamvis autem sub initio hujus tractatus, circa conceptionem, utriusque feminis, virilis atque muliebris, commiscelam ex mente veterum, qua scilicet crassam feminis masculini substantiam cum liquore quodam muliebri, pro foetus formatione, commiscere statuebant, variis rationibus negaverim, quod si tamen recentissimorum quoque opinionem de conceptione recte intuemur, juxta eandem pariter etiam aliquam licet subtiliorem utriusque feminis commixtionem concedi videmus, dum subtilissima tantum feminis virilis pars, sive aura genitalis, ad ovarium ascendens, ejusdem membranam penetrat, & ovulum unum vel plura excitat. Sive enim nonnulli conceptionem per irradiationem, sive alii per contagium, alii per effluvia seu miasmata explicent, ex physicis tamen constat, radios non quid esse incorporeum, sed lineas tantum, ad quas corpora lucida suam actionem continent; ita omne contagium materiale & per contactum agit, saltem quod id, quod virtuale antiquitus dicebant, vel non adeo immediate accipitur, vel non adeo integrum, sed per emissas aliquas sui partes, quas effluvia & miasmata vocant, in alterum operetur; hinc etiam semen masculinum equidem non tota sua substantia, sed per subtiliores, spirituosas, activas & energeticas ex ipso egredientes partes, in semen muliebre, in ovulo contentum, efficaciam exferere atque per contactum operari auguratur dictus. Joh. Ortlob. *l. a. Diss. 35. §. 13. p. 279.* hinc etiam subtiles feminis halitus partem substantiæ

An utriusque feminis commiscela detur?

feminis vocat Daniel Hoffmannus *Annotat. ad hypoth. Goveyan.*
p. 85.

§. 5.

*An femina
in coitu spi-
ritus confe-
rat?*

Licet etiam feminas ad opus generationis foetusque formatio-
nem, solam materiam, ovulum scilicet, vel potius in eo latentem
cicatriculam, in coitu foecundo ex femine virili excitandam, con-
ferre, ex variis autoribus monstraverim, quaeritur tamen, annon
in tali coitu ipsa quoque femina, orgasmo venereo percita, aliquid
spirituosi ad ovuli imprægnationem conferat? ex qua matris ope-
ratione non modo liberorum & parentum similitudinem & dissi-
militudinem, sed etiam vitiosam atque monstrosam infantum
conformationem optime derivare poterimus; cum feminarum,
jamjam per aliquot dies vel menses gravidarum, phantasiæ tam
maculæ seu nævi, quam partium in recens natis infantibus defe-
ctus, & omnes partus monstrosi a physicis adscribi soleant; ut ita
mater non solum passive, verum etiam active ad conceptionem
concurrat. Quam sententiam quoque fovere videtur Franci-
scus Maria Nigrisoli, ab aura omnino spirituita feminis masculini,
cum simili aura feminæ sociata foetum in aliquo ovulo eatenus ef-
formari contendens, quatenus vi motus legis a summo creatore
principio ejusmodi impressæ, omnes sic partes, non nisi ruditer
laudato mulieris agente jamdum elaboratæ & ovuli colliquamen-
to innatantes, rite invicem conjungantur ac magis magisque per-
ficientur. *vid. act. erudit. Lips. an. 1714. mens. Novembr. p. 523.* Qui
muliebrium spirituum concursus ex eo quoque probari mihi pos-
se videtur, quia meretrices in admissu marium, ob metum ingra-
vidationis, ut plurimum mere passive se habent, neque ad foetus
conceptionem sunt intentæ, quapropter etiam non sufficientes
spiritus per phantasiam ad ovarium propellunt, ut concipere pos-
sint; hinc etiam raro scorta & diobolares meretrices ingravidi
observantur. Hunc feminarum spirituum ad generationem
con-

concursum docet etiam Michael Ettmüllerus *Oper. part. I. f. m. 162.* Ad quaestionem enim, qua ratione genitura maris & ovum feminæ constituent semen perfectum? respondet: in viviparis sub coitu foecundo in ardore venereo, ubi genitura maris cum impetu irruens spiritibus animalibus turget, ita in mulieribus spiritus animales, affluendo ad testes, membranas eorum pungunt, & quoque liquori in istis contento se commiscent, unde spumescunt, & cum magna voluptate foras prorumpunt; sub qua actione ovulum genitura maris foecundatur. Et *Oper. Tom. I. fol. 1072.* scribit idem Ettmüllerus: Efficiens formationis foetus videtur esse spiritus genitalis utriusque sexus, matris quidem in ovulo concentratus, maris mediante genitura in congressu ejaculatur, qui licet originaliter videatur duplex, in ovo tamen mutua coitione unitus ex materia limpida in ovo coërcita corporis machinam format. Sic Johannes Baptista de Wenck *Ephem. Natur. Cur. Dec. IX & X. p. m. 552.* statuit, omni semini tam vegetativo, quam animali proprium inesse spiritum, qui in maribus influus, in femellis autem insitus nominatur, quorum prior ut totus activus principale agens est in ordine ad sui simile producendum; Feminæ autem, minus activus, a masculo actuandus est, quem ille expectat, ut animalis ideales formas corporeas, quas in tota seminis substantia confuse continet, in actum explicet.

§. 6.

Cum etiam circa recentiorum sententiam, uti dictum, in conceptione ovulum a solo spiritu feminali, sive aura vitali seminis virilis imprægnetur, nonnulli mirantur, cura tali spirituosa seminis parte in mulieribus ut plurimum unicum tantummodo vel duo, non autem omnia unius vel utriusque ovarii simul ovula foecunda reddantur, uti in oviparis, sic dictis, observatur, siquidem gallinæ semel vel bis a gallo calcata multa postmodum ova deponunt. Imo medicus ante allegatus, Gofey, ex sua hypothese ita loquitur: Si liquor viri feminalis in ipsum uterum intraret, per-
Cur non omnia ova simul foecundentur?

que tubas ad ovaria ascenderet, uti multi prætendunt, certum esset ac evidens, omnia ovula in ovariis inclusa simul debere foecundari, ac proinde feminas plurimis ovulis vitam sine concursu maris largiri posse, quod in gallinis observatu facillimum est, ova simul foecundata postea sine mare excludentibus fortu suo. Quia autem, uti ex sectionibus tam gallinarum aliarumque volucrum, quam ipsarum mulierum sufficienter patet, non omnia ejusdem ovarii ova, neque in gallinis, neque mulieribus, ejusdem magnitudinis atque perfectionis seu maturitatis deprehenduntur, ad conceptionem autem semper matura ova requiruntur, hinc etiam apparet, non omnia ova, sed matura tantum, ad conceptionem apta, reliqua vero adhuc immatura, & ad foecundationem inepta esse judicanda; unde etiam Johannes Jacobus Harderus *Prodrom. physiolog. cap. 8. p. 120.* inquit, ova ad debitam maturitatem quum pervenerunt & magnitudinem, tunicisque vestitæ sunt, servantur pro futuro conceptu, foecundationem a liquore genitali maris summopere desiderantia. Ad verba autem Goveyana modo recensita Daniel Hoffmannus *l. a.* ita commentatur: Consequentia hæc non omnibus æque certa videbitur; aura enim seminalis non omnia æqualiter attingit penetratque ovula, nec ab ovario ejiciuntur, nisi illa, quæ foecundantur, nec foecundantur, nisi maturiora & jam disposita. Quandoque tamen in nostris quoque regionibus plura simul eodem coitu in feminarum testiculis ovula sine miraculo irradiari possunt, ut non modo gemini, tres, vel quatuor & plures foetus uno partu editos reperiamus, de quo partu numeroso alibi sermo erit. Ad quæstionem, quare ab uno coitu haud singula utriusque ovarii ovula simul foecundentur? respondet Johannes Sigismundus Elsholtius: quo minus id fiat, diversa obstat partium constructio. Oviductus enim gallinarum rectus est & laxior: in homine vero angustus & adeo tortuosus, ut aura seminalis non nisi ovum proxime adjacens ordinario attingere possit, haud vero juxta per universum penetrare ovarium. Quod-
fi

si vero ad plura ovula quandoque auram illam penetrare contingat, plures etiam concipiuntur foetus. *v. Misc. Natur. Curios. Dec. I. an. 6 & 7. obs. 196. p. 289.* Juxta Georg. Philip. Nenter. *Physiolog. cap. II. Membr. I. p. 329.* ad conceptionem requiruntur ovula vera atque matura: vera sunt, quæ contradistinguuntur subventaneis, quæ scilicet prima foetus rudimenta non includunt, sed lympham tantum in se continent & hinc ad conceptionem inepta sunt. Matura vero sunt, quæ eam acquisiverunt perfectionem, ut a semine virili imprægnari possint: si vero immatura fuerint, ad conceptionem inepta sunt. Hæc autem ovulorum maturitas potissimum dependet a successiva nutritione, quam præstant ramæ arteriarum spermaticarum, quæ lymphæ gelatinosæ puriore parte testes eorumque glandulas molles & vesiculas, quæ racemum quasi constituunt, irrigant, unde primitus glandulæ luteæ, & ex his demum vera succrescunt ovula, quorum latentia prima germina sive rudimenta continuo affluxu nutrita & irrigata plenam tandem acquirunt maturitatem.

§. 7.

Aliter Carolus Drelincurtius de ovulis perfectis & imperfectis *Ovula perfecta.* judicat, dum *de concept. concept. Perioch. 27. p. m. 37.* femineis, inquit, ens, ovis nullum plane germen primitus inest intrinsecum, sed omne extrarium est & recens in illud advena atque adeo alienigenum. *Et de conception. adversar. Dogm. 12 p. 55.* ova, inquit, imperfecta sunt omnino, siquidem masculo germine carent, nec ullo fotu quicquam procreare queunt. Vera quidem ova sunt, sed irrita atque subventanea, incompleta scilicet ac infœcunda, nec prius perfecta dicenda veniunt, quam in uterum propulsa masculo semine compleantur atque fœcundentur. *Et p. 57.* ita pergit: Tota indole completum ovum atque perfectum ab incompleto ac imperfecto dissidet. Ovum quippe completum mixtum est ab utroque parente prognatum, ex cujus advena germine exoritur animal, ex innato vero liquore primitus nutritur. At incomple-

tum

tum & imperfectum, nec non ex sese prorsus infœcundum, mixtum est e femina deciduum unice & aptum natum, ut vivifico femine masculo prægnans, animal in sese conceptum aliquandiu sustentet. Non ergo generamur ex ovo, sed in ovo, animantium omnium primordio communi. Ratione loci in ovariis quomodo differant ovula perfecta ab imperfectis, ad Christianum Fridericum Garmannum perscripsit Michael Ettmüllerus his verbis: Superiori anno in teste cujusdam infanticidæ plus quam viginti invenimus talia ovula, distinctæ tamen magnitudinis, quædam milii saltem grani ad instar, quædam majora, quædam perfectæ magnitudinis, quæ perfecta ova in medio testis, illa quasi imperfecta saltem ejus ambitum occupabant. v. Garmann. *epistol. Cent. epist. 86. p. 354. item epistol. 100. p. 434.*

§. 8.

Ovula subventanea.

Sicuti autem ova vera & perfecta sive matura juxta Johann. Bohnii *Circul. anat. physiol. Progym. 1. p. 11.* vix vel nunquam sine præcedaneo coitu ovaria sive testiculos muliebres deferunt, ita e contra ova imperfecta, subventanea & casta, sine complexu venereo per solam fricatricum salacitatem, vel per nocturnas pollutiones ab ovariis in uterum devolvuntur, juxta Carol. Drelincurt. *de concept. concept. Perioch. 20. p. 19.* & Johann. Gothofr. Berger. *Physiol. p. 460.* qui etiam *p. 465.* a fimbriarum musculosarum oviductus in cœstu venereo constrictione per sola veneris ludibria ova interdum subventanea excludi scribit. De glanduloso ovuli corpore ita loquitur Johannes Bohnius *l. a. p. 19.* sicut experientia innotescit, per petulcam nonnullarum lasciviam & nefandas frictiones ac titillationes interdum, & sine omni maris cohabitatione aliquod ovulum ad uterum provocari, subventaneum equidem: ita nec ratio deest, quin in ejusmodi subjectis sibi relictis aliquando similis substantia generetur, quatenus vel a stimulis venereis intrinsicis, vel extraordinario sanguinis & succi genitalis orgasmo, exagita-

gitationem intestinam & secessum portionis lymphaticæ unius alteriusve ovuli, imprægnationis motui similem contingere non impossibile est. Ova in sterilibus hypenemia cum menstruo expurgari, se in propria uxore vidisse, Christiano Friderico Garmano medicus aliquoties confirmavit. v. Garmann *epistol.* 100. p. 435. quo loco ita pergit: Annus fere est, cum hic loci (Chemnitii) femina, quæ nunquam peperit, in ipso mensium fluxu, sed parci-ori, insignibus dorsi & lumborum tentaretur doloribus, quibus sedatis, & menstruo ad votum fluente tandem grumos sanguinis cum ejusmodi vesiculis egerebat. Femina gravidam se putans sexto mense excrevit utero septuaginta vesicas membranosas aqua pallida plenas, quantitate nucem castaneam æquantes. v. Christoph a Vega *de Art. medend. lib. III. Sect. X. cap. 13. fol. 399.*

§. 9.

Virgines quoque ova deponere testantur auctores; ducenta enim ovula seu vesiculas a virgine rejectas annotavit Nicolaus Venette p. 440. quam observationem in *Mulier. Part. I. cap. 3.* recensui, ubi plura exempla. Inquit etiam Theodorus Kerckringius *Anthropogen. cap. 1. p. 1. seq.* reperiuntur ova in testiculis feminarum, non tantum earum, quæ per conjugii usum fœcundæ sunt, sed etiam virginum, non secus ac fit in gallinis, quæ ova ponunt, etiam si galli ignorent consuetudinem. Et p. 3. ait idem: tam conjugatæ, quam virgines hæc ova sæpissime excernunt, insensibiliter quidem, quia non advertunt, nec quicquam de iis suspicantur: sed quod mihi ex relatione quarundam constat, sentiunt, dum reflectunt: hæc excretio potissimum instante purgatione menstrua aut alias stimulante libidine accidit. Prolixè de his ovulis subventaneis sequentia refert Isbrandus de Diemberbroeck *Anat. lib. I. cap. 24 fol. m. 134.* singularis, inquiens, & gravis difficultas occurrit, scilicet, cum aves etiam sine masculi congressu ova sua matura (quæ subventanea appellantur & infœcunda sunt) deponant, annon etiam maturæ virgines & mulieres, viris destitutæ ac sine coi-

An virgines ova deponant?

tu viventes, nonnunquam ova sua deponant sive exonerent? Verosimile videtur, hoc in frigidioribus & ad venerem non proclivibus vix contingere, cum in iis tantus calidi sanguinis & spirituum affluxus (qui alioqui per intentas venereas cogitationes fortiter promoveri solet) ad partes genitales non fiat, ut ovarii capsulae & simul tubae satis laxari possint ad ovorum exclusionem seu propulsionem & transitum. Sed in fervidis illis ac prurientibus, ad venerem maxime proclivibus, & venereis cogitationibus continue intentis, a copioso ad genitalia sanguinis spirituumque affluxu, ita nonnunquam laxari dictas partes, ut matura ova ex ovario sponte in tubas prolabantur per easque ad uterum deferantur, sed in eo tamen non diu detineantur, propter uteri orificium apertum, utpote quod non exacte clauditur, nisi cum vel semen virile ad conceptionem comprehendit, vel foetum continet. Quod autem antehac ista ova muliebria subventanea a nemine observata fuerint, hinc evenisse puto, quod mulieres ex utero elabentia non inspiciant, aut qualia sint cognoscant, nec a viris ea inspicere permittant, inter quae si forte aliquod ovum adesset, ab ipsis minime nasceretur: praeterea illud propter tenellam, qua circumdatur, pelliculum, vel disruptum excideret, vel inter illa lintea, quibus uterinas fordes excipere solent, mox disrumperetur, & sic nullam ovi figuram visui offerret. Interim haec speculatio saepe mihi memoriam refricavit, quod ante multos annos femina quaedam haud infimae fortis, cujus filia viginti quatuor annorum; satis salax, etsi tamen honesta, vehementibus suffocationibus uterinis saepe afficiebatur, mihi aliquoties narravit, scilicet, quod meis filiae praescriptis medicamentis nihil proficientibus, ipsam a praesente malo, & imminente mortis periculo, multoties cito liberasset obstetrix, per immisionem digiti in uteri vaginam & sic fricationem illic factam, qua mox e vulva viscidus aliquis liquor proliciebatur, cui saepe clara aliqua bullula aderat; & sic a lipothymia ad se redibat aegra. Maxime autem verosimile est, talia subventanea ova
etiam

etiam frequenter deponi ab illis mulieribus falacibus, quæ cum viro coeuntes, ob aliquam feminis ejus intemperiem non concipiunt. Sic Theodorus Kerckringius *Anthopog. Ichnogr. cap. I. p. 3 & 12.* hæc ovula delineans ita scribit: Tam conjugatæ, quam virgines hæc ova sæpissime excernunt, insensibiliter quidem, quia non advertunt, nec quicquam de iis suspicantur: sed quod mihi ex relatione quarundam constat, sentiunt, dum reflectunt: cum autem excreta sunt, paulo, quam hic depinximus, sunt majora, nec, quia mollia sunt & laxa, rotunditatem suam servant, & si manu tractentur ac diducantur, membrana manum sequitur: & hæc excretio potissimum instante purgatione menstrua, aut alias stimulante libidine accidit. Quam tamen Kerckringii sententiam nullo modo tolerari posse ait Johannes Sigismundus Elsholtius *M. N. C. Dec. 1. an. 6 & 7. obs. 197. p. 291.*

CAPUT VIII.

De Conceptionis ætate & voluptate.

§. I.

TEMPUS sive ætas, qua puellæ ad conceptionem & generationem aptæ judicantur, ordinarieque revera existunt, secundum physico-medicos in annos pubertatis, ab anno scilicet duodecimo vel decimo quarto, usque ad annum quadagesimum circiter secundum, vel nonum usque incidit, ita ut feminæ neque infra neque ultra dictos annos ad conceptionem habiles habeantur, de qua pubertate in *Parthenol. Sect. I.* egimus. Nihilominus tamen quandoque etiam modo juniores, modo seniores concepisse ac peperisse leguntur. Puellæ enim novennis ex concubitu gravidæ exemplum *Conceptionis ætas.* ex Hieronymo refert Anton. Ulmus *Physiol. Barb. hum. Sect. 3. cap. 9. fol. 293. seq.* de puella decem annorum nupta hæc refert Thomas Bartholinus *Histor. anat. Cent. V. hist. 17. p. 32.* Vidimus in hospitio nostro Lugduni ad confluentem Rhodani & Araris servam *puellarum*

grandævam, quæ olim anno ætatis suæ decimo nupta viro 38. ætatis annorum, ætatis duodecimo puerpera fuerat. Cujus etiam in patria exemplum meminisse addit. Item, inter Brachmannas in India idusitatum, quæ quinto sexto &c. anno elocantur, puerperæ nonnunquam ante decimum annum fiunt. Sexto ætatis anno quandam infantem masculum peperisse, refert Joh. Albertus Mandelslo *Itiner. orient. lib. I. c. 39.* Puellam octennem in Misnia a novenni juvene imprægnatam justo tempore puellam esse enixam, refert Johannes Sophronius Kozack *de Sale cap. 8. Sect. 12. p. 153.* Puellam octavo anno concepisse & aliam puellam novennem fuisse prægnantem, sub Benedicto XII. Pontifice maximo refert Franciscus Torreblanca *de Magia lib. II. cap. 18. p. m. 218.* Albertum Magnum vidisse, puellam nono anno redditam prægnantem, decimo peperisse, refert Simon Majolus *dier. canicular. colloqu. 3. fol. m. 42.* Sartoris cujusdam filiam decem annorum cum puero quatuordecim annos nato, a quo ante tres menses fuerat imprægnata, Noribergæ fuisse copulatam, in *Spermatologia nostra cap. 4. §. 16. p. 188.* recensuimus. Gallum quendam puerum undecim annorum agnatam suam novennem imprægnasse ex Josepho Scaligero refert Arnoldus Montanus *in der Gesandtschafft an den Kayser zu Japan fol. 365.* ubi addit, Papam Gregorium Magnum puellam novisse septennem a puero novenni imprægnatam. De puellis quinto, octavo & nono anno concipientibus vid. Marcell. Donat. *de med. histor. mirab. lib. IV. cap. 14. p. 383.* item Georg. Franc. *Satyr. 4. p. 74. seqq.* Joh. Schenck. *obs. lib. 4. fol. 559.* Plura quoque alibi de graviditate & partu reperientur exempla.

§. 2.

*Vetularum
conceptio.*

Quod autem hætenus de puellis earumque conceptione diximus, idem etiam de vetulis verum est. Quamvis enim Simon Majolus *Dier. Canicular. lib. I. cap. 3. fol. m. 42.* dicat, mulieres quinquagenarias concipere non posse; Et secundum Justi Lips. *Comment. ad Annot. Corn. Taciti p. m. 76.* mulier quinquagenaria major, vix

vix sit ut impleatur. Id quod etiam secundum naturæ cursum ordinarie observatur, cum circa hoc tempus plerumque menstruatio ac conceptio cesset, unde inquit Nicolaus Venette *de la Generat. Part. II. cap. 3. art. 6. p. m. 148.* si une fois les regles abandonnent, les femmes, lorsqu'elles sont un peu âgées, elles cessent en mesme temps d'engendrer. C'est pour cela, que la loy a déterminé aussi judicieusement un temps à l'égard des femmes, qu'à l'égard, des hommes. Elle estime les accouchemens prodigieux, qui se font après l'âge de 50. ans & n'admet point les enfans pour legitimes, qui naissent après ce temps là, parceque, selon le sentiment des medecins, les régles cessant aux femmes environ l'âge de 45. ou de 50. ans, il est impossible, qu'il se puisse naturellement engendrer un enfant, si la femme manque des choses necessaires à le former & à le nourrir. Cependant, si après cet âge - là il se trouve encore quelques femmes vigoureuses, qui puissent avoir leurs regles, je ne doute point, que l'on ne fît une grande injustice à un enfant, qui en naîtroit, si on le privoit du bien de ses parens. Ce fut sans doute la seule raison, qui obligea l'Empereur Henry, de faire accoucher sa femme âgée de 50. ans à la veue de tout le monde, pour ôter le soupçon que l'on auroit pû avoir de son accouchement. Nihilominus tamen vetulas concepisse atque peperisse, ex sacra scriptura testatur Sara Abrahami uxor nonagenaria Isaacum pariens. De muliere sexagenaria ex septuagenario sene gravida & pariente, vid. Joh. Schenck. *obs. libr. IV. fol. 558.* qualia exempla collegit Georgius Francus in Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 1. qu. 9. fol. 34.* Valescus de Tarant. *Philon. pharmac. lib. VI. cap. 9. Append. p. m. 662.* inquit: Menses ut plurimum cessant post annum quadragesimum quintum & aliquando post quinquagesimum quintum, ut scribit Constantinus: novi tamen mulierem boni habitus, quæ post sexagesimum annum habuit menstrua, concepit & peperit tres filios, quorum ultimus natus est anno matris suæ sexagesimo septimo. Plura exempla in Tract. de Partu adducemus.

§. 3.

Conceptio
sine prævia
menstruatione.

Ratio, cur Physiologi ad conceptionem tam annos pubertatis, quam ætatem quadraginta aliquot vel quinquaginta annorum requirant, uti dictum hæc esse solet, quia ab illo tempore usque ad illum terminum plerumque menstruationem patiantur, quam pariter plerique imprimis veteres tum ad foetus formationem, tum ejusdem nutrimentum, ad conceptionem tanquam necessarium requisitum præsupponunt. Marem enim generare non posse priusquam semen emittat; nec mulierem concipere, priusquam menstrua patiatur, inquit Paulus Zacchias *Quæst. med. leg. lib. I. Tit. 1. Qu. 6. n. 32. fol. m. 18.* Secundum Guil. Rondelet *Method. curand. Morb. lib. 3. cap. 61. p. 290.* sanguine menstruato augeatur foetus, & nutritur novem mensibus. Inquit etiam Antonius le Grand. *Histor. natur. Part. 8. art. 2. p. 358.* feminæ, quibus menses non profluunt, conceptui sunt inidoneæ. Unde illæ quas menstruus sanguis deseruit, steriles fiunt, & omnem foecunditatem deponunt. Johannes de Muralto *Clav. medicin. exercit. 4. p. 147.* ait: a creatore constitutum est, ut circa decimum quartum plerumque annum, usque ad quadragesimum, vel etiam quinquagesimum, quo intervallo feminæ ad conceptionem aptæ sunt singulis mensibus aliquid ex sanguine, quo reliquæ partes non indigent, ad uterum mittatur, quod vel foetui materiam suppeditet, vel si femina gravida non sit nec lactet, expurgetur! Et *M. N. C. Dec. II. an. 1. obs. 111. schol. p. 275.* eadem verba dictus Muraltus repetit, addendo, sanguinem menstruum hoc temporis intervallo ad uterum mitti, ut foetui formato alimoniam suppeditet &c. Rustica quædam temperamenti melancholici, nunquam menses passa singulis annis gravida fuit. *vid. M. N. C. Dec. I. an. 6 & 7. obs. 64. p. 92.* Sicuti autem secundum Pauli Zach. *l. a. n. 68 & 75.* non omnium est certissimus pubescendi terminus, sed interdum puellæ, juxta hætenus allegatas observationes, ante dictum pubertatis & menstruationis annum concipiunt; ita etiam plurimæ adultiores

annosque pubertatis dudum prætergressæ, nullis præcedentibus menstruis, imprægnatæ apud medicos leguntur. Quodsi vero menstrua purgatio conceptui promovendo absolute esset necessaria, nulla certe conciperent mulieres, nisi quibus fluxerint menses, quod tamen, juxta Joh. Freind *Emmenolog. cap. 2. p. 4.* experientię & historiæ medicæ prorsus repugnat. Refert enim Gualterus Charleton *de caus. Catamen. cap. 4. pag. 39.* universam nationem femellarum apud Tapuyas in Brasilia per totum vitæ cursum catameniis destitui, nec minus prolem edere. Et in extremo septentrione etiamnum vivere gentes, quæ sine menstruo tributo matres fieri possunt. Item vidisse Daniam ab ultima navigatione superstites Groenlandiæ incolas sequioris sexus, matres virgines, omnes hujus tributi ignaras, recenset Johannes Nicolaus Pechlinus *obs. med. phys. lib. 1. obs. 34. p. 81.* Plurima vero conceptionis, absque præcedanea menstruatione, exempla in variæ ætatis feminis observata *de virginit. Sect. II. de menstruat. cap. 7. §. 7. p. 19. seqq. 200.* recensuimus, quo benevolum lectorem remittimus. vid. insuper Franc. Piens *de febr. in spec. cap. 8. p. 218. seq. M. N. C. Dec. II. an. 5. obs. 120. sch. p. 242.* Ex Hor. Augenio refert Casparus a Reies *Quæst. 39. n. 22. p. 481.* puellam quandam a nono ætatis anno cum futuro sponso cohabitasse, & tandem anno decimo tertio gravidam factam esse, cum nunquam cruoris aliquid obtinuerit. Plura exempla refert Johannes Schenck. *obs. lib. 4. fol. 556.* Henricus Snelle *Theor. mechan. Part. 2. p. 110.* testatur, se novisse feminam, cui jam ante matrimonium suppressa erant menstrua, quæ nihilominus tamen nupta viro tres liberos successivis vicibus peperit; imo, quod notandum, nullo vel paucissimo vix ad unciam adscendentium lochiorum fluxu, in partu solum apparente. Feminam quandam Lipsiensem, aliquot foetuum matrem nunquam antea menstruatam se novisse, anno 1684. in discursu referebat Johannes Bohnius. vid. etiam Nicl. Vinette *de la Generat. Part. III. cap. 3. p. 373.* Mich. Albert. *Jurispr. med. IV. §. 13. p. 88.* Georg. Francus de Fran-

Franckenau *Satyr. 6. p. 99.* mulieris meminit, quæ menstrua nunquam passa fuerat, duodecies tamen pepererat. Refert etiam Franciscus Mauriceau *dans les observat. sur la Grossesse obs. 393. p. 230.* une observation d'une jeune femme âgée de seize ans, qui estoit devenue grosse, quoy - qu'elle n'eust jamais eû ses menstruës. Mensium quoque defectum in femina honestissima pariter ac nobili, sex infantum matre, annotavit Johannes Bohnius *Circ.anat. physiol. Progymnasm. 16. p. 242.* De qua tamen, absque prævio mensium fluxu, abducta conceptione Johannes Baptista Wenckius ita judicat: quamvis accidere possit, ut arbores quædam fructus, nullis præcedentibus floribus (quod rarum est) proferant, atque pariter quædam mulieres nullo præhabito menstrui fluxu imprægnentur; nihilominus tamen juxta ordinarium naturæ cursum semper menstruus mulierum fluxus conceptionem præcedere solet, qui antesignanus & index est fœcunditatis illius ægræ, ex qua defluit. *vid. M. N. C. Dec. III. an. 4. App. p. 203.* Et Georgius Wolffgangus Wedelius *Physiolog. Sect. III. cap. 28. p. 202.* conceptionem seu fœcundationem ovarii non contingere scribit, nisi menses, ceu flores, de fructibus subsequuturis testantes, præcesserint. Quicquid enim in contrarium afferunt exemplorum, ea non absolute valent, sed si vera illa sunt, non aliter intelligenda & concedenda sunt, quam quod antea non visis quidem mensibus, in coitu tamen fœcundo, laxatis repagulis, sanguis uberius effluerit, quem vulgo pro menstruo non habent, & ita patulam reddiderit viam.

§. 4.

Conceptio
tempore
menstrua-
tionis.

Menstruationis occasione monendum adhuc est, juxta & facilius varios autores ipsamque experientiam, feminas plerumque circa tempus menstruationis, vel potius cessante mensium fluxu, quam alio tempore, fœcundum coitum patiatque concipere. Inquit enim Hippocrates *de natur. puer. oper. Sect. III. fol. m. 17.* si menstruo sanguine vacuata mulier fuerit, concipit, si vero is redundarit, minime. Uteris enim & venis sanguine vacuis, mulieres

res foetus concipiunt; hæ namque post menstruam purgationem, ob jam dictas causas, utero concipiunt. Autor tractatus Belgici *Conceptio* Venus Minſieke Gaſthuis p. 382. ſcribit: wy bemerken dagelyks, *post men-* dat de Vrouwen verliefder zyn voor of naerhet vloeien harer *ſium flu-* ſtunden, als in eenigen anderen tiit: de Natur haer dan veel meer *xiun faci-* *lior.* luſt gevende om ſich te vermengen, ſoo zyn ſy ook in dien tiit veel meer onderworpen t'ontfangen. Et juxta verba Nicolai Venette *de la Generat. Part. III. cap. 4. art. 6. p. 422. ſeq.* nous obſervons tous les jours, que les femmes ſont plus amoureufes avant ou après leurs regles, qu'en tout autre temps: la nature leur donnant alors beaucoup plus d'envie de ſe joindre, elles ſont auſſi en ce temps la beaucoup plus ſujettes a concevoir. Ab annis pubertatis mulieres paulo ante, poſt, & in ipſa menſtrua purgatione alterationem ſeu irritationem ſenſilem & voluptuoſam vellicationem experiri, & ſalaciores fieri, docet Joh. Bapt. de Wenck. *M. N. C. Dec. III. An. 9 & 10. obſ. 136. p. 260.* Eſſi vero an mulieres aptitudinem concipiendi ex menſtruatione acquirant, eaque an illi operi unice ſit deſtinata, ex ea ratione, quod juxta §. antecedentem, plurimæ feminæ nullis præcedentibus menſtruis, concipiant, ambiguum ſit, Henrico tamen Snellen *Theor. mechan. Part. III. p. 110 ſeq.* credibile eſt, hoſce motus conceptionem accelerare & facilitare; plurimas enim eo tempore potiffimum concipere, admodum probabile eſt, quo motus illi exiſtunt aut inchoant inteſtini, inſtante nempe menſtruationis tempore, utpote magis aptis redditis ad majores exoſculationes ſpirituum ſui juris exiſtentium ac in ſe petulantius agentium &c. Et juxta Joh. Freind *Emmenol. cap. 7. p. 48* fluxus menſtruus quanquam conceptui non prorsus quidem neceſſarius, facit tamen, ut facilius concipiant mulieres: quippe vias uterinas ita aperit, ut liberior fiat ſemini in ſanguinem introitus. Tempus coeundi opportunius, ut ſequatur conceptus, eſt deſinentibus menſibus aut jam ſinitis, quia exſiccati tunc uteri trahunt, inquit Hieron. Barbatus *de Sanguin. p. 56.* Ipſo autem menſtruationis tempore fe-

minam concipere posse, testatur Franciscus Mauricæus in *Tractat. des observations sur la grossesse*, obs. 676. p. 391. de l'accouchement d'une femme, qui avoit conceû son enfant dans le temps, qu'elle estoit encore dans la fluxion de ses menstres, in quibus, le 23. Avril 1693. j'ay accouché une femme âgée de quarante-quatre ans ou environ, d'un enfant mâle, qui se portoit tres-bien, & qu'elle avoit mesme porté trois jours plus que les neuf mois complets, quoy qu'elle l'eust conçu, à ce que m'assura son mary, dans le temps, qu'elle estoit encore dans la fluxion de ses menstres. Ils avoient esté, l'un & l'autre depuis onze ou douze ans de ces steriles volontaires, qui ne couchent pas ordinairement ensemble, de crainte de faire des enfans, & d'en avoir la charge; de sorte que le mary de cette femme fut fort étonné voyant sa femme grosse, & fasché en mesme temps aussi bien qu'elle, de ce qu'ils seroient condamnés aux dépens, pour n'avoir pas crû, qu'une femme pouvoit concevoir, comme elle avoit fait, dans le temps mesme de l'evacuation de ses menstres; & lis craignoient outre cela, que cet enfant ayant esté certainement conçu dans un temps si peu convenable, ne fust sujet à plusieurs infirmités, pour avoir esté infecté dès le commencement de sa generation des superfluités menstruelles de sa mere; Cependant il vint au monde étant en parfaite santé. Sic mercator quidam pro secunda vice matrimonium contraxerat cum virgine evsarca, duos & viginti annos nata, & cubuerunt simul fluentibus adhuc menstruis purgationibus, remque semel habuerunt, sed ita facile, ut ex virgine facta sit mulier, quæ eodem temporis momento concepit. Maritus summo mane surrexit, atque ad merces emendas rura satis longinqua petiit. Reversus vero domum & uxor dormierunt simul, sed rem habere tentarunt frustra, propter angustius multo redditum, quam antea, sinus pudoris orificium, post fluxionem menstruorum & partium pudendarum exsiccationem &c. vid. Severin. Pin. de Not. Virginit. cap. 6. p. m. 59. seq. Utrum vero coitus cum femina menstruata sit noxi-

noxius? in *Emmenolog. seu de menstruat. cap. V. §. 131. p. 209.* prolixè vidimus.

§. 5.

Ad faciliorem conceptionem facere quoque humorem illum serosum, quem in coitu nonnunquam feminæ simul excernunt, veteresque pro semine muliebri habebant, statuunt nonnulli. *Conceptio an a liquore vaginali.* Inquit enim Franciscus Zypæus *Fundam. medicin. Part. II. cap. 7. p. 231.* Solet mulier eodem præter-propter tempore præ voluptate & titillatione, quas sentit ex injecto virili semine & penis motu, ex uteri sui lacunis contractis influxu spirituum animalium in fibras uteri, emittere humorem aliquem serosum, quem non semen esse alibi probavi. Ille humor ad conceptionem concurrere potest, quatenus virile semen diluendo & rarefaciendo ad spiritus seminalis faciliorem separationem peragendum motum peristalticum & ad ovaria elevationem concurrat &c.

§. 6.

Flagrorum usu faciliorem in mulieribus conceptionem adscribit Thomas Bartholinus *Tract. de usu Flagror. in Remed. & venen. p. 21. seq.* inquit, notandum, non viros tantum flagris excitari ad illicitas voluptates & intempestivas, sed & feminas flagellis incitari & incalescere, ut facilius concipiant. *An a flagrorum usu?* Notum id fuit Romanis mulieribus, quæ lupercis se offerebant flagellandas, ut conciperent. Autor hujus ritus est Juvenalis *Sat. 2.*

- Steriles moriuntur, & illis

Turgida non prodest condita pyxide Lyde;

Nec prodest agili palmas præbere lupercis.

Ubi vetus scholiastes: Steriles mulieres februantibus lupercis se offerebant, & ferula verberabantur. Cur vero palmæ verberatæ ad fecunditatem Romanas mulieres acceleraverint, sine superstitione, facilis ex circulatione ratio petitur. Incalescens enim plagis sanguis in manu recurrit ad cor exindeque ad uterum per arterias,

qui calefactus citius ad libidinem incitatur disponiturque ad conceptionem &c.

§. 7.

An sine
voluptate
conceptio
fiat?
negant alii.

Utrum vero mulieres sine delectatione concipere possint, inter medicos disceptari solet, quorum alii affirmativam, alii negativam defendunt. Hi, sive qui conceptionem sine voluptate fieri posse negant, sequentibus præterpropter rationibus nituntur, quia talis voluptas a partium genitalium confricatione, sine qua nulla cohabitatio fieri possit, in omnibus feminis coeuntibus excitatur. Et quamvis nonnullæ feminæ, vel maritatæ etiam, talem se veneream voluptatem sentire pernegent, minime tamen ipsis, ob necessariam in coitu affrictionem, a qua voluptas oritur, fidem adhibendam esse statuunt, earumque testimonium pro suspecto habent. Inquit enim Johannes Fernelius *Physiolog. lib. VII. cap. 6. p. 178.* nulla profecto earum muliercularum dictis fides habenda, quæ asseveranter pronunciant, se nulla coitus voluptate utero concepisse. Quod etiam Petrus de Peramato defendit, falsum, inquiens, hoc noscimus testimoniis multarum, quæ sæpe sæpius huius rei fecerunt periculum; nec sunt audiendæ quædam, quæ castitatem simulantes perhibent, se nulla fuisse oblectatione detentas, sed omnia per vim fuisse perpeffas, vid. Casp. a Reies *Quæst. 42. p. 505.* Deinde quamvis etiam quandoque v.g. in stupro violento, ab hostibus, admissio viri involuntaria & coacta sit, & absque venereo appetitu incipiatur, nihilominus tamen a subsequente confricatione femina ad voluptatem stimulatur, quam etiam delectationem absque dubio auget feminis virilis in uteri vaginam, vel, secundum veteres & nonnullos recentes, in uteri cavitatem injaculatio; ut ita involuntarie & vi inceptus actus venereus cum appetitu continuetur & absolvatur. Sicut enim illi, cui mel vel saccharum, vel etiam amaricantia cum nausea & vi in os intruduntur, dulcedo nihilominus mellis vel sacchari, vel etiam amaritudo, in ore remanet; ita etiam objecta reliqua sensuum suis organis

ganis incidentia, si voluptuosa fuerint, gratiam & voluptatem, si infesta, dolorem vel nauseam movebunt: ita membrum virile, vi quoque partibus mulierum verendis intrusum, ob plicas vaginæ uterinæ vellicatas, obque injectum virile semen, veneræ voluptatis sensationem causatur atque relinquit. Ab hoc mulierum coeuntium defectu voluptatis sterilitas equidem dependere videtur juxta observationem Plateri, de nobilis cujusdam uxore, toto matrimonii tempore nihil penitus voluptatis aut titillationis percipiente ac sterili. v. Felic. Plater. *Obs. lib. I. p. 260. seq.* Scribit tamen Averroes, se multas vidisse imprægnatas, cum per vim fuissent violatæ. v. Casp. a Reies *l. a.* Absque mutua vero maris & feminæ voluptate concipi non posse credit Realdus Columbus *de Re anatom. lib. II. cap. 15. p. 448.*

§. 8.

Huic tamen sententiæ alii contradicentes medici conceptionem citra voluptatem fieri posse asserunt & quidem tam veteres, quam recentiores. Inquit enim Hieronymus Mercurialis *de Morb. mul. lib. I. cap. 2.* quanquam Aristoteles *lib. I. de Gener. anim.* scribit, mulierem sæpe concipere sine coitus voluptate, tamen hoc apud medicos non est receptum &c. vid. Israel. Spach. *Gynæc. fol. 213.* Sine maris ac feminæ emissionem concipi impossibile est, sine voluptate vero femellæ fieri quidem potest, si locus turgeat, & vulva propius ostium descendat: quamvis magna ex parte sic accadat, ut utrorumque oblectamento id agatur, inquit Ludovicus Bonacciolus *de Fæt. format. cap. 2. p. 187.* Plura de hac materia ex veteribus reperies in Zacut. Lusitan. *de Medic. princip. histor. lib. III. Quæst. 18. oper. Tom. 1. fol. 475 seqq.* Roder. a Castr. *de Nat. mul. lib. II. cap. 1. p. 38.* Casp. a Reies *l. a. p. 507.* ubi feminam aliquam aut cum paucissima delectatione, aut citra ullam concipere posse multis rationibus statuit. it. Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. lib. III. Tit. 1. Qu. 7. n. 11. 12. seq. fol. 280. seq.* Marcell. Donat. *de med. histor. mirab. lib. IV. cap. 12. p. 396.* Quamvis etiam angustis & primum coitum admittentibus a

Alii adfirmant.

confricatione voluptas deneganda non fit, talis tamen in iis spon-
 sis, quæ tempore menstruationis coitum celebrant, vix expectari
 potest, cum sponso tunc temporis facilior ingressus, sponsæ virgi-
 nitas quandoque suspecta esse soleat, qualia exempla cum admoni-
 tione in Muliebribus ex Pinæo & aliis autoribus adduximus. Ra-
 tionem, cur citra voluptatem mulieres sæpe concipiant, hanc red-
 dit du Vernay apud Nicol. Blegny *Zodiac. med. Gall. An. II. mens.
 Mart. cap. 3. p. 72 seq.* censet scilicet, id adscribendum superfluxæ se-
 minis copię, ob quam contingat extensio extraordinaria vasorum
 id continentium, quapropter obstupe scat sensus filamentorum
 nerveorum, eorum structuram constituentium: Cujus rei præte-
 rea causa esse potest diuturnior seminis in illis mora, per quam lon-
 gior fermentatio inducitur, causa dissipationis partium maxime
 spirituosarum, unde aciditas quædam illi conciliatur, qualitas mi-
 nime omnium idonea ac multum discrepans ab ea, quæ requiritur
 ad titillationis excitationem, quæ ex plurimorum philosophorum
 sententia sextum sensum constituit. Quibus & hoc addere est,
 tempore repletionis tuborum semen continentium, cum uterus
 magis madescat, tunc hunc suppeditare posse omnibus partibus
 genitalibus humorem mucilaginosum, qui obducens nervorum
 extremitates, eos sensus acumine privat, unde imminutio vel abo-
 litio voluptatis, hinc cum nihilominus integra perstet natura se-
 minis muliebris, conceptio tamen locum habet, quæ contingit ea
 commixtione seminis muliebris cum virili tempore coitus. vid.
 etiam Tr. de Coit. §. 9.]

§. 9.

*Ipsorum
ratio.*

Cum vero plerique hætenus circa hanc materiam allegati, & alii
 ab ipsis iterum citati autores hanc sententiam ex veterum hypo-
 thesi, quod scilicet non solum mas, sed etiam femina in coitu fœ-
 cundo proprium semen excernat, atque ab eorum commixtione
 generatio & conceptio fœtusque formatio dependeat, unanimi-
 ter defendant, quid mirum, quod etiam cum veteribus, liquo-
 rem

rem illum, qui aliquando tum in coitu, tum ab alia etiam titillatione & phantasia venerea e partibus mulierum genitalibus effluere observatur, tam diu pro semine femineo habuerint, donec a recentioribus doctrina de generatione ex ovo, (quam equidem modo allegatus recens autor, du Vernay, adhuc futilibus subtilitatibus & figmentis annumerat) pluribus rationibus atque demonstrationibus confirmata & nostris temporibus ab omnibus anatomico-physiologis, licet aliquali cum discrepantia, recepta fuerit? Et sicuti ex anatomicis apparet, dictum liquorem, a veteribus pro mulierum semine habitum, non ex ipso utero, sed ex glandulis vaginalibus, per lacunas maximam partem provenire, neque retro ad uterum, sed ad extra effluere, ita etiam multo minus, ad conceptionem foetusque formationem, quæ in ovario & utero quærenda, aliquid conferre potest, licet ab ipso tempore coitus in majori quantitate secreto, salacitem seu voluptatem veneream majorem excitari libenter concedamus; Interim tamen non in quovis coitu foecundo dicti liquoris excretionem observari, experiuntur mares atque feminæ; quarum etiam nonnullæ, se quandoque coitum foecundum absque ullo voluptatis stimulo (qui simul a mentula viri propriaque conflictus amorosi impressione excitari solet,) expertas fuisse, constanter affirmant. Et quamvis ipsarum verba a plerisque in dubium vocentur atque ob paulo ante allegatas rationes vacillare videantur; quin tamen in certis subjectis, eg. frigidis seu phlegmaticis, perterritis & ab hoste stupratis, item in ebriis & profundo somno sepultis, ejusmodi insensatio sit possibilis, dubium non videtur, cum præsertim his ultimis, scilicet dormientibus, quandoque varia, v. g. candelæ, ligna, pessi & alia, per jocum & malitiam, in sinum muliebre, absque dormientium sensu, immissa vel intrusa legantur; præterea etiam varia feminarum in somno concipientium exempla hinc inde referantur atque defendantur. Uti de Stupratione in somno monstravimus.

§. 10.

Alii auto-
res.

Posse autem feminas absque voluptate in coitu concipere, præter modo allegatos autores, statuit etiam Guilielmus Harveus *de Generat. animal. exercit. 65. p. 421 seq.* Vasa, inquit, præparantia dicta, & deferentia, vel ejaculantia, nec in damis & cervis inveniuntur, nec (quod sciam) in alia aliqua femina visuntur; & anatomici (feminam in coitu semen emittere rati) ea in muliere solícite nimis inquirunt: quippe omnibus non contingunt, & in quibus infunt, nunquam eodem modo reperiuntur. Quamobrem verissimum videtur, quod etiam mulierum major pars asserit, ipsas nempe in coitu semen non effundere. Et licet salaciores quædam humorem aliquem in coitu emittant, eum tamen fœcundum semen esse, aut ad conceptum necessario requiri, non arbitror. Plurimæ enim sine ejusmodi effusione, & nonnullæ quoque citra voluptatem aliquam concipiunt. Et Johannes Adamus Genselius *Ephem. Acad. nat. cur. Cent. III & IV. obs. 49. p. 109.* talem conceptionem sine voluptate defendit; datis, inquit, omnibus requisitis ad conceptionem necessariis, non potest non eadem subsequi, licet præter voluntatem & citra appetitum naturalem coitus contingat. Illud in plurimis puellis toto quasi observatur die, quæ contra voluntatem suam & intentionem, ipsis quasi invitis imprægnantur: hoc vero in certis mulierculis, temperamenti phlegmatici, quales ipsemet novi, cernitur, quæ absque minima delectatione, voluptate ac titillationis sensu, atque sic sine appetitu concumbentes, tamen concipiunt. Sæpe numero concipere mulieres nulla delectatione in venereo congressu affectas testimonio Aristotelis probat Marcellus Donatus *de med. histor. mirabil. lib. IV. cap. 17. p. 396.* Liceat etiam hoc loco inferere observationem Johannis Nicolai Pechlini de Aphrodisia sine voluptate *ex observ. lib. I. obs. 44. p. 101. seq.* Copiose, inquit, disputat Caspar a Reyes, an mulier sine voluptate concipere possit, negantibus aliis, aliis affirmantibus; qui affirmant, exemplis se rem ostendere posse

se confidunt, qui negant, ratione se defendunt a natura corporis plurimisque inde circumstantiis petita. Si rationem audio, non facile & ipse existimem, sine voluptatis sensu concipere feminam posse; sin experientiam, victas dare manus debeo. Neque volo, quisquam opinetur, in hisce sola me mulierum confessione acquiescere, quæ sæpe extenuant, quod in suspicionem venereæ libidinis rapi potest, sed aliorum potius & virorum, quibuscum consuecunt. Non dubito etiam reperiri feminas, quæ voluptatem illam æstimare nesciant, & in ecstasi tam peculiari sui dulcedinisque obliviscantur, quod ipsum pro voluptate illa argumentum est longe maximum; non enim aliud quæritur, quam ut sensus sibi erepti vulgarium rerum curam abjiciant. Et utut conceptum sine voluptatis sensu fieri posse vix credibile sit, arbitror tamen esse, quæ jussæ & provocatæ sine prurigine virum & admittant & concipiant. Quod si autem concubitus sine feminis vel fœcundi aut voluptuarii effusione a mulieribus institui potest, & unum virorum semen, idque verminosum, generationis conficit arcana, quæ nupera est hypothesis, minus certe paradoxum videatur, nesciam & stertentem feminam pro illo corporis habitu imprægnatam aliquando esse, quod coram judice sancte & jurato affirmasse aliquam scio, cui tamen non temere fidem adhibuisset, nisi clandestinus amator commiseratione virginis non ita malæ ductus furtum ablatumque insciæ coitum prodidisset. Credo reperiri feminas tam crassa callosaque cuticula, spirituum adhæc tam lenta tarditate & habitu œdematoso, ut membri virilis molitiones, si & ipsum flaccidius exiliusque, roremque auræ feminalis non alio, quam vulgari contactu agnoscant, nullo ad interiora delato orgasmo: Verum, ut constat, gradus venereæ dulcedinis esse diversos, ita dubium non est, quin aliquando in obtusiores aut nullam desinere possit; atque eum in finem distinguere etiam causas oportet, quæ sensum provocent voluptatis; alia enim profecto est ab effervescentia sanguinis & spirituum, unde prima

fere oriuntur libidinis semina: alii a frictione solidi & naturalium, quæ plerumque illam aut repertam magis incendit, aut segnem excitat; alia a profusione seminis quæsitoque per angustias sensiles exitu: hæc, ut venerei certaminis est complementum, ita voluptati per gradus auctæ ultimum addit mirificumque sensum, quæque una est, propter quam οἱ ἀφροδισιάζοντες tam perditæ coitum affectent, & hanc sibi cœli imaginem finxerint Muhamedani. Itaque compendio dicam, quæ sentio: Sunt feminae quædam adeo obtusæ ac παχύδερμοι, ut vix ac ne vix quidem in libidinem despument, & quamvis motum percipiant aliquem, non tamen percipiant eum voluptatis gradum, quo amantes tantopere exsultant; quæ ipsæ forte, si penitus somno obruantur, etiam ignaræ perfundi semine virili & concipere possunt. At quæ usque eo incallescunt, ut saniem in coitu ejiciant genitalem, eas non posse non aliqua percelli ecstasi, quamdiu canaliculi isti nervei sunt tam angusti, & sanies multo spiritu spumosa, omnino adducor, ut credam. Quod si tamen effusio illa ad conceptum necessaria est, in quo ego valde dubito, haud intelligo, quomodo concipere possit, quæ nullo ejusmodi sensu aut ecstasi afficitur. Ut magis jam mirari habeam exemplum, quod mihi vir muneris conditione venerabilis de conjuge sua testatus est, eam, etsi blandulam, mellitulam, deliciarumque & venerum promam condam, nunc etiam plurimorum liberorum matrem, adeo sine omni voluptate concumbere, ut quem exquisitissimis blanditiis, osculis, & quæ ἡ ὀφθαλμομένη εὐνοία dictare solet, a marito forti provocavit coitum, mox verbis, minis, fere etiam lacrymis deprecetur: & cum exstimulato jam post tot illecebras membro fibulam imponi posse desperat, virum admittat quidem, sed animo remissiore & a sacris illis averso. Neque hæc heri aut nudius tertius, nec post tot liberorum fastidia, nata antipathia, sed ante viginti annos & cum primo coitu, quem tamen ipsum etiam, dici vix potest quibus artibus, in multas noctes distulerit. Et vero non unum nec alterum, sed viros

viros promiscue & feminas illam sexus sequioris ἀναρτησίαν dolentes numero plures cognovi, ut desinant jam infamare mulierculas probrosi viri, qui omnem voluptatis sensum peccandique occasiones in illas, veluti unica libidinis fomenta, rejiciunt, seque unos a crimine absolvunt. Hæc Pechlinus. Inquit etiam Rodericus a Castr. *de Natur. Mulier. Lib. II. cap. 1. p. 38.* humor quidam salivalis in feminis uteri cervicem per tenuissimas fibras adit; quem cum emittunt, mira voluptate afficiuntur, quod non perpetuo in feminis prolifici emissionem, sed plerumque evenit; plures enim citra libidinis voluptatem conceperunt. Et Nicolaus Venette *de la Generat. de l' Homme cap. IV. Art. 3. p. 391.* scribit: J'avouë, que le plaisir n'accompagne pas toujours la conception, & je ne saurois croire, que ce soit le seul écoulement de la semence des femmes, qui leur cause des contentements. Le chatouillement, qu'elles ressentent des parties de l'homme, & la forte imagination, qu'elles ont dans le combat amoureux, en sont la principale cause, si bien que je ne m'estonne pas, s'il y en a eu quelques-unes, qui, n'ayant pas la liberté de l'imagination & du chatouillement, ont engendré sans plaisirs.

§. II.

Porro etiam pro sententia affirmativa, sive feminas quandoque absque voluptatis veneræ sensu concipere posse, alia adhuc argumenta a conceptione sine plenaria penis in partes mulieris genitales immisione feminisque virilis a variis causis impedita injectione, vel etiam a conceptione in somno, desumpta, dimicare videntur. Quamvis enim, ex Galeni omniumque veterum medicorum judicio, sine penis in uterum ejusve vaginam immisione nulla fiat generatio; vid. etiam P. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. III. T. I. Q. 8. fol. 283 seqq.* dantur tamen varia mentulæ virilis in vulvam intrusionis feminisque legitimæ injectionis, (a quibus primario voluptas oritur,) impedimenta, salva

Conceptio
sine penis
intromissione.

tamen conceptione, quæ etiam sine penis intromissione possibilis est, uti de angustis sive arctis, occlusis et imperforatis, sive atretis liquet, quæ virum absque dolore non admittere, nihilominus tamen sine legitima cohabitatione concipere possunt; siquidem licet in ejusmodi feminarum labiis pudendi, a partu vel aliis causis præter naturam occlusis vel coalitis, item in membrana, quandoque vaginæ introitum occludente, (quæ anatomicis vulgo hymen dicitur, atque interdum satis spissa & crassa reperitur) vel etiam in ipsius vaginæ stricto coalitu, interdum equidem parvum quoddam pro aliquali feminis virilis, vel ejusdem spiritus genitalis, immissione, deprehendatur foramen, vix tamen a tantillo feminis, quantillum per tam parvum foramen ingreditur, multo minus a spiritu penetrante, absque debita mentulæ intromissione, solita voluptas expectanda erit. Ad talem vero conceptionem requiritur, ut semen sit prolificum, & statim post vulvæ labia vel proxime ad perforationem sive aperturam rejiciatur, ne ipsius spiritus ab aere dissipentur. Tale exemplum refert Petrus Borellus *Cent. IV. obs. 26. p. 297.* Sine profunda penis immissione conceptionem fieri posse, defendit etiam Michael Ettmüllerus *Oper. Tom. I. fol. m. 168.* inquiens: Verum est, quod etiam virgo concipere possit, cui penis non adeo profunde intruditur, & cui claustra, quæ vocantur virginalia, minus in tali casu aperiuntur, modo tam artificiose ejaculetur genitura maris, ne ab aeris externi ingressu vitari aut spiritus genitalis dissipari possit, quin potius hic ipse prompte se in uterum insinuet, & ita virginem imprægnet. Sufficit ergo ad conceptionem saltem spiritus genitalis maris, modo extra aerem externum possit venire in vaginam uteri. Refert etiam D. dela Morandiere, quendam a septennio conjugatum de uxore conquestum esse, quod nunquam illam inire potuerit. Constituta autem a judice per chirurgum & matronas exploratione, indicta muliere repertum fuisse orificium ex-

ternum vulvæ obturatum a carne solida eaque naturali, pertusa tamen in medio ad menstruorum effluxum, vix tamen styli cujuspiam vulgaris capaci; qua de causa generationi inhabilis judicata fuit ac viduitati mancipata. Libidinis tamen stimulis urgentibus eadem concepit, actu quanquam venereo imperfecto; Partus enim tempore adveniente accersitus de la Morandiere exitum artificio infanti procuravit, scilicet incisione facta carnis vaginæ introitum obsidentis &c. vid. Nicol. de Blegny *Zodiac. Med. Gallic. An. I. Novembr. Obs. 6. p. 173.* Plura exempla vid. in *Gynæcolog. Sect. II. cap. 2. §. 22 seq. p. 162. sq. de atretarum conceptione.*

§. 12.

Dari autem angustarum & imperforatarum feminarum absque voluptate, & potius cum dolore, concipientium exempla, ex *Gynæcol. Sect. II. cap. 2.* repeti potest; meminit enim Johannes Riolanus *Anthropograph. lib. II. cap. 35. fol. 197.* se Parisiis vidisse mulierem, quæ ex partu difficili laceratas habuerit partes genitales, cujus nymphæ & quatuor carunculæ postmodum tam arcte coaluerant, ut vix specilli cuspidem foramen admitteret, nihilominus decimo quarto abhinc anno iterum concepit. Refert etiam Riolanus, in Francia imprægnatam fuisse quandam, cujus virginitatis claustra omnia firma atque illæsa manserant. Et anno 1609, mulier quædam imperforata accusavit maritum impotentiae & frigiditatis coram judice, quod non ab eo quicquam passa fuisset; quæ tamen gravida fuit inventa. Cum aurifaber honestam puellam duxisset, ipsique in congressu liber aditus ad illam non daretur, quin etiam illa in congressu de dolore & quod difficulter maritum admittere posset, conquereretur, post menses aliquot maritus de divortio cogitare cœpit, ipsa tamen gravida tempore legitimo, facta incisione, infantem maturum progeniit, vid. Gu. Fabric. Hild. *Obs. chirurg. Cent. III. obs. 60. fol. 244 sq.* Fe-

Imperforatas absque voluptate concipere.

mina, cui orificium uteri externum firma carne ita erat coalitum, ut tantum foraminulum, vix frameam admittens, pro excernendis mensibus superesset, hinc etiam ad conceptionem inepta judicaretur, veneris œstro percita nihilominus concepit, juxta Stephan. Blancard. *Collect. med. phys. Cent. III. obs. 56. p. 428.* Puella Romana, cui vulvæ labia a nativitate erant unita, nisi quod per exiguum foramen, vix pisum capiens, urina & menstrua egrederentur, licet penem admittere non poterat, concepit, teste Henrico a Moinichen *Obs. 13. p. 49 seq.* Alii puellæ, cum a carbonibus totam perinæi, vulvæ & pubis regionem combusserat, chirurgi negligentia integra vulvæ labia firma cicatrice sibi conjungebantur, relictis tantum duobus foraminulis; a proco nihilominus per contactum absque membri intromissione ingravida fuit, *vid. M. N. C. Dec. I. An. 3. obs. 273. p. 486.* In femina quadam tempore partus præter membranam hymenem integram & valde crassam alia adhuc membrana præternaturalis crassa vulvam profundius claudebat foetusque exitum impedi-
bat, juxta Frid. Ruysch. *Obs. 22. p. 27.* Noviomagi mulier quædam parturiens ad ingressum vaginæ validam transversam membranam, in medio exili foramine perforatam, tantaque firmitudine habebat, ut digitis ab obstetrice dilacerari nequiret; hæc penitus impediabat, quo minus obstetrix digitum ullo modo immittere posset; & quia mariti penem adhuc multo minus recipere potuerat, mirabantur omnes, quomodo illa imprægnari potuisset. Sed confitebatur maritus, se multoties tentasse, an-
ne per illud obstaculum rigido suo ariete perrumpere posset, sed nunquam penetrare potuisse, aut interiora subiisse: interim tamen in ista lucta ipsi multoties semen effluxisse & contra membranam istam ejaculatum fuisse, referente Isbrando de Diemerbroec *Anatom. lib. I. c. 23. f. 126.* Puellam sedecim annorum eximie formæ, cui ob genitalia, a natali clausa, menses & urina
ordi-

ordinarie, modo solitarie, modo cum cæteris fecibus per alvum sine molestia fluebant, parentes ideo, quod ad matrimonium inepta videretur, in cœnobium deducere volebant, quam tamen eremum illa declinans postmodum a jurisperito, femine virili tantum extra pudendum virgineum asperfo vitiata fuit. *v. M. N. C. Dec. II. an. 7. app. p. 160 seq.* De partu difficili ob hymenis paululum tantummodo perforati præsentiam frequentem observationem refert Franciscus Mauriceau *Observat. 489. p. 287.* J'ay veu une femme de trente-cinq ans, qui estoit en travail de son premier enfant, depuis vingt-quatre heures, que ses eaux estoient ecoulées; ce qui rendoit son travail plus difficile & laborieux; la quelle difficulté estoit encore augmentée par son hymen, qui me parut tout entier à l'entrée du col dela matrice, & si peu perforé, qu'on ne pouvoit pas y introduire seulement, l'extrémité du petit doigt; ce qui me fit connoistre une verité, dont cette femme m'assura; qui estoit, qu'ayant epousé un homme fort vieux, qui par sa foiblesse n'avoit pas pû en forçant son hymen, faire aucune introduction de sa verge dans le col de sa matrice, elle n'avoit pas laissé de devenir grosse, à son grand etonnement. Et *Obs. 583. p. 341.* idem autor historiam recenset d'une jeune femme, qui quoyque son hymen ne fust perforé, que d'un petit trou dela grosseur d'un tuyau de plume à escrire, n'avoit pas laissé de concevoir, sans introduction du membre viril. Refert etiam Johannes Bohnius *Exercitat. physiologic. 24. §. 2.* modo virginem, ad cuius vulvæ extremum tantum absque penis in vaginam admisione, semen virile depositum erat, modo aliam, cujus orificium externum membrana robusta satis totum fere occludebatur, ut deflorari non posset, modo feminam, cujus vaginæ ostium, a difficili partu laceratum, maximam partem coaluerat, nihilominus concepisse. Exemplum feminæ, cujus vagina uterina post ulcera male curata in medio a cicatrice atque duritie ita erat angustata

gustata fereque coalita, ut vix candelam ceream, multo minus mariti membrum admittere posset, quæ tamen postmodum conceperat, atque post institutam curam feliciter pepererat, recitat Cosmus Viardel *von der vveiblichen Geburt Lib. II. cap. 5 p. 46 sq.* Daniel Sauvri etiam dicit, se multas nosse feminas, quæ conceperint, nulla præcedente admissione membri virilis in vaginam, quæ quidem fuerint imperforatæ, excepto parvulo quodam foramine, tam pro emissionem urinæ, quam pro effluxu mensium, destinato. vid. Gofey *Hypothes. de Generat. Fætus p. 65.* ad quem locum notat Daniel Hofmannus *l. a.* ubi menses per foraminulum possunt egredi, ibi halitus feminales ingredi posse, nullum est dubium. Et Jean Baptiste Verduc *de l' Usage des Parties Tom. I. cap. 1. p. m. 16.* inquit: il ne faut pas se persuader, que toute la semence soit necessaire, pour rendre les œufs feconds, puisqu'il arrive souvent, que la semence n'entre pas dans la matrice; & même l'on a plusieurs experiences des femmes, qui sont devenuës grosses, quoyqu'il n'y ait eu que les parties extérieures d'arrosées, sans d'autres approches. vid. etiam *Spermatolog. nostr. Cap. 10. §. 19. p. 480. seqq.* Imo dantur etiam exempla mulierum, quæ ob nimiam angustiam, occlusionem & imperforationem seu atresiam a maritis suis separatæ postmodum ab aliis fuerunt imprægnatæ, de quibus videatur *Tract. de Coit. cap. II. §. 24.* De quæstione, an conceptio sine coitu seu intromissione membri virilis, sed ex sola affrictione penis feminisque aspersione ad orificium matricis, fieri possit vid. Mich. Albert. *Jurisprud. med. cap. 2. §. 13. p. 29.*

§. 13.

An detur.
conceptio in
somno?

Pertinet huc etiam quæstio an virgo vel alia femina dormiens a mare inscia imprægnari seu concipere queat? ad quam plurimi autores ex ea ratione negative respondent, quia post lapsum primorum parentum conceptio sine voluptate vel delectatione

fieri

fieri non possit. Cum vero hactenus allegatorum autorum nonnulli, non sine ratione contrarium, scilicet sæpius feminas absque venerea voluptate, non dormientes, concipere, defendant, hoc loco aliquot tantummodo in somno concipientium feminarum exempla ex Gynæcologiæ nostræ *Sect. II. cap. 6.* de stupro in somno & aliis autoribus adduci possent, quamquam nonnullis ejusmodi relationes suspectæ esse soleant, siquidem secundum Casp. a Reies *Elys. jucundarum Quæstion. Camp. Quæst. 42. p. m. 503.* non raro accidat, ut innuptæ aliquæ, quibus ex furtivo concubitu uterus increscit ad confessores mox adeuntes de illata vi conquerantur, & oblectamentum nullum habuisse insuper addant & persuadere conentur, ut majorem sic suæ turpitudinis excusationem habere credantur, ac si rem omnem citra voluntatem aut voluptatem peractam fuisse, aut excusationis aut ruboris causa inculcent.

§. 14.

Hanc tamen in somno imprægnationem sub certis conditionibus tam jurisconsulti, quam medici admittunt, v. g. secundum facultatis juridicæ Jenensis responsum, nihil impossibilitatis alit, quod persona quædam muliebris & quidem facilius quam virilis, cum tantum passive se gerat, cum primis autem uxor in conjugio vivens itidem tanquam in somnio, maxime si ad affectus soporosos inclinet, aut insigniter delassata fuerit vel ex ebrietate in profundum somnum delapsa fuerit, a viro imprægnari possit &c. vid. Mich. Bernh. Valentin. *Novell. med. legal. Cas. 1. p. 30.* quo loco etiam pag. seqq. sequitur casus de imprægnatione dormientis in sella cum responso facultatis medicæ Lipsiensis. vid. Joh. Frider. Zittmann. *medicin. forens. seu Respons. Facult. med. Lips. Cent. VI. cas. 77. p. 1642.* Et *Cent. V. cas. 21. p. 1156. 1158.* ad quæstionem; an virgo alto somno sepulta deflorari & imprægnari possit? respondet dicta facultas, quod equidem secundum adductas circumstantias non facile sit judicandum, dor-

*Conceditur
a nonnullis.*

Syllepsilogia.

S

mien-

mientem virginem stupro violento esse imprægnatam, quippe quod absque notabili sensatione præcipue in persona nondum deflorata, difficulter fieri posset, interim tamen ibidem, sola affriccione penis feminisque ad externum matricis orificium aspersione, absque singulari tactu & agnitione stupratoris ipsam concepisse, adductis variis medicorum observationibus conceditur.

§. 15.

Porro de hac quæstione, utrum sine partium genitalium utriusque sexus applicatione ac sine hymenis dilaceratione conceptio fieri possit, prolixius tractant nonnulli autores; v. g. Joh. Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. Lib. IV. Tr. 2. cap. 3. pag. 457.* quæstionem movet: An & qua ratione flore virgineo incorrupto mulier aliquando concipere valeat? An sine læsione hymenis fieri possit conceptio? vid. Thom. Bartholin. *Anatomie Lib. I. cap. 31. p. 286.* Virginem quampiam servata corporali virginitate, id est, non deleta virginitatis flore, seu non rupta aut dilacerata membrana, quatuor carunculis interposita, concipere posse, defendit Vopiscus Fortunatus Plempius *Fundam. medicin. Lib. II. cap. 9. p. 140.* De quæstione, an incorrupta possit imprægnari, & an conceptus possibilis virginitatis claustro non violato? vid. Casp. a Reies *Camp. Elys. Fucund. Quæst. 41. p. 491. seq.* Si une femme peut devenir grosse sans l'application des parties naturelles d'un homme? quærit Nicolas Venette *de la Generat. de l'homme Part. IV. cap. 5. p. 633 sq.* An femina possit concipere absque coitu? vid. Hier. Fabric. ab Aquap. *de operat. chirurg. Part. I. cap. 81. pag. edit. Francof. 104.* Item de hac quæstione, an arctæ vel atretæ & imperforatæ sive velatæ, quibus ante uteri osculum interius membrana quædam modo crassior, modo tenuior præter naturam obtenditur, quæ & egressum mensibus, & aliquando foetui, & ingressum virili membro impedit, generare possint, nec ne, pluribus agit Paulus Zacch.

Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. III. Tit. 1. Quæst. 7. n. 24. seqq. fol. 282. seq.* vid. etiam Petr. Müller. *Disput. de Prægnant. cap. 2 Thes. 8. p. 10.* An virgo possit deflorari, licet hymen non disrumpatur, aut an conceptus sit possibilis, clauistro virginitatis non violato? vid. Mich. Albert. *Fur. prud. med. cap. 3. §. 3. p. 61.*

§. 16.

Ad conceptionem non modo plerique voluptatem, sed non-nulli etiam frequentem & reiteratum coitum requiri statuunt, cui tamen sententiæ contradicit, præter quotidianam experientiam, Paulus Zacchias *Quæstion. med. leg. Tom. III. Consil. 23. n. 3. fol. 41.* ad generationem, inquit, non requiritur frequentatio coitus, sed satis est, ut unica vice mulier cognoscatur; ex unico enim coitu non solum fit generatio, sed interdum etiam multiplex generatio, cum videamus ex unico coitu geminos & trigeminos nesci.

§. 17.

Absque membri virilis in uteri vaginam immisione seminis-que in eandem injectione, sed a sola ejusdem circa vulvæ rimam & ingressum aspersione vel pollutione conceptionem fieri posse, hætenus vidimus; cum autem dentur etiam viri, qui in coitu nullum plane semen, vel loco ejusdem spiritus vel flatus quandoque cum delectatione excernunt, vel per penem expellunt, sive qui erigunt, non tamen ejaculantur, ut adeo similes sint militibus, qui aut inanem bombardam in alios dirigunt, aut plumbea quidem glande gravidam, sed inertis ac stupido pulvere pyrio, qui impetum ab igne non concipit, instructam displodere satagunt; quæritur, an ab ejusmodi congressu conceptio sit expectanda? Exemplum autem virorum in coitu nullum semen excernentium ut adducamus, refert Petrus Forestus *Obs. medic. Lib. XXVI. obs. 18. fol. m. 586.* Juvenem raræ & siccioris temperaturæ, cum nuper viduam duxisset, sibi conquestum esse,

se, se cum coitu utaretur, v. retro licet optime extento & rigido, semen tamen ejaculari non posse, quamvis ille & non pauci alii, cum aliquo tempore in conjugio vixissent, utentes iis, quæ semen augerent, ad venerem exercendam deinde potentes fuerint. Sic Marcellus Donatus *de medic. histor. mirab. Lib. IV. cap. 18. p. 397.* illustris juvenis meminit, qui in venereo congressu cum muliere semen emittere nequibat, quamvis in somnio atque manibus perfricata mentula, vel nullo negotio excerneret; qui autor etiam *pag. seq.* aliam huic similem historiam de adolescente, ministro domestico, recenset, confesso, se, quando cum muliere rem haberet, semen effundere non posse, cum vero dormiret, plurimum ei semen prodire. Quam observationem etiam ex Rufo adducit Hieronymus Mercurialis *Medicin. Pract. Lib. III. cap. 39. fol. m. 442.* Coitum sine ulla seminis ejectione annotavit etiam Fridericus Christianus Cregutus *M. N. C. Dec. III. An. 5. & 6. obs. 287. p. 645.* scilicet vir triginta quatuor annorum jam undecim annorum spatio cum uxore in matrimonio vixerat; et quamvis ab eo tempore sæpe numero congressum celebrassent, ne guttulam tamen liquoris in ipsius naturæ sinum effudit, quanquam salacissimus fuerit. Juvenis Dalmata forma eleganti præditus, moestus & tristis ad Amatam Lusitanam venit, se malle mori, inquiens, quam simile vitium pati; hic namque cum coibat cum muliere, nullum emittebat semen, sed potius ventris crepitus edebat. vid. Joh. Schenck. *Obs. medic. Lib. IV. fol. m. 532.* quo loco plura existant exempla. Juxta Felic. Plater. *Observat. med. Lib. I. p. m. 257.* conquerebatur matrona quædam, ad conceptum ob ætatem non amplius idonea de marito, quod congressu eam supra modum exerceret excrucietque citra spermatis tamen effusionem. Cur ejusmodi veneris equites coitum non absolvere vel semen emittere possint, varias adducit Marcellus Donatus *l. a. p. 397. seqq.* Joh. Ben. Sinibald. *Geneanthrop. Lib. III. Tract. 3. cap. 7. p. 328. seq.* Spermatolog. nostr.

Cap. I. §. 30. p. 36. seq. Quamvis autem in adductis de feminis in coitu defectu exemplis nulla conceptionis fiat mentio, annon tamen in ejusmodi congressu femina imprægnari queat, non dubitare videtur Michael Alberti *Jurisprud. medic. cap. V. §. 2. p. 103.* judicans, quod ad concipiendum non æque necesse sit, ut semen cavitatem uteri ingrediatur, & si aliquid immateriale fœcundationem efficere debet, non necesse sit, ut orificium uteri interdum aperiatur, sufficit quod interna libido utriusque conjugis, & intentio & propensio ad generandum singularis satisfaciat, quippe quæ etiam ad gemellorum conceptum contribuit. Vir quidam confuevit interdum cæstro libidinis percitus geniali desiderio favere & obtemperare, cui tamen cum indulgebat, ea mulcebatur ac perfundebatur veneris dulcedine, ut impotens voluptatis sensibus fere omnibus destitutus, humi concideret, & quod erat magis admiratione dignum, feminis nihil effundebat. Hunc ipsum tamen virginem non solum subagitasse, sed & imprægnasse, tradit Martinus Leopardus Vissensis. vid. Georg. Frid. Rallii *Disquis. de Generat. animal. Sect. II. §. II. p. 87.* ubi ita pergit: Quamvis medicorum Romanorum, Bononiensium & Mediolanensium collegia, unanimi quasi conspiratu, responsum dederint, fieri ne utiquam potuisse, ut mulier conceperit a viro, qui nullam effundit genituram, Sinibaldus tamen & cum eodem Martinus Leopardus Vissensis hanc rem temere negandam non esse consentiunt.

§. 18.

Deinde loco feminis flatus vel auram per penem explodi, docet Zacutus Lusitanus *de Prax. med. admir. lib. II. obs. 121. fol. m. 71.* *A flatu vel aura loco feminis.* Quidam videlicet ea partium genitalium imbecillitate, una cum copia pituitæ multæ laborabat, ut, cum coibat, non semen per penem, sed loco ejus flatus emittere sentiret. De perillustri quodam marito, ob scirrhum testium consummatum, nunquam vel tantillum feminis effundente, in *συνστοία* conjugali, nihilominus ex auræ cujusdam blandæ explosione delicias sentiente, vid. Joh.

Maur. Hoffmann. *Disquisit. corp. hum. anatom. Patholog. Specim.*
VIII. §. 17. p. 100.

§. 19.

Conceptio
an a flatu
sine semine?

Ut autem ad quæstionem, an nimirum feminæ a viro, nullum in coitu semen ejiciente, vel flatum sive auram vel spiritum per penem emittente, concipere possint, redeamus, ab iis equidem viris, qui nec semen nec flatum in actu venereo prodire sentiunt, a sola penis in vaginam immissione nulla conceptionis spes promittenda erit; nisi in ejusmodi casu, pariter auram vel spiritum simul absque sensatione explodi statuamus; hinc etiam in adductis & aliis exemplis plerumque tamdiu sterilitas fuit observata, donec per idonea medicamenta semen fuerit auctum vel correctum; uti Forestus *l. 4.* non paucos, nullum semen in coitu ejaculantes, fuisse steriles, deinde vero post semen augmentum medicamentorum usum ad venerem & procreationem potentes fuisse scribit. Anno 1669. apud Georg. Wolffg. Wedelium conquerebatur textoris cujusdam uxor, maritum sibi permolestum esse in concubitu, & extremam sæpe accersere delassationem, nulla, licet maxime urgeret, subsequa feminis emissionem. Quod cum per quinque annos durasset, in sterili conjugio vivebant, donec tandem exantlato morbo icterico, aliquoto tempore elapso, post ingentem conatum exantlasset suum munus melius, inde filiæ pater factus est, vid. Georg. Wolffg. Wedel. *Patholog. med. dogmat. Sect. III. cap. 2. p. m. 638.* vid. etiam Thom. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. II. obs. 44. p. 138 seq.* Ex medici cujusdam fide dignissimi, Marini Leopardi Vissensis communicatione Johannes Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. lib. I. Tr. 3. cap. 8. §. 17. p. 61 seq.* ubi homines spiritibus tantum seminalibus a viro & muliere missis, absque ulla genituræ effusione concipi posse statuit, sequentia refert: Virum quendam consuevisse interdum cæstro libidinis percitum geniali desiderio favere & obtemperare; cui tamen cum indulgebatur, ea mulcebatut atque perfundebatur veneris dulcedine, ut im-

impotens voluptatis, sensibus fere omnibus destitutus humi concideret; &, quod erat magis admiratione dignum, feminis nihil effundebat. Cæterum tanta voluptatis vi devictus hic homo post unam venerem per mensem libidinis incitamentis, & carnis igniculis vacare consuevit. Cum autem bonus vir virginem, plenam nubilibus annis, consanguineam domi haberet, cujus erat in domesticis usus, hanc, proh facinus, subagitavit; quod cum fecisset sæpius, tandem illa concepit utero. Tanti sceleris percrebuit fama pervenitque ad præsulis aures, unde corruptor vinculis & carceribus paulo post traditus fuit, qui tamen audacter negat & fronte pervicaci asserit, se genituræ expertem esse, ac proinde nequaquam de se virginem concepisse, verum aliunde adhibuisse virum. Defectus autem feminis hujusmodi testes probatos affert, & insuper experientiam allaturum se, pollicetur. Pro tanto eventu consulitur medicorum Romanorum collegium, atque etiam Bononiense, & Mediolanense; quæ unanimi conspiratur responsum dedere, fieri neutiquam potuisse, ut mulier conceperit a viro, qui nullam effundit genituram. Quod responsum medicum de viri, nullam genituram ejicientis, infœcundo coitu sententiam equidem in tantum confirmat Sinibaldus; quia vero adducta Marini Leopardi observatio, de virgine absque femine virili concipiente, contrarium testatur, non immerito hanc rem non esse temere negandam, ejusque eventum naturalem esse potuisse, variis rationibus, a spiritibus desumptis, defendit, hancque spirituum copiam non modo ex pruritu venereo, sed etiam ex intensissima sensuum voluptatis & libidinis per longum spatium extinctione probat. Cum etiam secundum recentiorum physiologorum hypothesin, non tam crassa, quam subtilis & spirituosissima feminis virilis materia ad conceptionem concurrat, crassaque tenuior tantum vehiculum judicetur atque ex hoc præsupposito, imprimis, si ea, quæ de atretarum & ordinaria conceptione five ovulorum fœcundatione hætenus diximus, quo etiam pertinet, quod

quod Johannes Conradus Peyerus *Exercit. XI X. pag. 102 seq.* ad Johannem Jacobum Harderum de spirituum efficacia scribit, consideremus, facillime etiam a tali spiritus genitalis, absque crassiori ejusdem vehiculo, in coitu explosione, conceptio fieri posse videtur, imprimis si in tali cohabitatione, secundum supra allegatas observationes, absque femine crasso, flatus vel aura a viro vel femina sentiatur. Utrum vero talis aura sive flatus, si quis revera observaretur, a retenti vel in coitu remanentis feminis spiritu genitali, an sola flatulentia & motu in congressu dependeat, vel annon alius superveniens imprægnator verum spiritum genitalem crassiori feminis vehiculo adhuc involutum, in debitum locum ejacularit, res mihi adhuc anceps decidendi remanet, cum juxta exemplum, paulo ante ex Zacuto Lusitano adductum, vir ille, qui per penem loco feminis flatum emittebat, tamdiu sterilis permansit, demumque post varia medicamenta & diuturnam a venere abstinentioniam cum uxore concumbens semen emisit prolemque genuerit.

§. 20.

*Conceptio
sine coitu.*

An detur conceptio sine coitu, item de conceptione falsa, vide *Spermatol. nostr. Cap. IV. §. 2. p. 156. & cap. V. §. 3. p. 223.* Scribunt historici: Serpentes vel dracones, aut, ethnicorum persuasione, deos sub serpentum specie feminas aliquando iniisse, hasque ex eorum cum illis concubitu, sine viro concepisse partumque edidisse; a tali concubitu Alexandrum Magnum, Scipionem Africanum, Cæsarem, Augustum & Galerium imperatores prognatos fingunt. vid. Christ. Frid. Garmann. *de Miracul. mortuor. lib. III. Tit. I. §. 137. pag. m. 913.* Philipp. Camerar. *Horar. subciv. Cent. I. cap. 69. p. 307 seq.* Refert etiam Cajus Suetonius in *August. cap. 94. p. m. 191 seq.* Atiam Augusti matrem cum ad solenne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum cæteræ matronæ dormirent, obdormisse: draconem repente irrepsisse ad eam, pauloque post egressum: illamque expergefactam, quasi a concubi-

cubitu mariti purificasse se: & statim in corpore ejus exstitisse maculam, veluti depicti draconis: nec potuisse unquam eximi: adeo ut mox publicis balneis perpetuo abstineret: Augustum natum mense decimo, & ob hoc Apollinis filium existimatum.

§. 21.

Pro conceptione fabulosa non immerito habenda relatio de Magdalena d' Auvermont, Hieronymi Augusti de Montelione, *Conceptio fabulosa.* equitis gallici uxore, quæ post quatuor annorum viri absentiam sola imaginatione filium concepisse in Gallia a Parlamento Gratianopolitano promulgabatur. Quod Parlamentum, juxta Anton. Deusing. *de Fæt. Mussip. Sect. II. p. 23.* omnino fuit deceptum a medicis & obstetricibus, cum prolem mulieris, a qua maritus quadriennium abfuerat, huic filium legitimum atque hæredem per sententiam constituit pronunciatam 13. Febr. 1637. censuitque, potuisse illam mulierem per fortem imaginationem, qua se cum marito rem habere per insomnium sibi visa erat, utero concepisse, atque vi illius imaginationis imprægnatam esse. Quæ sententia Parlamenti prædicti Gallico idiomate typis excusa est Parisiis anno prænominato, cum hac inscriptione: Arrest notable de la Cour de Parlement de Grenoble, donné au profit d'une Mademoiselle, sur la naissance d'un sien fils, arrivé quatre ans après l'absence de son mary, & sans avoir eu cognoissance d'aucun homme: Suivant la rapport fait en la dite cour, par plusieurs medecins de Montpellier, sage femmes, matrones, & autres personnes de qualité. De hac relatione scribit Thomas Bartholinus *Anatom. lib. I. cap. 31. p. 286.* sola imaginatione Magdalena d' Auvermont Emanuele concepisse nuperis annis in Gallia promulgabatur, quod suspectum reddidit de Lord Professor Monspeliensis, & mihi ibidem dissuasit P. Sanchius. Idem Bartholinus *Histor. anat. Cent. VI. hist. 61. p. 298.* totam Parlamenti Gratianopolitani memorabilem sententiam recenset & *pag. 302 seq.* de fide hujus relationis dubitandi rationes annectit. Totum etiam hoc negotium, quale fuit

typis mandatum, ex mente Gvidonis Patin, nihil aliud unquam fuit, quam merum figmentum, & mera fabula, a quodam nebulone excogitata, qui per fugam salutis suæ consulere coactus est, ne incideret in manus Parlamenti Gratianopolitani, & carnificis illius civitatis. Imo factum hoc esse dicitur ab isto nebulone in irrisum quorundam senatorum & in contumeliam doctorum scholæ Monspeliensis. vid. Th. Bartholin. *Epist. med. Cent. III. epist. 83. p. 356.* Inquit etiam Olaus Borrichius, in urbe Gratianopoli compertum a Boissieu, magistro rationum publicarum in Parlamento, historiam de Gratianopolitana femina ex imaginatione puerpera fabulam esse, sed fabulam ab otiosis quibusdam ingeniis confutam usque adeo constanti fama per Gallias pro vera jactatam, ut necesse habuerit Parlamentum publico diplomate sese tueri & vanitatem commenti redarguere. vid. Th. Barthol. *Act. Hafn. Vol. V. n. 84. p. 201.* Secundum Paul. Ammann. *Irenic. Num. Pompil. p. 88.* infomnia hæc sunt amantium, non autem congrementium, si hanc decisionem maritus redux credidit, cessat quæstio. Ego crederem potius, alium bonum virum rem habuisse in absentia mariti cum hac muliere; Si enim phantasia tam efficax foret, tunc plures (si non omnes) extra matrimonium sic concipere possent, & sic conjunctio viri nullo modo esset necessaria vid. etiam Ammann. *Medicin. crit. Disc. 44. p. 287.* Et certe vix hodie adeo credulos reperies maritos, qui sibi tale quid ab uxoribus persuaderi patiantur, uti statuit Georgius Fridericus Rallius *de Generat. animal. Sect. I. p. 50.* Hanc historiam latius cum decretis etiam Parliamentorum & judicii latis describere Harsdorfferum histor. amœn. refert Georgius Wolffg. Wedelius *Physiolog. Sect. III. cap. 28. p. 204.*

§. 22.

Conceptio
hermaphro-
ditica.

De conceptione hermaphroditica, an scilicet hermaphroditi perfecti, sive quibus natura utriusque sexus perfecta membra genitalia tam externa, quam præsertim interna, concessit, intra &

per

per se ipsos absque alterius viri vel feminæ concursu seu cohabitatione maritali concipere & generare possint? in *Spermatol. nostr. cap. 13. §. 33. pag. 678. seqq.* egimus, quo benevolum lectorem remittimus.

CAPUT IX.

De Conceptione marium & feminarum.

§. I.

CUM denique in coitu fœcundo unicum plerumque tantummodo ovulum in ovario muliebri fœcundetur, hincque unicustantum fœtus, & quidem vel mas vel femina concipiatur; imo quandoque hæc femina non nisi filios, illa vero solas puellas pariat, de hac differentis sexus conceptione autorum etiam sententiæ variant. Sicuti enim nonnulli veterum in genere solum virum semen fœcundum sive totam fœtus materiam in se continere, illudque in coitu feminæ utero injicere, feminam autem tale semen excipere, in apto loco fovere, demumque nutrimentum a sanguine menstruo præbere credebant, ita etiam ratione differentis sexus masculos ex dextro, puellas autem ex sinistro mariti latere vel testiculo provenire; atque post conceptionem mares in dextro, femellas in sinistro materni uteri latere recondi, talemque sexus differentiam a solo patris femine dependere statuebant. Hinc Galenus, ex Hippocrate, *de usupart. lib. XIV. cap. 4. fol. 286 seq.* fœtum, inquit, mares in dextris, feminæ autem in sinistris sunt potius. vid. etiam Hippocr. *Secl. V. Aphor. 48.* Et Joh. Baptista Porta *Mag. natural. lib. II. cap. 21. p. m. 93.* quo loco agit, quomodo mares vel feminæ gigni possint? inter alia ita scribit: Medici omnes dixerunt, dextrum latus calidissimum, unde si mulier dextro latere emissum semen retinuerit, marem concipiet, in sinistro vero feminam, idque in animalibus multiparis videre possibile esse: nam si prægnantem suam aperueris, in dextro latere mares, in sinistro feminas reperies. Ideo præcipiunt mulieribus post receptum

*Conceptio
marium &
feminarum.*

*An ex testi-
culo dextro
mares?*

ceptum semen in dextrum latus cubare. Unde arietis dextro latere præligato, feminas tantum gigni, Plinius scripsit. Taurus ubi juvencam supervenit, certis signis comprehendere licet, quem sexum generaverit, quoniam si parte dextra defilivit, marem feminasse, manifestum est, si læva, feminam. Quamobrem Ægyptii, mulierem, quæ filiam pepererit, significaturi, taurum pingunt sinistrorsum respicientem, sin filium, taurum, qui se vertat dextrorsum &c. Alios ejusmodi aphorismos refert etiam S. J. five Samuel Janſon *von Erzeugung der Menschen Cap. 2. p. 85.* mulieres, quæ multum dormire consueverunt supra dextrum latus, vix pariunt feminam. Et *p. 86.* si genitale semen a dextro teste decidat in cellulam matricis dextram, masculus tum generatur. Sed si a sinistro in sinistram ipsius ceciderit cavernulam, formatur inde femella. Si vero testis dextri in sinistram ipsius ceciderit cavernulam, formatur inde virago; Et si sinistri in dextram effluat, nascetur effœminatus: in medium autem interstitium utriusque sexus, formatur hermaphroditus. Item ex Hipp. *de morb. popular. §. 4.* Hircire incipiens, observa, uter testis extra apparuerit: siquidem dexter masculum, si vero sinister, femellam portendit. Plura de hac materia reperies ibidem *p. 83. seq.* Sequentia ex L. Cœlio Lactantio refert Casparus Posnerus *Geneanthrop. Tab. V.* cum forte in lævam uteri partem masculinæ stirpis semen inciderit, marem quidem gigni, opinatio est, sed quia in feminea parte conceptus, aliquid in se habere femineum, supra quam decus virile patiatur, vel formam insignem, vel nimium candorem, vel corporis lævitatem, vel artus delicatos, vel staturam brevem, vel vocem gracilem vel animum imbecillem, vel ex his plura: item si partem in dextram semen feminini sexus influxerit, feminam quidem procreari, sed quoniam in parte masculina concepta sit, habere in se aliquid virilitatis ultra quam sexus ratio permittat, aut valida membra, aut immoderatam longitudinem, aut fuscum colorem, aut animum audacem, aut ex his plura.

Si vero masculinum in dextram, & in sinistram femininum pervenerit, utrosque foetus recte provenire, ut & feminæ per omnia naturæ suæ decus constet, & maribus tam mente, quam corpore robur fervetur. Cui tamen sententiæ ibidem Posnerus contradicit. Hanc opinionem etiam confirmare videtur Nicolaus Venette de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 4. Art. 5. p. 426 seq. inquit: Je connois quelques femmes, qui ont toujours accoutumé de se coucher sur le côté droit, lorsqu'elles dorment avec leurs maris, & c'est aussi dans cette posture, qu'elles sont caressées, & qu'elles conçoivent presque toujours des garçons. On ne sauroit donner d'autre raison de ce qui arrive de la sorte que celle qui favorise mon sentiment. Car la semence de l'homme étant reçue dans la matrice de la femme située dans la posture, que nous avons marquée, ne peut tomber par son propre poids, que dans la corne droite, où les garçons sont le plus souvent formés. C'est une remarque, qu'a fait Rhasis aussi bien que moy, lorsqu'il dit: Que les femmes, qui se couchent ordinairement du côté droit, ne font presque jamais de filles.

§. 2.

Alii sexus differentiam non in marito, seu viro, sed in femina ejusque uteri calore atque frigiditate quærebant; dum mares pro calidioribus, feminas vero pro frigidioribus habebant, hincque mares in calido, & puellas in frigido utero formari statuebant, quæ uteri frigiditas a menstruorum frigidiorum, caliditas vero a calidiorum affluxu dependeret. Alii adhuc eandem differentiam a majori vel minori feminis virilis, vel muliebris in commixtione efficacia & prædominio defendebant; siquidem juxta Joh. Bapt. Port. Mag. Nat. l. II. c. 21. p. 93 sq. Hipponax inquit, si quidem genitale semen prævaluerit, marem gigni, sin alimentum, feminam. Hanc differentiam habet Casparus Posnerus Geneanthropol. l. a. veluti & feminarum & marium, non qua complexionibus modo corporisque robur, sed & mores ani-

An a calore
vel frigidi-
tate uteri?

An a femi-
nis prædo-
minio?

mi insignis observatur varietas, ita ex prædominio feminis virilis fortis muliebri debiliori commixti generantur quidem mares, sed minus generosi; itemque effœminati sive semiviri ex masculi debilioris femineo fortiori mixti victoria; at viri animo splendidi corporeque validi, si & masculum & femineum fuerit forte: Parilique modo feminæ mulierosissimæ gignuntur, si semen & masculum & femineum fuerit debile: his autem fortiores, ubi masculo valido debile feminarum accedens obtinuerit dominium; & denique istis quoque audaciores ac viragines (nempe virum & animo & corpore referentes) si paternum debilea materno vincatur. Quidam hanc causam utriusque parentis spiritibus attribuunt, & ideas debiliores a fortioribus partim destrui, partim juvari asserunt; hinc Augustus Quirinus Rivinus *Disput. de Spirit. Homin. vital. cap. 3. §. 11.* asserit, ideam sexus in spiritu hoc distinctam esse, atque in maris femine latitare ideam sexus virilis per omnia, in mulieris femine sexus sequioris ideam. Cæsar Cremoninus *de femin. Dictat. 6. p. m. 196 sq.* scribit, sanguis feminæ habet vim determinatam ad talem generationem, & quantum est de se, magis ad feminam, quam ad masculum. Similiter semen masculi est excrementum ultimi alimenti, bene concoctum, quod habet vim activam ad generandum, & quantum est de se, præcipue masculum. Ambo autem ista sunt corpora, & debet inter ipsa esse actio & passio ratione qualitaturn corporearum, præcipue vero caloris, & in hac pugna actionis & passionis potest unumquodque & vincere & vinci &c. *Et pag. 199.* oportet in femine haberi virtutes, quantum ad istam virtutem, quippe generandi masculum vel feminam, & virtutem generandi tale individuum: modo igitur stantibus his virtutibus potest fieri, quod aliquis masculus vincat, quantum ad virtutem individualement feminæ, sed quantum ad virtutem masculi & feminæ vincatur a femina, & sic nascatur femina similis patri, vel contra, si contrarium in virtutibus accadat &c. Circa sen-

sententiam Cremonini ad Nicolaum Contarenum ita scribit Johannes Veslingius *Observ. & Epist. n. 3. p. 33.* Sexuum diversitas, ut non infert diversitatem speciei, sic nec varietatem principiorum ad speciem propagandam. Longe probabilius dicitur, voluisse naturam in homine, animantium nobilissimo, sexum distinguere, ut mas principaliter concurreret ad semen & calorem feminis magis vegetum suppeditandum pro generando mare; femina vero præcipue ad conceptum nutriendum & gestandum, sic tamen ut semen quoque ex hibeat, ex quo partes minus præcipuæ & secundinæ fiant, & quod semen viri ad feminæ generationem & efformationem viam det, vel etiam id ipsum dirigat, cum vegetius fuerit. Et Lambertus Velthufius *Tract. de Generat. cap. 3. p. m. 65.* ait: Quemadmodum tot foetus fiunt, in quot partibus vis seminalis complete exerere potest suam virtutem: tuncque conceptus fieri dicatur; ita etiam maris aut feminæ conceptus fit, quatenus vis seminalis a mare aut femina prædominans alterutrius vim cogit in suum obsequium secumque rapit, unde & ipsa augetur &c. Sic juxta Melch. Frid. Geuder. *Dissertat. de ort. animal. p. 294.* autores de spirituum ideis in duas divisi sunt partes: alii enim utriusque parentis spiritibus hoc tribuunt officium, & ideas debiliores partim destrui a fortioribus, partim juvari asserunt; ita ut si ideæ spirituum matris sint fortiores, generetur puella; sin patris, puellus. De hac tamen sententia Geuderus *p. 296.* ita scribit: Illi qui totam sexus virilis ideam in semine maris, sequioris in semine feminæ latere ajunt, multiplicare videntur entia præter rationem & necessitatem, cum una idea sufficeret. Qui ideam debiliorem a fortiori destrui ajunt, pariter multas relinquunt difficultates, mittam, quod possibile non sit, ideam in respectu ad aliam debiliorem, minime vero absolute debilem & inefficacem ita destrui, ut nullum prorsus ideæ partium alterius sexus remaneat vel minimum vestigium: Sed id tantum urgebo, quod, quotidiana teste experientia, sæpe

pe a marito robustiore filiæ, ex uxore robusta filii generentur; & quod a conjugibus ratione virium, temperamenti &c. æqualibus utriusque sexus proveniant liberi, sine ulla nota hermaphroditica, quæ tamen, si secundum mentem formatio corporis procederet, vix abesse posset. Provocant quidem & illi ad experientiam, e muliere minus falaci, maritoque vegeto mares, contra ex matre lasciva debili que sene puellas generari dicentes; verum minime omnium hoc semper contingit; quin videas haud raro senes decrepitos & depontanos ex uxoribus suis juvenculis in ipso ætatis flore vigoreque constitutis filios æque ac filias insigni cum lætitiâ animique voluptate suscipere; imo nota mihi sunt exempla specialia senum, qui ex juvenculis suis uxoribus vegetis ne unicam quidem filiam; aliquot e contrario filiolos susceperunt.

§. 3.

Ab ætate

feminarum.

Dantur porro adhuc alii, qui sexus differentiam ab ætate & quidem sequioris sexus deducunt, dum puellæ & seniores feminæ femellas potius, quam mares procreent. Inquit Antonius le Grand *Histor. Natur. Part. VIII. Artic. 2. p 359.* puellæ, quæ tempestive concubitus admittunt, quæque non satis adhuc firmo corpore congregiuntur, feminas potius, quam mares generant, sicut & ætate provecta mulieres & quæ aliquantulum in senectutem vergunt. Conceptionis hujus causa in caloris defectum refundenda est, qui in novellis mulieribus & senescentibus imperfectus est, & æstus virilem non æquat. A diversis enim feminum viribus mas aut femina provenit, & prout unum in aliud dominatur, varius sexus nascitur. Hinc si muliebres semen virili vigore antecedit, femina procreatur, sin autem masculinum præstet, maris progignendi vim utero confert. Cum autem juvenculæ & declinata jam ætate mulieres modicum calorem habeant, nec tantum valeant, quantum ætate florentes; fit ut ad feminæ conceptum aptiores sint, & in sui generis sexu proferendo accommodatiores reddantur. De his & aliis veterum sententiis prolixè agit Scipio Mercurius *della Comi-*

nare

nare Lib. I. cap. 9. p. m. 63 seqq. edition. German. p. 107 seqq. & cap. 10. p. 73 seq.

§. 4.

Quia vero secundum neotericorum principia in conceptione *An ex ova-*
non vir, sed mulier, foetus materiam, ovulum scilicet, ad gene- *riis?*
rationem confert, feminisque virilis atque muliebris commix-
tio rejicitur, mirum non est, quod recentiores etiam quoad se-
xus differentiam veterum sententiæ contradicant, atque diffe-
rentiam hanc potius ab ovulis foetusque staminibus a prima sta-
tim formatione in ovulis jamjam latitantibus derivent; quan-
quam circa hanc sententiam recentiores quoque discrepent,
dum alii mares ex ovario muliebri dextro atque femellas e sini-
stro prodire sibi persuadeant, alii vero utriusque sexus foetus
promiscue, modo e dextro, modo e sinistro matris ovario pro-
venire posse concedant. Inquit enim Johannes Jacobus Fran-
ciscus Vicarius *Basf. univ. medicin. Lib. I. cap. 3. pag. 32.* quomodo
mas vel femella oriatur, hæc habeto; me expertum esse etiam
anatomicis sectionibus, conceptionem maris fieri, si ovum ex
dextro mulieris, femellæ vero, si e sinistro ejus ovario foecunda-
tur & in uterum delabitur, quod satis a cicatriculis ovorum re-
lictis patescit in corporum dissectionibus; hæ cicatriculæ si ad-
huc rubent, & nonnihil tument, recentius est partus factus; si
jam satis obscuræ sunt, veteriores partus denotant; sic quon-
dam in dissectione mulieris cujusdam (de cujus partibus nihil
noveram) cum admiratione præsentibus demonstravi, quot il-
la proles feminini, quot masculini generis (sexus) gestaverit at-
que habuerit; uti & hoc in vaccis non una duntaxat, sed pluri-
bus vicibus præstiti. Hujus tamen opinionis, qua nonnulli in
uno ex testibus muliebribus pueros, in altero puellas latitare de-
lineatas docent, absurditatem, secundum Christ. Joh. Lang.
Physiolog. Thes. 38. Part. I. fol. 236. demonstrant animalia, quæ
plures foetus gerunt, utpote in quibus bina cornua indiscrimi-
natim

natim masculis & femellis repleta, in dissectionibus deprehenduntur.

§. 5.

Negatur.

Veterum sententiæ, quod mares e dextro & femellæ ex sinistro viri testiculo generentur, contradicit experientia, uti in *Spermatologia nostra cap. 9, §. 3 seq. p. 412 seqq.* monstravimus; ex *M. N. C. Dec. 1. an. 4. & 5. Obs. 13. p. 18.* Salomonem Braunium villicum quendam, a natura monorchidem, non castratum, multorum liberorum utriusque sexus patrem observasse. Deinde quoque ibidem ex Baldassare Timæo a *Güldenlee Lib. III. cas. 45. p. 185.* exemplum adduxi cujusdam nomine *Mannteuffel*, qui adhuc puer ex sectione herniæ carnosæ, testiculo dextro privatus, adultusque dein factus trium uxorum legitima successione maritus liberos quindecim utriusque sexus genuit. Amicus etiam intimus Benedicti Hermanni, in infantia sua ab herniotomo sinistro testiculo orbatus cum uxore diversi sexus liberos procreavit, *vid. M. N. C. Dec. II. an. 3. Obs. 66. p. 156.* Huc pertinent etiam alii castrati, imprimis Hottentotti, de quibus *vid. Spermatolog. nostr. Cap. 2. §. 17. p. 60.* Minime proinde, ex solo testiculo dextro filios atque e sinistro puellas procreari, ex his observationibus elucet. Quandoque etiam mares in sinistro, & puellæ in dextro uteri latere deprehenduntur, uti inquit Nicol. Vennette *l. a p. 511.* Il s' est aussi bien trouvé des garçons du côté gauche de la matrice, que des filles du côté droit. Nous avons mesme quelque fois trouve dans la dissection de quelque femme un mâle & une femelle du 'mesme costé. De sorte que ce n' est ny la matrice, ny ses parties droites ou gauches, qui sont la cause dela difference des sexes. Illa quoque veterum opinio, quod omnes corporis partes dextræ sinistris sint calidiores atque robustiores item quod omnes mares robustiores, sint feminis, indeque mares, utpote robustiores e dextro, & puellæ tanquam frigidiores ac debiliores e sinistro testiculo prodeant, maxime

xime vacillat, quia sinistrae corporis partes eundem sanguinis affluxum eandemque spirituum distributionem atque vigorem seu robur, uti dextrae partes, accipiunt, quamvis quibusdam per consuetudinem & crebrius exercitium manus dextra, vel totum brachium, majus robur acquirat. Neque etiam viri robur semper ad filiorum conceptionem facit, sæpe enim juxta Christ. Joh. Lang. l. a. a viro robusto viribusque egregiis prædito, & conjugē tenerrimæ texturæ, imo continuo ægrotante nil nisi femellæ nascuntur; et ex uxore robusta, marito vero valetudinario aut decrepito, filii. Cui addendum ex hac opinione frequentius hermaphroditos futuros, cum e tanto numero conjugum æqualis congressus virium ratione dubio sine sæpissime accideret.

§. 6.

Ut autem de hac sententia aliorum quoque autorum verba adducam, ita scribit Marcus Gerbezius *Chronolog. Med. pract. an.* 5. §. 26. p. m. 352. Sub dimidium Februarii eram vesperi ad minuendum diuturnioris adhuc noctis tædium fortuito a tribus amicis visitatus, & inter reliqua amica colloquia casu incideramus in quæstionem, quinam accideret, quod a mulieribus nunc concipiantur masculi foetus soli, nunc femellæ solæ, nunc hæ, nunc illi promiscue, nunc etiam gemelli, vel plane ternæ, aut plures proles? Et omnes in ea fuere persuasione, quod id procedat unice a vigorosiore unius vel alterius parentis semine, in conceptione gemellorum autem, vel plurium foetuum a solito copiosiore patris semine, correspondente ei in reliquis requisitis matris speciali dispositione. Quibus vero reposueram ego, me plane aliam fovere sententiam: nimirum ad id nec facere quantitatem, nec qualitatem virilis feminis, nec robur; eo quod experiamur, a quibuscunque parentibus, debilibus & robustis, hujus & illius ætatis, hujus & illius temperamenti, imo & valetudinis, progenerari & meros masculos foetus, & femellas,

& jam hos, jam illos, subinde etiam gemellos, vel plures proles. Cui necessario contrarium accideret, si negotium a feminis robore, vel quantitate, vel qualitate singulari dependeret. Aliam proinde debere subesse tantæ varietatis causam, & eam quidem potissimum debere matri foetum concepturæ. Talem videlicet ovorum in ovario uterino constitutionem, qualem subinde videmus in ovis gallinarum, quorum manifeste quæpiam conspiciamus vitello pallidioris sexui femineo concipiendo destinata, alia vitello magis rubeo, flavescenteve, sexui masculino concipiendo destinata, alia plane duobus vitellis prædita, geminis concipiendis destinata. Sic Fridericus Hoffmannus *medicin. ration. systemat. Tom. prior. Philosop. corp. hum. Part. II. cap. 12. Th. 13. Schol. p. 240.* inquit: non tantum in minutissima genituræ virilis portione, sed & in quovis feminae ovulo integra corporis organici structura, utut maxime exigua latitat in schol. nisi in ovulo ista stamina & prima rudimenta femellæ continerentur, nulla ratio apparet, qua ex virili femine femininum corpus diversis generationis organis donatum possit prodire. Et Melchiori Friderico Geudero *de ort. animal. p. 302.* vero perquam est consentaneum, structuram corporis animalis omnis esse opus manuum DEI, & latere in ovulis singulis integram & absolutissimam partium omnium admirandum in modum constructarum ideam & delineationem subtilissimam, a summo omnium opifice ac creatore uti benignissimo, ita potentissimo immediate inditam, a spirituofo feminis virilis contagio evolvendam, in motum suscitandam &c. Item Johannes Bartholomæus Adamus Beringer *Ideæ Institut. medic. Thes. 15. p. 37 seq.* ait, in ovulis jam a divino architecto prima totius corporis stamina esse jacta, & ab eodem architecto quoque provenire masculi vel femellæ generationem; cujus divinam operam fideliter potius admirari, quam curiose ulterius perscrutari æqui bonique faciamus. Quibus consentit etiam Christ. Joh. Langius *Oper. Tom. I. fol. 228.* in-

inquiens: quod sexus nunc potioris nunc sequioris appareat fœtus, ovulis solis in acceptis ferendum est, quæ promiscue mares femellasque in cicatriculis jamjam delineatas tenent. Prout ergo omnipotentis numinis jussu impingit plasticus spiritus maris in ovulum, quod femellam aut masculum intus habet conclusum, ita quoque nascitur hujus aut alterius sexus homuncio.

§. 7.

Sententiam suam de conceptione marium & femellarum explicans Nicolaus Venette eandem pariter in germinibus seu staminibus fœtus tum virilis, tum muliebris, in vesiculis seu ovulis ovariorum muliebrium latitantibus, inter se tamen differentibus, adscribit; cujus verba *Tract. de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 6. p. 507 seq.* ita sonant: Dans une femme feconde les cornes dela matrice sont remplies de semence, qui se change en petites boules, grosses à peu près comme de petits pois, les quelles sont rangées dans leurs petites cellules, comme sont en quelque façon les œufs dans l'ovaire d'une poule, dont il naît plusieurs enfans, quand la semence de l'homme en a touché plusieurs. La boule, que la semence de l'homme a rendu feconde, conserve parmy ses liqueurs le germe d'un enfant, qui d'abord sans doute est moindre qu'un ciron, & qui a esté formé, si c'est un garçon, d'une matiere chaude seche & epaisse, pleine de feu & d'esprits, avec de pores resserrez & des parties presseés. Mais, si c'est une fille, la matiere en est moins chaude, plus humide & plus delicate. Les parties en sont plus deliées & les pores plus ouverts & plus polis. Elle ne contient pas tant de feu, & il n'y a pas une si grande abondance d'esprits: si bien que la difference de l'un & de l'autre sexe ne vient que dela diversité des substances du pere & dela mere, de leurs qualités premieres, & de celle que l'on appelle dela matiere &c. Lorsque la matrice recoit la semence de l'homme, & que ses cornes par une vertu particuliere attirent cette humeur pour la communiquer à la semence dela femme, qui a de disposition à recevoir

Nicolai
Venette sen-
tentia.

dubium.

Auctoris
sententia.

une impression subite par l'activité de la matiere spiritueuse de l'homme, alors l'ame & les esprits de cette matiere agissante servent de principe subalterne a tout ce bel ouvrage. Si ces principes trouvent une boule, où il y ait un germe de garçon, ils luy donnent de la fecondité en faisant fermenter toutes les petites parties de l'humeur, qui y est renfermée. Ils penetrent & excitent ce petit projet, que l'intelligence de la mere avoit commencé à former. Mais si l'ame & les esprits, qui sont envelopés dans la semence de l'homme, touchent & rendent feconde une autre boule, qui ait des dispositions à faire une fille, la semence de l'homme y fera les mesmes impressions, puisque souvent elle est indifferente à toute sorte de sexe. Utrum vero juxta allegatum auctorem in una eademque femina, vel etiam in uno eodemque ovario alterum ovulum, tanquam materia foetus pro masculino possit esse siccum, calidum atque spirituosum, alterum vero pro femella frigidum & humidum ex supra adductis dubium mihi manet; Quapropter potius a prima statim formatione in muliebrium ovariorum ovulis tam pro maribus, quam femellis prima principia seu stamina, per satis efficax seu spirituosum semen virile ejusque auram suo tempore excitanda, jamjam latere, indeque utriusque sexus generationem dependere statuimus.

§. 8.

An mares
& feminae
pro lubitu
progigni
possunt?

Ventilari nihilominus quandoque solet quaestio: An & qua ratione seu arte mares & femellæ pro lubitu progigni possint? Ad quam quaestionem nonnulli non modo affirmative respondent, sed varia quoque consilia pro hoc scopo exhibent; siquidem ipse Hippocrates *de superfætat. oper. Sect. III. fol 46.* scribit: cum vir marem procreare volet, mensibus desinentibus aut cessantibus uxorem adeat, & quam penitissime intrudat, dum semen excernat. At ubi feminam generare volet, cum plurimi menses mulieri fluxerint, nec dum cessarint. Dexter autem testis quoad

maxi-

maxime fieri poterit, obligandus, sinister vero si maris procreatio expetitur. Vel juxta versionem Jani Cornarii *p. m. 145.* ubi vir marem generare voluerit, mensibus desinentibus aut defectis misceatur, & quam penitissime intrudat, donec desæviat. Ubi vero femellam generare volet, quamplurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat, ac dextrum testem obliget, quantum id tolerare poterit: Sed si marem generare expetat, sinister testis obligandus erit. Quod statuit etiam Johannes Baptista Porta *Mag. natural. lib. II. c. 21. p. 94.* ad quæstionem, quomodo mares vel feminæ gigni possint? respondens: Si desideras, ut, quod orietur, sit masculus, quo tempore coeundum est, vinculo sinistrum testem excipito, sin autem feminam, dextrum similiter deligato, ex Columella, Africano & Didymo. Sed quia in magnis gregibus operosum est, tentemus id alio modo. Aquilonis flatu mares concipiuntur, austro feminæ, ex Plinio: Vix tanta est aquilonis, ut vel ea, quæ non nisi feminas pariant, immutet ad prolis masculæ procreationem. Spectare ad aquilonem oportet, quum coeunt, femina. Quæ mane iniri solent, marem, si sero diei admiseris, non patiuntur. Aristoteles, vir callidissimus naturæ rerum, præcipit admissuræ tempore observare ficcis diebus halitus septentrionales, ut contra ventum gregem pascamus, & eum spectans admittatur pecus, ut si feminæ generandæ sint, austrinos flatus captare, ut eadem ratione matrices ineantur. Mares etiam & feminæ generantur vi tum aquarum, tum admissariorum: nam & aquæ faciunt, ut feminæ maresve concipiantur. Non procul a Panensium civitate fluvius est Milichus, & post illum alius, nomine Charadinus: ex hoc pecora tempore veris bibentia ut plurimum mares parere ajunt, quam ob causam pastores in diversam a flumine partem ea abigunt. Hæc ex Porta. Hieronymus Cardanus *de subtilit. lib. XII. fol. m. 361.* sequentem masculos generandi modum docet, primo ut homo seu vir exerceatur solidioreque utatur cibo & rarius concumbat: nam sic semen calidius evadit. Secundo,

cundo, ut mater super latus decumbat dextrum, & a concubitu illico super illud quiescat. Tertio facit & ad hoc herba mercurialis dicta mascula, quæ duos quasi coleos habet pro seminibus. Prolixè etiam Nicolaus Venette *l. a. p. 505. seq.* ad quæstionem, s'il y a un art pour faire des garçons, ou des filles? affirmative respondet variasque regulas atque cautelas annectit. e. g. 1) quod nimis juvenes vel etiam senes non observentur filios generare, cum in prioribus calor naturalis sit admodum debilis atque perfecti feminis elaborationi insufficiens, in posterioribus vero spiritus, ad pueri generationem necessarii, ob nimium languorem deficient, indeque pro hoc scopo media ætas requiratur. 3) Quod esculenta atque potulenta calida & spirituosæ sint assumenda. 3) Diæta bene observanda omnisque cibi & potus abundantia, ob vitandas cruditates sint fugienda. 4) Quod veneris nimius & irregularis usus noceat nimisque debilitet, adeo ut etiam juniores mariti circa matrimonii initium crebriores congressus celebrantes non nisi filias generent. 5) Quod feminæ post moderatum mensium fluxum congregientes ordinarie filios concipiant; Quodsi vero abundantem patiantur menstruationem, & ante mensium eruptionem, aut statim post eorum evacuationem imprægnentur, tunc semper puellas pariant: 6) quod regiones meridionales ad puellorum seu marium generationem ob varias causas non æque aptæ sint, quam septentrionales. Denique dictus autor *p. 520.* ita concludit: on doit donc conclure après toutes ces raisons, qu'il y a un art pour faire des garçons ou des filles: & si l'homme & la femme se marient, lors qu'ils ne croissent plus, s'ils observent exactement la façon de vivre, que je viens de prescrire, s'ils ne s'es caressent, que rarement, & qu'ils donnent le temps l'un & l'autre à la chaleur naturelle de cuire leur semence, & à l'ame, de la perfectionner; s'ils s'embrassent à propos après les reales, & s'ils attendent, qu'un vent souffle du septentrion au plein de la lune, je suis très-persuadé, par l'experience que j'en ay, qu'ils feront un garçon plus tost,

stoft, qu'une fille. Quamvis autem, his regulis observatis, foecundum coitum atque conceptionem expectari posse, facillime concedam, minime tamen exinde marium potius quam femellarum generationem sperandam esse, ob supra a me adductas rationes persuaderi patiar. Auctoris judicium.

§. 9.

Nonnulli etiam maris vel feminæ conceptionem phantasiæ vel imaginationi matris adscribunt; Inquit enim Emanuel Kœnig *Regn. animal. Sect. I. art. 17. p. m. 75.* Licet non negemus præsentiam ideæ realis in ovo ante congressum, videtur tamen illam magis completam vel pro mare, vel pro femella (sicut novimus quosdam pro arietatione membri virilis vel intensiori vel remissa magis, ut & imaginationis directione asseverare, se vel marem vel feminam progignere posse) evadere a motu per ingravidationem inducto, dum patefactis quibusdam in ovario poris & meatibus antea occlusis, ideæ in ovis excitantur, ad rectam determinationem disponuntur, liberantur, & affluente succonutriti & vegetari, sicque de potentia ad actum progredi incipiunt. Et juxta Theodor. Craan. *Dissert. de homin. cap. 41. p. 706.* huc facere videtur quoque matris imaginatio tunc temporis facta, quæ multum valet, ita ut videamus, quod in primordio generationis ab exiguis circumstantiis tota sexus dependeat diversitas. Hanc tamen imaginationis efficaciam negat Nicolaus Venette *l. a. p. 512.* L'imagination, inquit, de la femme quelque sorte qu'elle soit, ne peut encore produire cet effet. Car, combien y a-t-il de femmes, qui n'ont que des filles, & qui ne peuvent avoir des garçons, bienque leur imagination soit incessamment embarrassée & comme farcie de l'idée de ces derniers? L'imagination ne change ny n'os humeurs, ny leur temperament; la bile ne sauroit par sa force devenir pituite & la matiere, qui a des dispositions pour une fille, ne sauroit pas son moyen en avoir pour un garçon; le tempera-

ment de l'un & de l'autre étant trop éloigné, leur matiere trop opposee & leurs parties trop differentes.

§. 10.

*Autoris
dubium.*

Utri vero de sexus differentia, mariumque vel femellarum conceptione sententiæ, an nimirum de primis foetuum in ovulis mulierum contentis flaminibus, an vero de prolifico virilis seminis robore seu vi plastica, subscribere debeam, in tam occulto conceptionis mysterio dubius adhuc hæreo; quodsi enim in mulieris cujusdam ovulis mera muliebrium foetuum flamina lateant, talis autem femina cum forte quodam, tam Martis, quam Veneris heroe, quia fortes, juxta poetam, creantur fortibus, iterumque tales fortes procreare deberent, coitum foecundum celebret, quaeritur, an possibile sit, ut talia flamina muliebria per eundem coitum in flamina virilia vel foetus masculos permutari possint; vel annon alia potius absque discrimine sexus in ovulo latens materia foetus per spirituosum fortis viri semen excitari atque in marem formari possit? qualia heroum, multos filios procreantium, exempla historiæ referunt. Legimus in S. scriptura *Lib. Judic. cap. 8. vers. 30.* quod Gideon habuerit septuaginta filios, qui egressi erant de femore ejus, eo quod plures habuerat uxores. Herculem etiam ebrium Thespîi regis Bœotiæ filias numero quinquaginta, una nocte vitiasse, omnesque earum mares seu filios peperisse, præter natu maximam & minimam, quæ geminos pepererunt, legimus apud Natal. Comit. *Mythol. lib. VII. cap. 1. p. m 612.* Interdum etiam annotantur feminæ, in primo matrimonio non nisi filias in lucem edentes, quæ tamen postmodum defuncto priori marito in secundo matrimonio meros filios parere solent. Quo in casu quaeri posset, annon prioris mariti semen ad imprægnanda ovula virilia, vel excitanda eorum flamina, nimis debile atque insufficientis fuerit? Ad quod tamen e contra responderi posset, in tali casu ovula feminea citius fuisse maturata, quam virilia. Notatu quoque dignum est, quod de longævi cujusdam viri familia, abs-

absque interventu filiarum, centum atque duodecim filios & descendentes procreante, alia occasione sequentibus verbis refert autor *derer* remarquablen curieusen *Briefe im 2 Paquet 24. Couvert. n. 49. p. 189.* *Mein seel. Herr Vater hat aus Adam Stolzens sehenswürdigem Dresden p. 126. in seinen MStis Miscellaneis excerpiret, wie anno 1603. in der Dreßdner Vorstadt Melchior Hoffmann, Churfürstlicher Sächsischer Cammer-Musicus, am 21. April mit seinem Eheweibe Annen, gebobrner Wunderbachin, ein grosses Gastmahl angestellet, zum Andencken, daß es Tages vorher gleich 50. Jahr gewesen, als selbige zu Stralsund am 21. April. 1553. mit einander durch einen Evangelisch-Lutherischen Prediger copuliret worden, darbey genanter Herr Stolze als etwas besonders aufgezeichnet, daß diese beyden Ehe-Leute, so zusammen ein Alter von 161. Jahren zehlen können, in diesem ihren Ehestande 22. Kinder erzeugt, aus welchen anno 1602. in Stralsund 35. in Schwerin 19. in Rostock 6. und in Dreßden 18. also in allen 78. Enckel, aus diesen aber 12. Uhrenckel und zusammen solchergestalt 112. Seelen, ja welches am meisten zu admiriren, alle männlichen Geschlechts, gelebet. Sie haben im Gasthose zum grauen Wolff genannt, bey der St. Annen-Kirche logiret und sind bey dem Gastmahl 62. Personen (unter denen die Durchl. Landes-Fürstin selbst persöhnlich zu seyn sich gnädigst gefallen und Speisen und Tranck aus der Churfst. Küche und Kellerey diesen schneeweissen Jubel-Hochzeitem, nebst 10. Ducaten am Golde zum Geschencke reichen lassen) zugegen gewesen. Darunter sich auch ein Adel. Mund-Koch von 102. Jahren befunden.*

§. II.

Quæritur proinde, unde tam largus unius ejusdemque sexus proventus, utrum ex ovulis mulierum, an vero a prolifico viri ^{Helmontii} femine oriatur? Inquit equidem Johannes Bapt. van Helmont ^{sententia.} *Tract. imago fermenti §. 11 seqq. fol. 71.* in feminibus vitalibus, generans inspirat archeum, cum sui similitudine & auram vitalem una cum feminis massa; fiunt itaque femina a conceptu generantis, facientis imaginem sui per libidinem: Semen autem est substantia,

Negatur.

in qua jam archeus est, qui est Gas spirituale, continens in se fermentum, imaginem rei atque insuper notitiam dispositivam rerum agendarum. Huic tamen Helmontii sententiæ contradicit Melchior Fridericus Geuderus *de Ferment. Diss. de ort. animal. p. 287 seq.* inquit creditu adeo facile non est, quod generans cum semine inspiret archeum, cum sui similitudine; & quidem mediante conceptu, sive facta imagine sui per libidinem. Et *p. 290.* inquit insignis est Helmontii temeritas, cum expresse alicubi asserit: esse in patrantis manu generare marem aut puellam: quasi vero inter artes mechanicas, quarum gubernatio a libera mentis voluntate dependet, locum haberet illud artificium.

§. 12.

Conceptionis signatur.

Denique etiam tam feminæ, quam mares post coitum admodum sunt sollicitæ, an talis cohabitatio fuerit fœcunda nec ne, quapropter, an non certa dentur conceptionis signa, apud obstetrices & medicos inquirunt; quamvis autem talia signa sigillatim observata admodum æquivoca & dubia existant, attamen juxta Michaelis Alberti *System. Jurisprudent. medic. cap. 4. §. 10. p. 85.* nonnulla illorum sub justa conciliatione explorata aliquo modo veritatem testantur: sunt vero in hac consideratione sequentia signa recensenda & indaganda 1) quando sub actu cohabitationis uteri vagina membrum maris valide amplectitur & arcte continet, insuperque conjuges cum distincta libidine coeunt, ut & quando intimiora uteri cum discreto aliquo sensu alliciuntur, ut variæ mulieres exinde futuram conceptionem certius ominentur: qua occasione inter medicos occurrit quæstio: an feminæ sine delectatione concipere queant? item an vir, an vero mulier sub coitu majorem voluptatem sentiat? 2) aliud signum allegatur fiendæ aut factæ conceptionis, quando semen maris in utero per aliquot dies retinetur, & a coitu uterus siccus permanet; quod signum jam Hippocrates indicavit, licet illud æque fallax existat, quoniam feminæ etiam concipiunt, quæ non diu semen retinent,

aut

aut quibus semen non intimius communicatum fuit, imo quoniam plurimæ feminæ nesciunt, an & quando semen elabatur; 3) propterea multa passim recensentur, velut insolita corporis perhorrescentia, levis dolor inter umbilicum & pudenda, aut in lumbis, quasi mitior colica afflictio, aversio ab ulteriori coitu, animi morositas, corporis torpor, dejectio appetitus, nausea, vomitus, mensium insolitæ turbæ, aut insolitus largus mensium fluxus, aut cum mensibus alterans fluor albus, difficultates & inordinatæ qualitates quoad urinæ excretionem. 4) His signis etiam annumerantur capitis dolores, vertigo caliginosa, si papillæ minuuntur, si oculi flavescent, si venæ illorum sanguine turgent, si palpebræ concavantur, si genæ livescent, & similia alia. Ejusmodi signa etiam Paulo Zacchiæ *Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. 3. Quæst. 1.* an prægnantia ex certis quibusdam signis possit infallibiliter cognosci? *n. 46. fol. 91.* fallacia videntur. Inquit enim ibidem: Etiam si vulva a concubitu sicca remanens fidem facere possit jam celebratæ conceptionis, scimus tamen conceptionem non nisi tunc vere dici posse factam ex Hippocrate, cum semen in uteris septem diebus permanferit: Plurimum enim ac pluries uterus a coitu siccus remanet, & semen quidem attractum retinetur, quod tamen non multo post foras prolabitur. Eodem quoque pacto capitis gravitas, totius corporis, & ipsius capitis dolores & oculorum caligines mulieribus, quæ non conceperant, etiam ex ipso coitu, non secuto conceptu, non accidere &c. Secundum Mich. Ettmüller. *Oper. Vol. II. fol. m. 1073.* communia conceptionis signa pathognomica, atque hinc infallibilia non dantur. Probabilia tamen, & ex quorum syndrome satis apparenter concludi potest conceptio, sunt fere sequentia 1) orificii uteri interni stricta clausura, ita ut ne specillum quidem admittat; 2) menstruorum ordinaria emanatio seu retentio; 3) horror aut horripilatio quædam primis post congressum diebus superveniens. 4) Varia circa stomachum ac digestionem succeden-

cedentia symptomata. 5) hysterici affectus & abdominis tormina. 6) Tumor ventris circa regionem umbilicalem. 7) Motus infantis & 8) primis mensibus gravitas capitis & vagæ vertigines, dolor dentium molestus, & similia.

§. 13.

Alia signa.

Inter alia conceptionis signa, si successive in quadam muliere omnia observare liceret, sequentia certiora, licet non infallibilia, videntur v. g. lassitudo & quasi propensio ad somnum, faciei color primo & secundo a coitu diebus ad albedinem vergens; dehinc mensium absque febre vel alio statu morbofo & iracundia aut terrore emanatio, faciei pallor aut variæ maculæ, anorexia & ciborum, alias gratorum, imprimis carniū nausea, seu fastidium, vel etiam pica seu malacia, sive magnus insolitorum vel antea ingratorum appetitus, vomitus matutinus vel vespertinus, vel alio certo tempore quasi ordinarius, quod fastidium quandoque se etiam ad certum potus genus, v. g. vinum, vel cerevisiam extendit. Mammarum porro successiva & dolorosa induratio & intumescencia a lacte; aliqualis faciei & partium musculosarum emaciatio; in abdomine imprimis circa regionem umbilici versus pubem intumescencia observatur non inæqualis, sed globosa; & circa vigesimam circiter graviditatis septimanam in hypogastrica illa regione foetus motus, partim in principio leniter ab ipsa matre, postmodum etiam ab alterius manu, imprimis bene calida ventri tepido, vel manu frigida calenti abdomini imposita percipitur, imprimis si venter circa uteri regionem vel circa tumorem aqua Reginæ bene lavetur. vide insuper Jodoc. Lomm. *Observ. p. 278 seq.*

§. 14.

Fallacia.

Occasione partus semestris Paulus Ammannus *Medic. Critic. Cas. I. Discurs. 1. p. m. 10 seq.* de incertis conceptionis signis fatetur, quæstiones circa partum esse spinosas, quia nos medici ignoramus

ramus tempus conceptionis, imo ipsæ mulieres, interdum etiam satis peritæ, illud ignorant, hinc fieri potest, ut v. g. mulier, quando prioribus duobus mensibus est ingravidata, se non putet esse gravidam, & inchoet ingravidationem circa tertium mensem, tunc pariet filium, septimo quidem mense, juxta ipsius calculum, qui tamen revera est partus nonimestris; & contra putare potest mulier, se primis statim duobus mensibus factam fuisse gravidam, quod tamen non est & hinc juxta computationem ipsius orietur partus undecim mensium, cum tamen saltem sint novem; hinc desideramus signa conceptionis certa &c.

§. 15.

De signis conceptionis ita scribit Mons. Dionis *de l'Accouchem. Lib. I. cap. 8. p. 74 seqq.* Afin que le chirurgien ne puisse pas se tromper sur le jugement, qu'il doit porter touchant la conception, il faut qu'il en distingue les signes en quatre temps differens: 1) en ceux, qui ont précédé l'action: 2) en ceux, qui ont accompagné l'action: 3) en ceux, qui ont suivi immédiatement l'action: 4) En ceux, qui ne sont survenus, que quelques tems après l'action. Les signes, qui precedent l'action, sont: si la femme à un air de santé, si elle n'est point trop grasse, ni trop maigre; si elle est d'un bon temperament, c'est, a dire amoureux, si elle aime bon son mari, si elle en a été séparée par quelque voyage, si elle a souhaité son retour avec embrassement, si étant revenu elle a ressenti un treffaillement de joye, qui lui annonçoit le plaisir qu'elle en attendoit, si il est arrivé sur la fin du tems de ses ordinaires, ou peu de jours après; avec toutes ces bonnes dispositions une femme est prête à concevoir. Ceux, qui accompagnent l'action, sont l'avidité, avec laquelle la femme souhaite le mari, l'ardeur avec laquelle elle le reçoit, le plaisir mutuel, qu'ils ressentent l'un & l'autre; si le mari sent la tête de sa verge fraper contre orifice interne, ce qui fait un redou-

redoublement de plaisir à la femme ; quand l'homme & la femme ejaculent leurs semences en même tems ; quoique celle de la femme ne fasse que contribuer à son plaisir ; cela marque une matrice échauffée, & en fureur, pour ainsi dire, qui va au devant de la semence de l'homme pour la recevoir, & qui l'ayant reçue, fait un mouvement de contraction qui la comprime & l'oblige d'entrer dans les trompes, & d'aller jusqu'à l'ovaire. Les habiles faiseuses d'enfant sont sûres d'avoir conçu, quand elles ont senti ce tremoussement incontinent après l'ejaculation, parceque c'en est un signe infallible. Ceux qui suivent de près l'action du coit ; Mauriceau veut que l'homme retire la verge plus seiche, qu'à l'ordinaire ; que la femme ne se trouve point mouillée, parcequ'il suppose que les deux semences sont retenues pour former l'enfant ; mais cela ne se trouve pas vrai, car il n'y a qu'une tres-petite parti de la semence de l'homme, qui soit portée à l'ovaire, & la femme est mouillée comme de coutume ; si elle a senti une legere douleur au nombril, si la region de la matrice s'est aplatie, si elle s'est sentie plus abatue & plus fatiguée après l'action, qu'elle n'avoit accoutumé de l'être, & si elle n'a point eu d'envie de recommencer ; ce sont des signes, qu'elle a conçu. Les signes qui n'arrivent que quelques jours après l'action, sont en tres-grand nombre : si elle devient chagrine, de mauvaise humeur, paresseuse & assoupie ; si elle perd l'appetit, & ne veut point manger de ce qu'elle aimoit la plus, si elle a des envies desprées pour des alimens extraordinaires ; si elle a les yeux battus, enfonchez & languissans, si son sein commence à lui faire de la douleur, si il grossit & se durcit, si le cercle en est plus gros & plus brun, si les bouts en sont plus gros & plus relevez, si elle crache beaucoup, si elle a des douleurs de dents, si elle vomit quelques fois, si elle a de l'indifference pour les caresses du mari ; enfin si elle ne voye plus rien. Tous ces signes dénotent la conception ; ils ne sont pas nean-

neanmoins si certains, qu' ils ne puissent tromper &c. De conceptionis signis plura paulo infra de graviditatis signis reperies.

CAPUT X.

De conceptionis impedimento & sterilitate.

§. I.

AD quæstionem, an feminæ conceptionem impedire possint? *An femina respondet Michael Alberti Jurispr. medic. Cap. 4. §. 18. p. 94. conceptio- nem impe- dire possit?* hoc omnino variis modis fieri posse, quamvis doctores juste judicent, quod illa mulier excusanda minime sit, quæ, ne concipiat, medicamenta accipit: Et tale conceptionis impedimentum 1) malo situ & decubitu succubæ coëuntis; 2) purgante medicamento mox post coitum assumpto; 3) quando mox post hanc carnalem copulam, ut exceptum sperma confestim effluat; (quod vero signum adhuc aliqualem patitur exceptionem; 4) quando cum iræ affectu & magna aversione femina compressionem viri admittit, quemadmodum inter amantes conceptio facilius, inter illos vero, qui odio se invicem prosequuntur, difficilius contingit; 5) quando mox post coitum mingunt; 6) aut brevi post in balneum descendunt; 7) aliis pravis experimentis genitalia afficiunt vel eluendo, vel suffimigiis offendendo; 8) quando ante coitum medicamenta sanguinem exæstuantia, e quibus etiam camphora eminet, assumunt. De reliquo inter auctores varie differitur de aliis adminiculis venerem extinguentibus & sterilitatem conciliantibus, utpote de Nicotiana, stupefacientibus, præcipue opio &c. Juxta du Vernay conceptionis impedimentum subest, cum ob varias in concubitu clunium succussiones & agitationes semen maris ad latera vaginæ ejaculatum impingit, adeo ut actione sua privetur, ac, quod cavitatem uteri subire debet, id extra effunditur, ac proinde inutile evadit. vid. Nicol. Blegn. *Zodiac. Med. Gallic. An. II. mens.*

Mart. Obs. III. p. 72. vid. etiam Paulus Zacchias Quæst. med. leg. Lib. III. Tit. 1. Quæst. 1. n. 30. f. m. 266.

§. 2.

*Sterilitatis
causæ.*

Dantur etiam aliæ impeditæ conceptionis seu sterilitatis causæ; quod sterilitatis vocabulum equidem a plurimis medicis tam maribus, quam feminis attribuitur, verbi gratia juxta Barthol. Castelli, seu Jacobi Pancratii Brunonis *Lexic. medic.* sterilitas de utroque sexu dicatur, sitque abolita generatio vel conceptio prolis ob morbos varios partium generationi in utroque sexu destinatarum, vid. etiam Theodori Zwingeri *Theatr. Prax. medic. Part. post. p. 464. & 467. seq.* nobis tamen potius maribus impotentiam, & feminis sterilitatem tribuere libet. Causas vero muliebris sterilitatis dictus Zwingerus, modo in vagina uteri, modo in utero, atque testiculis seu ovariis quærit, dum vagina uteri, dum imperforata sit, si per se, vel simul cum utero prolapsa, si glandulæ ipsius sint obstructæ, vel si hæ lympham mucosam acriusculam, aut copiosam nimis eructent, occasionem sterilitati præbere possint quatenus sub hoc statu aura masculini seminis vel obliteratur & inviscatur, vel propter obstructions varias etiam in cervice uterina contingentes penetrare, aut certe ad massam humoralem feminæ pertingere, inibique, prout nonnullorum sententia est, tendentiam & directionem motus spirituum ad ovaria suscitare nequit. Cervicis uterinæ culpa, pergit idem autor, steriles sunt, feminæ, quando illa similiter imperforata existit, vel alias firmiter ita clausa, ut spiritui seminis masculini plastico transitum omnem deneget; vel quando laxa nimis existit, semenque modo admissum statim iterum elabi finit. Uteri vitio idem contingit, quando ejus substantia vel dura nimis, obstructa, scirrhusa, aut etiam cancrofa evasit, ut sufficienter expandi nequeat pro foetu continendo; aut spiritum seminis masculini transire non finit per poros sive Fallopii tubam; vel quando substantia uteri flaccida nimium, œdematosa, aut putredini quali-

qualicunque obnoxia existit: in quo statu ovula utcunque fecundata neque retinere ac fovere, neque nutrire valet. Si porro tubæ Fallopiæ imperviæ quomodocunque extiterint, & ita vel seminali auræ, vel ovulis transitum non concedant, sterilitas quoque contingit. Tandem ovaria scirrhusa, cancrofa, œdematosa, pinguedine obfita, viscosis humoribus obstrueta, flaccida, item hydropica, aut corruptis etiam ovulis scatentia sterilitatem inducunt: Si præterea feminæ, temperamento gaudeant sanguineo-biliofo & hæmorrhagiis uterinis sint obnoxie; si nimis corporis exercitationibus, si largiori quotidie potui vini, cibis falsis nimiumque aromaticis indulgeant; si lue tandem venerea corruptæ fuerint feminæ sterilitatem quoque sibi contrahunt. Mensium suppressionem huc aliqui referunt, sed vidimus aliquas, nondum menstruatas, concepisse tamen & genuisse. Hactenus allegatus Zwingerus.

§. 3.

Exemplum sterilitatis a vaginæ uterinæ occlusionē vid. *Sterilitatis exempla.* Ephemerid. A. N. C. Cent. IX. & X. Obs. 73. p. 384. propter obstruētum uteri collum a carnea excrescentia refert Casparus Theophilus Bierlingius M. N. C. Dec. 1. an. 2. obs. 208. p. 310 seq. Anno scilicet 1662. die 30. Maji, Lipsiæ subiectum femininum cultro anatomico explorabatur, quod ob nimiam lasciviam & adulterium commissum decollatum erat. Illius desiderium neque a marito, neque ab aliis satiari vel ab ullo ingravidari poterat. In dextro latere arteria spermatica bifida reperiēbatur. Extra collum uteri pendebat excrescentia carnea circa interius colli orificium adnata, longitudine digitum minorem, crassitie vero lumbricum ferme æquans, quæ uteri collum exacte claudebat, & loco obstaculi erat, ut nullum semen in uterum ingredi potuerit. vid. etiam Bierling. *Adversar. Curios. Obs.* 29. p. 58. de sterilitate. In duabus in fecundis mulieribus internum uteri orificium coalitum se

deprehendisse refert D. Pauli *Histor. Morb. Vratislav. An. 1702. p. 210 seq.* vid. etiam Fr. Plazzon. *Lib. II. cap. 7. pag. 131.* Gothofr. Moeb. *Physiol. cap. 20. p. 537.* Abditam sterilitatis causam inciso corpore inventam annotavit Guilhelmus Fabricius Hildanus *Observat. chirurg. Cent. I. obs. 65. fol. oper. 51.* inquit, sexagenariam matronam, quæ binis nuptiis sterilis fuerat, cum chirurgo & medico dissecui. Perquisita diligenter sterilitatis causa invenimus scirrhum circa orificium fundi uteri, qui instar annuli collum matricis circumdabat, adeoque uterum claudebat, ut styli acies vix immitti posset: unde nil mirum, quod in coitu sperma a matricis ingressu perpetuo arceretur. Et observatione sequenti idem autor aliam sterilitatis causam adducit. Honestæ scilicet matrona in primo puerperio inflammatione uteri laboraverat, curata tandem sterilis mansit. In hujus post mortem dissectæ cervice ante orificium fundi uteri scirrhum magnitudine ovi anserini Fabricius invenit, ipsi adeo adhærentem, ut unum videretur corpus, nec ullo modo ab ea divelli potuerit. Propter hunc scirrhum semen virile ad uterum penetrare non potuit. Nemini igitur mirum videri debet, quod medici aliquando in sterilibus frustra sibi multa negotia facebant; hujusmodi enim causæ medicos latent, aut, si non lateant, eæ tamen non nisi ab ipso Deo auferri possunt. vid. etiam Muliebr. nostr. *Sect. III. cap. 2. §. 12. p. 228 seq.* Sterilitatem e tubarum Fallopiarum clausura ita describit Fridericus Ruyschius *Centur. Observ. anat. chirurg. obs. 83. p. 108.* Sterilitatis mulierum multæ inveniuntur causæ, inter quas tubarum Fallopiarum clausura haut infima est habenda: Hanc modo circa insertionem in uterum, alias in earum extremo observo. Si tot cadavera non secuissem, nunquam credidissem, tubas Fallopianas seu oviductus tam frequenter in mulieribus esse clausos, quod sæpius a partu difficili (in quo non raro illæ partes levem inflammationem patiuntur) vel ab aliis ventris doloribus provenire expertus sum; & quod

quod observatu dignum est, si in extremitatibus sint clausæ tubæ, ut plurimum eas arcte cum ovariis coalitas inveni, quod magis experientiam nostram quoad causam confirmat, &c.

§. 4.

Occurrunt adhuc aliæ sterilitatis muliebris causæ, quarum nonnullæ quandoque removentur, v. g. exemplum sterilitatis a fluore albo refert Janus Abrahamus a Gehema *Observat. medic. Dec. I. obs. 6. p. 30 seq.* his verbis: Amicus mihi admodum familiaris conquereretur de conjugis suæ sterilitate, monui, ne uxori injurius esset, culpam fortassis in seipso hærere; ad quæ ille: se certo certius scire, eam penes conjugem esse. Interroganti mihi, num uxori menstrua deficerent, vel insolito ordine effluerent? Se hoc nunquam observasse, nedum ex conjugē percepisse, respondebat, at si ista scire percupias illam ipsam examini tuo subjice. Imperata proinde a marito venia, honestissima femina mihi inquirenti respondit: menstruum sibi ab ineunte matrimonio, neque debito tempore fluxisse, neque coccineum reddidisse colorem, sed loco hujus fluore semper laborasse albo; en, inquiebam, haud obscuram sterilitatis tuæ causam. Illa incredibili liberorum amore inflammata, consilium a me efflagitat. Suasi ut uterum sequenti suffimigio, sale nempe ammoniaco & cineribus clavellatis, anatica portione, aqua communi solutis prunisque injectis, repurgaret; cui medicamini per aliquot tempus insistent, quæ tredecim fere annos sterilefcebat, vix uno anno elapso, hilarula gemellorum mater facta est. Item juxta Joh. de Muralt. observationem, textoris cujusdam uxor viginti trium annorum, inordinate cibo & potu a longo tempore usa triennium integrum sterilis in matrimonio vixit. Inde vero a pubertate novem annis continuis albo fluore tentata est. Tandem adhibitis medicamentis variis concepit. *v. M. N. C. Dec. II. An. 1. obs. m. p. 274.* Duæ steriles, quia utero erant humidiores, semen non retinentes, multamque per pudenda pituitam indies excernentes, post aquas Spadanas curatæ pepererunt,

A longo
pene.

rerunt, secundum Henr. ab Heer *Observ. med.* 14. p. m. 132. De sterilitate propter coitum dolorificum ob longitudinem penis, & quomodo emendata fuerit, vid. Guilh. Fabric. Hild. *Observ. Chir. Cent. VI. obs. 61. fol. 575.* Sidonia Spießin in honesto conjugio inter Westphalos undecim fere annos vixerat, usa interim peritorum medicorum consiliis sed absque omni effectu. Tandem familiam suam transtulit in principatum Halberstadensem, facta est plurium liberorum mater. Hoc vitium antiquum a mutato aere emendatum fuisse, putat Christianus Francisc. Paullini *M. N. C. Dec. II. An. VI. append. p. 76.* quo loco alia ejusmodi exempla adducit. De cura sterilitatis in femina Bernensi vid. *ibid. Ann. VII. obs. 104. p. 166.* Sterilitatem feminae ab ebrietate recenset Vitus Riedlinus *Linnear. medicar. ann. 1698. mens. Jul. obs. 23. p. 300.*

§. 5.

Ab alumine.

De sterilitate ex alumine sequentem observationem recenset Thomas Bartholinus *Actor. Hafn. Vol. IV. obs. 41. p. 123.* Camphoram immodice siccam, si in sinu virginum gestetur, juvenes ad venerem reddere impotentes, Cardanus Lib. 5. de Subtilit. refert. Cui tamen experientia non favet. De alumine propior observatio nuper innotuit. Ambiebat illicitos puellae amplexus insulanus quidam, extra viciniam suam ignotus. Annuebat illa quidem votis exorata, sed metu imprægnationis deterrebatur. Spondit procius indemnem fore, si aluminis frustum ore arctius illa contineret, dum venere exoptata frueretur. Persuaderi sibi passa est credula blanditiis & falsis promissis, seque tutam ab alumine sperans, tam anxie ore constrinxit alumen non sine fastidio, quam sedulo alter opus susceptum cum voluptate peregit. De florata illa, tandem post decem mensium effluxum credulitatis suae vel simplicitatis pretium retulit, mater facta. Sive casu, sive traditione aliqua insulanus ille in alumen inciderit, certum est, veterum quosdam de alumine ita sensisse, sed non eo, quo puellae huic persuasum, modo. Huic ori inditum, ut adstrictione, qua

qua pollet, maxima, obturaret forsan os puellæ de sua pudicitia sollicitæ. Veteres autem ori vulvæ imposuerunt, ut adstringendi vi clauderet os uteri, ne, recepto semine conceptio fieret. Ita Dioscorides *Lib. V. cap. 123.* inquit, alumen etiam præstat mulieribus, ne concipiant, ante coitum ori vulvæ inditum &c.

§. 6.

Sterilitatem ex amnio uxoris loco Periapiti gestato derivat *Ab Amnio.* Paulus Spindlerus *Observ. 65. p. 121.* inquit: Retulit mihi vir fide dignus, M. L. S. affinem suum per integrum annum impotentem vixisse cum uxore sua, nulla quæ cogitari poterat hujus rei ratione, inventa. Tandem aliquando interrogans uxorem, quid Periapiti loco gereret, ipsa amnium suum esse respondit. Quo sublato statim Veneris stimulis tentatus coivit. Exinde hoc impotentia vel sterilitatis fuisse causam conclusit.

§. 7.

Alias quoque impeditæ conceptionis causas adducit Johannes de Muralto in scholio paulo ante allegatæ observationis, frequentibus verbis: in femina prolis cupida, ut votum obtineat, requiritur uterus bene dispositus, pubertatis anni & ætas non ultra quinquagesimum annum provecta, denique ordinata menstrua. Ad uteri dispositionem quod attinet, orificii matricis coarctatio mulieribus plurimum incommodat, qua fit, ut non modo retenti menses generationem impediant, sed insuper mala alia pullulent. Deinde obest quoque cervicis uteri amplitudo nimia: ita enim semen masculinum non retinetur, sed diffluit, evanescente spiritu. Tertio oris interni perversio, seu obliquitas, recipiendo femini inidonea. Quarto morbi alii organici, inter quos compressio ab omento pingui, cicatrix, tuberculum, callus, adipis copia, membrana hymenæo æquo durior & strictior: quæ omnia impediunt, ne menses effluere, & vicissim semen admitti possit. Quinto ovi muliebris, e quo foetus nascitur crassities, impediens item, ne feminis virilis impressionem fecundam, aut vitalem chara-

characterem recipiat. Sexto tubarum obstructio, qua ovum descensu prohibetur ad uterum. Septimo demum ovarii marcor, quando caruncula circa ovum foecundum emergens flaccescit, nec ovum ab ovario liberat. Menstrua quoque sterilitatem inducunt; si nimia fuerint, ita ut semen virile eluant & ovum foecundum inundent, quod per vias lubricas & hiantes frustrato partu evadit. Sed & retentio menstruorum matricem infestat & semen utero traditum propter sanguinis boni inopiam luxuriantibus malis humoribus suffocat. Ex mulieribus quoque eæ, quæ nimium viragines sunt, generationi minus idoneæ putantur, cum

Observatio. purgationibus mensruis & humoribus nutritiis fere careant. Vivit adhuc Secretarii cujusdam vidua sexaginta aliquot annorum, quæ per totam vitam nunquam menstruata, neque etiam a marito suo, qui in priori matrimonio cum illa uxore novem liberos utriusque sexus generaverat, imprægnata fuit.

§. 8.

A calculis. Sterilitatem etiam a calculis vel scirrhotate annotarunt autores v. g. Omentum durum ac fere lapidosum sterilitatem inducens in muliere refert Dominicus Panarolus *Pentecost. III. obs. 10. p. 68 seq.* multæ inquit sunt sterilitatis causæ in muliere, de quibus fere omnes medici, tum antiqui, tum recentiores scripsere. Unam tamen observavi a nullo in lucem editam, videlicet duritiem maximam omenti, a quo uterus tactus distendi non poterat & sic genituram projiciebat. In reliquis vero ista mulier bene colorata erat & optima fruebatur valetudine; hoc tamen habebat, ut omentum undique fatis crassum, durum ac fere lapidosum uterum premeret, turgendo ipsius abdomen observavi, ex quo sterilitas orta fuerat. Refert etiam Theod. de Mayerhe eques auratus, se in cadaveris humani dissectione, quam Lutetiæ suis manibus fecerat, insolitam sibi & inauditam oblatam fuisse sterilitatis causam, calculum videlicet exactissime meatum illum cludentem, qui a prostaticis in urethram dehiscit, per quem e vasis varicosis semen vibrante ejacula-

ejaculatione expellitur. vid. Christ. Fr. Garmann. *de Mirac. mortuor. lib. III. Tit. 3. §. 78. p. 1112.* De sterilitate tractatum scripsit Johannes Hucherus, cujus liber primus agit de sterilitate virili, secundus de muliebri idiopathica, tertius de sterilitate sympathica, & quartus de occultis sterilitatis causis, seu de maleficiis. De arcenda sterilitate & progignendis liberis librum edidit Jason a Pratis. De quæstione utrum fascinatio sterilitatem inducat vid. Zacut Lusit. *de Medic. princ. histor. lib. III. Qu. 31. oper. Tom. I. f. 509.*

§. 9.

Sterilitatem ab uteri steatmate annotavit Georgius Hieronymus Velschius *Episagm. obs. 72. p. 43.* mulierem, inquit, quæ nunquam conceperat, quamvis innumeris medicamentis usa esset, Johannes Veslingius a morte sectam 1642. vidit tumore uteri laborasse, membrana propria materiam sebo similem continente, quem ideo inter sterilitatis causas merito referendum censebat.

a steatmate.

§. 10.

Ab arteriæ & venæ spermaticæ defectu & a fimbriarum in tubis absentia sterilitatem dependere inexplicabilem, refert Dns Poupart. *vid. Histor. Academ. reg. scient. Parisiens. An. 1699. p. 274.* Sic etiam Christianus Johannes Langius *Oper. Part. III. Disput. 38. §. 18. fol 512.* nullus dubitat, quandoque salacitatis culpam in fimbriatas tubarum seu oviductuum extremitates ponere, si propter conformationem minus convenientem usum præstare naturalem, hoc est, testiculos apprehendere, & in coitu tamdiu retinere, donec virtus activa seminis suo satisfecit officio, haud fuerint apti.

ab arteriarum & venarum spermaticarum defectu.

§. 11.

Juxta H. G. Herfeld *Cogit. de Orig. Morbor. §. 13. p. 16. & 17.* est & aliud genus feminarum minus ad procreandam sobolem idoneum, nimirum earum, quarum ovarium nimia pinguedine est oblitum; aut quarum ovarium crassa & tenace est obductum visciditate, unde spiritus illaqueantur & suffocantur, & virile semen impeditur, ut ad ovarium penetrare non possit, illudque fœcundare;

ab ovarii pinguedine.

omnia quippe oportet sint temperata. Si vero per penetrantissimam vim feminis virilis eousque vibrat & transit illud, ut ovarium inde foecundetur, attamen visciditas usque adeo est, & continuat permanere tenax, ut admittere nolit descensum in vulvam, manebit in eo loco, ubi conceptus erat foetus.

§. 12.

ab ebrietate.

Ebrietatem in sequiore sexu sterilitatem inducere confirmat Vitus Riedlinus *Linear. Medic. An. l V. mens. Jun. obs. 23. p. 602 seq.* in-
quiens: Matrimonium contraxerat quædam haud ex fece plebis oriunda femina cum quodam, quem impense dilexerat, nec consultis prius amicis elegerat, unde ego vix ac ne vix quidem dubitavi, brevi eam quoque exoptatos conjugii fructus edituram, & sic lætam matrem evasuram. At cum quandam ex cognatis ejusdem propterea interrogassem, hæc respondit, ne, quæso, expectes ex hoc conjugio proles, nimirum dedita est tum vini, tum cerevisiæ potui, hisque liquoribus sæpius se nimium invitat, unde vix ac ne vix quidem concipere poterit. Ulterius ruminanti hoc responsum in memoriam revocavit, quandam, quæ quamdiu quidem vixit, de nulloque malo, quam de siti tantum non continua conquesta fuit, cui sedandæ, quia cerevisiæ præsertim non pepercit, & eam tantum non quotidie ad ebrietatem usque ingurgitavit, inde licet maritum habuerit, cui nil quicquam hac præsertim in parte defuit, ad venerem etiam sat proclivis extiterit, conjugium tamen per plures annos sterile habuit, nec vel unicam suscepit prolem.

§. 13.

A nimia obesitate.

Casum sequentem medico forenses, an scilicet a mensium defectu & nimia pinguedine in uxore sterilitas oriatur? recenset Michael Alberti *System. Jurispr. med. cap. 2. pag. 55 seq.* Lucilla, eines vornehmen Kauffmanns Tochter, wurde in dem Anfange ihres 14den Jahres an einen andern berühmten Kauffmann verbeyrathet, ehe sie ihre Menses bekommen hatte: Ob zwar dieselbe von guter Statur, und

libri-

übrigens gesund und dem Gemüth und Leibe nach munter ist, so hat sie doch fast bey 3. Jahr ohne einen erlangten Kinder-Seegen mit ihrem gesunden und untadelhafften Ehemanne, friedlich und vergnügt gelebt. Wenn aber dieselbe allererst im Ehestande ihre weibliche Reinigung bekommen, doch solche etwas unordentlich bisher gehabt, anbey aber am Leibe sehr starck und fett wird, auch dem äußerlichen Ansehen nach fast übermäßig vollblütig ist; als erget an N. unser freundliches Ersuchen, daß sie nach denen Medicinischen Gründen untersuchen und decidiren mögen: 1) Ob Lucilla schlechter Dinges incapable zur Kinder-Zeugung sey? 2) Ob sie verweilete Imprægnation vielleicht einer natürlichen Hinderung und Ursache zuzuschreiben sey? Und 3) wie allenfalls diesen Hindernissen sicher und gründlich abzuhelffen sey? In quem casum dictus autor hanc epicrisin dedit; 1) Sterilitas junioris conjugii ob præmaturum matrimonium, retardatum & anomalum mensium fluxum & nimiam corporis obesitatem: 2) Multum impedit conceptionem, quando ante justum terminum genitalia mulierum ad actus venereos urgentur: 3) præjudicatur enim ordini naturæ, quando hæc præmature citra internum suum sensum atque præparationem ad hoc negotium cogitur: 4) nisi prius legitime menses erumpant, non convenit genitalia mulierum ad alios irregulares humorum affluxus adigere; 5) hac enim præmatura copula ordo mensium imprimis suis initiis eximie turbatus fuit, hinc tantæ anomalix hoc mensium negotium comitantur: 6) quamdiu hæc confusio quoad menses in hac persona adest & durat, tamdiu nulla conceptio speranda & urgenda: 7) Etsi perversus mensium status deesset, vel ipsa sola obesitas sterilitatis causa esset, quoniam etiam intrinsecus nimia pinguedine organa muliebria prædita & onerata sunt, ut propterea ipsa natura mulierum hoc onere aggravata conceptionem respuat: 8) hinc observationes testantur, quod nimis pingues feminæ aut ægrius concipiant, aut facile abortiant, aut difficillime pariant: 9) Est vero hæc sterilitas utique curabilis, quando (1) menses in justum ordinem con-

vertuntur, (2) quando præjudiciofa ista obesitas minuitur; 10) posterius obtinetur per diætam temperatam: per infessus domesticos, per usum thermarum temperatarum internum & externum: per peregrinationes; per modicum vini usum, interea tamen hæc persona in cohabitatione matrimoniali moderamen observet, ne ulteriori genitalium irritamento motus simul confusi magis confundantur.

§. 14.

Ovariorum
læsio.

Ex ovariorum læsione eorumque per castrationem facta extractione omnia animalia ex ea ratione sterilefcere, quia ovula, in quibus conceptuum ideæ vel stamina delitescent, simul abolentur atque extirpantur, capite primo, paragrapho ultimo ex Johannis Conradi Peyerii *Merycolog. Lib. I. cap. 5. p. m. 48 seq.* demonstravimus. Rationes sterilitatis a fomitis simili declarat Michael Etmüllerus *Oper. Tom. I. fol. m. 168.* Sicuti, inquit, fomes humidus aut pinguis non facile inflammatur; sic ova uterina, si nimis humida nec spirituosæ sunt, minus possunt concipere nec incendi a spiritu genitali, sicut scintillula quædam, quæ promptè nimis extinguitur, fomitem non accendit. Hinc si spiritus genitalis maris minus spirituosus aut volatilis, dissipatur, & sic non sufficit, ut possit ovum rectè excitare & fœcundare. *vid. etiam Tom. II. f. 1079.*

§. 15.

Varie
causæ.

Sequentes sterilitatis feminarum causas collegit Michael Alberti *System. Jurisprud. med. cap. 2. §. 29. p. 45.* 1) Quando mulierculæ animo valde morosæ, iracundæ & immoderatæ sunt; 2) quando admodum valetudinariæ existunt & multa imbecillitate laborant; 3) quando frequentes arduasve mensium anomalias experiuntur; 4) quando repetitos abortus perpessæ sunt; 5) quando violentas mensium provocationes & eruptiones, ut & 6) stupendas uteri hæmorrhagias subierunt; 7) quando porro abor-

abortionis pocula hauserunt; 8) quando diutius fluore albo contaminatæ sunt; 9) quando feminarum uterus nimis angustus est, ut dilatationem respuat; 10) quando feminæ gravi prolapsu uteri laborant; 11) quando violentas & vehementes contusiones lumborum & genitalium perpessæ sunt; 12) quando muliebrem membrum alio translatus est; 13) si etiam alii fontici morbi uterum detinent, quales passim ab autoribus recensentur; 14) si clitoris enormi magnitudine prædita est, ut congressum maris respuat; 15) si tubæ Fallopiianæ occlusæ sunt; 16) quamdiu atrisia præsto est; 17) aut si uterus plane deficit; 18) vel si internum orificium uteri clausum est; 19) vel si nimia laxitas & latitudo in utero adest; 20) si uteri perversus situs accusari potest; 21) nec non si genitalia mulierum nimis arida sunt; 22) an vero vulva geminata aut uterus duplex generationem impediatur, nondum observationibus illustrarunt autores; huc pertinet 23) ovariorum defectus, vel 24) scirrhusa induratio. Quas causas adductas allegatus Alberti variis autoritatibus confirmat, vid. etiam Joh. Ben. Sini- bald. *Geneanthrop. Lib. VI. Tr. 2. p. 602 seqq.*

§. 16.

Secundum verba de Monsieur Dionis *des Accouchem. Lib. I. cap. 7. pag. 68. seq.* on distingue deux sortes de sterilité; l'une qui est naturelle, l'autre qui arrive par accident; par la naturelle on entend celle, qui vient par le vice de la conformation, la quelle on ne voit point, & à laquelle on ne peut apporter aucun remède; par celle qui vient par accident, on entend celle, dont on connoit la cause, & à laquelle le chirurgien peut remédier. La sterilité naturelle est celle, dont les parties de la matrice sont mal construites dès la première conformation, & qui par conséquent ne peuvent point faire l'action, au quel elles étoient destinées, comme un fond de matrice trop dure & trop solide, qui ne laisse point échapper par les embouchures des arteriolles, le

Dionis.

sang qui doit sortir tous les mois, & qui ne peut point recevoir les racines de l'œuf & du placenta: une trompe dont l'ouverture du côté de la matrice, qui étant bouchée ne permet pas à la semence de l'homme d'être porté à l'ovaire, ni à l'œuf de descendre dans la matrice; des ressorts de la trompe mal fabriquez, qui l'empêcheront d'aller embrasser l'œuf pour le recevoir, & le conduire où il doit aller; la membrane de l'ovaire trop épaisse, qui ne permettra pas à la semence de pénétrer dans l'œuf, ni de le laisser échapper. Or plusieurs empêchement de cette nature rendent une femme stérile pendant toute sa vie; celles qui ont eu plusieurs maris, & qui néanmoins n'ont point fait d'enfans, doivent être certaines, qu'elles ont quelque'un de ces défauts naturels, qui les empêchent d'en avoir. On renferme les causes de la stérilité par accident en quatre articles; le premier est la mauvaise habitude de tout le corps: le second, les impuritez, qui se jettent & qui s'écoulent par la matrice: le troisième, quand l'orifice interne est calleux ou recourbé: & le quatrième est, quand l'orifice externe n'est pas ouvert, comme il le doit être &c.

§. 17.

Divortium.

Ob ejusmodi feminarum sterilitatem idem autor *l. a. pag. 72.* divortium seu matrimonii dissolutionem concedi debere statuit, inquiens: ceux, qui ont passé un tems considerable dans le mariage sans avoir des enfans, sont obligez en conscience de consulter medecins ou chirurgiens de se baigner, d'aller prendre les eaux, & de faire & s'vivre ce qu'ils leurs prescrirent, d'avoir recours aux saints, faire pelerinages; & il pourra arriver, qu'après tout cela ils n'en auront point, mais ils n'auront rien à se reprocher; ils auront fait voir leur bonne volonté. Henri II. fut plusieurs années marié avec Catherine de Medicis, sans avoir des enfans. Le Roy consulta Fernel, son premier medecin, qui après avoir examiné d'où venoit le défaut

faut, lui enseigna la posture, dont il se devoit servir en caressant la reine, qui en eut sept tout de suite. Henri IV. ne pouvant point avoir des enfans avec la reine Catherine sa premiere femme, après nombre d'années passées, & avoit fait plusieurs remèdes inutiles: l'Eglise le separa. Il épousa Marie de Medicis, dont il en eut plusieurs; cequi fait voir, que la sterilité est une cause dela dissolution du mariage.

§. 18.

Cum vero liberos in matrimonio procreandi impotentia se- *Cantela.*
cundum plerasque observationes sæpius in maritis quam uxori-
bus lateat, vera sterilitatis causa, numque curabilis vel incur-
abilis sit, ante divortium est indaganda; vid. autem Paul. Zacch.
Quæst. med. legal. Lib. III. Tit. 1. Quæst. 7. fol. 280. sq. Solent etiam
doctores repudium connivere, si mulier sponsa medicamenta
sterilitatis sumserit, quia hæc nefario ausu finem matrimonii
principalem, nimirum procreationem sobolis, pessundat, nec
non summe peccat in proprium corpus, ac functionem partium
corporis, ad quam exercendam a creatore optimo maximo
creatæ ac æstimatæ sunt, vid. Joh. Georg. Nicolai *Tract. de Re-
pud. & Divort. Cap. 2. p. 86.* De tali divortio & quæstione, an
in divortiis matrimonii par esse debeat ratio mulieris ac viri?
ita judicat Johannes Riolanus *Anthropograph. Lib. II. c. 25. fol. 183.*
Vir judicatur ineptus ad generationem, nisi habeat arrectionem,
introductionem in finum muliebrem & ejectionem feminis:
ideoque, si mulier careat ejectione feminis, haud dubie sterilis
censenda & prorsus infœcunda. Cognosces ejaculationem fe-
minis ex voluptate in succussione lumborum & partium puden-
darum profusione. Sed astuta & versipellis mulier, quæ recu-
sat divortium, ista simulabit, nec facile potest deprehendi, quia
dicet se nihil emittere, nisi post actionem viri. Quapropter ist-
hæc causa divortii ex parte mulieris in familiis duntaxat prin-
cipum

cipum concedi potest, quibus proles est necessaria, non autem in vulgaribus familiis, quia multi hac de causa suas uxores lubenter repudiarent.

§. 19.

*Mularum
sterilitas.*

Mularum sterilitatis causam a defectu ovorum in ovariis derivant anatomici, siquidem Nicolaus Steno, qui primus hoc ovarium divulgavit, anno 1670. Johanni Swammerdamio retulit, mulas testiculos quidem habere, sed ovis carere, ut ita facile sit de causa sterilitatis earundem conjecturam capere, uti ipse Swammerdam in *Miracul. Natur. sive uter. muliebr. fabric. cap. 3. Biblioth. anat. Part. I. fol. 496.* refert. Mulam tamen etiam mulam peperisse, ex aliis autoribus allegat Georgius Francus de Franckenau *Satyr. med. IV. pag. 78.* de equa, inquit, mulam alia mula prægnantem pariente, vid. Torquemada *Dial. VIII.* Item de mula prægnante vid. Alex. Benedict. *de morb. curand. Lib. XXV. cap. 29.* quo tamen loco eandem observationem mihi reperire non licuit.

§. 20.

Plura de sterilitate ejusque signis & cura vid. Carol. Musitan. *de Morb. mulier. cap. 4. p. 96 seqq.* Christ. Joh. Lang. *Oper. med. Part. III. fol. 508 sq.* Mich. Ettmüller. *Oper. Vol. II. fol. 1078.* Joh. Varandæus *de morb. mulier. Lib. II. cap. 1. Oper. fol. 564 seq.*

SECTIO II.

De didymotokia seu gemellatione.

CAPUT I.

De Gemellorum ortu.

§. I.

*Gemello-
rum deno-
minatio.*

PER hætenus explicatam conceptionem in nostrarum feminarum ovariis plerumque & ordinarie unicum tantum ovulum, in brutorum autem femellarum ovariis plerumque duo vel plura ovula, a marium femine, dicto modo fœcundantur,

tur, uti in quibusdam animalibus, domesticis & feris, v. g. canibus, felibus, muribus, majoribus & minoribus, suibus, domesticis æque ac sylvestribus, quotidie videmus; quippe quæ unica vice interdum quatuor, sex, octo vel decem & plures foetus pariunt. Id quod tamen etiam quandoque in ovariis humanis accidere, testantur plurium foetuum partus, quibus interdum duo, tres, quatuor vel plures uno eodemque fere tempore eduntur, quapropter etiam gemelli, trimelli vel trigemini vocantur; de quibus agendi magis equidem conveniens locus videtur tractatus de Partu; quia vero gemellorum principium statim a conceptione dependet, nobis etiam non solum ipsorum generationem seu conceptionem, verum etiam varia ad eosdem spectantia hoc loco in ferere liceat.

§. 2.

Sunt autem gemelli, græce *δίδυμοι*, de quibus hic loquimur, *Definitio.* juxta Christiani Frid. Garmanni *Disput. de Gemell. & Part. numeros. sub Godofr. VVelschii Præsidio Lips. Anno 1677. habitæ cap. 1.*

§. 4. conceptus in utero geminatus, speciei humanæ conformis, separatus, quorum uterque peculiaribus involucris, peculiarique placenta gaudet, a spirituum mechanicorum feminis proprietate & materiæ aptitudine dependens, quique uno aut saltem mox iterato congressu fit, & unico partu, quamvis successive excluditur.

§. 3.

Circa causas & originem gemellorum diversas olim fovebant *Causa.* autores sententias, dum alii eandem in cœlo, seu astris, alii in utero ejusque sinuum seu cellularum varietate, alii in utero bipartito, alii in ejusdem majori quantitate, alii cum Hippocrate in feminis copia & in partes divisione quærun, ita scilicet, ut, si quædam feminis portio in dextram, quædam vero in sinistram uteri partem dilabatur, duplex fiat partus. Verba Hippocratis de gemellorum generatione *Oper. Sect. III. de natur. puer. fol.*

m. 28 seq. sic sonant: Gemelli ex uno veneris complexu procreantur ad hunc modum. Uteri sinus plures & incurvos habent, hos quidem longius distantes, illos vero pudendo viciniore. Et ex animalibus, quæ plura gignunt, plures sinus habent, quam quæ pauca. Quod in avibus, feris & volucribus ad eundem se habet modum: Cum genitura ad duos sinus divisa pervenerit, eamque uteri receperint, neque sinus alter ad alterum transmiserit, ea utroque sinu separata membrana vestitur, vitamque eo modo accipit, quo & unus foetus. Quod vero ex uno congressu gemini procreentur, hoc argumento constat. Canis, fuscus & alia animalia uno congressu duos & plures foetus pariunt, quorum quisque in utero suo sinu & membrana conditur. Atque hæc ipsi contingere cernimus, eosque omnes eodem ut plurimum die parere. Ad eundem quoque modum in muliere, ex uno veneris complexu nati gemelli, uterque suo sinu & involucro conditur, & eadem die in lucem prodit, alterumque prius, cum suo involucro foras egreditur &c.

§. 4.

In ovulis.

Cum autem juxta recentiores anatomicos & ipsam avtopsiam nulli in utero appareant sinus vel cellulæ, quod etiam confirmat Amatus Lusitanus *Curat. med. Cent. I. curat. 27. fol. m. 55.* inquiens: cum mulier Ferrariensis ob difficilem partum mortua esset, eam aperuimus ac dissecavimus, geminos enim in matrice completos habebat, masculum & feminam, & illos quidem mortuos; inde extracta matrice, percepimus falsum esse, quod quidam dicunt, in matrice locellos plures esse, cum revera matrix, sive uterus, similis vesicæ sit, in qua præter communem quandam cavitatem, nulla altera apparet. Cum insuper etiam neque feminis copia, neque ejusdem in duo uteri latera divisio ad gemellorum originem sufficiens videatur, siquidem foetus non ex semine virili, sed ex ovulo muliebri, vel ejusdem cicatricula, uti hæc-

hactenus monstravimus, generatur; hinc etiam non immerito gemellorum ortus pariter in ovulis duobus, vel pluribus querendus erit. De veterum circa gemellorum generationem errore, ita scribit Johannes Sigismundus Elsholtius: Quantopere hactenus gemellorum origo philosophantium animos torserit, in propatulo est. Qui in cellulas uteri causam retulere quondam, suam in rebus anatomicis prodiderunt ignorantiam. Seminis copia, aut in partes divisio non explebat etiam mentes acutius cernentes: Multo minus uteri paulo major, quam feminis communiter esse consuevit, amplitudo. Ita problema hoc inter incerta ad nostrum usque ævum jacuit. *vid. M. N. C. Dec. I. An. 6. & 7. Obs. 198. p. 293.* quo loco etiam sententiam de ovulis amplectitur.

§. 5.

Sicuti autem in genere ad conceptionem non modo ovula, ^{Semen spirituosum.} sed ad horum quoque imprægnationem efficax simul, sive satis spirituosum semen virile requiritur; ita etiam ad duo vel tria pluraque ovula fœcundanda sufficiens dicti feminis vis spirituosa, insuper etiam tot ovulorum muliebrium maturitas necessaria est. Unde Theodorus Craan *de Exort. sive Generat. Homin. Quæst. 5. p. 279.* ad quæstionem, quomodo generentur gemelli? ita respondet: Veteres medici voluerunt, uterum distinctum esse in tot cavitates sive cellulas, ope membranarum a se invicem distinctas, quot fœtus in utero generentur, sed experientia plane contrarium docet; uterus enim non nisi unam & continuam habet cavitatem. Hoc tamen certum est, si plures fœtus simul in utero generentur, quod unusquisque suis propriis includatur membranis. Cæterum duo, tres, quatuor & plures concipiuntur fœtus, quando nimirum semen masculinum fuit valde spirituosum, ita, ut vel tria, vel quatuor ovula simul fuerint imprægnata pari felicitate per tubas Fallopianas compulsa ad uteri fundum, quorum singula ibi progerminent.

§. 6.

Gemella-
tionis mo-
dus.

ex ovis ge-
minatis.

Variis scilicet modis accidere potest gemellatio five duorum vel plurium foetuum conceptio, & primo quidem ex uno eodemque ovulo, si nimirum in ovario, five dextro, five sinistro, ovulum aliquod geminatum, five in quo duorum foetuum stamina vel germina, per tenuissimam membranulam distincta, latent, a prima formatione hærens coitu fecundetur; qualia ova geminata seu binis vitellis dotata sæpius a gallinis excerni videmus & legimus. Inquit enim Aristoteles *Histor. Animal. lib. VI. cap. 3. fol. m. 417.* dari ova gemina, quæ binis constant vitellis: qui, ne invicem confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis medium; aliis vitelli contactu mutuo sine illo discrimine junguntur. Sunt in genere gallinarum (five sunt nonnullæ gallinæ,) quæ pariunt gemina ova; quædam enim duodeviginti peperit gemina exclusitque, præterquam si qua essent (ut fit) irrita. Scribit etiam Guilielmus Harvæus *Tr. de Generat. Animal. Exercit. 24. de ovis gemelliferis p. m. 139.* se vidisse sæpius ova gemellifica, quorum singulos vitellos bina albumina ambiebant, cum membranis communibus propriisque singillatim obvolventibus. Item inquit se alia quoque ova vidisse cum binis vitellis, quasi connascentibus, quibus utrisque unicum albumen commune circumfundebatur. Apud nos interdum gemellifica ova nascuntur, & gemelli quoque aliquando, licet rarissime, excluduntur. Talia ovula gemina vel duplicia, five duplici dotata vitello equidem concedit etiam Hieronym. Fabricius ab Aquapendente *de Format. Ovi & Pull. cap. 8. fol. m. 15.* ex ipsis tamen non gemellos, sed pullos tantum quodammodo duplices vel monstrosos, nimirum cum duobus capitibus, quatuor cruribus & similibus gigni statuit. Item Albertus Magnus de Animalibus ita scribit: Inveniuntur ova, ex quibus exeunt gemelli, eo quod duas habeant gemmas & duo citrina, inter quæ est tela subtilis. Sunt enim gallinæ quædam, quæ quasi faciunt ova gemellina, ita quod inventa est apud

Mace-

Macedones gallina, quæ octodecim fecit ova, & quando cubavit ea, ex quolibet eorum exiverunt duo pulli, ita ut ex octodecim ovis sex & triginta produxerit pullos. Porro inquit Aristoteles: Quædam gallinæ habent quasi in proprietate naturali, facere hujusmodi ova duplicium gemmarum. Et illæ sunt, quæ habent matrices longas & largas, quæ moventur in receptione feminis galli. Motus enim matris facit spermatis divisionem. Et tunc aut duo ova, aut unum duplicis gemmæ concipiunt. &c. v. *M. N. C. Dec. I. an. 3. obs. 188. p. 350.* Vid. etiam Joh. Frider. Ortlob. *Histor. Part. Dissert. 35. §. 15. p. 280.* & Jason a Pratis de uteris *Lib. I. cap. 3. p. 72.* inquit: Vitella in ovo si distinguuntur membrana, gemini pulli discreti sine ulla supervacua parte generentur. Exemplum ejusmodi ovorum geminorum sive prægnantium commemorat Thomas Bartholinus *M. N. C. An. I. obs. 36. p. 120.* Ovum, inquit, prægnans alio ovo hisce diebus anno 1669. rusticus mihi ostendit &c. Ovum duplici vitello præditum annotavit Ehrenfridus Hagedorn *l. a. An. 2. obs. 241. p. 342.* inquit: Gorlicii asservatur apud virum optime mihi notum gallina, quæ aliquoties peperit ova duplici vitello prædita tantæque magnitudinis, ut anserum æquarent ova. Ejusmodi ova duplici dotata vitello aliquoties mihi ipsi observare contigit.

§. 7.

Sicuti proinde ex binis in uno ovo gallinaceo latitantibus vitellis bini pulli perfecti, vel monstrosi generari possunt, ita quoque cum ovulis ovariorum muliebrium, secundum quosdam au- Ex binis
staminibus
in uno ovo. tores se res habet, ut in unico ovulo binorum foetuum staminina lateant, vel juxta Joh. Jac. Fr. Vicar. *Basf. Medic. Lib. I. cap. 3. p. 31.* duo ova in una vesicula contineantur simulque coitu foecundo imprægnentur. Quod etiam unica cella major in ovariis post partum gemellorum reperta confirmat. Unde ad Henricum Volgnadium *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. obs. 198. p. 293.* perscribit Johannes Sigismundus Elsholtius: Meministi, mi Vollgnadi, haud ita pri-

dem in observatione nostra de ovario humano atque tubis ad te missa, pingi cellam ovarii unam grandiusculam & materia rubenti spongiæ simili obductam, ex qua suspicabar tunc, devolutum fuisse ovum pro conceptione gemellorum, quos postremo partu femina illa ediderat. Profecto hac in opinione ego roboror indies, & naturæ magnum ibi mysterium videre mihi videor. Illius enim cellæ præ cæteris omnibus capacitas insignis quid arguit, nisi in ipsa hæssisset ovum simplex reliquis majus, aut duo ova cæteris æqualia. De priori, si unicum peperisset foetus mater, nemo dubitaret: jam vero, ubi de gemellis, hoc ultimo partu editis constat, posterius verum esse conjicio, nimirum cellam illam haud complexam esse ovum simplex, sed bina ova, membrana tantum tenui intersepta. Cellæ enim suis singulæ septis carneis sat crassis ab invicem distinguuntur, atque ova ut plurimum simplicia complectuntur; Quotiescunque vero in cella una geminatum ovum hæret, istamque cellam aura seminalis in ecstasi venerea attingit, tunc ex ovo illo gemello in uterum devoluto, non nisi gemelli, me judice, nasci poterunt. Atque hanc esse veram atque unicam gemellorum originem, hucusque incognitam, arbitror. Sic Johannes Mauritius Hoffmannus in *idea Macklum. Anat. Physiolog. Sect. XII. §. 5. p. m. 91.* inquit: Fit conceptio primaque futuri embryonis efformatio, & quidem modo unius, modo gemelli, trimelli, quadrimelli, prout unum vel totidem numero, ovula feminis masculini spiritu imprægnata fuerint, quamvis non impossibile sit, unum etiam ovum gemini foetus stamina comprehendere posse, eo quod talis quandoque visus fuerit simplici membranarum utrique communium ambitu cinctus. Posse autem ex uno simplici ovo gemellos nasci, secundum Michael. Ettmüller. *Tom. I. fol. m. 163.* probabile reddit monstrum illud biceps, de quo Brunnerus peculiari Dissertatione agit, quod revera in ovo simplici genitum omnino videbatur. Et Johannes Bohnius *Circul. anat. physiol. Progymn. I. p. 22.* non pro plane impossibili habendum

dum cenſet, ex uno ovulo aliquando prodire gemellos, ſimili forſan ratione, ac interdum unum frumenti granum plures ſpicas promit. Ova gallinarum duplici vitello, albumine & cicatricula prædita gemellifica deprehenduntur: quales illos potiffimum credere fas eſt, gemellos, qui diſtinctis includuntur involucris. Juxta Joh. Gothofr. Bergeri *Phyſiolog. med. lib. II. cap. 1. p. 465.* poſſunt etiam ex uno ovo gemelli excitari, uti ex uno tritici grano, vel alio quovis femine, ſive ovulo vegetabili, duplex imo multiplex interdum ſpica provenit, & ex unius ovi gallinacei duplici vel triplici cicatricula totidem pulli enaſcuntur. Et Lucas Schroëckius *Additam. in Joh. Helwig. obſ. 13. pag. 39.* inquit, ſi duplex reperiatur concretus in ovo orbiculus a natura, quæ ludere ubique, præcipue etiam in ovis, ſolet (quod v. g. duplex in multis gallinarum ovis vitellus loquitur, ex quibus ovis duplices oriuntur pulli, atque monſtra exin gallinacea, partibus quibusdam abundantia, prodire poſſunt,) non poterit non exin foetus duplici e corpore conflatus inde produci.

§. 8.

Deinde quoque ex binis unius ejusdemque ovarii ovulis, inter ſe connexis, ſibi que arcte adhærentibus, gemellos oriri nonnulli ſtatuunt, ſiquidem Gerardus Blaſius *Obſerv. med. Part. V. obſ. 4. p. 66 ſeq.* poſtquam in cadavere mulieris viginti ſeptem annorum, (quæ non ſemel gemellos pepererat, jam undecim liberorum mater) non tantum extra teſticulum ſiniſtrum ovum aliquod hæſiſſe, membranis ſingularibus involutum, verum etiam ex ipſo teſticulo ovorum par non unum, quæ ſibi arcte cohærebant, viderat, eademque ovula ſeparaverat, gemellorum generationem exinde deduci poſſe, non dubitat. Juxta Marc. Gorbez. *Chronolog. med. præſt. An. V. §. 26. p. 353.* ſunt gemelli ſubinde eiſdem membranis incluſi, & propterea in ſtatu præternaturali concreti; non ſecus ac ſubinde videmus in vegetabilibus duos nucleos uni cortici incluſos, duobus ſurculis propellendis deſtinatos, duo vel plura germi-

*ē duobus
ovulis ſibi
annexis.*

germina eidem tritici grano inexistencia, totidem culmis protrudendis destinata. Gemellos foetus ex gemellis ovulis tertiæ cui-dam membranulæ inclusis, ita tamen, ut hæc totaliter a se invicem divisa, generari, secus si in parte quadam cohærentia fuerint, monstra progigni scribit Joh. Barthol. Adamus Beringer *Institut. medicin. lib. I. Th. 15. p. 37 seq.* Et secundum Stephan. Blancard. *Institut. medicin. cap. 25. p. 274.* si duo ova arctius sibi adhærent, gemellorum conceptio est. Quod si bina talia ova arctius propriis tunicis sibi fuerint connexa, ita ut integra & absque laceratione ab invicem divelli nequeant, quin præter æqualem molem & æqualitatem & imprimis talem conglutinationem, ovarii carceribus simul extrusa suscipiantur & hinc foecundentur, gemellorum etiam conceptionem fieri probabiliter asserit Schraderus, de muliere, quæ mense sexto ex abortu gemellorum interiit, observatis vestigiis seu foraminibus duorum ovorum juxta se invicem conditorum, vid. Mich. Ettmüll. *Oper. Tom. I. fol. 163. item Tom. II. fol. 1073.* Hanc autem observationem Justus Schraderus *de observat. Harvei Præfat. ** b.* ex Swammerdamio sequentibus verbis recenset: Femina sex menses gravida, postquam gemellos exanimes pepererat, vivere desiit; aperto ejusdem cadavere occurrit uterus magnitudine caput infantis æquans, in cujus cavitate nil nisi sanguis concretus delituit. Testiculus dexter nullam alterationem passus, sed plane integer; in sinistro vero visa est quædam quasi inflammatio, præterea notabilis cicatrix, qua divisa corpusculum heterogeneum fibrosum, subflavum, duplici foveola præditum sese obtulit, omnia hujus testiculi ova ejusdem fere magnitudinis fuerunt, mirisque vasorum plexibus & cincinnis exornata, quædam substantiæ testis altius immerfa, alia superficiei & tunicæ investienti magis vicina; porro aliquot eorundem paria, (singula scilicet) tam arcte propriis tunicis sibi invicem fuerunt connata, ut integra & absque laceratione neutiquam potuerint divelli; quale par e mox memorata foveola, gemino sinu

con-

constante, procul omni dubio exciderat. In cujusvis ovi liquore accurate intuenti observata est mica candidior, instar quarti officuli auditus, ovorum in spiritu vini per tres quatuorve dies infusorum liquor circa micam istam factus est mucilaginosus & spissior, quemadmodum fere vini spiritus affuso spiritu urinæ (si nempe uterque probe rectificatus fuerit) in mucaginem quandam degenerare solet.

§. 9.

Sæpius etiam pro gemellorum generatione bina ovula, arcte sibi non cohærentia, sed modo in uno eodemque, modo in utroque ovario existentia, dummodo sint matura, simul & unico coitu, imprægnari posse, non dubitant medici, siquidem Fridericus Hoffmannus *Fundam. medicin. cap. 8. p. 53.* inquit: si duo ova simul sunt matura & simul foecundantur, tunc gemelli fiunt. Et juxta Petri Dionis *Anatom. corp. human. Demonstr. 4. pag. 227.* gemelli semper formantur ex binis ovis, quæ simul & semel ex ovario exsoluta fuerunt vel, secundum ejusdem Dionis verba des Accouchemens *Lib. I. cap. 2, p. m. 36.* les gemeaux viennent toujours de deux oeufs, qui se sont detachez en même tems de l'ovaire. Et secundum Carol. Drelincurt. *de Concept. conceptus Periœch. 19. pag. m. 17.* attendere est, ovum unicum, utero exceptum, undantaxat embryoni, ex semine maris, formando perinde destinari, ac unicum tritici granulum terræ gremio creditum, uni spicæ, ex germine suo procreandæ, determinatur. Sic insuper ova bina, (vel ab uno duntaxat testiculo, vel ab uno in simul & altero) in uterum immissa masculoque femine turgida, gemellis delineandis atque producendis (haud secus ac tritici grana duo in terram projecta spicis duabus erupturis) præstitui. Id quod Johannes Baptista Verduccius *de l' Usage des Parties, Tom. I. cap. 1. p. m. 41.* his verbis exprimit: de même, qu'un sel grain de semence ne produit qu'un arbre; de même aussi un seul œuf ne contient qu'un fœtus: ainsi quand on en voit deux, c'est qu'il s'est detaché deux œufs de

ex binis ovulis in uno vel duobus ovariiis.

l'ovaire, qui sont descendus dans la matrice, de même qu'il faut deux grains pour deux plantes. Il n'est pourtant pas impossible, qu'un seul œuf renferme deux foetus, comme on voit, qu'un grain de bled pousse plusieurs épis, parceque cet œuf peut être double, & renfermer deux cicatrices, deux jaunes & deux blanc, comme on le voit quelque fois dans les œufs des poules, ainsi qu'on l'a fait remarquer. Et secundum Joh. Jac. Francisc. Vicar. *Bas. univers. medicin. lib. I. cap. 3. pag. 31.* gemelli generantur dupliciter, vel enim duo ova in una vesicula continentur, vel in diversis vesiculis. Et juxta Petri Linsing. *Institut. med. p. m. 87.* gemellatio fit 1) dum spiritus genitalis duo ovula propriis tunicis sibi arcte connata foecundat, tubaque orificio excipit ambo, utpote non nisi vi separabilia: 2) dum spiritus genitalis ad utrumque delatus ovarium utrinque ovulum foecundat, 3) dum unum simplex ovulum duplices habet dispositiones ac delineationes, ut hoc a spiritu maris genitali foecundatum & utero apportatum geminos constituat: sic constat, geminos nunc simplici, nunc duplici involutos esse tunica. Sic Marco Gerbezio *Chronolog. med. pract. An. 5. § 26. p. m. 353.* gemellos, vel etiam plures foetus concipi tunc probabile est, cum bina vel plura ova eadem vice sunt adeo adulta, ut singula idonea sint actu recipere vim imprægnativam seminis virilis. Inde etiam fieri, quod gemelli subinde sint eisdem membranis inclusi, & propterea in statu præternaturali concreti, subinde autem singuli partus singulis. Non secus, ac subinde videmus in vegetabilibus duos nucleos uni cortici inclusos, duobus furculis propellendis destinatos, duo vel plura germina eidem tritici grano inexistencia, totidem culmis protrudendis destinata.

§. 10.

ex pluri-
bus con-
gressibus.

Posse autem feminas non solum unico coitu, sed etiam pluribus eadem nocte, vel post breve temporis spatium, reiteratis congressibus, gemellos concipere; testatur femina gemellos pariens, quæ

quæ sponte confitebatur, conceptionis nocte ter maxima cum voluptate a marito amplexam fuisse. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. pract. obs. 69. Schol. §. 4. p. 906.* Quo loco etiam monstrat, gemellorum conceptionem accidere posse, si in unico congressu semen foecundum bis a mare ejaculetur; idque pariter sequenti exemplo confirmat: Servus quidam cujusdam opilionis filiam in Apenburg vehementer amans, cum ab ejus patre, quia antea aliam imprægnaverat, matrimonii consensum impetrare non posset, filiam ex mutuo amore certeque inde subsecuturo matrimonio persuasit, ut, in loco aliquo determinato congregarentur, quo pater ad consensum cogeretur. Imprægnata filia duos peperit filios, in examine judiciali, ad quæstionem, quoties cum illa rem habuisset, servus confessus est semel, in isto vero actu venereo bis semen evacuassee. Circa quas tamen observationes, & quidem circa priorem dubium oriri posset, quod licet allegata femina, secundum propriam confessionem, unica nocte tres congressus cum marito celebraverit, in ipsius tamen ovariis statim a primo, tanquam spirituosiori & efficaciori coitu, duo ovula simul foecunda reddi potuerint. Quod etiam circa alteram observationem, qua opilionis servus in uno actu venereo, bis (si verum est) semen ejaculasse dicitur, pariter statuendum, quod nimirum prima seminis virilis ejectio ad duo ovula simul imprægnanda sufficiens adeoque dicti gemelli revera unico coitu concepti fuerint.

§. II.

Quamvis etiam Paulo Zacchiæ *Conf. 66. op. Tom. III. fol. m. 127. n. 21.* libenter concedamus, dupliciter posse dici, duos foetus esse simul conceptos, nempe aut uno eodemque coitu, aut una eademque nocte, sed replicato coitu; dupliciter tamen mihi etiam gemelli videntur considerandi, vel ratione conceptionis, vel ratione partus. Gemelli proprie vocantur illi foetus, quando vel unicum ovulum geminatum, in uno ovario, vel etiam duo, in uno vel ambobus ovariis

Gemelli

quid proprie sint?

contenta, ovula, unico coitu simul foecundantur. Deinde gemellis quoque annumerantur illi foetus, quorum ovula, non uno eodemque momento ac coitu, sed post aliquot horarum vel etiam dierum spatium, & quidem mediante novo congressu, in motum & vitam excitantur, nihilominus tamen, quandoque placentis suis connectuntur, vel coalescunt, demumque uno eodemque partu vel paulo post, ex utero materno prodire solent. Porro etiam vulgo vocantur gemelli, qui, licet nec eadem nocte, nec hebdomade, nec eodem mense, sed quandoque post longius temporis intervallum concepti, postmodum tamen eadem fere hora vel die, cum alio & priori embryone, a quo tam ratione magnitudinis, quam aliorum signorum atque maturitatis differunt, minores & immaturi adhuc, simul a matre excluduntur; qui vero potius ad superfoetatos quam gemellos referendi sunt, nisi gemellorum nomen tantummodo iis impertire velis, qui uno eodemque partu nascuntur.

§. 12.

*Gemellatio
frequens.*

Nonnullis etiam familiis familiare quid est, ut feminæ gemellos concipiant & pariant. Scribit enim Johannes Riolanus *Anthropogr. libr. I l. cap. 35. fol. m. 197.* se novisse mulieres, quæ singulis conceptionibus geminos proferebant, quod sit quibusdam familiis gentilitium. Mulieris novies gemellos parientis exemplum communicat Ehrenfridus Hagendorn *Histor. med. phys. Cent. III. hist. 7. p. 291.* In oppidulo *Neustädte* Marchiæ vixit faber quidam stannarius, cujus uxor novies continua serie peperit gemellos, eosque propemodum singulos masculini generis (sexus) præter unicam filiolum, ex quibus bini cum patre per incendium oppidi periere, reliquis autem in vivis adhuc agentibus. De Danielis Geigeri, medici Pofoniensis matre, novies gemellos, dein duabus vicibus singulos foetus pariente, vid. Georg. Franci *Annotat. in Paul. Zacchiæ Quæst. medico-legal. lib. I. Tit. 2. Qu. 8. fol. m. 77.* quo loco etiam ex Plinio mulieris Ægyptiacæ, quater binos foetus enixæ, memi-

meminit. Musici cujusdam uxor tam foecunda fuit, ut intra octennium decem foetus, & inter hos ter gemellos enixa fuerit, ita quidem, ut prima vice duæ filiolæ, secunda filiulus & filiola, & tertia duo filioli in lucem prodierint. vid. Viti Riedlin. *Linear. med. An. 1696. Januar. obs. 30. p. 49.* Andreæ Eberhardo Raubero imperatoris Maximiliani II. consiliario, viro ultra tres ulnas longo, ex secunda conjuge octo gemellorum paria nascebantur. vid. *Monatl. Unterred. von allerhand Büchern 1690. Novemb. p. 1062.* Feminam quandam Peloponnensiam quinquies quaternos liberos enixam esse refert Simon Majolus *Dier. canicul. Tom. I. cap. 3. fol. 41.* vid. etiam Aristot. *Histor. animal. Lib. VII. cap. 4. fol. 435.* Utrum vero ad crebriorem gemellationem, secundum Conradi Bertholdi Behrens sententiam, *Ephemerid. Cent. III & IV. obs. 159. p. 365.* a parte matris, organica partium ejusdem uterinarum conformatio, an potius magna ovulorum in ovariis copia eorumve cohæsiō, vel etiam ingens virilis feminis vis plastica, ad plura ovula unica vice foecundanda concurrat, quilibet judicet. Foecunditatem feminarum Scoticarum in ovariorum dispositione ac ovulorum pluralitate derivat Johannes Sigismundus Elsholtius *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs. 198. p. 293.* inquit: Ad trigeminos quod attinet, cellam unam interdum trina, fortassis etiam pro pluribus plura ova continere, probabile est: Neque absurde adeo hinc inferretur, in feminis Scoticis esse ovaria ea foecunditate disposita, ut cellæ pleræque plusculis farciantur ovulis, cum gemellorum atque trigeminorum partus ibi sint adeo frequentes.

§. 13.

Cur autem non semper vel sæpius nascantur gemelli, cum ta- *Gemelli cur*
men bina sint ovaria? ad hoc reponit idem Elsholtius *l. a. Obs. non semper*
196. p. 288. rem ita se habere in Scotia & forte aliis nonnullis re- *nascantur.*
gionibus, ubi feminæ uno partu ut plurimum binos, quandoque

etiam plures foetus; sub nostro autem climate, quod gemelli rarius nascantur, nisi ex coelo atque astris causam deducere placuerit; varia tamen impedimenta hujus rei alia ex vitio conformationis, obstructionis, compressionis, aut intemperiei dextrae sinistraeve tubae intervenientia afferri possunt: Attestante hoc sectione cadaverum femininorum, dum partes illae generationi dicatae in alterutro latere non raro male affectae conspiciuntur. Mihi tamen magis probabile videtur, causam unius, duorum vel plurium foetuum in ovulorum maturitate & immaturitate consistere, ita ut, quando bina ovula aequaliter sint matura, concipiantur gemelli, si plura, plures foetus. Id confirmat etiam Marcus Gerbezius *Chronolog. medico-pract. An. V. §. 26. p. 353.* Gemellos, inquit, vel etiam plures foetus concipi tunc probabile est, cum bina vel plura ova eadem vice sunt adeo adulta, ut singula idonea sint actu recipere, vim impraegnativam feminis virilis.

§. 14.

*Trigemi
& plures
foetus.*

Quod haecenus de gemellorum conceptione diximus, idem etiam in trigeminis & quadrigeminis & pluribus foetibus locum habet. Inquit enim Aristoteles *de Histor. Animal. Lib. VII. cap. 4. fol. m. 435.* Saepè & locis plerisque, ut in terra quoque Aegypto, geminos fieri, certum est. Pariunt etiam tres & quatuor, & quidem locis nonnullis valde ita fit, quod dictum jam est, sed quinque complurimum nascuntur. Jam enim hoc pluribus evenisse conspectum est, & quaedam viginti, partibus quatuor, edidit, quinos enim singulis partibus enixa est, majorque eorum pars enutriri & adolescere potuit. Sic Michael Ettmüllerus *Oper. Tom. I. fol. 163.* scribit: Quod si duo simul foecundentur ovula, fiunt gemelli; quando tria foecundantur, fit trimellus; si plura, plures oriuntur foetus, pro numero scilicet ovorum, in uno aut pluribus se invicem subsequentibus congressibus, a spiritu maris genitali, tanquam a gallo foecundatorum & in utero retentorum. Et secundum Carol. Drelin-

curt.

curt. de concept. Conceptus Perioch. 19. p. 18. triplex, quadruplex & quintuplex ovum, mascula virtute prægnans, tres quatuorve vel etiam quinque foetus una vice progenuisse, a me Parisiis visum est.

§. 15.

Cum autem varia hinc inde reperiantur gemellorum exempla, pauca tantum hoc loco adducere liceat, Hafniæ 1661. mulier quædam plebeja gemellos peperit, utriusque manu sex digitis aucta & ornata, referente Thoma Bartholino *Epistol. medic. Cent. III. Ep. 92. p. 397 seq.* Gemello-
rum exem-
pla. Duas puellas mortuas, intra trihorium natas, annotavit Lucas Schrœckius *M. N. C. Dec. I. An. 9. & 10. obs. 61. p. 354 seq. ibidem obs. 62. p. 356.* filiolas quoque binas paucò temporis intervallo natas addit, quarum altera per tempus supervixit, altera mortua nascebatur, foetum quinquemestrem longitudine, iusta articulorum compagine, nisi quod a capite in acumen strigato ad pedes usque quasi studio duos inter asseres leniter compressa esset, præsentans. De gemellis, quorum alter uteri orificio inhærebat, alter vero, matre mortua, viam exeundi per latus sinistrum sibi faciebat, observationem recenset Johannes Christianus Menzelius *M. N. C. Dec. III. An. 4. Obs. 121. p. 251 seq.* Germanicis verbis ipsi communicatam: *Eine vornehme adeliche Frau lasset zur Zeit ihrer Geburt eine Heb- Amme und einen Medicum fordern: es hält sich aber die Frucht so sehr zurücke, so, daß der Medicus ungemeine treibende Dinge verordnet. Summa, die Frau bekommt eine Ohnmacht über die andere, und stirbet nach aller Meynung, und bleibt die Frucht in der Geburt stecken; man leget sie auf das Stroh; des Morgens, da die Leute wiederum in die Kammer kommen, finden sie, daß die Frucht in der Geburt noch stecke, allein eine andere Frucht oder Kind bey ihr liegen, welches sich mit grosser Gewalt in der lincken Seite durchgearbeitet, und ein Loch fast Spannen lang gemachet.* De gravida interfecta gemellos enitente hanc observationem refert Philippus Salmuth *Obs. med. Cent.*

Cent. II. obs. 1. pag. 60. Prope Halam Saxonum nobilis quidam iter faciens perdit bulgam ex ephippio dependentem. Hanc reperit femina quædam gravida. Obvium hæc habet clericum quendam, cui monstrat hippoperam, eamque se reperisse ait. Bene ait ille & illam paulisper comitatus interficit capite prorsus abscisso, peramque secum aufert. Nobilis hanc amissam forte percipiens via illa revertitur feminam reperit interfectam & quidem gemellos enixam. Persequitur latronem, quem peram ex brachio adhuc gestantem offendens quærit, unde illam acceperit? Hic obmutescit: Arguit eum nobilis homicidii, fatetur, in carcerem conjicitur. Et de muliere, quæ suspenfa gemellos peperit, ex Pauli Eberi Calendario historiam recenset Diomedes Cornarius *Histor. admir. 4. p. 47. Anno 1567. die 14. Junii* inter Daventriam & Sutphaniam ab Hispanis maritus cum uxore gravida suspenduntur. Uxor quum pependisset per horas quatuor, gemellos vivos mortua peperit. Gemellorum partum laboriosum observavit Justus Fridericus Dillenius in femina nobile, cujus alter foetus post præmaturum aquarum effluxum veris partus doloribus excitatis alterutrius pedis digitos primores ex utero matris exserere coepit, altero pede tantisper in utero remanente, donec obstetricis manuali opera uterque pes una cum cruribus & abdomine axillas tenus in lucem prodiret; tunc obstetrix manum amplius adhibere nolebat, verita, ne, si fortius corpusculum attraheret, caput ab eo avulsum in utero maneret. Alia requisita obstetrix manibus oleo liliorum alborum probe perunctis genitalia parturientis leniter ampliabat ac dilatabat: chirurgus vero prehensa utraque manu foetus jam mortui coxendice utraque caute ac provide eandem ex utero extrahebat, simulque cavebat, ne corpusculum a capite amitteret. Biduo rursus elapso alter ejus sexus foetus vivus naturali partu a puerpera nobilissima fuit exclusus. vid. *Ephemer. Acad. N. C. Cent. VII & VIII. Obs. 42. p. 88 seq.* ubi similem gemellorum

rum

rum a matrona nobilissima 1715. sed intervallo trium septimanarum in lucem editorum, historiam sibi a Johanne Christophoro Jæschio relatam annectit. Aliud gemellorum exemplum, quorum alter vita privatus, rescisso primum brachio, feliciter extractus, alter partu editus est, refert Vitus Riedlinus *Millenar. Curar. medic. Cent. IV. obs. 378. p. 225.* Geminos, diversi sexus contra veterum sententiam in hominum genere non solum generari, sed etiam servari, probat Rodericus a Castro *de Nat. Mulier. Lib. III. cap. 13. p. 248.* Exemplo fratris & sororis gemellorum, quorum iste Franciscus a Costa gemellus fuit cum sorore Leonora Pez, quorum uterque quadragesimum fere egit annum, atque ille non solum viribus corporis, verum etiam animi ornamentis, virtute, prudentia & morum integritate fuit conspicuus: Soror vero, quæ illum uno die tantum prævenit, numerosam habuit prolem.

§. 16.

De trimello ad Georgium Segerum scribit Thomas Bartholinus *Epist. med. Cent. III. Epist. 62. p. 250.* quod in vicinia Hafniæ uxor militis paupercula, mater antea octo liberorum trimellos peperit, sed abortivos, primam scilicet filiam die lunæ, medium filiolum die Martis, tertiam filiolum die Jovis. Trinos filios simul exclusos annotavit Gabriel Clauderus *M. N. C. Dec. II. An. 4. obs. 151. p. 286.* De muliere, quæ anno 1694. tres filias, viginti quatuor horarum spatio peperit, *Dec. III. An. 2. obs. 175. p. 267.* vid. etiam Thomæ Bartholini *Histor. medic. Cent. IV. obs. 83. p. 402.* Femina militis decrepita una vice tres vivas peperit filias, quæ intra spatium octidui superstiti matre, animas exhalarunt omnes, teste Johanne Dolæo *M. N. C. Dec. I. An. 9. & 10. obs. 138. p. 311.* De trimellis ita scribit Petrus Dionis des Accouchem. *Lib. II. chap. 3. p. 135.* J'ay veu une jeune femme qui dela premiere couche accoucha de trois garçons. J'ay encore vû la femme d'un' Apoticaire de Befort, qui étoit accouchée deux mois auparavant de

Cc

trois

Syllepsilogia.

trois garçons. Madame d'Arnoton, femme d'un Maître des Requettes, demeurant rue de Richelieu, accoucha il y a huit ou dix ans de trois filles. Monsieur d'Arnoton étoit à jouer dans son voisinage lorsqu'un laquais lui vint dire, que madame étoit accouchée d'une fille; un quart d'heure après il en vint un autre lui annoncer qu'elle étoit accouchée d'une seconde fille; & un autre quart-d'heure ensuite il vint un troisieme laquais, qui lui dit, que madame venoit d'accoucher d'une troisieme fille; aussitot en se levant brusquement, il pria les dames, avec qui il jouoit, de lui permettre d'aller chez lui, pour empêcher sa femme d'en faire d'avantage. Novit etiam Georgius Francus exemplum in uxoris suæ avia, quæ duas filias & filium uno partu edidit, qui omnes adoleverunt. Idem Heidelbergæ in serici tinctoris uxore aliisque vid. *M. N. C. Dec. II. An. 3. obs. 201. p. 402.* Anno 1628. Norimbergæ pistoris filia ab Italo quodam constuprata tres filiolos uno partu enixa erat; hoc percipiens ipsa læte exclamavit, se quoque ab insultatore suo mercedis loco thalerum tribus iconibus masculinis insignitum accepisse, vid. Joh. Helwig. *Obs. 144. p. 387.* ubi plura exempla recensentur. vit. etiam Viti Riedlini *Linear. medic. An. 1695. Dec. n. 19. p. 440.*

§. 17.

An vero ejusmodi gemellis vel trigeminis, qui non eadem hora, vel die, sed secundo vel tertio nascantur, gemellorum vel trimellorum nomen competat? dubitare videtur Thomas Bartholinus *l. a.* inquiens, ter hæc uxor verius enixa dici potest, quia tempus intercessit; alias ter enixa videtur *ff. de verb. signif. §. 137.* etiam quæ trigeminos peperit. Sed Justus Fridericus Dillenius non modo foetibus intervallo bidui, sed etiam trium septimanarum, in lucem editis, gemellorum nomen imponit. Quamvis illi foetus, qui priori partui post aliquot septimanas vel

vel unum aut alterum mensem superveniunt, ab aliis autoribus potius a superfoetatione deducantur.

§. 18.

Porro dantur etiam duplices gemelli, five quatuor foetus, uno *Gemelli du-*
partu editi. Scribit enim C. Jul. Solinus *Collectan. Rer. memorab. plices.*
five Polybist. cap. 3. n. 66. p. m. 14. Fausta, quædam ex plebe, partu
uno quatuor geminos, mares duos & feminas totidem edidit,
monstruosa foecunditate portendens indicium futuræ calamitatis.
Lotharii secundi seculo mulier inventa est, quæ uno partu qua-
tuor mares enixa est, vid. Simon. Majol. *Dier. canicular. Tom. I.*
Colloqu. 3. fol. m. 41. quo loco etiam quatuor puellas a matrefa-
milias natas atque secundum non leves auctores Peloponne-
siam quandam quinquies quaternos enixam esse annectit. Quale
exemplum Anno 1683. die 30. Novembris Augustæ contigit,
dum referente Luca Schroeckio *M. N. C. Dec. II. A. 2. obs. 9.*
p. 26 seq. murarii, Jacobi Thomas, uxor viginti novem anno-
rum, parvæ staturæ & tenuis fortunæ femina quatuor jam libe-
rorum, diverso tempore editorum, mater in fine mensis octavi
post ingravidationem, circa horam matutinam tertiam, diffici-
li partu puellum, pedibus scilicet primo prodeuntibus enixa est;
quem, doloribus, qui ab exclusione hac cessaverant, hora nona
redeuntibus, alius hora secunda pomeridiana & paulo post filio-
læ totidem successive, omnes in situ naturali, sine magno partu-
rientis nisu exceperunt. Ipsi infantes, singuli spithamas duas
longi omnibus corporis partibus rite ac belle conformati eo-
dem die sacra baptismatis unda fuerunt lustrati; paulo tamen
post vitam ordine, in nativitate observato, inverso deposuere.
Simile exemplum annotavit etiam Ehrenfridus Hagendorn *Hi-*
stor. med. phys. Cent. III. Hist. 8. p. 292. de hortulani uxore, quæ
quatuor uno partu felicissimo nixu enitebatur liberos, ex qui-
bus duo filioli totidemque filiolæ non tantum vitales in auras
excluebantur, verum singuli quoque sacro baptismatis ritu ini-
tiabantur.

tiabantur. Ex quibus tamen bini elapsis aliquot a baptismo horis mundo valedixerunt, reliqui vero per tempus integra valetudine sunt usi. An. 1694. in oppido Rust ad Lacum Pisonum, vulgo *Neusiedler-See*, mulier quædam robusta, viginti annorum, primipara, jam sextum, post ingravidationem mensem emensa, circa initium septimi, nullis prægressis erroribus, aut casu, qui partum accelerare potuissent, difficili partu puellam mortuam, & elapso horæ spatio tres puellios vivos eodem partu enixa est, qui a mulieribus baptizati brevi post obierunt. Membra alias bene fuerunt conformata & proportionata, singuli sesqui spithamam longi singulisque placentis ac secundinis præditi, secundum observationem *Andræ Læti M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. Obs. 157. p. 352.* Scottas mulieres esse multiparas atque frequentissime quadrimellos parere, scribit *Isbrandus de Diemberbroec Anatom. Lib. I. cap. 29. fol. m. 185.* Anno Christi 1538. femina perparvæ staturæ, textoris uxor in vago *Kleinreuth*, prope Noribergam, uno partus nixu duos filios & duas filiolas ediderat, omnesque baptismo sacro erant lavati. vid. *Joh. Helwig. Observ. 144. p. 387.* Bina quatuor foetuum uno partu exclusorum exempla communicat *Georgius Francus M. N. C. Dec. II. A. 3. obs. 201. p. 402 seq.* In præfecturæ inferioris archi-palatinatus Alzeianæ pago *V Veinheim*, Helveti; cujusdam uxor, juvenis adhuc durante matrimonio hætenus quinque vicibus totidem filios adhuc superstites ex ordine feliciter enixa est. Cum autem sexta utero gereret vice, utut difficilius prioribus, paucis retro diebus ex improvise domi suæ cecidit, unde partus tormina sentiebat, quæ tamen iterum remiserunt, donec circa vesperam filiolum ederet admodum imbecillum, quare, ut baptizaretur, statim Pastorem loci parens accersivit. Cum autem Pastor peractis sacris audiret, adhuc plurimum foetuum esse spem, commoratus est aliquantisper, sed frustra. Sequentis diei summo mane pastorem revocat parens, enarratque post noctis meridiem uxorem iterum edidisse filiolum

lum secundum vivum, & mox filiolum mortuam, quartaque vice filiolum mortuum: Una omnes hi infantes parvi quidem, sed perfecti & recte formati erant. Alterum exemplum anno 1634. in vicinia prope Spiram accidit, ubi minoris staturæ femina intra biduum duas puellas, duosque pueros feliciter peperit, qui & ad septimanam usque quartam vixerunt, sed dein unus post alterum iterum emoriebatur, vid. etiam Casin. Viardel *von der weiblichen Geburt Lib. II. c. 13. p. 68. seq.*

§. 19.

De partu quinque filiorum agit Aulus Gellius *Noct. Attic. Lib. X. cap. 2. p. m. 303.* inquiens: Aristoteles philosophus memoriæ tradidit, mulierem in Ægypto uno partu quinque enixam pueros, eumque esse finem dixit: multi jugæ hominum portionis: neque plures unquam simul genitos compertum. Hunc autem esse numerum ait rarissimum. Sed & divo Augusto imperante, qui temporum ejus historiam scripserunt, ancillam Cæsaris Augusti in agro Laurente peperisse quinque pueros dicunt, eosque pauculos dies vixisse matrem quoque eorum, non multo post quam peperit, mortuam, monumentumque ei factum, jussu Augusti, in via Laurentina. De libera muliere, qua ab Alexandria Romam perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quatuor eodem tempore enixa dicebatur, quintum post quadragimum diem. vid. Simon Majol. *l. a.* Sic juxta Aristotel. *de Histor. animal. lib. 7. cap. 4. fol. m. 435.* femina quædam viginti foetus, partibus quatuor edidit: quinos enim singulis partibus enixa est. Mulieres quovis partu tres, quatuor, quinque & plures proles parientis, ex Balduino Ronffeo meminuit Ehrenfriedus Hagendornius *Histor. phys. medic. Cent. III. histor. 8. p. 292.* In relationibus ordinariis Lipsiensibus anno 1718. sequens legebatur observatio *Leipzig den 12. Mart. 1718. Zu Lissabon hat eine Frau 7. Knäb-
lein auf einmahl gebohren, welche auch alle getauft worden. Nach die-
sem aber sind 5. darvon gestorben. Eben diese Frau hat auch vor einem
Jahre 4. Kinder zur Welt gebracht, worvon ebenfalls noch 2. am Leben
sind.*

§. 20.

Alia observatio.

Sequentem observationem recenset Gabriel Clauderus *M. N. C. Dec. II. An. 4. obs. 151. p. 286 seq.* Dum præterito anno mense Aprili milites Lüneburgici Saxoniam superiorem transibant, Hungariam petitori ac hosti communi Anti-Christiano cum aliis se opposituri, nonnulli pernoctabant in pago *Königshofen*, prope Eisenbergam, Misniæ urbem, dum hospita die antecedenti peperat filiolum; Inter gaudia & pocula convivalia consueta miscentur quoque discursus de re militari, ubi inter alia miles magis consultum fuisse dicit, si exclusus fuerit filius, ne deficerent gloriosissimo nostro Imperatori milites necessarii. Cui hospes jocosè reponit, imposterum pro virili virum sese fore præstiturum. Quid fit? Togatus hic in castris venereis miles, absoluto puerperii tempore, uxorem denuo reddit gravidam, & accidit, ut illa, dictis militibus Lüneburgicis principio mensis Decembris rursus hic transeuntibus ac domum repetentibus, partu septimestri emeretur quinque filiolos, quorum tres vivi sacro baptismo statim imbuti, cum reliquis duobus, vitam extra uterum non expertis, uniloculo inclusi terræ fuerint redditi. Nimius extra dubium fuit rustici hujus in coitu fervor; hinc spiritus seminales in ovario muliebri largius disseminati conatum ejus intentioni insufficientem reddiderunt. Posse autem unico coitu quinque simul unius ovarii ovula, uti in gemellis tantum duo, imprægnari, dubitare vetat observatio Johannis Mauricii Hoffmann. *M. N. C. Dec. II. An. 9. obs. 224.* in qua sciagraphiam notabilium in anatome corporis feminini visorum exhibens inter alia *p. 413 seq.* inquit: Ovarium sinistrum aquæ calidissimæ aliquamdiu immersum separato membranaceo involucro ovula multa nostro suggerebat visui, cum primis vero contemplantur quinque ovulorum in unum factum coalitum; tot namque numerare poteramus arctissime sibi invicem connata, ut nullum præter lineas adfuerit separationis aut distinctionis indicium &c. Ubi simul quinque hæc ovula depi-

depicta reperies. Plura trium, quatuor, quinque & plurium, unico quasi partu editorum, foetuum alleganda restarent, quæ tamen in Tractatu de Partu & quidem de partu numerofo recensēbimus, hoc loco iterum ad gemellos & quidem primo ad eorum signa regredientes.

CAPUT II.

De gemellorum signis.

§. I.

AN scilicet gemellorum gestatio in prægnantibus aliquo signo <sup>Gemello-
rum signa
an dentur?</sup> dignosci possit, affirmant alii autores, alii negant. De gemellorum signis ita sentit Dionis *des Accouchemens Lib. II. cap. 3. p. 136.* dans les premiers mois on ne peut pas connoître, s'il y a deux enfans; on ne s'en apperçoit, que lorsque les enfans commencent à remuer; & on en a des signes certains, quand en examinant le ventre de la mere, on le trouve plus gros, qu'il ne devroit être, s'il n'y en avoit qu'un. S'il y a deux eminences l'un au côté droit, l'autre au côté gauche, & qu'il y ait une ligne au milieu un peu déprimé, & moins élevée, que les deux côtes: si en mettant les deux mains sur le ventre, on sent plusieurs & différens mouvemens aux deux côtes; si ces mouvemens, sont plus fréquens qu'à l'ordinaire; si le ventre est tendu en rondeur, & non pas en pointe sur le devant; si la femme est plus incommodée de cette grossesse, que des autres: si le fardeau de l'enfant lui fait de la peine à porter; si ses jambes & ses cuisses sont toujours enflées, & même les levres de la matrice: tous ces signes assurent la pluralité d'enfans. Inquit etiam Petrus Pachequus *Observat. Lazaro Riverio communicat. obs. 45. p. 276.* Uxorem meam & multas alias mulierculas geminam prolem parituras prædixi, quarum matres gemellas ediderant, graviditas illis molesta præter morem, uterus maxime turgere & brevi tibiæ & pedes inflarentur, parumque moveretur foetus ultimis mensibus, conclusus in angusto loco, propter socium, dimi-

dimidium locum occupantem: raro in prædictione aberravimus. Et Franciscus Mauriceau dans les observat. sur la grossesse. *Obsf. 165. p. 92.* inquit: J'ay predict a une femme, qu'elle estoit grosse de deux enfans: car elle avoit le ventre grandement tendu en largeur, avec une depression vers le milieu, & les jambes & les cuisses extrêmement enflées, comme aussi toutes les deux leevres dela vulve, qui estoient si tumifiées, que son chirurgien avoit estoit obligé d'y faire plusieurs scarifications pour en evacuer les serofitez. Ces dispositions estant presque toujours ordinaires à toutes les femmes, qui sont grosses de plusieurs enfans.

§. 2.

Signa incerta

Ex nullo tamen signo gestationem gemellorum colligi posse, statuit Thomas Bartholinus *de insolit. Part. viis cap. 20. pag m. 208. seq.* credens meram esse conjecturam, siquidem nullum certum signum detur, antequam in lucem gemelli prodeant. Non tumor abdominis, qui major in simplici foetu aliquando, quam in gemellis; nec motuum diversitas, quam non raro in gravidis ex solo embryone tantam notavit; ut jurasset, gemellos utero claudi, & in gemellis motum adeo exile vidit, præsertim ultimis mensibus, quia arctius inter se connexis gemellis, locus pro motu deficeret, ut pro simplici foetu vix sufficiens videretur. Nec id indicat externa linea medium abdomen dividens, quod aliqui pro certo signo habent, ipse tamen Bartholinus falsum in uxore sua deprehendit. vid. etiam idem Bartholinus *Anatom. lib. I. cap. 29. p. 277.* quo loco adhuc addit, nec pedum tibiæarumque ultimis mensibus inflationem signum esse gemellorum, quia etiam in simplici foetu tument: nec denique amplam ventris distensionem, quam varius situs in uno foetu fingere potest. Tumor pedum, quem plerique medici ac obstetrices pro signo gemellorum agnoscunt, non semper adeo certum deprehenditur, unde de femina, quæ antea semper gemellos gestarat, ita scribit François Mauriceau *dans les observat. sur la Grossesse obsf. 502. p. 301.* Ce qui me parut assez extraordinaire

naire, en cette femme, est qu'ellen'avoit point eu les jambes enflée dans les derniers mois de sa grossesse, comme ont ordinairement les femmes, qui sont grosses de plusieurs enfans.

§. 3.

A tumore abdominis desumptum gemellorum signum æque incertum est, quia nonnunquam in simplici foetu, a mola simul præsentē, vel flatibus, vel abundantibus aquis nimis intumescit. An tumor abdominis signum sit gemellorum?
Annotante enim Philippo Jacobo Hartmanno, in femina filiorum enixa abdomen rigide erat extensum atque sub regione epigastrica ab uno hypochondrio ad alterum, transversim iuxta foetus magnitudine, corpus situm esse comparebat: durum istud & renitens, quamvis puerpera ægerrime tactum ferret. Isti vero in regione epigastrica loco elato respondebat depressus, instar convallis, qui umbilicalem ab uno illo ad oppositum emetiebatur; post quem rursus in hypogastrio par supremæ abdominis elatio conspiciebatur. Illis obstetrix gemellorum restitantium suspensiones oggerēbat, foetumque jamjam in lucem proditurum supremam epigastrii regionem adhuc occupasse, quo ipso de gemellis conjecturam firmare studebat. Defunctæ autem femine apertio rerum faciem detexit: intensum, ad rupturam usque abdomen quando chirurgus perforabat, quasi ex bombardâ explosio facta in faciem secantis sordes ejaculatæ foetore pessimo totum conclave inficiebant. Corpus autem illud elatum & durum deprehendebatur, colon nimis expansum. *vid. M. N. C. Dec. III. An. 9 & 10. obs. 102. p. 189.* Sic Vitus Riedlinus *Linear. med. an. 1697. Aug. obs. 27. p. 568.* mulieris cujusdam meminit, quæ ter trifariam gemellos enixa fuerat, cum vero post hæc iterum concepisset & abdomen inde magis, quam unquam ante magnitudine auctum fuisset, non solum ex hoc ter geminos se gestare firmiter credidit, sed & capita illorum tactu se deprehendere posse coram aliquot amicis, sæpius sancte affirmavit, qui hoc etiam tanquam expertæ crediderunt. At cum postea debito feliciter peperisset, non nisi unicus solum

filiolus, sed sat magnus in conspectum venit. Ex quo, quam fallacia & hictantum non omnia sint signa, patet. Juxta Antonium Deusingium, ipse abdominis tumor gemellos minime comprobatur, utpote qui nonnullis unum foetum gestantibus major esse potest, quam aliis quidem gestantibus gemellos, nec certi quid arguit protuberantia in latera, quæ quandoque ex æquo ab uno itidem foetu contingit utrinque, ac ubi gemelli gestantur, fieri potest, ut protuberantia in alterutro latere major sit. vid. Thom. Bartholin. *Cent. IV. Epist. 30. p. 125 seq. & Epist. 31. p. 193.* Ipse Bartholinus non modo tumorem majorem in simplici partu, quam in gemellis sæpius se observasse, sed etiam duplicem in abdomine lineam, quam aliqui pro indicio, gemellos utero gestari, habent, in uxore sua id non successisse animadvertit. Motuum equidem vel diversitas vel vehementia suspicionem firmiorem subministrat, exemplo Rebeccæ *Genes. cap. 25. vers. 22 seq.* in cujus utero collidebantur inter se filii sive gemini; Non paucas tamen Bartholinus novit gravidas, quæ in hoc signo falsæ fuerunt, uniusque foetus diversum validumque motum sentientes. In propria uxore, duodecimo partu gemellas edente filiolas, foetuum motum longe tardius, quam unquam antea perceptum annotavit Vitus Riedlinus *Linæar. med. 1697. Sept. obs. 3. p. 664 seq.*

§. 4.

Incerta signa ante partum.

De signis ante partum ita scribit Henricus a Deventer *Nov. Lun. Obstetricant. cap. 44. p. 189 seq.* Difficile nonnunquam est dignoscere aut dijudicare, unusne an plures existent infantes, præsertim ab initio, quum superiora uteri tactu non exploraveris; nonnunquam unicus infans in utero manibus pedibusque ita intricari potest, ut videantur gemini inesse: quocunque manum vertas, brachium obvium habes, aut crus, aut manum, aut pedem, ut nonnunquam dixeris: perinde est, ac si totus infans ex meris brachiis, cruribusque aut manibus pedibusque compositus esset. Equidem non ignoro, pergit dictus autor, hæc, quæ dicta sunt, aliena

aliena videri inexpertis, cogitantibus, nil facilius esse, quam res tactu discernere, & facillime manum a pede dignosci, si quis animum parum attendere velit. Sed sine offensione accipiendum est, quod istiusmodi hominum genus dicit: in tranquillo (sicut proverbium habet) quilibet gubernator est; Si, quæ latent, membra intra uterum æque clare distinguere possent, ac extra, plumbeus fane rusticus aut Bœotica mulier istam operam facillime præstaret: quoniam vero uteri, ac imprimis oris ejus angustia manus adeo arcte comprimitur, vix quicquam difficilius factu est, quam quæ manu comprehenderis, tactu dignoscere, præsertim post humores diutius effluxos manu altius immissa: ex unius quidem membri contrectatione de altero judicari posse concedo, exempli gratia, ex clunibus & femore, id, quod annexum, sentitur, necessario crus, non autem brachium, esse judicandum; ita etiam ab humeris & brachio descendenti satis cognitum est, subsequens membrum cubitum esse, non autem tibiam; interim sciendum est, non semper tam amplum dari spatium, ut ab uno membro distinctim ad aliud progredi manu liceret, aut eam tam libere movere; ægre nonnunquam manus promovetur aut removetur, & tum ex quoquo membro primum obvium judicium ferendum est: posito, te manum primum, eaque relicta pedem obvium habere, deinde manu dextrorsum aut sinistrorsum flexa brachium sentis siue crus, unde certus es, te hoc vel illud membrum sentire? aut si quidem distinguere possis, qui scis, unius ejusdemque corporis membra esse? forsan ita se res habet, forsan non; neque certior eris, etiamsi quarta vel quinta vice tactu repetito brachia vel crura sensisse tibi persuadeas, qui scis, num eadem sint, quæ antea sensisti? mihi quidem exploratum est, plures per hunc errorem lapsos esse. Certissimum gemellorum indicium, si duo capita, aut duo terga sentias: nunquam in uno eodemque corpore duplex caput invenitur, nisi monstrum fuerit; & tum errore adhuc facile capi poteris, num duplex illud caput uni eidemque corpori annexum sit.

§. 5.

in ipso
partu.

Denique in ipso partu nonnulli medici & obstetrices ex alterius jamjam editi foetus umbilico ejusque rugis nodisque, alterius in utero adhuc detenti gemelli praesentiam augurantur atque praedicunt, idque Avicennae verbis confirmant, qui *Fen. 21. lib. 3. Tract. I. cap. 17.* ita scribit: De signis geminorum, & qui supra sunt, secundum quod dixerunt, & expertum est, ut consideretur umbilicus nati primi continuus cum foetu; tunc si non fuerit in ipso ruga nec nodus, non erit post natum primum filius; & si fuerint in ipso rugae, tunc praegnatio erit secundum numerum rugarum. Quae verba ita explicat Casparus a Reies *Quaest. jucund. 52. n. 3. p. 662.* fane ex tali signo videtur voluisse Avicenna, non solum foetus, quos postea mulier paritura est, cognosci posse, sed gemellorum etiam notitiam inde haberi. Haec tamen tanquam fabulosa a peritioribus non immerito rejiciuntur; de quibus alibi plura.

CAPUT III.

De gemellorum tunicis atque placentis.

§. 1.

Gemello-
rum tunica.

Porro non solum de umbilicali funiculo, sed etiam de placentis & tunicis gemellorum, quae partes simul secundinae vocantur, nonnulla considerata veniunt, & primo quidem de ipsorum tunicis ventilari solet quaestio: *An gemelli unico vel pluribus includantur involucriis?* Ad quam differentes differenter respondent auctores, dum alii singulis gemellis peculiarem tribuunt membranam, alii utrisque geminis simul conceptis eodemque tempore exclusis; alii unius ejusdemque sexus unicam tantum tunicam, diversi autem sexus geminis duas membranas adscribunt. Inquit enim Hippocrates *de Superfoetat. oper. Sect. III. fol. m. 43.* Quae gemellos utero gestat, eo die, velut concepit, parit, uno autem involucrio utrumque foetum continet. Et *Tr. de Puer. natur. l. a.*

f. 28.

f. 28. duplici foetui duplex etiam involucrum concedit his verbis: Quod ex uno congressu gemini procreentur, hoc argumento constat, canis, sus & alia animalia uno congressu duos & plures foetus pariunt, quorum quisque in utero suo sinu & membrana conditur. Atque hæc ipsi contingere cernimus, eosque omnes eadem ut plurimum die parere. Adeundem quoque modum in muliere, ex uno veneris complexu nati gemelli uterque sinu suo & involucri conditur, & eadem die in lucem prodit, alterumque prius cum suo involucri foras egreditur. Statuit autem Johannes Jacobus Franciscus Vicarius *Bas. univers. med. lib. I. cap. 3. p. 31.* quod, si duo ova in una vesicula contineantur, tunc fiant vel duo masculi, vel binæ femellæ, ac tunc contineantur in una secundina; vel si contineantur hæc ova in diversis vesiculis, tum etiam in diversis secundinis (sive gemelli, sive diversi sexus & plures generentur) includantur. Juxta verba Andreæ Laurentii *Histor. anat. lib. VIII. qu. 21. fol. 313.* quæ gemellos gestat, eadem die parit, habet autem utrosque puellios in una secundina. Itaque qui gemelli unius sunt sexus, iisdem secundinis involvuntur: sua quisque tamen vasa habet umbilicalia: qui vero diversi sunt sexus, diversas tunicas accipiunt. Qui item unius sunt sexus, eadem uteri parte gestantur dextera quippe mares ambo, sinistra femellæ geminæ. Quod si diversi sint sexus, mas dextera, femina sinistra uteri parte concluduntur. Referente Thoma Bartholino *Act. Hafniens. Vol. II. obs. 22. p. 53.* in examine obstetrices quædam de gemellorum secundinis interrogatæ, omnes se & simplices, sed nota quadam separabiles, & geminas distincte separatas observasse respondebant. Monebat tamen alia quædam, Elisabetha, cæteris ut videretur exercitior & præcipua, secundinas seu membranas geminatas esse, si diversi sexus sint gemelli, simplices & unitas, si unius sexus. De numero membranarum ratione differentis sexus inquit Joachimus Georgius Elsnerus *M.N.C. Dec. I. An. 1. obs. 39. p. 127.* Hippocrates & cum illo totus fere eruditissimorum anatomi-

corum globus in hac fuere sententia, quod, licet feminæ gemellos pluresve gestent utero, foetus illos adnatos esse unicæ placenta, divisis solummodo funiculis. Quæ sententia licet a quam plurimis hætenus amplexa fuerit, fuere tamen nonnulli, qui primo scrupulosi, tandem subtilitate sua præoccupati, concluderunt: quando gemelli sunt unius sexus, tunc gaudere illos communi placenta; si alter illorum esset masculus, altera vero femina, tunc singularibus involvi membranulis, singularemque habere placenta. Cujus sententiæ fautor quam maximus esse videtur subtilissimus Boccalinus, in cujus relatione ex Parnasso *Relat. 93.* Apollinis verba ad Traream sequentia sunt: Un vostro pari deve sapere, che all' ora, che una donna concepisce due gemelli, se essi sono maschi ambedue, si veggono racchiusi entra una sottilissima membrana, cosa che anco accade, se amendue sono femine: Ma se arriene, che uno sia maschio, e l'altra femina, la sagacissima natura in una particolar membrana separata dal maschio conserva la femmina &c. De his foetus membranis Cornelius Stalpart van der Wiel *Observ. rar. Cent. I. obs. 74. p. 331.* ita scribit: Certant viri docti, num gemelli in utero imprægnati una eademque semper cingantur membrana, quæ in duas, veluti mediastino quodam divisa partes foetus distinguat. Verum equidem est in superfœtatione, cum nec simul concipiuntur, nec simul eduntur, singulos foetus distinctis involvi membranis, diversisque uteri affigi partibus, ita ut, etiamnum incluso altero, alter emitti queat. Longe autem aliter circa gemellos eodem conceptos tempore res se habet, qui eadem quidem plerumque inclusi membrana, eodemque contenti loco, alterius tamen cujusdam tenuioris membranæ interventu distinguuntur, quæ aquæ pressione post alterius egressum facillime rumpitur. Secundum Joh. Jac. Franc. Vicar. *Bas. univ. medicin. lib. I. cap. 3. p. 31.* si duo ova in una vesicula continentur, tunc fiunt vel duo masculi, vel binæ femellæ, ac tum continentur in una secundina, vel continentur in diversis vesiculis & tum etiam in diversis secundinis includuntur.

§. 2.

Nonnulli quoque autores, inter membranas chorion & ^{Ratione} amnion distinguentes, singulis equidem gemellis atque trigemi-^{chorii & amnii.} nis alteram harum membranarum, tenuem scilicet, five amnium in specie concedunt; alteram autem, seu crassiore, chorion dictam, tam gemellis, quam trigeminis communem eosque cunctos involventem agnoscunt. Quod etiam non improbabile videtur Johanni Bohnio *circul. anat. physiol. progymn. H. p. 25.* ubi inquit: Laurentius equidem distinctione inter gemellos unius ac disparis sexus nodum solvere conatur, illosque easdem seu communes, hos diversas & solitarias habere tunicas asserit: obstat tamen experientia, quæ diversi æque ac ejusdem sexus foetus distinctis ut plurimum amiculis prodire testatur, quod vel ideo mirari haud decet, dum singula ovula, unico foetui consecrata propriis suis instructa cernuntur tunicis, & multipararum quilibet catulus peculiares fecundinas sibi vendicat. Haud omnimode tamen impossibile videtur naturæque vim infert, in uno eodemque ovulo femineo, duorum aliquando embryonum flamina produci, adeoque binos foetus communi interdum & unico involucro gaudere; pari circiter fato ac ex uno tritici grano duplex, imo multiplex spica progerminat & in uno ovo duplex atque triplex cicatricula cum totidem vitellis & albuminibus conspicitur, ex quo gemini pulli nascuntur, raro quamvis vivaces; magis autem singulare est Stenoni in utero ovis cujusdam visum foetus scilicet tres communi chorio stipati, amniis autem propriis seclusi. Imo hæc communio secundinarum non tantum, prout de oviparis modo dictum, causa est, cur gemelli ejusmodi ut plurimum abortivi aut brevioris vitæ sint? sed quoque cur corpora eorum variis modis coalescant & monstrosa prodeant. Docet etiam Melchior Sebizius, quod, quamvis unusquisque foetuum in gemellis & partu numerosiore peculiari gaudeat involucro interno, ἀμνιον Græce dicto, involucrum tamen externum, χάριον nuncupatum, non raro

ro unicum habent, uti ex Sebizio refert Christianus Fridericus Garmannus *Oolog. curios. Dissert. I. §. 34. p. 29 seq.* ubi addit: hoc tamen perpetuum non est, membranæque istæ potius una propter contiguitatem & mutuam adnascentiam videntur, quam reipsa sunt. Et Johannes Bartholomæus Adamus Beringer *Ideæ Institut. medicin. Thes. 15. pag. 37.* inquit, gemellos foetus ex gemellis ovulis tertiæ cuidam membranulæ inclusis, ita tamen, ut hæc totaliter a se invicem divisa, generari, secus si in parte quadam cohærentia fuerint, monstra progigni. Item Franciscus Mauriceau statuit de *Art. obstetric. lib. II. cap. 3. p. m. 262.* quod, si plures adsint foetus, iidem nunquam in uno eodemque involucro reperiantur conclusi, sed quilibet peculiarem habeat tunicam, amnium scilicet & propriam aquam, ne ipsorum corpora se invicem attingentia postmodum coalescant invicemque cohæreant; in quo casu facillime monstra oriri possunt.

§. 3.

Autoris
sententia.

Quænam autem sententia de gemellorum tunicis veritati & experientiæ proxime accedat, ex observationibus, quarum aliquot tantum recensebo, benevolus lector ipse judicet. Exemplum gemellorum unius sexus in unica secundina recenset Nicolaus Blegny *Zodiac. Med. Gallic. An. I. mens. Novembr. Obs. 5. p. 173.* inquit: Chirurgus in oppido Tilleriano Normanniæ Magister, in partu difficiliore vocatus ejusdem sexus gemellos eduxit unica secundina obvolutos, etsi alter vita donatus esset, magnitudinis solitæ; alter mortuus, exsiccatus, a secundina liber, quasi tantum quinquemestris. Filiolas gemellas communem & unicam secundinam habentes peperit uxor Viti Riedlini, cujus vid. *Lin. Med. An. 1697. Octobr. Obs. 3. p. 666.* E contra Johannes Guillelmus Riva in gemellis unius ejusdemq; sexus duplicem secundinam observavit, & quidem in cadavere Romanæ puerperæ duas secundinas cum suis funiculis, quorum singulis annexus erat puerulus, invenit, qui foetus ambo ejusdem perfectionis & magnitudinis

dinis fuerunt existimati; uti ex ejusdem Rivæ communicatione cum annexa figura refert Joachimus Georgius Elsnerus *M. N. C. Dec. I. an. I. obs. 39. p. m. 127. seq.* Quamvis etiam sæpissime gemelli disparis sexus plerumque etiam diversis involuti reperiantur involucris, juxta sententiam supra allegatorum autorum, & Cosmi Viardel exemplum *von der vveibl. Geburt, lib. II. c. 17. p. 82. seq.* ubi duplicem secundinam cum duplicis aquæ effusione in gemellorum disparis sexus partu annotasse refert; femina scilicet post aquæ effusionem primo filiolum pepererat, post horæ autem spatium, rupta alia membrana novaque excreta aqua, Viardel filiolum extraxerat. Contrarium tamen exemplum, diversi scilicet sexus gemellorum, uni eidemque involucro inclusorum, refert modo dictus Elsnerus, qui *loc. all. pag. 129.* se Vratislaviæ in femina operarii cujusdam, quæ enixa fuit gemellos diversi sexus, una involutos secundina unaque placenta, vidisse affirmat simulque iconem addit: plura similia addi possent exempla gemellorum diversi sexus, qui adhuc in vivis, quique communi in utero gavisi sunt involucro. Ex quibus nunc evidenter apparet, naturam certæ regulæ adstrictam non esse. Non enim semper gemellos pluresve foetus una gaudere videmus placenta, nec naturam, ob diversitatem sexus, foetus semper separare.

§. 4.

Interdum etiam nascuntur gemelli, qui non sunt ejusdem magnitudinis, quapropter a quibusdam pro superfoetatis haberi possent, quale exemplum recenset Lucas Schrœckius *M. N. C. Dec. I. an. 9. & 10. obs. 162. p. 356.* Femina scilicet quædam parvæ staturæ gibbosa, exacto novem mensium curriculo filiolas binas, paucotemporis intervallo pepererat, quarum una elegans, & omnibus corpusculi membris rite conformata, viva & alacris; altera foetum quinquemestrem longitudine, iusta articulorum compagine, nisi quod a capite, in acumen fastigiato, ad pedes usque, quasi studio duos inter asseres leniter compressa esset, præsentans, mortua na-

Gemelli diverse magnitudinis.

sciebatur. Superfoetationem hic factam suspicari quis potuisset, nisi placenta una uterina, quæ gemellis istis ejusdem sexus communis erat, dubium solvisset.

§. 5.

De trimel-
lorum tu-
nicis.

Quandoque etiam tergeminos eadem membrana conclusos repertos fuisse, minus verum non videtur Cornelio Stalpart van der Wiel *observ. rarior. Cent. I. obs. 75. Schol. p. 332.* quandoquidem obstetrix quædam, Elifabetha Tomboy, illud ipsum sibi in rustici cujusdam tergeminis videre licuisse retulit. Eo tamen casu distincto quivis ligatur funiculo. Et Cornelius Solingen *Embryulc. ofte Afbalinge eenes dooden Vruchts cap. 31. pag. m. 292.* inquit: Evenvv el heeft my een sekere oude vvoedvrouvv vvillen verfe-keren, dat sy drie kindertjens in een vverk met tvve scheydts vliessen gehaelt heeft. Id est, eo casu tres istos foetus duabus intermediis a se invicem segregatos fuisse membranis. Germanica Francisci Mauricæi versio *de Morb. gravid. lib. I. cap. 9. p. m. 13.* ita de geminorum tunicis loquitur: *Wenn das Weib mit zweyen oder einer größern Zahl Kindern, die in eben einem Beysschlaff sind gezeuget worden, und insgemein Zwillinge genennet werden, niederkommt, (das doch ein anders ist, als die After-Empfängniß) so kan man es daran erkennen, dafs sie alle beede einer Dicke und Gröffe sind, und dafs sie nur eine beeden gemeine Nachgeburt haben, und keins von dem andern anderst, als durch ihr Häutlein, die ein jedes absonderlich mit seinem Gewässer unwickeln, gesondert, und nicht alle beede in eben einem Häutlein, und eben einem Gewässer, wie etliche entgegen der wahren Beschaffenheit meynen, seyn werden.* Quod latine sic reddit Theophilus Bonetus *Polyalb. Tom. III. cap. 26. f. 335.* Exinde gemelli esse censentur, quod ambo ejusdem fere sint magnitudinis, unaque communi fruantur secundina, neque ab invicem separentur, nisi beneficio propriæ membranæ utrumque cum aquis concludentis: Neque enim uterque una eademque membrana includitur, eademque aquæ innatant, id quod nonnulli perperam credunt.

Tri-

Trimellos in communi chorio, sed distinctis amniis conclusos, in puerpera post duarum puellarum partum, ob tertium infantem jam mortuum in utero remanentem, exspirante per sectionem observavit Adamus Brendelius *observ. anat. obs. 8. p. 25 seq.* qua foetum mortuum etiamnum tam chorio communi, quam amnio proprio investitum reperit. Horum etiam foetuum funiculi peculiare non procul a placenta ad instar trium ramorum concurrebant; & truncum tres digitos latum valdeque crassum & amplis vasis instructum constituebant, qui demum placentæ uterinæ implantabatur, ac sua vasa in varios ramulos surculosque dirempta per totam hepatis uterini compagem diffundebat. vid. etiam Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. III. & IV. obs. 65. p. 376. Ita etiam Nicolaus Steno observavit foetus tres communi contentos chorio, amniis autem propriis seclusos, fuisse, vid. Joh. Gothofr. Berger *Physiol. Part. II. cap. 1. p. 466.* *Justina Siegemundin obstetrix Brandenburgica Tract. German. de art. obstetric. cap. 6. p. 119 seq. ad questionem, Wie es sich mit denen Zwillingen verhalte, ob sie allezeit in einer Nachgeburt liegen, oder ob ein jedes Kind seine eigene Nachgeburt habe, und wenn sie in einer liegen, ob auch das Wasser zweymahl springet? wie es sich verhalte, wenn ein jedes Kind in seiner eigenen Nachgeburt lieget, ob denn die erste Nachgeburt des ersten Kindes bald dem andern Kinde nachgehet, oder ob sie zurücke bleibe, bis die Kinder beyde gebobren sind? ita respondet: Es liegen zwar Zwillinge in einer Nachgeburt, und haben nur ein Netze oder Häutgen zum Unterscheid, aber doch ein jedes hat sein eigen Wasser, weilen das Mittel-Häutchen des andern Kindes Wasser beschliessen hilfft. Wenn also das erste Kind gebobren ist, so folget die völlige Wasser-Blase des andern Kindes, wie bey angehender Geburt des ersten Kindes, und muß eben so springen, es sey viel oder wenig Wasser bey denen Kindern. Es geschiehet zwar, daß zwey Kinder in einem Wasser und einer Nachgeburt beysammen liegen, und kein Netze darzwischen ist, aber sehr selten, da ich doch viel Zwillingen geholffen habe, alsdenn springet das Wasser nur ein-*

mahl, und folgen die Kinder bald eines dem andern nach. So liegen auch viel Zwillinge ein jedes in einer eigenen Nachgeburt, dabey springet das Wasser auch zweymahl, als wenn das erste geboren worden, so spannet sich das andere Wasser an, wie das erste, bis es springet, wenn es wohl in acht genommen wird. Circa quæstionem, an gemelli uni simul membranæ sint involuti, an vero singuli foetus propria veste obducantur, & inde an una solum, an vero plures secundinæ pro numero foetuum tales partus sequantur, Vitus Riedlinus *Linear. medic. an. 1695. Decemb. lin. 7. p. 441. seq.* observationem recenset de textoris cujusdam uxore, quadraginta quinque annorum, quæ post aliquot infantes iterum gravida ex nimis intumescente abdomine ipsamet plures foetus in utero latitare conclusit. Partu instante obstetrix foetus pedes deprehendebat, eumque feliciter extrahebat, funiculoque umbilicali dextro alligato secundinam promovere voluit, ast loco hujus alium adhuc subesse foetum invenit, qui iterum pedibus ex utero, nec ita difficulter prodiit, funiculo hujus itidem breviori sinistro pedi appenso; ventreque exterius explorato, tertium adhuc in utero hære re foetum percepit, qui totus amnio involutus cum magno matris labore protrusus fuit, debiliior tamen. Hunc cum suo funiculo secundina, & unica quidem sequebatur, in quo tamen tres quasi cellulæ & duo adhuc amnia notabantur.

§. 6.

Gemello-
rum pla-
centa.

Non autem solummodo circa gemellorum membranas, uti hætenus dictum, sed etiam circa placentas uterinas atque funiculos umbilicales dissentiunt autores, dum nonnulli cuilibet gemello proprium funiculum umbilicalem propriamque placentam assignant; Feminae enim cuidam gemellos parienti, quorum uterque propria gaudebat placenta, se adstitisse scribit Johannes Jacobus Harderus *M. N. C. Dec. II. an. 2. obs. 185. pag. 409.* Alii cuilibet gemello proprium equidem funiculum, communem autem cum altero foetu placentam adscribunt; Duplici ut plurimum gemel-

mellos gaudere placenta uterina, rarius, imo rarissime una ex Henr. a Deventer *cap. 44.* allegat Hermannus Frid. Teichmeyerus *Instit. medic. leg. cap. 1. p. 11.* Ipsius autem Deventerii verba Nov. Lum. *obstetr. p. m. 194.* sic sonant: Quodsi forte (sed raro id fit) unicuique infanti peculiaris sit secundina, & obstetrix infantis jam exclusi secundinam segregatam & solutam inveniat, eam mox poterit excludere. Alii adhuc ratione sexus discrepant, dum gemellis unius ejusdemque sexus unicam tantum placentam communem, disparis autem sexus foetibus propriam attribuunt. Quod pariter de trimellis affirmant. Cui tamen sententiæ alii contradicunt, v.g. Petrus Rommelius *M. N. C. Dec. III. an. 7. & 8. obs. 45. p. 70.* inquit: Plurimi medicorum olim & nunc in ea versantur opinione, ac si in partu gemellorum, pro diversitate sexus diversimode etiam sese habeant secundinæ, ita scilicet: si gemelli sint diversi sexus, secundinæ tunc etiam sint geminatæ, & quilibet foetuum peculiarem obtineat placentam; si vero unius ejusdemque sexus fuerint, tunc secundinas esse unitas & simplices. Quam maxime vero hallucinati sint talia statuentes, & adhuc dum hallucinentur, quotidiana fere commonstrat experientia, quæ naturam (ignoscite quæso, quibus hoc vocabulum fordet) nunc simplicibus secundinis, pro pluribus foetibus, non unius tantum ejusdemque, sed etiam diversi sexus, contentam esse, mox vero duplici placenta in gemellis ejusdem sexus luxuriari docet.

§. 7.

De geminis, qui singuli sua conclusi erant membrana pro- *Exempla.*
priisque donabantur placentis vid. Corn. Stalpart van der Wiel
cent. I. obs. 75. p. 329 seq. hi quoque gemelli singuli suo utebantur
umbilicali funiculo, insuper tamen etiam tertio communi erant
donati. Trimellorum exempla aliquot adducit Thomas Bar-
tholinus *Histor. anatom. cent. IV. hist. 83. p. 402.* Et *pag. seq.* ita per-
git: quanquam singuli suos habeant funiculos, unicæ tamen pla-
centæ nonnunquam inferuntur, ex observatione Michaelis Ru-

perti Besleri: Nonnunquam binis, quod obstetrix nostra vidit apud puerperam in platea boreali. vid. etiam *ejusdem epist. medic. Cent. III. ep. 62. p. 250 seq.* ubi unicam placentam uterinam pluribus sufficere embryonibus scribit. *Item anatom. lib. I. cap. 36. p. m. 304. seq.* Gemellorum unius sexus unicam tantum placentam communem habentium exempla annotavit Franciscus Mauriceau *observat. sur la grossesse, obs. 93. p. 55.* inquit: Le 14. Aoust 1673. j'ay accouché une femme de deux enfans masles, qui n'avoient qu'un seul arrirefaix, qui leur estoit commun, comme il arrive le plus souvent aux enfans jumeaux. *Obs. 159. p. 89.* inquit: Le 5. Mars 1676. je delivray une femme d'un fort gros arrirefaix, qui estoit commun à deux gros enfans masles vivans, dont elle estoit accouchée toute seule depuis une demy-heure. *Obs. 212. p. 120.* scribit: Le 22. Janvier 1678. j'ay accouchée une femme de deux filles vivantes, qui n'avoient qu'un seul arrirefaix commun. Alia exempla de gemellis cum una placenta idem autor annotavit *l. a. obs. 227. p. 130.* & quidem de puellis. *item obs. 451. p. 264. obs. 528. p. 309. seq. obs. 540. p. 317.* de gemellis masculis *vid. obs. 279. p. 163. obs. 481. p. 282. obs. 565. p. 331. obs. 590. p. 344.*

§. 8.

an gemelli
unius sexus
unicam placentam
habent?

Quandoque tamen etiam gemelli unius sexus duas habent placentas particulares, quod confirmat Lucas Schroëckius *M. N. C. Dec. I. an. 9. & 10. obs. 161. p. 354 seq.* Scilicet femina quædam honesta post varia symptomata & incredibilis lymphæ copię, ultra triginta mensuras, profluxum, puellulam mortuam peperit, subsequente mox feliciter secundina; & trihorio fere elapso, alteram enitebatur filiolum vita quoque privatam, restitante secundina, quæ putredinem acquirens, frustillatim non absque foetore, pluribus successive diebus excernebatur. Obstetrix quædam affirmabat, se in gemellis etiam si unius sexus essent, placentas tamen observasse duas distinctas, v. Joh. Nicol. Pechlin. *obs. 33. p. 79.* Et Petrus Rommelius trium recordatur puerperarum, quarum singulæ ge-

gemellos unius sexus, nunc puelllos, nunc femellas, utroque foetu propria placenta gaudente, in lucem feliciter ediderunt. v. M. N. C. Dec. III. an. 7. & 8. obs. 45. pag. 70. Modo allegatus Franciscus Mauriceau aliquot ejusmodi observationes recenset loco citato obs. 31. p. 20. inquiens: Le 15. Janvier 1671. j'ay accouché une femme de deux gros enfans masles vivans, qui avoient chacun leur arrierefaix separé l'un de l'autre. Obs. 102. p. 60. inquit: Le 23. Decembre 1673. scribit: j'ay accouché une femme grosse de huit mois & demy de deux filles, vivantes, qui avoient chacune leur arrierefaix separé, dont les membranes se tenoient neanmoins par un petit intervalle vers le bas. vid. etiam obs. 161. p. 90. obs. 165. p. 92. obs. 227. p. 130. ubi scribit: Le 4. Aoust 1678. j'ay accouché une femme âgée de trente cinq ans, au terme de huit mois de sa premiere grossesse, de deux filles, qui n'avoient, qu'un seul arrierefaix, qui leur estoit commun. Et obs. 570. p. 334. sequentem casum refert: Le 2. Fevrier 1690. je vis une femme accouchée depuis deux jours de deux filles vivantes, qui estoit fort fatiguée du mauvais traitement, qu'elle avoit receû de sa sagefemme dans le temps de son accouchement; la quelle sagefemme après avoir receû la premiere de ces filles, n'ayant pas reconnu, que cette femme avoit encore un autre enfant dans le ventre, luy avoit fait faire durant plus d'une heure & demie de violens efforts pour vomir, pretendait seulement par ce moyen de la delivrer plus facilement de son arrierefaix: mais enfin voyant qu'elle ne la pouvoit delivrer, l'autre enfant se presentant de soy-même pour fortir, luy fit connoistre, qu'elle s'estoit trompée. Et après que ce second enfant eût esté poussé dehors par la nature, cette ignorante sagefemme ayant tiré l'arrierefaix d'un de ces enfans, & croyant alors avoir, tout fait, & avoir bien delivré cette femme, la laissa en cet estat, ressentant encore de grandes douleurs dans le ventre, qui luy firent vuider au bout d'une heure le second arrierefaix, dont la nature se delivra d'elle mesme, cette sagefemme n'ayant pas eû le jugement de

con-

considerer, que, si ces deux enfans n'avoient eû qu'un seul arrierefaix, qui leur eust esté commun, comme il arrive assez souvent, cet arrierefaix auroit eû deux cordons. Anno 1679. femina 36. annorum quatuor filias uno partu edidit, erant autem tantum septimestres, & ad paucas horas saltem vitales. Ex quibus tres una secundina inclusæ fuerunt, quarta propriam habuerat, teste Mauricio Hoffmanno *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. IX. & X. Append. obs. 30. p. 459.*

§. 9.

*In geminis
diversi se-
xus plures
placenta.*

Disparis sexus gemelli modo duas placentas, sive quilibet fœtus propriam, modo unicam sive communem habent, uti idem Mauriceau *Obs. 4. p. 3.* refert inquiens: Le 30. Mars 1669. j'ay accouché une femme de deux enfans, qui avoient chacun leur arrierefaix separé l'un de l'autre; Le premier de deux enfans estoit un garçon; & le second estoit une fille. Juxta *Obs. 22. p. 14.* Le 16. Avril 1670. il a accouché une femme de deux enfans, qui avoient chacun leur arrierefaix entierement separé l'un de l'autre; si non qu'ils estoient seulement joints par un intervalle membraneux, large d'un travers de doigt. Le premier de ces deux enfans, qui estoit une fille de mediocre grosseur, vint naturellement la tête la premiere, & le second, qui estoit un garçon, bien plus gros & plus fort, vint les pieds devant. vid. etiam *Obs. 512. p. 300.* Et *obs. 537. p. 315.* mentionem facit trigeminorum sive trium infantum diversi sexus, his usus verbis: Le 14. Aoust 1688. j'ay accouché une pauvre femme grosse de trois enfans, au terme de huit mois: Lorsque je fus appelé, il y avoit une heure & demie, qu'elle estoit accouchée naturellement du premier de trois enfans, dont elle estoit grosse, qui estoit une fille vivante, que sa sagefemme avoit recuë; mais je la delivray des deux autres, dont l'un estoit un autre fille, qui estoit aussi vivante; ensuite de quoy je tiray le troisieme de ces enfans par le pieds. Ce dernier enfant estoit un garçon, qui estoit mort au ventre de la mere. Tous ces trois enfans avoient

avoient chacun leur arrirefaix tres-bien figuré, & ces arrirefaix estoient aussi distinctement séparé l'un de l'autre, tant de leur corps, que de leurs membranes, que s'il n'y avoit eu qu'un seul enfant. C'est ce qui fit, que j'en tiray ces trois arrirefaix que l'un après l'autre, & qu'estant tous trois ainsi entierement séparés, l'attraction du premier ne servoit de rien à faire sortir les autres, que je fus obligé de tirer aussi séparément, après toutefois avoir tiré auparavant tous les enfans.

§. 10.

Econtra etiam unicam placentam variis infantibus diversi sexus communem tam modo dictus Mauriceau quam alii annota- Unica ple-
centa.
runt autores v.g. Philippus Jacobus Hartmannus refert *M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. obs. 209. p. 478.* quod acutissimis cum doloribus misere tempore graviditatis conflictata marita aliquot annorum difficili semper partu, fatalem gemellorum anno 1697. subierit, tribusque a partu filii filiæque horis exspiraverit. Placenta horum gemellorum unica fuit, funiculis trium digitorum transversorum spatio a se invicem distantibus. Gemellorum diversi sexus unicam tamen & simplicem utrique foetui communem placentam habentium tria exempla recenset Petrus Rommelius *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. obs. 45. p. 70 seq.* vid. etiam Joh. Jac. Harder. *Apiar. obs. 92. p. 350.* Item de trimellis, quorum duo priores pedibus extrahebantur, tertius autem amnio involutus protrudebatur; quem unica secundina sequebatur, in qua tres quasi cellulæ & duo adhuc amnia notabantur, vid. Vit. Riedlin. *Lin. med. an. 1695. Decembr. obs. 17. p. 443.* De trimellis cum unica placenta natis Thomas Bartholinus *Epistol. medic. Cent. III. epist. 62. p. 250.* ad Georgium Segerum ita scribit: in vicinia nostra uxor militis pauperula, mater antea octorum liberorum, trimellos nudius tertius peperit, sed abortivos, primam filiam die lunæ, medium filiolum die Martis, tertiam filiolum Jovis die. Unica secundina ampla omnes tres gaudebant, quæ die Veneris tanto cum dolore pro-

dibat, ut crederetur quartus foetus superesse. Una igitur placenta uterina pluribus embryonibus sufficit. In examine obstetrix quædam affirmabat, semel se unam in gemino sexu, sed obiter discriminatam placentam observasse, juxta Joh. Nicol. Pechlin. *Observ. Phys. med. lib. 1. obs. 33. p. 79.* Vratislaviæ femina operarii cujusdam gemellos diversi sexus, una involutos secundina unaque placenta, enixa est, quod se vidisse scribit Joachimus Georgius Elsnerus *M. N. C. Dec. 1. An. 1. obs. 39. p. 129.* Unicam placentam duobus foetibus sive gemellis diversi sexus communem observavit etiam Franciscus Mauriceau *l. all. obs. 459. p. 269. item obs. 522. p. 306.* Et *obs. 512. pag. 300.* non modo refert exemplum gemellorum disparis sexus, quorum quilibet suam placentam separatam habebat, sed etiam aliud in contrarium addit, puellæ scilicet atque pueri, una eademque placenta connexorum. Quibus observationibus frequentia annectit: L'on voit par ces deux exemples, que le nombre des arrierefaix ne correspond pas toujours à celui des enfans, car quelque fois il n'y en a qu'un, qui est commun à tous les deux enfans, quoyqu' ils soient de different sexe; & d'autres fois chaque enfant en a un, qui luy est propre & particulier. Et juxta Joach. Georg. Elsner. *l. a.* exinde evidenter apparet, naturam certæ regulæ adstrictam non esse. Non enim semper gemellos pluresve foetus una gaudere videmus placenta, nec naturam, ob diversitatem sexus, foetus semper separare. Hinc etiam obstetrix Parisiensis Margarita du Tertre *Instruct. d'une Sagefemme p. m. 117.* ad quæstionem: Quand les jumeaux sont de different sexe, les placenta sont-ils plutôt separez, que quand ils sont de meme sexe? ita respondet: Non, car j'en ay veu de separez, où il y avoit garçon & fille, d'autres fois deux garçon, & d'autres fois des filles.

§. II.

*in quadri-
mellis unica
placenta.*

Quod autem hætenus de gemellorum & trigeminorum placentis diximus, idem etiam in quadrigeminis & aliis fortasse partibus, numerosis occurrit, siquidem juxta Lucæ Schrœckii observatio-

vationem *M. N. C. Dec. II. An. 2. obs. 9. p. 26 seq.* quam supra jamjam recensuimus, quatuor infantes diversi sexus, duo scilicet filii, Andreas & Nicolaus, & duæ filiæ, Barbara & Marianna, unicam tantum habuerunt placentam uterinam, quæ horum sustentationi in utero matris inservit, & mox post partum ultimum facile prodiit. Fuit autem hæc placenta quadratæ figuræ, spithamas duas in longitudine, & in latitudine unam cum semisse, in crassitie vero digitos tres transversos æquans, cæterum a sulcis decussatim per eam excurrentibus in quatuor quasi partes divisa, totidem nempe funiculis umbilicalibus recipiendis dicatus, ita ut cujuslibet foetus umbilicalia vasa in separatum & sibi proprium placentæ angulum implantata fuerint; prout non minus unumquemque foetum, propriæ membranæ involverant, & quemlibet partum aquæ solitæ effluxus præcesserat. Quadrigeminorum uno partu exclusorum singulisque placentis ac secundinis præditorum paulo ante ex *M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. observ. 157. p. 352.* mentionem fecimus.

§. 12.

Annon autem in aliis quoque casibus, uti in gemellis & triginis, five unius ejusdemque, five disparis sexus, unica tantum placenta uterina deprehendi creditur, pariter duæ vel plures placentæ revera adsint, quamvis ita inter se conglutinatæ, ut earum coalitus, ob subtilitatem, visum non facile incurrat, vel etiam ex negligentia accurate non perscrutetur, uti nonnunquam in musculis abdominis pyramidalibus, quæ tamen oculata manu facillime separari possunt, evenire solet, dubius adhuc hæreo, cum quilibet foetus propriam tunicam atque placentam ordinarie possident, semperque placenta a chorio ortum trahat. Cui sententiæ quoque favet Regnerus de Graaf *de Mulier. organ. cap. 15. p. 382. seq.* Placenta, inquit, in mulieribus unica tantum est, quotiescunque unicus in utero foetus existit; si vero contingat, plures simul ejusdem vel diversi sexus adesse, placentæ quoque plures occurrunt: si illa a chorio enascatur, quotiescunque duplex chorion

Auctoris
sententia.

rion adest, placenta etiam duplex aderit; sed placenta a chorio nascitur, ergo &c. Minorem probant observationes de foetibus extra uterum repertis, in quibus minime hæc placenta desiderabatur, quod non contingeret, nisi chorion vi efformandi placentam præditum statuamus; Sæpe numero tamen contingit, has duas placentas ita simul uniri, ut nulla inter illas linea vel membranula appareat; quapropter eas unicam diceremus, nisi ex earum origine geminoque umbilico geminam quoque placentam esse constaret. Inquit etiam Thomas Whartonus *Adenograph. cap. 35. pag. m. 216 seq.* ubi plures foetus, ibi quoque plura adsunt choria, quibus includuntur; & necesse, ut pluribus quoque placentis utero adhæreant. Ubi vero contingit gemellos, sive ejusdem, sive utriusque sexus, habere placentam quodammodo unitam, ut aliquando observavimus; illa placenta tamen non una est per genuinam partium continuationem, sed per quandam contiguitatem & mutuam adnascentiam. Nam linea conspicua utramque partem determinans ita eas dividit, ut unius medietas uni funiculo umbilicali, & alterius alteri evidenter sit appropriata &c. Interim tamen minime eorum amplector sententiam, qui in gemellis, in quibus duæ inveniuntur placentæ, non æque gemellationem, quam superfoetationem quærendam esse statuunt, vid. *M. N. C. Dec. I. An. 1. obs. 39. p. 129. Joh. Jac. Harder. Apiar. obs. 92. p. 350.* Siquidem in uno vel ambobus ovariis unico coitu duo vel plura ovula simul imprægnari, dehinc per tubas Fallopianas ad uteri cavitatem descendere, singulaque propriis placentis absque cohæfione utero affigi possunt; pariter ubi econtra duo vel plura ova non una sed altera vel tertia nocte subsequenter congressibus foecundantur & successive postmodum ex ovariis ad uterum protruduntur, ibidemque dum foetuum stamina adhuc mollia sunt, facillime placentis suis coalescere queunt. Quos foetus, quia unica quasi gaudent placenta & unico fere partu excluduntur, plerique

rique gemellos, trimellos & quadrimellos appellant, alii tamen potius ad superfoetatos referunt. vid. *M. N. C. l. a.*

CAPUT IV.

De gemellorum accidentibus.

§. I.

QVandoque inter gemellos tanta observatur similitudo, ut non modo quoad faciem & alia externa, sed etiam quoad mores & animi affectus sibi sint simillimi, & inter ipsos parum differentiae intercedat vixque a se invicem distingui possint; Quale exemplum refert Casparus Theophilus Bierlingius *Thesaur. theoret. pract. obs. 69, Schol. §. 5. pag 907.* Erphordiae, inquiens, vivebant duo gemelli id temporis quadraginta annorum, a vulgo *die Kranichfelden* dicti, quibuscum multoties familiariter conversatus sum, hi quoad animum & quoad corpus, sibi invicem tam similes erant, ut unus ab altero vix dignosci posset. In gemellis sexus feminei similem, similitudinem annotavit Gabriel Clauderus *M. N. C. Dec. II. An. 7. obs. 175. p. 334.* Viro scilicet magnifico nascebantur geminae sanæ; hæ ab incunabulis non modo, si consideres ea, quæ ad externa spectant, formam, vocem, gestus & centum alia, sibi semper fuere adeo conformes, ut etiam a parentibus & domesticis vix discerni invicem potuerint, ac ovum ovo vix similis; sed etiam quoad interna unanimes prodebant mentis effectus, mirandamque sanguinis sympathiam, ut idem fere semper senserint, simul obambulaverint, imo eosdem morbos, non modo quidem variolas & morbillos, sed & alios, v. g. vomitus, obstructions menterii, tumultus hypochondriorum, uteri, &c. non sine omnium stupore fuerint passæ. Accedit suavissima illa harmonia conjugialis, quam sine delectabili risu vix percipiet curiosus lector; dum scilicet nobiles factæ ac honestus juvenis unam in matrimonium decenter ambiverat, parentibus consentientibus, altera fo-

Gemello-
rum simili-
tudo.

exempla.

roris sponso externis, iisque licitis amatoriiis ceremoniis pari modo ire obviam allaborat. Postquam vero paulo post & altera idem cum proco fatum experitur, hæ ambæ inter amafios suos pudici amoris ebullitiones, methodis quidem honestis, reciproce dividebant, alternabant, miscebant, conjungebant. Non simul quoque & unanimes mundum sint egressuræ, veluti ingressæ ac progressæ, dies docebit. Gemellorum quoque, similitudine corporis & vultus adeo exacta, ut non nisi a gnarissimis discerni possent; ac sanitate utriusque jam ad vigesimum, quem tunc habebant, annum integra, nisi quod altero interdum male se habente, alter quoque conquerebatur, meminit Conradus Bartholdus Behrens *Ephemerid. acad. N. C. Cent. III. & IV. obs. 159. p. 364.* Sorores gemellas iisdem morbis subjectas annotavit Vitus Riedlinus *Linear. med. an. 1700. mens. Septembr. p. 1071 seq.* Viro cuidam honesto & pio uno eodemque partu uxor ediderat gemellas filiolas, elegantis formæ & sanas, quæ per primum mensem corpore sat augebantur; postea vero ambæ uno eodemque tempore aphthis corripiebantur. Deinde in ea, quæ primo lucem aspexerat, ulcus in dextro brachiolo suboriebatur, quod malum etiam brevi post in sorore & quidem in ipsa hac parte apparuit. Dehinc ambæ sorores modo memorato ordine diarrhœa corripiebantur tam contumaci, ut remediis nil quicquam proficientibus, sed accedentibus convulsionibus primo minor natus vita privaretur, quam altera per quadriduum fere adhuc supervivens, & quamdiu mortua fuerat soror, foetorem, qualem mortui solent, de se spargens, comitabatur. Sicque quas haud ita pridem unus concluderat uterus, uno quoque sepulchro conditæ fuerunt. Et Petrus Borellus *Histor. med. phys. Cent. II. obs. 4. p. 189.* inquit: Notanda est historia, quæ Castris accidit; Gemellæ natæ sunt, quæ non solum omnino similes fuerunt, sed etiam eadem die conjugio junctæ, virisque eandem artem profitentibus, quod ab astrorum influxu simili provenisse non vero ab simile est. Quod autem Borellus tanquam singulare quip-

quippiam adducit, aliis singulare non videtur, & ex accidenti contingere potuit juxta Behrens *l. a. p. 368*. Ante triginta aliquot annos mihi ipsi hic Dresdæ videre contigit duas sorores geminas, annum tunc temporis agentes decimum quartum, peregre huc venientes, quæ tantæ erant faciei & vocis seu loquelæ similitudinis, ut difficillime vel plane non distingui inter se possent; siquidem idem oculorum color, idem nasus, idemque os, idem, in gena utriusque sororis sinistra, nævus fuscus, idem vocis sonus & accentus, idem dentium nitor, eadem statura, tam ratione longitudinis, quam crassitie. Præterea simillimo vel eodem amictu seu vestimentis incedebant, ut adeo ipsarum quoque parentes ac domestici in earum dignotione quandoque errarent, quapropter etiam, secundum parentum, tunc temporis simul præsentium, relationem, domi existentes certo signo vel lemniscis certi coloris sese contradistinguere dictæ sorores solebant. Post aliquot autem annos, & postquam nupserant, tam ratione longitudinis, quam etiam faciei notabiliter satis ab invicem differebant. Sic Albertus M. geminos in Germania tantæ conformitatis vidit, ut dignosci nullo modo possent: Verum augebatur miraculum, quod gestus iidem, animi affectiones eadem, eadem vox ac loquela. Nunquam soli seorsum, sed simul semper, quin separati paulum ægerrime ferebant, uterque in ægritudinem eandem incidebat, ab eodem uterque surgebat, uti refert Henricus Kornmanus *de Miracul. mortuor. observ. curios. p. 133.* ubi plura de geminis.

Observatio.

§. 2.

Circa causam hujus gemellorum similitudinis dissentiunt recentiores medici a veteribus, dum hi, uti supra diximus, gemellos ex una, unico coitu ejaculati, atque æqualiter in duas partes divisi, certisque cellulis injecti, feminis virilis portione constitui, eodem alimento pasci, easdemque mutationes subire credebant; illi vero, moderni scilicet, nec alios foetus nec gemellos ex semine virili, sed ex ovulis muliebribus derivant. De hac similitudine

Causa similitudinis.

ita

ita loquitur Dionis *des Accouchemens lib. II. cap. 3. p. 138.* la ressemblance des jumeaux peut autoriser la pensée que j'avance, étant tous deux contenus dans le même œuf; frapez tous deux du même esprit de la semence de l'homme, & dans le même moment, ils doivent se ressembler; & si ce sont les idées, dont l'imagination du mari & de la femme est remplie dans le temps de l'action, qui donnent la ressemblance, les jumeaux ayant la même, il faut tirer une conséquence infallible, qu'ils ont été conçus tous deux dans le même instant. Et secundum Christianum Fridericum Garmannum *de Miracul. Mortuor. lib. I. tit. 4. §. 40. p. 168.* gemellos sibi invicem facies & mores maximam partem habere similes, mirum alicui non videbitur, qui expendit, eas ex una feminis portione, si veteres audias, constare, aut si recentiores, ex duobus ovis in uno tamen racemo simul prognatis, & post uno coitu divisis, quæ unicus etiam paterni feminis effluxus irrigando foecundavit, latentem in cor humanum ideam actuavit, & in foetum perfectum transire fecit. Accedit alimenti in utero idenditas iidemque per certa tempora mutationis gradus. Cui fini pariter operatur maxime efficax in hoc opere matris imaginatio, quæ in his uno eodemque momento symbolizat, & præscriptas lineas ducit & explicat mirabiliter, eodemque temporis momento semel impressum perficit, & sigillat symbolum. Quod si contigerit, gemellos uno tantum ovo includi, formæ illa paritas felicius & facilius succedet. Quod autem in nonnullis morum & facierum disparitas non raro se conspectui objiciat, causa nulla alia est, quam quod tales revera gemelli non sint, cum primis si utriusque & non unius sexus notis conspicui. Tales namque non uno coitu concepti, seu, ut verius eloquar, & forsan clarius, successivo, quam insensibilem superfoetationem non incongrue forsan diceres. Ejusmodi superfoetationem sexus in gemellis diversitas tacite subinnuit, inde illam æqualitatem non nisi unius sexus gemellis, si historiarum fidem sequaris, deprehendes gemellos ob nutrimenti identitatem

tatem non modo quoad figuram externam, sed & internas animi operationes sibi ut plurimum assimilari, in vulgus notum est, inquit Gabriel Clauderus *M. N. C. D. II. an. 7. obs. 175. p. 334.*

§. 3.

Ad talem gemellorum similitudinem nonnulli etiam astra *An astra?* virtutem suam conferre credunt, uti paulo ante ex Petro Borello adduximus. Sic legimus apud Valerium Maximum, Polystratum & Hippoclidem eodem die natos eundem præceptorem, nempe Epicurum habuisse, idem patrimonium possedisse, eandem senectutem attigisse & eodem abiisse momento. Quam observationem ex Borello equidem Casparus Theophilus Bierlingius *l. a. p. 907.* de gemellis explicat, quamvis neque in Borello, neque in ipso Valerio Maximo gemellorum mentio fiat, nisi ex nomine patrimonium didymotokian eruere velis. Ipsius autem Valerii Maximi verba *lib. 1. cap. 8. extern. §. 18. p. m. 126.* sic sonant: Polystratus & Hippocrides, philosophi, eodem die nati, ejusdem præceptoris, Epicuri, sectam secuti, patrimonii etiam possidendi adeundæque scholæ communione conjuncti, eodemque momento temporis ultima senectute extincti. Tam æqualem fortunæ pariter atque amicitiae societatem, quis non ipsius cœlestis concordiae sinu genitam, nutritam atque finitam putet? Hæc autem omnia non ex gemellatione, sed ex accidente contigisse videntur.

§. 4.

Matris phantasiæ absque dubio adscribendum est, quod refert Aristoteles *de Hist. Anim. libr. VII. cap. 4. fol. 435.* quod adultera quædam duos gemellos, alterum suo marito, alterum adultero similem pepererit, imprimis si conceptio unico coitu facta fuerit. vid. etiam C. Plin. *histor. nat. lib. VII. cap. 11. fol. 109.*

§. 5.

Nonnunquam etiam nascuntur gemelli coaliti vel sibi invicem cohærentes seu monstrosi, cujus rationem quidam autores in *Gemellorum coalitus.* semine virili corrupto atque gemellorum collisione quærunt; in-

Causa
collisio.

quit enim Johannes Helwigius *obs. 13. schol. p. 37.* fieri potest ejusmodi foetuum cohærentia aliquando ex liquido & corrupto semine, aliquando ex terrore aliisque adversis casibus, ut gemelli in utero jam concepti collidantur, ruptis feminibus, quæ natura glutinosæ sunt substantiæ, aliquatenus concrecant & juxta Anton. Deusing. *Considerat. foetus Mussipont. §. 27. p. 21.* vel ex uno coitu, vel per superfœtationem, quando duo subeunt femina, alterum antea, alterum postea, quæ cum in utero confunduntur, evenit, ut membra coalescant atque diffideant. De gemellis monstrosis vid. *ibid. sect. VI. p. 109. seq.* Vel secundum Anton. le Grand *hisor. natur. part. VIII. art. 3. p. 364.* talis bicorpor foetus non ex redundantis materiæ influxu tantum, sed ex ipsa uteri angustia oriri potest, dum aliqua feminis portio, quæ situ ab alia secreta, in membrum corporis aut embryonem ab alio distinctum compingi cœperat, ob spatii angustiam alteriusque vicinæ partis compressionem incrementum accipere non valet: Unde necessum est, ut magnitudine debita careat aut alteri membro connectatur & adhærescat. Cum autem, secundum hætenus dicta, conceptio non tam in virili semine, quam ovulis feminarum consistat, ideo etiam vitiosa atque monstrosa gemellorum conceptio vel formatio in iisdem quærenda erit; quando scilicet duorum foetuum stamina vel cicatriculæ in uno eodemque ovulo, ejusve membranis, continentur, tunc sane facillime, imprimis si nulla in hoc ovulo membranula seu interstitium inter has cicatriculas adsit, vel si talis membranula tenuissima a quacunque causa rumpatur, ut ita dicta duorum gemellorum stamina statim in principio in unum corpus monstrosus confundi incipiant; vel quando ex una eademque cujusdam ovarii foveola duo ovula, vel etiam quando ex uno vel utroque ovario tot ova fœcundata per tubas Fallopianas uteri cavitatem ingressa sese approximant ibidemque cohærescant, postea demum disrupto istorum foetuum interstitio, vel dilaceratis & corruptis membranulis foetus tales variis in partibus

bus connascuntur, vel alio modo monstrosi evadunt, uti ex variis duorum foetuum inter se connatorum monstrosis liquet. Quod vero a collisione in utero concepti jam gemelli concreescere queant, maxime dubitat Lucas Schrœckius, cum tam vehemens & violenta eorum conjunctio sive collisio absque præsentis vitæ dispendio possibilis vix esse possit; sed talis conjunctio per blandiorem potius adproximationem, in primis præsertim conformationis diebus, mediante humore illo cicatriculas ambiente, lento, albugineo & ad concretionem satis apto, facilius admitti posset. vid. Joh. Helwig. *l. a. p. 40.* Annon autem detur etiam causa externa, quæ violentia quadam ova uterum illapsa ita invicem collidere possit, ut arctius sibi adpropinquantia in augmento quoque suo sibi adhæreant, non dubitat Emanuel Kœnig *M. N. C. Dec. II. an. 8. obs. 45. p. 306.* De ejusmodi foetuum coalitu ita scribit Johannes Riolanus *de monstr. Paris. cap. 4. oper. fol. m. 837.* Quemadmodum ovum, duos habens vitellos membrana secretos, geminos profert pullos, quam si rumpi contingat, uniuntur ea parte, qua fit concurrentium humorum concretio, unde partus monstrosus, ut cum duobus capitibus, duabus tantum alis & pedibus, vel contra cum uno capite, quatuor alis, totidemque pedibus: Ita ab initio tunicis discretis foetus, iis humoris acrimonia erosus aut violentia aliqua effractus, uniuntur ea parte, qua membrana rupta fuit, propter feminis & humorum concursum. Hinc alii capite, alii ventre, alii dorso cohærent. Et Johannes Georgius Schenckius *histor. monstrosor. p. 19.* observationem de puella bicipiti, reliqua omnia unum corpus referente addit: manifestum est in his contingere, quod in fructibus. Duas tentavit natura puellas, in ipso exortu principalium membrorum collisa atque constricta sunt omnia, præter caput, omnia igitur principalia præter cerebrum in unum coiverunt &c. Michael Ernestus Ettmüllerus disput. de monstr. Hungar. quoad causam hujus monstrositatis, haud absolum esse putat, si statuatur: in uno o-

vulo imprægnato futurorum gemellorum flamina eo modo, quo tunc in monstro bicipite conspiciebantur, delineata latuisse; vel utrosque hos gemellos ex uno ovulo imprægnato prodituros, in unica secundina fuisse inclusos & sic circa nates coaluisse; vel duo fuisse ovula imprægnata & ad uterum protrusa, atque embryones, postquam eorum viscera & artus formari cœperunt, illic loci, ubi post cohærebant, rupta forsan membrana, fuisse contigua, & propter visciditatem, qua ordinarie pollent, in ejusmodi continuitatem concrevisse. Recurri etiam posse ad materiæ ineptitudinem, retur, quæ forsan fuit nimia tenuitas, ob quam dum formatrix facultas formationi incumbit, refluit, & inter se prave miscetur, quo fit, ut partes unius gemelli cum partibus alterius non solum uniantur, sed intus maneant ac separari non possint; cum præsertim pro duobus corporibus perfecte efformandis materiæ quantitas non sufficiat, & dum in unoquoque pro illius complemento materiam adaptare contendit, quæ non satis suppetit, invicem permiscentur, & in unum, illis in partibus, ad quarum supplementum defectus dabatur, uniuntur, quare cum facultas formatrix non potest facere, quod vult, facit, quod potest; nec imaginationem vult exclusam. vid. Nov. literar. German. mens. Januar. an. 1708. p. 31. A gravidarum etiam imaginatione talem foetuum coalitum oriri posse, docet Christianus Franciscus Paullini observatione de gemellis canum instar in utero cohærentibus. Nobilis scilicet femina in Finmarchia, notante Ambrosio Rhodio, ex superiori hypocausto in culinam descendens sub scala forte reperit canes venaticos a coitu cohærentes. Quo fœdo spectaculo perterrita non destitit quidem, clausis foribus, utrumque baculo tamdiu delumbare, donec sejungerentur. Peperit postea gemellos diversi sexus mortuos, ac pudendis, canum instar, monstrose cohærentes. Qui ocyus & clanculum tumulati rumorem effugere publicum. vid. M. N. C. Dec. II. an. 5. App. p. 53.

§. 6.

Variis autem modis geminos sibi adnasci partusque mon- *Exempla.*
 strosos formare sequentes & aliæ testantur observationes. Hi-
 storiam & anatomen gemellorum coalitorum anno 1702. in Prus-
 sia natorum commemorat Philippus Jacobus Hartmannus *M. N. C. D. III. an. 9. & 10. obs. 189. p. 332 seq.* in quo foetu monstroso ap-
 paruerunt 1) duo capita cum faciebus collisque duobus. 2) Bra-
 chia, cubiti manusque quatuor. 3) Thorax cum sternone utrobi-
 que adhuc duplex, circa cartilaginis ensiformis regionem vero in
 unum coalescens, costis nothis abhinc versus latera protensis. &c.
 Ejusmodi exempla congeffit etiam Fortunius Licetus, *de Mon-*
stris lib. II. p. 77. 79 seq. p. 90. 105. 119. &c. quem tractatum gallice red-
 didit Jean Palfyn, *cujus vid. pag. m. 10. 11 seq. it. 107. 114.* quibus
 locis non modo varios foetus diversimode connexos, sed etiam
 gemellum alterius umbilico vel lateri monstrofe adhærentem re-
 peries. *vid. etiam Joh. Georg. Schenck. histor. monstros. p. 15. 22.*
24 seq. 50 seq. 65 seq. De infante cum capite duplici, & corde sim-
 plici, *vid. Lud. Cælii Rhodig. lect. antiqu. lib. XXIV. cap. 3. f. 915.*
v. etiam Philipp. Camerar. Hor. subcis. cent. II. cap. 67. p. 275 seq.
Anton. Deusing. de foet. Mussip. p. 19. Anno 1664. Viennæ pepe-
 rit mulier quædam gemellas concretas mortuas, quarum corpus
 duo habebat capita, sed in unum conereta, duo ora, quatuor o-
 culos, duplicem nasum, binas tantum aures, brachia duo &c. an-
 notante Johanne Georgio Greifelio *M. N. C. Dec. I. a. 1. obs. 55.*
p. 152. Gemellas femellas thorace medio unico conclusas cum col-
 lo & capite duplici artubusque geminatis &c. enixa est Margare-
 ta Treuberin, referente Johanne Mauricio Hoffmanno *M. N. C.*
Dec. II. an. 4. obs. 152. p. 288. De gemellis monstrosis, coalitis par-
 tibus obscænis observationem annotavit Johannes Conradus
 Peyerus *M. N. C. Dec. II. an. 2. obs. III. p. 267.* Vinitoris scilicet
 uxor Scaphusæ 1675. gemellos feminini sexus difficillimo partu
 enixa est, coalitis ossibus sacris & partibus obscænis, monstrosos:

qui uterum habebant geminum totidemque vaginas, sed vulvam unicam; bina item intestina recta, unum tamen podicem. Gemellorum corporibus concretorum exempla varia collegit Johannes Helwigius *obs. 13. 14. & 15. p. 35 seqq.* vid. etiam *M. N. C. Dec. I. an. 3. obs. 129. p. 217.* Johan. Lang. *epistol. medicin. lib. II. epist. 8. p. 534. seq.* Amat. Lusit. *Curat. medic. cent. III. cur. 57. fol. m. 273.* Marc. Mapp. *de Acephal. p. 18 seq.* Th. Barthol. *histor. anatom. cent. I. histor. 66. p. 102.* in quibus autoribus etiam gemelli occurrunt, quorum alter ex alterius pectore vel alia parte dependet. v. p. 60.

§. 7.

Gemelli
coaliti &
separati.

De gemellis sibi invicem adnatis feliciter tamen separatis sequentem observationem recenset Emanuel Kœnig *M. N. C. Dec. II. an. 8. obs. 145. p. 305.* Infra Basileam in pago Huttingen prope Rhenum, mulier, dicta Clementia Meyerin, gemellos peperit sexus feminini, quibus nomen Elisabethæ & Catharinæ in sacro baptismo impositum erat, non sine magnis partus doloribus, idque ex perverso alterius foetus situ, retroflexis capite & pedibus; Lucina tamen favente matreque vegetæ firmæque constitutionis existente ambo vivi permansere & adhuc sunt vegeti. In hoc partus negotio præprimis stupendus erat horum infantum coalitus, a cartilagine ensiformi usque ad eorum umbilicos in unum funem, summopere crassum contortos, vasis ordinariis duplicibus, quatuor scilicet arteriis & binis venis, facili negotio discernendis. Contigit vero hic coalitus in ipsis cartilaginibus ensiformibus, dum in ovorum evolutione hæ partes adhuc membranaceæ existerent, & sibi e tali regione prope nimis accederent, ceu curiosissimæ observationes Theodori Kerckringii *Osteogen. fœt. cap. 1. p. 213.* hoc illustrat. Quia vero in cartilagine ex fibrarum compage strictiori & duriori sensus aut nullus aut obtusissimus saltem existit, separatio tenellorum horum infantum etiam sine convulsionibus supervenientibus tanto facilius &

tutius institui potuit, ligatura scilicet prægressa indies strictiori dein cultelli scissura.

§. 8.

Non autem solum a feminis humanis, sed etiam brutis na- *Gemelli
coaliti in
brutis.*
scuntur gemelli monstrosi, sive bruta binis capitibus, pluribus pe-
dibus, & alia conformatione monstrosa, vituli enim bicipitis cum
sex pedibus meminit Olaus Borrichius in Thom. Bartholin.
epist. medic. cent. IV. epist. 17. p. 78. in nundinis Lugdunensibus,
inquiens, nil pæne in naturalibus rarum occurrit, præter vituli
bicipitis, ex utero secti exuvias. Excreverat in utero vitulus iste
in justam magnitudinem, amphibænæ similis, quippe alterum
illi caput ordinaria sede, alterum loco caudæ, utrumque cras-
sum & validum, sex illi pedes eo ordine dispositi, ut primus ca-
piti supponeretur primo, duo sequentes vicino trunco, quartus
alteri capiti, duo reliqui vicino illi trunco; duo in latere caudæ
eminebant, truncus totus aptissime sibi invicem connexus, ut
unum animal omnes crederent, duo tamen ei corda fuisse, & re-
liqua interiora duplicata, imo in altero maris, in altero femellæ
delituisse patrimonium, constanter asseverabat ille, qui nobis
exuvias ostendit. Anno 1657. mense Decembri in oppidulo quo-
dam Noribergensi ex dissecto corpore hordæ, seu vaccæ gravidæ
& demortuæ vitulus biceps exemptus fuit, juxta Johann. Hel-
wig. *Obs. 15. p. 43.* Anno 1658. prope Altorfium in pago a vacca
partus monstrosus edebatur, mox post partum extinctus, qui
præterquam quod biceps erat, cutis quoque rupturam in utero
factam ostendebat; quam observationem cum figura ab Henrico
Erndelio delineata, communicat Georgius Segerus *M. N. C.*
Dec. I. an. 2. obs. 94. p. 168. Vitulos aliquot duobus capitibus
monstrosos, item vitulum duobus capitibus, unico corpore, po-
sterioribus anterioribusque cruribus duplicatis. Porro vitulum
sextipedem, & vitulum cum duobus capitibus caninis septem-
que pedibus vitulinis, ex Lycosthene & aliis congeffit Johannes
Geor-

Georgius Schenckius *monstror. histor. p. 104 seqq.* De vitulo monstroso gemello observationem atque figuram communicat Johannes Mauricius Hoffmannus *M. N. C. Dec. III. an. 1. obs. 143. p. 238.* Monstrum vitulinum biceps seu bifrons delineat Johannes Schmidius *M. N. C. Dec. I. an. 4. & 5. obs. 63. p. 207.* Aliam vitulam bicipitem anno 1673. Stadæ natam depingit Christophorus Listorpius *l. a. an. 6. & 7. obs. 74. p. 103.* Vitulum venalem, cui duo capita a latere conjungebantur, se vidisse scribit Petrus Borellus *histor. med. phys. cent. III. hist. 3. p. 199.* Idem vitulum vidit, cui caput unicum, corpora duo, cauda tamen una erat imperfecta, & duobus pedibus posterioribus carebat, sex enim erant tantum in duobus vitulis per femora conjunctis; caudam unam etiam habuit perfectam, aliam vero imperfectam &c. Ibidem etiam *p. 198.* dictus Borellus suum bicorporeum cum unico capite se vidisse scribit. Et porcum uno capite, quatuor auribus, duobus oculis ac linguis, octo pedibus, corpore a capite ad umbilicum usque conjuncto, ad posteriores vero partes separato, in Sungoia natum esse ex Lycosthene refert Johannes Georgius Schenckius *l. a. p. 115.* in quo tractatu varia animalium gemellorum & monstrorum exempla reperies. In pago Blandio Meloduni ortus est agnus triceps; medium caput reliquis crassius erat; balante uno reliqua pariter balabant capita. vid. Fort. Licet. *demonstr. lib. I. cap. 4. pag. 22.*

§. 9.

Gemelli in
mola.

De gemellis in mola comprehensis sequentem observationem communicat Adamus Brendelius *Ephemerid. academ. nat. cur. cent. III. & IV. obs. 164. p. 375.* Mulier quædam post partum alterum de tensivo abdominis dolore, murmure & insultibus hysteris, appetitu dejecto, & lassitudine artuum per tempus aliquot conqueritur, facies pallido & livido infecta colore squallet, catamenia inordinate manant; subinde penitus exarescunt, ut tandem in suspicionem graviditatis propter abdominis in-

crescen-

crescentis molem, veniret. Demum post duos, & quod excurrit, menses, ex insperato terrore perculsa, exquisitissimos dolores hystericos, & profusissimam mensium fluxionem, cum grumis sanguineis experitur, inter quos caro deformis, ossibus destituta, & vasis dives, cum larga hæmorrhagia prodit, in cujus medio duo gemelli conclusi latebant, si figuram molæ spectes, ad similitudinem parvi cyprini accedebat, de qua mulierculæ multa non sine risu confabulabantur. Paulo tamen aliter hanc observationem recenset idem Brendelius *Decad. II. observat. anat. obs. 3. p. 12.* scilicet dictam molam non æque a viva adhuc muliere fuisse rejectam, sed hanc mulierem, cum ultra dimidium anni cachexia conflictata esset, tandem lente consumptam exspirasse. Deinde sic pergit dictus autor: Secto abdomine, intestina in aquam flavam, & eam copiosam immersa, natitabant, uterus crassus, durus, ac tantum non scirrhusus, ovarium sinistrum flaccidum & hydatidum plenum, dextrum vero solidiusculum erat, in quo corpus luteum & spongiosum, quod ovulo, ut Malpighius de utero scribit, pro custodia servit, conspiciebatur. Aperto utero mola, quam vocant, in conspectum prodibat, qua secta, intus duo gemelli, membranulis suis investiti, sed ope amnii ab invicem sejuncti, latitabant, qui cum mola nitide præparati, in liquore balsamico asservantur.

§. 10.

Gemelli specie humana a vacca editi leguntur in Joh. Rhod. *obs. med. cent. III. obs. 58. p. 151.* Anno 1618. die 12. Maji ad amplissimum consultissimumque virum Jacobum Feschium juris civilis in academia Basiliensi antecessorem nostra memoria perscriptum fuit in vicina provincia, quæ illustrissimo & reverendissimo archiduci Leopoldo Austriaco parebat, vaccam gemellos peperisse forma humana, qui cum ipsa rogo traditi, viro quodam sibi fuga consulente. Quæsitum fuit a jurisconsultis collegii, num partus iste judicio tam præcipiti recte igni fuisset expiatus.

Syllepsilogia.

H h

§. II.

§. II.

Gemelli peregrino sermone loquentes.

De gemellis peregrino idiomate inter se loquentibus extat observatio in Philippi Salmuthi *obs. med. cent. II. obs. 56. p. 85.* Nobili scilicet Curdt de Voigt, præfecto in Paltzkaw, duo nascuntur filii, qui invicem colloquentes peregrino prorsus & incognito idiomate utuntur seque mutuo intelligunt, dum unus alteri aliquid porrigit cum articulato quodam sermone, sed omnibus adstantibus, tam doctis, quam indoctis plane ignoto. Datur parentibus consilium, ut eos separent, & alterum ad agnatos mittant. Obtemperant illi; inde patriam linguam, germanicam nimirum addiscunt.

§. 12.

Gemelli ab interfecta gravida editi.

De gravida interfecta gemellos enitente sequentem observationem refert Philippus Salmuth *obs. med. cent. II. obs. 1. p. 60.* Prope Halam Saxonum nobilis quidam iter faciens perdit bulgam, ex ephippio dependentem. Hanc reperit femina quædam gravida. Obvium hæc habet clericum quendam, cui monstrat hippoperam, eamque se reperisse ait: Bene ait ille, & illam paulisper comitatus interficit, capite prorsus abscisso: peramque secum aufert. Nobilis hanc amissam forte percipiens via illa revertitur, feminam reperit interfectam, & quidem gemellos enixam. Persequitur latronem, quem peram ex brachio adhuc gestantem offendens, quærit, unde illam acceperit? Hic obmutescit: arguit eum nobilis homicidii, fatetur: in carcerem conjicitur. De gravida cum marito suspensa gemellos pariente. v. Guil. Fabric. *epist. ad Mich. Dæring. oper. fol. 906.*

§. 13.

Geminorum coalitorum baptismus,

nomen.

Circa gemellos coalitos seu monstrosos, quorum paulo ante mentionem fecimus, adhuc notandum, multos equidem statim in partu, vel paulo post vita defungi, alios vero per aliquot horas, dies, septimanas, vel etiam annos, superstites permanere, qui non immerito sacro baptismatis lavacro ablui simulque nomen adipi-

adipisci solent. Imprimis autem illis, qui duobus capitibus insuper etiam duplici pectore gaudent, duplex etiam nomen imponitur, uti de duobus fratribus Italis in pectore connatis recenset Johannes Helwigius *Obs. 16. p. 44 seq.* his verbis: Anno 1644. mense Octobri Noribergam venerat homo monstrosus, natione Italus, annorum ætatis viginti septem, anteriori corporis sui parte sub sterni osse xyphoide alium hominem annexum in fasci gestans, vocabatur major Lazarus, minor Johannes Baptista Colloreti, ex plebeja familia Genuæ orti, cælibis status, aliis corporis partibus ab invicem disjunctis, ambo masculini sexus, unus altero duplo major. Major vultus colore lurido, barba & capillis spadiceis; minor magno capite, vultus colore vivaciore, albo, subrubicundo, barba & capillis nigris; alioquin ambo bene formati, præter quod minor dextro crure mancus, & oculos parumper, sine ulla nictatione & motu, apertos teneret, os quoque parum hisceret, ut vix dentes superioris maxillæ conspicerentur, eque levi oris & genarum motu conjiciebatur quicquam ruminare, ebulliente inter labia spuma candida, pauca, ac dum hoc fiebat, major plerumque syncopen vel cardialgiam quandam sentiret, quem dolorem tamen assumpto cibo vel mica panis vino imbuta, mox sedavit. Major alias pro lubitu solus edebat, potabat, sed ambo simul urinam reddiderunt: pulsuum & cordis motus singulis erat proprius, ac evidenter subsultans. Hunc Lazarum Colloredo Genuensem bis se vidisse scribit Thomas Bartholinus *Histor. medicin. Cent. I. hist. 56. p. m. 102 seq.* scilicet Hafniæ primum, deinde Basileæ octo & viginti annorum. Præter ea quæ modo ex Helwigio adduximus, sequentia addit Bartholinus: Excrementa nulla minor frater excernit nisi per os, nares & aures, nutriturque eo, quod major assumit. Unde partes animales & vitales distinctas habebit, quum & dormiat, sudet, moveatur, quando major vel vigilet, vel quiescat, vel siccus est. Uterque etiam suo nomine ad baptismatis fontem insignitus fuit, major Lazari, minor Johannis Baptistæ.

Lazarus animo ubique præfenti videbatur, nifi quod de fato subinde follicitus mortem fratris timebat, quod fe foetore & putredine exftinguendum quoque præfagiret, hinc magis in curando fratre, quam fe laborabat. Peperit autem hos foetus monftrofos pellegrina uxor Baptiftæ Colloreti die 12. Maji 1617. in parœcia fancti Bartholomæi de Cofta in ditione Genuenfi; baptizati fuerunt, ut duo corpora: unus appellatus eft Joh. Baptifta & alter Lazarus; uti ad Fortunium perfcipfit Auguftinus Pincetus, vid. Joh. Helwig. *l. a. p. 46.* ubi etiam addit: Quod autem mirabile reddit hoc monftum, illud eft, quod unus folus lac fugit, & ambo nutriuntur ac vivunt; & dum major fugit lac, obfervatur minori lac pervenire ufque ad labia, quibus ipfum lambere pergit; quam rem ego vidi & obfervavi. vid. etiam Jean Palfyn *des monftres p. 124.* Hunc Lazarum Colloredum in Italia primum, deinde & in Alfatia fe vidiffe fcribit Georgius Hieronymus Velfchius *Hecatost. I. obs. 46. p. 62.* Et Vratislaviæ in suburbio S. Mauritiï eundem vidit Philippus Jacobus Sachfius. *vid. Epift. ad Joh. Dan. Major. de cancr. & serpent. petrefact. p. 54 feq.* Idem monftum bicorporeum primo Romæ anno 1617. dehinc iterum magis adultum anno 1623. fe vidiffe, refert Paulus Zacchias *Quæft. med. legal. lib. VII. tit. 1. quæft. 9. n. 1. fol. 601.* quo loco varia de eodem annectit. Dicto Lazaro in tribus morbis pluries, quam triginta vicibus, venam fectam fuiſſe, aliaque medicamenta medicos confulere noluiſſe, ex Harſdörfferi theatro refert Lucas Schroeckius *Additam. ad Joh. Helwig. obs. 16. p. 49.* Auguſtæ tamen dictus Lazarus, febre tertiana, paroxyſmo tertio terminata, correptus medicamenta, non fine emolumento, a Lucæ Schroeckii parente, ejusdem nominis, præſcribi ſibi paſſus fuit; cumque purgans hauſiſſet pharmacum, frater ejus, Johannes Baptiſta præter debilitatis alicujus notam, copioſiori, quam alias naturaliter ſolebat, ſalivatione infeſtatus fuerat, durante vero paroxyſmo febrili inquietiorem ſefe præbuerat.

§. 14.

Aliud exemplum duorum foetuum sibi invicem cohærentium refert Paulus Zacchias *Quæst. med. legal. l. a. n. 2. fol. 601.* Anno 1610. natum erat Consignani mensis Martii die undecima; Est autem Consignanum in Tuscia diœcesis Pistoriensis, ortum ex juvencula matre, non majore annis sedecim. Puelli erant sexus indistincti & ambigui, idcirco uni Johannis, alteri Mariæ nomen impositum est. Ad umbilicum usque superne optime conformati, inde per epigastrium sibi invicem adversi cohærentes, crura ad latera exporrigebant, quorum quidem alterum alteri deerat. Utrumque ita fluxisse non segnius, quam cæteri pueri faciant nuper-nati, referebant. Sic Margareta Treuberin, quadragenaria major, vidua, conceptas ex inhonesto concubitu, in pago Hagenhausen, enixa est favente Lucina primum vivas, & baptismatis fonte irrigatas, mox tamen subsecuta morte peremptas, femellas, gemellas, si capita & artus atque viscerum plurimorum interranea species, thorace medio unico conclusas. Capita erant bina adversa fronte se intuentia, sinistrum tamen paulo majus & rotundum bichorio prius, quam dextrum oblonge depressum uteri claustra per-ruperat; Collum geminum numero parem capitis olympum gemina excipiebat cervice, pectus medium a parte anteriore & posteriore cernebatur, illic & hic prostante sterno, una tamen tantum relicta intus thoracis cavitate costis, a vertebriis dorso quasi extremis ad sternum medium geminum arcuato ductu protensis &c. vid. Joh. Mauric. Hoffmann. *M. N. C. Dec. II. an. 4. obs. 152. p. 288.* quo loco dictus Hoffmannus tam externarum, quam internarum partium figuras tribus tabulis æneis incisas communicat. Aliud gemellorum coalitorum anno 1702. mense Martio in Prussia natorum exemplum communicat Philippus Jacobus Hartmannus *M. N. C. Dec. III. An. 9 & 10. obs. 189. p. 332. de quo p. 334.* sequens relatio Germanica legitur: *Ein gewisser und wahrhafter Bericht von einer Mißgeburt; welche sich nahe bey Mühlhausen, einer Stadt im Königreich*

*Alia rara
exempla co-
alitorum.*

Preussen in einem Dorffe Nahmens Zipoten in diesem 1702. Jahre, den 9. Martii begeben, die des Schulzens daselbst seine Frau zur Welt gebracht, solcher gestalt: Es sind zwey Knæblein an einander gewachsen, ein iegliches hat seinen Kopff absonderlich, seine zwey Hænde und zwey Næbel gehabt; aber es ist nur ein Bauch, und ein männliches Glied, auch nur zwey Füße gewesen, das eine ist Matthias, das andere aber George getauffet worden, haben beyde gesogen, wenn sie geweinet, hat ein jedes für sich geweinet; sind aber etliche Tage darauff, nachdem sie von vielen Menschen gesehen worden, gestorben und zwar eins eine Stunde eher, als das andere. Sub præsidio Michaelis Ernesti-Ettmülleri anno 1708. prodiit disputatio de monstro Hungarico 1701. Szoenii, qui prope Comoram vicus est, a rustica nato. Scilicet primum exitum ex uteri ergastulo molitus est, & ad umbilicum usque prodiit foetus, in sacri baptismi lavacro Helenæ nomen nactus. Tribus horis post vero demum pedes ejus cum altero foetu priori adnato, & Juditha vocato, quæ natibus prodiit, sunt exclusi. Obtinet hoc monstrum duo capita, quatuor brachia, totidem pedes, duos truncos. Circa finem vertebrarum lumborum utraque corpora sibi cohærebant &c. vid. Nov. literar. German. an. 1708. mens. Januar. p. 31. Puerum bicipitem quatuorque brachia, reliquas autem corporis partes non duplices sed simplices & naturaliter habentem, in choro musico regis Scotiæ dulce modulatum esse variasque linguas calluisse ex Hectore Boethio & Georgio Buchanano refert Erasmus Francisci *lustige Schau-Bühne* Tom. II. p. 411.

§. 15.

Discre-
pantia vo-
luntatis.

Circa hos gemellos maxime quoque notanda est ipsorum quoad mentem & voluntatem discrepantia, sive quod differentis temperamenti corpora habuerint; siquidem sæpissime inter se rixabantur, dum alter hoc, alter vero illud avide affectabat. Quandoque etiam de realiqua amice inter se consultabant. Item siquando ipsorum partes inferiores, vel pedes contundebantur aliove modo lædebantur, tum utrumque corpus tales persentiebat

bat dolores, e contra vero, si vel acu vel alio instrumento partes superiores lædebantur, tunc unicum sive alterum tantum ipsorum corpus læsionem sentiebat. Denique etiam in ipsa morte differentia hæc annotabatur, quod altero defuncto, alter non statim, sed post multos demum dies successive atrophiam & putrefactione obierit. Vixerunt autem hi gemelli monstrofi ad annum usque vigesimum octavum. Absque dubio etiam his fratribus in baptismo diversa imposita fuere nomina. Hanc historiam etiam verbis Buchanani refert Philippus Camerarius *Horar. subcissv. Cent. II. cap. 67. p. 275.* Circa hoc tempus, inquit, monstrum novigenis, in Scotia natum est, inferiore quidem corporis parte specie maris, nec quicquam a communi hominum forma discrepans: Umbilicum vero supra trunco corporis & reliquis omnibus membris geminis & ad usum ac speciem discretis. Id rex diligenter & educandum & erudiendum curavit, & maxime in musicis, quæ in re mirabiliter profecit. Quin & varias linguas edidicit, & variis voluntatibus duo corpora secum discordia discutebant, ac interdum litigabant; interdum veluti in commune consultabant. Illud etiam in eo mirabile fuit, quod cum inferne cruralumbive offenderentur, utrumque corpus communiter dolorem sentiebat. Cum vero superne purgeretur aut alioqui læderetur, ad alterum corpus tantum doloris sensus perveniebat. Quod discrimen in morte quoque fuit magis perspicuum. Nam cum alterum corpus complures ante alterum dies fuisset extinctum, quod superstes fuit, dimidio sui computrescente paulatim contabuit. Vixit diu monstrum annos XXVIII. & decessit administrante rem Scotiam Johanne prorege. Hac de re scribimus confidentius, quod adhuc supersint homines honesti complures, qui hoc monstrum viderint. Hæc Buchananus. vid. etiam Johann. Riolan. *Oper. fol. 858.* Eodem modo circa annum salutis 1543. in confinio Britanniae & Normanniae visum est portentum in una vel potius in duabus mulieribus. Duo erant capita, quatuor
brachia

brachia, & cætera gemina omnia usque ad umbilicum. Inferius duo crura, duo pedes & cætera omnia singula, videbat, comedebat, loquebatur una, flebat, esuriebat altera, ore gemino manducabatur, sed uno meatu digerebatur. Postremo una defuncta supervixit altera, portavit pleno biennio viva mortuam, donec & mole ponderis, & foetore cadaveris ipsa quoque defecit. Varia ejusmodi exempla adducit Ambrosius Paræus *Thesaur. chirurg. lib. XXIV. cap. 2. fol. 543.* & quidem ex Lycosthene de virginis bicipitis monstrum sistit, quod, dempta capitis geminatione a natura velut ad amissim membrorum omnium venustate & perfectione contextum erat. Duo illa capita idem habebant edendi & bibendi, idem dormiendi, idem loquendi, idem rerum omnium desiderium, ostiatim victum quæritabant benigneque omnes porrigebant. Tandem tamen Bavaria illud exigere visum est; quod frequenti sui conspectu, mota fortiter gravidarum imaginatione, similem foetibus in utero deformitatis impressionem affingere posset. Anno 1475. Veronæ in Italia natæ produntur duæ virgunculæ sibi dorso ab imis humeris ad nates usque arctissime adhærentes. Monstri novitas pauperes parentes impulit, ut id per omnia Italiæ oppida ad corrogandam ex accurrente ad spectaculum undique multitudine pecuniam circumferrent. Et *fol. 546.* gemellarum virginum adversis frontibus cohærentium effigiem ponit: scribit, inquiens, Münsterus, visas sibi anno 1495. duas virgines in Bristanto pago, non longe a Wormacia, corporibus integras & numeris omnibus absolutas, sed adversis frontibus sic conglutinatas, ut nulla arte separari & distrahi unquam potuerint, ad decimum usque ab ortu annum convixerunt. Tum necesse fuit, vivam & superstitem a mortuæ cadavere divellere: sed illa sorori suæ non diu supervixit, propter inflictæ plagæ divulsivæ malignitatem. Aliam quoque gemellorum seu foetuum distincti sexus, anno 1570. Lutetiæ natorum, sibi que circa partes genitales cohærentium, effigiem addit, qui foetus baptismo donati & Ludovici,

ci, & Ludovicæ nomine insigniti sunt. Item *fol. 547.* scribit: Anno 1572. in Ponte Sæo ad Andes oppidulo prodierunt in lucem gemellæ feminæ, cætera membris omnibus perfectæ, nisi quod alterutrius manus sinistra quatuor tantum digitis distincta erat. Cohærebant autem anterioribus partibus, nempe a mento ad umbilicum usque, qui ipsis unicus, ut & cor unum erat. Vixere femi-
horam, & regenerationis lavacro insignitæ fuere &c. Sequentem historiam refert Johannes Riolanus *Disput. de monstr. cap. 5. oper. fol. 838.* Anno 1552. in Anglia non procul ab Oxonia natum est monstrum biceps, quatuor manibus donatum, sed ventre unitum, & partibus inferioribus unicum. Ex istis gemellis uno vigilante alter dormiebat, dum hic lætam faciem ostenderet, ille tristis & mœstus apparebat; quindecim dies vixere, sed alter unico die alteri supervixit. Ejusmodi exempla aliquot leguntur in Casp. a Reies *Camp. Elys. quæst. 45. n. 45. p. 560.* Scilicet Paulus Diaconus de monstro similiter narrat, quod post mortem Theodosii natum est; ab infernis ad umbilicum usque perfectus puer erat, mox in duo corpora superius dividebatur, duobus pectoribus, duobus capitibus, quorum unum edere conspiciebatur, jejunante altero, uno etiam vigilante, alterum caput dormiebat; alias etiam utrumque pariter somnum capiebat; nec tamen raro inter se contendebant, uno alterum percutiente, unde aliquando alter, aliquando ambo plorabant. Albertus quoque Magnus de duobus aliis infantibus, sic monstrose unitis mentionem facit, qui diversæ prorsus complexionis erant, & conditionis plane adversæ; cum enim unus furibundus aliquo casu erat cholericus, alter mansuetus & mitis permanebat. Et Henricus de Gandavo de duobus aliis scribit, qui ad invicem & mutuo rixabantur; alter quippe pius erat & devotus, alter vitiosus; ac dum unus orare volebat, alter de quærendis meretricibus sollicitus erat.

§. 16.

Utrum autem ejusmodi gemelli coaliti unicum tantum sint
Syllepsilogia. Li ani-

Coaliti an
unicam ha-
beant ani-
mam?

animal, siue an unicam tantum habeant animam, an duas? olim auto-
res contrariis argumentis disputare solebant, dum alii cor, alii vero
cerebrum pro animæ sede habebant. Quando proinde in ejusmodi
gemellis inter se cohærentibus unicum tantummodo cor reperi-
batur, tunc unicam animam, si vero duo corda adesse judicabantur,
duæ quoq; animæ adesse credebantur. Inquit enim Ludov. Coelius
Rhod. *Lectio antiqu. lib. XXIV. cap. 3. fol. m. 916.* quod unum cor ha-
bet, unum animal est, quod duo, animal item duplex coalitum pro-
pter conceptuum conjunctionem. Item si ex mente Aristotelis cor
sit sedes animæ, esset autem unicum, verisimile est ambobus gemel-
lis unicam datam esse animam; item cum jecur sit fons & principi-
um sanguinis, anima autem sita sit in sanguine: ut sanguinis, sic ani-
mæ unicum erit principium. Proinde Aristoteles gemellos, quibus
est cor commune, pro uno & eodem animali habuisset, etiamsi
suum cuique esset caput distinctum, inquit Johannes Riolanus *de*
monstr. Paris. cap. 5. oper. fol. m. 838. Contra medicorum, pergit
idem, & Platonis opinione cerebrum est sedes rationalis animæ,
illic *ἡγεμονικόν* residere hoc signo demonstratur, quod medici,
quanquam jurati Peripatetici, tamen læsa ratione, memoria aut
imaginatione, capiti admoveant topica, non cordi aut jecori. At-
qui unaquæque gemellarum Parisiensium suum cerebrum ha-
bebat. Quare probabilius est, si duos pueros discretos & perfe-
ctos vel tales femellas natura instituit, ita differentes animas indi-
disse. Quam ultimam sententiam, scilicet tales gemellos coalitos
duo habentes capita duas quoque habere animas duosque esse ho-
mines, plerique recentiorum amplectuntur, cum tales bicipites
diversas suas cogitationes explicent, atque differentes edant actio-
nes, uti ex hæcenus allegatis exemplis liquet, siquidem de gemel-
lis a Philippo Jacobo Hartmanno *M. N. C. Dec. III. An 9 & 10. pag.*
334. recensetur, quod altero dormiente, alter se vigilem; altero
ejulante, alter pacatum; altero sitiente, alter se exsatiatum osten-
derit. Neque etiam, uno ægrotante, alter eidem morbo est ex-
posi-

positus, quod in gemellis, quorum ex Michaelē Ernesto Ettmüllero mentionem fecimus, Lipsiæ contigit, ubi Juditha vomitu vexata fuit, Helena existente salva. Utræque tamen variolis laborarunt, quod propter contagium variolosum factum esse innuit dictus autor. Imperante Theodosio Cæsare puer natus fuit, qui umbilicotenus integer extabat, superne autem partes ejusdem gemina facie apparebant, ut duo pectora totidemque capita essent, suis partibus ac sensibus prædita. Nam & una pars aliquando cibus & potione utebatur, altera abstinebat. Sic itidem in somno, quiete, varie ac differenter se habebant, ut vicissim lusterent, & risu, & lacrymis tenerentur, mutuisque plagis se caderent, ac si diversis animis atque ingenio forent. vid. Joh. Georg. Schenck. *monstror. histor.* p. 16. Tales differentes actiones etiam paulo ante ex Philippo Camerario, Johanne Riolano, & Casparo a Reies adduximus. Quamvis etiam alii gemelli, secundum Paræi exemplum idem edendi & bibendi, idem dormiendi & loquendi, idemque rerum omnium desiderium habuerint, minime tamen exinde unicam tantum animam concludere licet, cum absque dubio variæ discrepantiæ in iisdem fuerint observatæ. Notatu digna est etiam observatio, quam idem Schenckius *l. a. p. 20 seq.* ex Jacobo Rueff recenset: Anno 1538. natus est quidam & ad perfecti viri staturam excrevit, capite & humeris tantum geminus, ita ut caput alterum ante, alterum retro esset, mira interim similitudine: Barbis etiam & oculis sese referebant mutuo. Idem erat cibi appetitus, fames eadem, vox simillima, idem uxoris, quam habebat, & excernendi utrisque capitibus erat desiderium. Annum excidebat trigesimum, quando hunc videre Jacobo Rueff contigit.

§. 17.

Quamvis autem nonnulli autores in illis quoque gemellis, in quibus non modo duo capita, sed etiam duplex thorax apparent, utriusque autem foetus coalitus vel circa cartilaginem ensiformem, *An coaliti unicum habeant cor?*

mei, vel circa umbilicum incipit, non immerito duo in iisdem corda duasque animas præsupponant, dubii tamen interim manent, an in iis foetibus, in quibus duo equidem capita vel etiam duo colla, totum vero reliquum corpus quoad externa simplex tantummodo & naturale apparent, unicum solummodo cor lateat, secundum cujus numerum dicto foetui vel unicam vel duplicem animam adscribere possint; siquidem in ejusmodi gemellis interdum vel duo perfecta corda, vel unicum divisum pluribusque cavitatibus dotatum, interdum etiam duplex epar & intestina aliaque viscera deprehenduntur duplicia; quorum tamen simplicitatem vel duplicitatem, cujus notitia ad nominis in baptismo impositionem maxime necessaria esset, absque dissectione minime dignoscere licebit; quapropter potius ex capitibus, tanquam partibus principalibus externis, quam cordibus interne latentibus judicandum erit.

§. 18.

*Gemelli diu
in abdomi-
ne retenti.*

De duobus gemellis, diversi sexus, per conceptionem tubariam, extra uterum in abdomine per septem fere annos occlusis, posteaque defuncta illustrissima matre a chirurgo quodam exemptis, exemplum communicat Franciscus Mayr *M. N. C. Dec. III. an. 4. obs. 77. p. 167 seqq.* quam alibi, ubi de conceptione tubar. egimus, prolixius recensuimus. Scribit etiam Alexander Benedictus *de re medic. lib. XXV. cap. 23. fol. 475.* in Cypro insula tempestate nostra feminam geminos peperisse, accepimus, alterum octavo mense, alterum decimo nono macie confectum utrinque dentatum, qui capitis partem, quam sinciput vocamus, consumperat: is statim editus omnium admiratione per umbilicum irrepsisse dicitur: tanquam monstrificum animal vivum sepeliri iusserunt.

§. 19.

*Gemello-
rum jus
primogeni-
turae.*

De gemellorum primogenitura, sive cuinam illorum primogeniti nomen & jus proprie tribui debeat, cum aliis, ad dominos juris-

jurisconsultos imprimis spectantibus, evolvatur Paul. Zacch. *Quæst. medic. legal. libr. IX. tit. 12. qu. i. fol. 817 seqq.* Herm. Fri-
der. Teichmeyer. *institut. medic. legal. cap. II. p. 11 seqq.* Conrad.
Philipp. Hoffmann. *de puerper. tempor. cap. II. §. 35. seq. p. 61 seqq.*
ad 65.

SECTIO III.

De superfœtatione.

CAPUT I.

De Superfœtationis possibilitate.

§. I.

FActa aliquoties in gemellatione superfœtationis mentio, *Superfœ-*
pluribus adhuc de eadem differendi occasionem præbet. *tatio.*
Quamvis enim tam in gemellis quam superfœtatis simul *differat a ge-*
duo fœtus in utero materno contineantur, hæc tamen inter eos *mellatione.*
intercedit differentia, ut illi uno eodemque tempore concipian-
tur, posteaque eodem etiam tempore nascantur, hi vero succes-
sive diversoque tempore tam concipiantur, quam nascantur, ita
ut uno partu jam edito, successive alius vel plures fœtus diversa
post tempora edantur; sive ut gemellorum ovula uno eodem-
que coitu, vel eadem nocte repetitis congressibus fœcundentur,
posteaque eodem partu, vel paulo post, & sæpe quidem iisdem
membranis inclusi, gemelli edantur; superfœtatorum autem o-
vula non simul, sed post aliquot dierum, septimanarum, vel lon-
gius etiam temporis spatium, diversis amplexibus, imprægnen-
tur, ideoque etiam neque iisdem contenti secundinis, sive mem-
branis, neque eodem tempore, sed pro diversitate conceptio-
nis, modo citius, modo tardius post se invicem superfœtati ex-
cludantur. Et Christianus Fridericus Garmannus *Discurs. phys.*
med. de gemell. & part. numerosior. cap. 1. §. 6. partum gemellorum
a superfœtatione ita distinguit: quod gemellorum conceptus

uno aut saltem mox iterato congressu fiat, eique unico partu, quamvis successive excludantur; superfoetatio autem fiat aliquando post aliquot septimanarum decursum, prius facta conceptione. Unde si duos foetus hoc modo utero gestet gravida, improprie gemini dicantur, quia nec uno coitu concepti, nec uno instante partus termino lucem haurire gestiant. Et juxta Wilh. Hulder. Waldschmieds *Dissertat. de superfoetat.* sentiendum est: si uno congressu ovulum foecundum redditur, simplex fit conceptio, aut gemellorum, cæteris tamen paribus; si duorum vel plurium foetuum rudimenta præexstiterint in tali ovulo: id quod etiam, sed multo infrequentius contingit, si unum, duo, tria ovula unico coitu imprægnantur. E contrario fit superfoetatio, si a prima ovuli cujusdam foecundatione & conceptione, a nova cohabitatione post temporis aliquod intervallum instituta, novum imprægnatur ovulum, novaque fit super priorem conceptionem conceptio. Secundum Petri Pauli Peredæ *Schol. in Mich. Johann. Paschalii method. curand. lib. I. cap. 55. pag. m. 153. b.* superfoetatio non solum in primo mense, sed & in quarto & quinto contingit; quod sequenti exemplo confirmat: Uxor cujusdam doctoris, qui hic Valentiaë regiaë cancellariaë præsidebat, Gallart appellati, post quatuor menses ab obitu viri filium peperit, & deinde nono mense alterum &c.

§. 2.

Definitio.

Varie tamen superfoetationem medici describunt, siquidem Danieli Sennerto *pract. medic. lib. IV. Part. II. sect. 4. cap. 6. p. m. 308.* superfoetatio appellatur, quando ex diversis congressibus plures foetus concipiuntur. Et juxta Ambros. Paræi *chir. lib. XXIII. de homin. generat. cap. 32. fol. 519.* superfoetatio nihil aliud est, quam secunda quædam conceptio, cum scilicet gravida jam mulier iterum viri concubitu usa concipit. vid. etiam Joh. Conrad. Axtii *dialog. de part. septimestr. p. 71.* Quæ tamen Paræi definitio Paulo Zacchiaë *quæst. med. legal. lib. I. tit. 3. qu. 4. n. 2. fol.*

m. 102. non probatur, cum non explicet rei naturam, nisi verborum circumvolutione eam declaret, ut ab ipso factitatum est. Siquidem dicentes: quod superfœtatio est secunda quædam conceptio, possumus & hanc secundam conceptionem factam intelligere post prioris conceptus editionem. Et Georgius Francus *annot.* in dictum Zacchiæ locum, recte Paræi definitionem a Zacchia taxari scribit, nec meliorem esse Sennerti addit. Idemque Francus etiam *satyr. medic. 13. §. 3. p. m. 222.* inquit: Secundum Herculis Saxonix praxin superfœtatio nihil est aliud, quam secunda conceptio post primam facta. Sed quot instantias hæc patitur descriptio, bone deus! nec multo videtur melior illa Sennerti, quæ dicitur esse, quando ex diversis congressibus plures foetus concipiuntur. Quamvis autem Sennerti atque Saxonix definitiones aliquam obscuritatem præ se ferre videantur, vix tamen Paræi definitio, mea quidem sententia, neque a Paulo Zacchia, neque a Georgio Franco virgulam censoriam meruisse videtur, cum non modo ibidem mulieris gravidæ, sed etiam viri concubitu iterum usæ mentionem faciat, imo ipse Zacchias Paræi verba pro ipsius quasi excusatione adducat, necesse, inquiens, habet Paræi definitio ea, quæ ibi sequitur, declaratione, nimirum, cum scilicet mulier adhuc gravis iterum concipit. Porro Michael Ettmüllerus *oper. tom. II. fol. 1073.* inquit: Superfœtatio fit, quando ovulum unum, & post aliquot septimanas vel menses repetito denuo congressu aliud foecundatur, unde post partum primum aliquot septimanarum vel mensium alius partus vitalis supervenit. Hermannus Fridericus Teichmeyerus *institut. medic. legal. cap. II. p. 73.* superfœtationem ita definit: Superfœtatio sive superimprægnatio, germanice *Überschwängerung*, est conceptio, supra conceptionem facta, cum scilicet mulier jam gravis iterum ex novo coitu & novo semine alium infimul foetum concipit. Anutius Foësius *annotat. in Hippocrat. oper. sect. VII. f. 236.* superfœtationem vocat, quan-

quando concepto foetu, alter præpostere conceptus est. Andræ Laurentio *histor. anat. lib. VIII. quæst. 22. fol. 313.* est superfoetatio, quam græci ἐπικύησις dicunt, nihil aliud, quam secunda conceptio, cum gravida jam mulier iterum cum viro coiens concipit, quasi sit nova quædam supra jam conceptum puellum foetatio. Et juxta Conrad. Phil. Hoffmann. *de puerper. tempor. cap. 2. §. 31. p. 55.* superfoetatio nihil aliud est, quam conceptio supra conceptionem facta, cum superfoetatio fiat, quando mulier, quæ jam concepit, & gravida est, ex novo coitu, novoque semine, alium insuper foetum concipit.

§. 3.

Denomina-
tio.

Pro meliori autem superfoetationis explicatione alii autores alia denominatione aliaque descriptione utuntur. Nonnulli enim eandem superimprægnationem, alii conceptionem supra conceptionem, græce ἐπικύημα vel ἐπικύησις ab ἐπικύω vel ἐπικύισκω, vel ab ἐπὶ super & κύω gravida sum. v. Joh. Jac. Fr. Vicar. *Bas. medicin. lib. I. c. 3. p. 32.* Germanice *Überschwängung*, vid. Cosm. Viardel *Hebammenbuch lib. I. cap. 6. p. 23.* Nomen græcum ἐπικύημα Johannes Goræus *definit. fol. 113. b.* explicat, quod sit foetus alter gravida jam muliere conceptus. Sic Paulo Zacchiæ

Descriptio.

l. a. superfoetatio tunc fit, cum mulier, quæ jam concepit & gravida adhuc est, ex novo coitu ac novo semine alium insuper foetum concipit; Et juxta Joh. Fernel. *physiolog. lib. VII. cap. 12. p. m. 190.* si post conceptionem ex alio congressu semen utero concipitur, gemelli non fiunt, sed ea fit, quæ superfoetatio dici solet. Non enim uno tempore, sed dierum interjecto numero eduntur ii foetus: estque ut concipiendi, sic & pariendi, tempus varium; vel secundum Georg. Franc. de Franckenau *satyr. medic. 13. p. 222.* est superfoetatio, qua intra pauciores dies, hebdomadas vel menses, post prioris foetus alicujus conceptionem, unus vel etiam plures adhuc foetus ex diversis congressibus concipiuntur. Johannes Sperling *de format. homin. in uter. cap. 4. qu. 3. p. 75.* inquit:

Super-

Superfoetatio est conceptio supra conceptionem facta. Cum scilicet gravida iterum congregiendi supra foetum priorem concipit alium. Et Michael Ettmüllerus *Oper. Tom. I. fol. m. 163.* statuit, quod, si post aliquot, a prima conceptione, septimanas vel menses ex repetito denuo coitu contingat, ut unum ovulorum in ovariiis post alterum foecundetur, fiat superfoetatio, unde partum primum aliquot septimanarum vel mensium spatio alius partus supervenit. Vel juxta verba Johannis Muralti *Colleg. anat. lect. 12. p. 200.* *Die Uberschwangerung ist eine zweyte Empfengniß, welche geschieht, wenn das Kind in der Mutter allbereit formiret ist, und seine Gliedmassen hat, da dann die Frau in ihrem Leibe noch ein anders empfängt, welches zwar selten bey den Menschen, öffters aber bey unvernünftigen Thieren zu geschehen pfleget.* Quæ verba etiam in Cosm. Viardel *l. a. p. 23.* extant.

§. 4.

Utrum vero revera in mulieribus dentur ejusmodi superfoetationes, nonnulli veterum medicorum, & quidem ideo dubitarunt, quia gravidis post primam conceptionem internum uteri orificium ita claudatur, ut ne acum quidem, multo minus, pro novo foetu sufficientem feminis virilis quantitatem admittere possit; deinde etiam quod uterus absque summo foetus in utero jam commorantis detrimento aperiri non possit. Insuper etiam prior foetus veteribus uteri cavitatem adeo implere credebatur, ut nulla supersint loca, quibus posterior adhærere aut saltem, propter compressionem, commode accrescere possit. Unde periculum oriatur, ne prioris foetus immatura consequatur exclusio. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. practic. cas. 69. p. 901.* Alii contra superfoetationem hanc quoque movent objectionem: si vasa omnia primi foetus chorio & involucris ita adhærent, ut ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac, si profluat, abortionis periculum portendat, quia vincula & vasa abrupta esse indicium est; qui fieri potest, ut superfoetatio fiat, si neque sunt va-

Superfoetatio an detur? Negatur.

fa, quibus coagmentetur novum chorium, neque, per quæ novus foetus alimentum suscipiat? vid. Roder. a Castr. *de Natur. mulier. lib. III. cap. 13. p. 149.* Negativæ quoque sententiæ ex recentioribus adhæret Gerardus Blasius *Comment. in Joh. Vesling. Syntagm. anatom. cap. 7. pag. 102.* Inscitiæ, inquit, in anatomicis indicium non parvæ est, in utero muliebri cellulas quærere, majoris, hinc contendere, posse feminam foetus plurimos concipere: nihil enim tam rarum, quam vera superfoetatio, quam cum Cl. Patino aliisque neque unquam vidi, neque possibilem judico, licet varii contrarium sustinere conentur. Quidam etiam feminis humanis superfoetationem non concedunt, quia ipsarum uteri, non æque ac brutarum feminarum sæpe superfoetantium, in duas vel plures cellulas sunt divisi, &c. vid. Joann. Hucher. *de Sterilitat. lib. III. p. 453.* Dicunt etiam multi, impossibile esse, ut uno edito eoque primo partu atque perfectiore, alter superfoetatus, non simul in tanto naturæ conamine ejiciatur. vid. Georg. Franc. *Satyr. 13. p. 223.* Paul. Zacch. *Quæst. medic. legal. lib. I. tit. 3. qu. 3. n. 2. fol. 97.* Et Johannes Sperlingius *de Format. homin. cap. 4. qu. 3. p. 76.* negantium rationes his verbis explicat: Si uterus facta conceptione tam exquisitè clauditur, ut ne acus quidem aciem & specilli cuspidem admittat, unde illa nova conceptio? Si virili semini ad uterum, ob osculum interius exactissime clausum, non patet aditus, unde illa superfoetatio? Et pateat porta, nullum tamen in uteri cavitate vacuum datur, cui semen novum immitti, & conceptus supra conceptum fieri possit? Fiat autem & hoc, aperiatur uterus, immittatur semen novum, qui vero accidit, quod conceptus prior non exeat? Quibus ille coercetur repagulis? præsertim cum intra tres, quatuor aut quinque dies post primum conceptum contingit superfoetatio. Vetat Hippocrates mulierem coire post semen retentum per decem aut duodecim dies. Quia nempe verendum, ne ejiciatur conceptus prior. Si hoc, cur idem non accidit in superfoetatione? Forsan superfoetare cum creduntur quædam,

dam, id habemus, quod in tritico: Cum scilicet ex uno grano tritici plures pullulant spicæ, quarum una citius, altera serius maturascit, una ad perfectionem perducitur, altera vacua & infructuosa remanet. Plures autores superfœtationem negantes allegat G. Francus *Satyr. med.* 13. p. 220. 222. vid. Casp. Posner. *Geneanth. Tab.* 4.

§. 5.

Sequentes rationes contra superfœtationem ex aliis autoribus allegat atque defendit recens autor A. O. Gœlicke *Med. Forens. spec.* III. §. 3. p. 34. f. 1) Superfœtationem esse rem usque adeo raram, imo rarissimam, ut inter millies millenas imprægnationes vix semel atque iterum contingere soleat. 2) Nullam femellam brutam superfœtare, sola muliere excepta. 3) Superfœtationem non modo ægerime per se agnosci, sed & superfœtatum a gemellis haud facile discerni. 4) Superfœtationem fieri vix posse, nisi tribus vel quatuor diebus post priorem conceptionem. Quod tamen adsertum qua ratione cum eo conciliandum sit, quod integris quadraginta diebus vel duobus demum mensibus superfœtatum post primum legitimum conceptum excludi possit, vix apparet. 5) Superfœtationem non nisi a primo conceptionis legitimæ die ad trigessimum usque contingere; transacto illo tempore autem prorsum impossibilem esse; quia, cum uterus paulatim indies repleretur semen recens vix admittere, nedum admissum retinere valeret. 6) Ipsas quoque leges superfœtationem talem, quadraginta diebus post primam conceptionem factam inter portenta & miracula naturæ referre. Ex his præsuppositis doctrinæ de superfœtatione falsitatem liquido agnosci posse, prolixius monstrare conatur allegatus autor, qui etiam p. 44. pergit, portentosas veterum enarrationes de superfœtatione multis quoque recentiorum glaucoma induxisse, & inter multos alios bonum quoque Sennerum seduxisse, ut non modo ipsius superfœtationis existentiam agnosceret, sed & causas ejus, differentias, signa tam diagnostica, quam prognostica ipsamque plane medendi methodum cum

therapia tradiderit. Quod ipsum nihil reapse aliud est, quam quis regionem Slarafforum, quæ nunquam in rerum natura fuit, secundum principales urbes, vicos, pagos, sylvas, flumina, montes, imo incolas plane describere vellet. Omnimodam orificii uterini clausuram post primam conceptionem indicat etiam H. v. Poort in *Hippocrat. Aphorismetric. Paraphr. p. 9 seq.* ita canens:

Cum virum passa est mulier, futuri

Siquidem fœtus rudimenta matrix

Claudit, arctari solet, ut marinæ

Tegmina conchæ:

§. 6.

*Aliorum
sententia
affirmativa.*

Adductis tamen veterum rationibus alii diversimode contradicunt: v. g. ad objectionem de plenaria orificii uterini, post factam conceptionem, occlusionem, item de sanguinis menstrui impedito affluxu hincque dependente abortu ita respondet Rodericus a Castro *de Natur. mulier. lib. III. cap. 13. p. 149.* primæ objectioni sunt qui respondent, gravidarum uterum in coitu perpetuo aperiri, veteres tamen docuisse, sponte sua non hiare; alii uterum post conceptionem, certis temporis intervallis aperiri, rentur, ut excrementitiis humoribus, qui in ipso cumulari solent, exitus pateat, ideoque concipere gravidam, quæ tum temporis in viri amplexum venerit; Qui tamen rem accuratius considerant, uterum tantummodo aperiri tradunt, cum avidior est, & libidine effertus, aut jucundam nimis sentit viri titillationem, perinde ac ventriculi orificium, a pastu clausum, oblatis delicatioribus cupediis referatur, non tamen quibusvis hominibus, sed edacioribus, hoc tamen rarissime contingere, atque adeo rarissime fieri superfœtationem. Secundæ objectioni dicendum est, id, perpetuo sagacissimæ naturæ curæ esse, ne omnia vasa pro sui nutritione unico fœtui implantentur, sed semper aliqua servari, vel ad mensium purgationem, si forte sanguis redundet, ne copia fœtura suffocetur vel ad novos conceptus alendos, si forte concubuerit femina & seinen

femen concipiatur, ut per dicta vasa, quæ majoris utilitatis gratia otiosa huic usui relicta sunt, novum foetum fabrefaciat. Secundum Joh. Hucher. *de sterilitat. lib. III. p. 453.* humanis feminis secundam conceptionem, prima non sublata, consuetam esse, autores sunt Hippocrates & Aristoteles, iis scilicet, quibus per ardorem libidinis uteri os internum recluditur, semenque virile in id uteri latus reconditur, quod a priori conceptu liberum magisque vacuum relictum est. Itaque superfoetantes feminas omnes esse natura calidas, thorosas, genitalibus pilosis, acrique semine & menstruo multo circa uterum collecto, turgentes: utero denique ipso robustis facultatibus prædito, ut aperiatur, attrahat retineatque conceptum foetum præ seminis aviditate, neque expellat: ut gravantem sanguinem solet per primos imprægnationis menses. Et Johannes Sperlingius *loc. modo all. p. 77.* rationes contra superfœtationem allegatas falsis non carere inquit: Falsum esse, conceptione facta tam arcte claudi uterum, ut nec mucronem specilli admittat, uti nonnulli Aphorismum Hippocratis *Sect. V. Aph. 51. ὁκόσται ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τῶν ὅλων τὸ σῶμα τῶν ὑπερέων συμμέμυκεν* vertunt & explicant: Quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est. Qui tamen Spigelio non recte Hippocratem intellexisse videntur, qui ita illum vertendum censet: quæ uterum ferunt, iis os uteri connivet; *συμμέμυκεν* enim non significat (ut ipsi explicant) prorsus clausum esse, ut stylum ne minimum admittat; sed connivere, ut nos palpebris, cum dormimus. Item, ex Spigelio pergit Sperlingius, uteri os interius gravidis hiat, tantoque magis, quanto sunt partui viciniore, quicquid etiam alii crepent ex Hippocrate, cum ipsi nec recte Hippocratem intelligant, neque experientiam consulant. Ego vero non tantum centies id tetigi, sed & obstetrices investigare docui, ut cognoscerent, revera gravidæ essent mulieres, an molam tantum generent, cum facile digito id explorare liceat. Docui quoque easdem, cum tempore partus maxime hiet, investigare, foetusne versus terram capite sit convolutus,

an proprium adhuc situm teneat, ex quo colligant, jamjam instare partum, aut longius adhuc abesse &c. Ex quibus Spigelii verbis ita concludit demum *l. a.* Sperlingius: nihil ergo vetat, uterum conniventem in libidinis ardore hiare novumque semen recipere. Sicut & non obstat, gravidis quandoque per eundem fluere sanguinem. Neque etiam tanta opus est hic cavitate. Tantillum spatii pro exiguo semper præsto. Membranofus enim uterus est, nunc major fit, nunc minor. Conceptus prior non effluit, quia si major fuerit, viginti, triginta aut quadraginta dierum, utero adhærescit ope membranarum. Sin minor, & uteri & conceptus robur, effluxum impedit. Hinc non omnes superfoetationis capaces sunt, sed calidæ, salaces, robustæ. Paucis tamen circa modo allegatum Hippocratis Aphorismum admonere liceat, cum Spigelio alios quoque autores verbum græcum *συνμύεσθαι* non per claudi sed connivere reddere, vid. Johann. Tilemann. *Aphorism. Hippocrat. p. 37.* Cornel. Stalp. van der Wiel *Obs. Cent. I. obs. 74. schol. p. 324.* & Johann. Heurn. *Interpret. Aphorism. Hippocrat. p. m. 383.* quo tamen loco omnimodam uteri occlusionem intelligit simulque mentem suam de superfoetationis possibilitate annectit; quæres, inquires, cum constet, superfoetationes fieri, an igitur post conceptum uterus aliquando aperiatur? maxime id evenit primis mensibus, cum uterus avidissime alterum semen excipit. Cæterum hoc signum intelligitur de illis mulieribus, quæ operam dant liberis, nam in virginibus etiam connivet. Connivet autem os uteri, ne aer subeat & semen corrumpat, uterique ne calor evanescat, quo utitur potissimum ad foetus conformationem &c. vid. etiam Joh. Bened. Sinibald. *Ceneanthrop. lib. VIII. Tract. 2. cap. 3. p. 701 seq.* Hieron. Mercurial. *Pisan. prælect. de homin. gener. f. 22.* ubi inquit: Utrum superfoetationes fiant, ut scilicet post jam factum conceptum, novus plures post dies superinducatur, nonnulli dubitarunt, quod apud Hippocratem & Galenum legatur, ubi receptum atque retentum est intra uterum semen,

men, os ipsius ita occludi, ut nec subtilissimus acus illud penetrare queat. Verum, quia autores & experimenta ostendunt, superfœtationes fieri, censerī oportet, Hippocratis sententiam ita esse interpretandam, quasi ut plurimum ita contingat; neque os uteri aperiatur, nisi quando is, licet plenus feminis eximia voluptate ductus, paulisper sese dilatat, donec illud intro trahat, exigua facta apertura.

§. 7.

Objectiones superfœtationem negantium adducit equidem *affirm. ratio.* Paulus Zacchias *quæst. med. leg. lib. I. tit. 3. qu. 2. fol. 97.* simul tamen easdem autoritate & exemplis resolvit *fol. 99.* Et Georgius Francus de Franckenau *satyr. med. 13. §. 4 seq. p. 222 seq.* ad quæstionem, an detur superfœtatio? aliquot negantes autores allegat, pagina tamen sequenti affirmantium partes tam ob autoritatem, quam experientiam, beatiores esse prolixè defendit. Superfœtationem affirmat etiam Conradus Philippus Hoffmannus de *puerper. tempor. cap. 2. p. 55 seq.* inquit: Multi equidem negarunt exinde superfœtationem, quod uterus concepto femine illico ita arctetur & claudatur, tamque arcte amplexetur, ut vacuum in ejus cavitate locus nullus maneat; imo quod os interius ipsius uteri adeo comprimatur, ut ne specilli quidem tenuissimi mucronem admittat. Sed respondetur, illud licet verum asseramus, si tamen mulier coitu utens, ex eo summam percipiat delectationem, uterus ingenti illa voluptate irretitus quasi obviam irruenti femini non minus, ac in priori conceptu antea fecerat, hiantem se offert ore, ut ea, qua flagrat virilis feminis aviditate, sese expleat; atque ratione ejus corpus quatenus per longum arctari, & per latum dilatari potest, irruenti femini locum aliquem præbet. Idem autor etiam *loco alleg.* ad quæstionem, num partu jam edito successive plures adhuc fœtus, diversa post tempora edi possint? respondet, quod sic, idque ex superfœtatione. Casus, ubi hæc quæstio Jctis necessaria videri possit,prehenditur in
ma-

materia secundarum nuptiarum. Vidua enim de jure prohibetur intra annum luctus ad secundas convolare nuptias. Si quaeris hujus constitutionis rationem? sane turbatio sanguinis objicitur, quæ metuenda esset, si secundus maritus cum vidua prægnante relicta concumberet, cum facilius superfoetatio ex concubitu insequi posset. Primaria igitur hujus prohibitionis ratio videtur esse non sanguinis turbatio, sed superfoetatio. Superfoetationem sequenti modo defendit Wilhelmus Huldericus Waldfschmied *dissertat. de superfoetat. B. 2. b.* quod si a personis fide dignis, ea quæ nec plane nova atque inaudita, nec per naturam impossibilia existunt, & quorum ipsi per propriam experientiam convictos sese affirmant, tradantur, ecquis quæso de talibus dubitabit? Nisi fidem historicam omnem proscribere velimus; imprimis si nulla fraudis aut mendacii suppetat ratio. Atque hæ sunt illæ causæ, illa momenta, quibus ego cum aliis inductus superfoetationi cuidam prætensæ subscribo. Nec plane impossibile est, superfoetatio aut secundi foetus conceptus, gravida jam existente muliere, aut quando intra pauciores dies, hebdomadas vel menses post prioris foetus alicujus conceptionem, unus vel etiam plures adhuc foetus ex diversis congressibus concipiuntur.

§. 8.

Alia sententia.

Neque tamen omnes recentium atque superfoetationem defendentium rationes aliis satisfaciunt, inquit enim Andreas Laurentius *histor. anat. lib. VIII. quest. 22. fol. 314.* fuere quamplurimi, qui uterum certis temporibus mira naturæ providentia ad noxiarum exclusionem aperiri somniarunt. Si ergo ea hora coeat mulier, poterit virile semen, cujus desiderio fremit & ardet, excipere: inde superfoetatio. Sed deliramenta sunt hæc, & meræ nugæ. Si enim certis temporibus toto graviditatis tempore uterus aperitur, ut supervacua expellat, cur retinentur lochia toto novem mensium spatio? Poteritne ea hora, qua foeda humorum illuvie expurgatur, uterus semen concipere? extinguetur mehercle,

cle, & obruetur genitura. Sunt ex neotericis, qui uterum semper hiare, neque exquisitè claudi contendunt, suumque dogma his rationibus stabiliunt: Fluunt sæpissime utero gerentibus menses pallidi, pituitosi, nigri, qui in uteri cavitate latitant. Non ergo ita exquisitè ejus osculum intercluditur. Deinde, mulier gravida in coitu semen effundit, quod per pudendum effluere sentit. Non potest autem per pudendum exire, nisi ab uteri cavitate per osculum eo decedat; quia mulier semen suum per cornua, id est, latera in cavitatem & fundum uteri ejaculatur. Hiat ergo perpetuo osculum, unde facilis superfætatio. His rationibus magnum se quidpiam fecisse putant; cum tamen, ob anatomicæ artis imperitiâ, Hippocratico splendori tenebras offundant. Namque, pergit Laurentius, ut primam eorum rationem impugnem, an ignorant, per uterum duarum venarum propagines spargi, quarum aliæ ad internam uteri cavitatem feruntur, foetum alituræ: aliæ ad exteriorem uteri partem, cervicem & pudendum usque, excurrunt? Per has toto graviditatis tempore sanguinem fluere, & corporis supervacua expurgari quid prohibet, interiore uteri osculo nullo modo hiante? Postrema ratio urget magis, nisi a nobis deprehensi essent duo ductus, semini muliebri excernendo dicati. Prior ductus ad cornua, hoc est, latera uteri emicantia fertur, quo semen in uteri fundum, si gravida non sit, ejaculatur. Alter ductus, veteribus & neotericis etiam incognitus, a nobis sæpe in publicis sectionibus observatus, priori continuus per latera uteri ad cervicem & pudendum desinit. Hoc gravidas semen effundere existimamus, & ideo majore in coitu voluptate frui &c. Ad has duas rationes contra superfætationem, scilicet quod 1) ob uteri, a prima conceptione, constrictionem sperma masculinum neque excipi neque contineri, multo minus talis conceptio iterata succedere possit, 2) quod mulieris, jam prægnantis semen, non minus quam masculinum ad secundam conceptionem necessarium, hac ratione non in uteri

cavitatem seu fundum, sed potius per certum vas in orificii interni extremitatem atque vaginam effundatur; eadem cum Andrea Laurentio, modo allegato respondet Franciscus Mauriceau *de morb. gravidar. lib. I. cap. 9. p. m. 109 seq. edit. germ.* & ex hoc Theophilus Bonet. *polyalb. sive Thesaur. med. pract. tom. III. lib. V. fol. 334 seq.* ubi totum fere Mauricæi caput reperies. Alios autores superfoetationem affirmantes allegat Georgius Francus *satyr. med. 13. §. 5. p. 223.* Marcell. Donat. *de med. histor. mirab. lib. IV. c. 16. p. 389 seq.* Gregor. Horst *oper. tom. I. fol. 122 seq.* Casp. Theoph. Bierling *thesaur. theor. pract. cas. 69. schol. p. 902.* Cornel. Solingen *vom Amt der Wehmütter, cap. 5. p. m. 605 seq.* Dan. Sennert. *pract. lib. IV. part. II. sect. 4. cap. 6. p. m. 308 seq.* Wilh. Hulder. Waldschmiedt *dissert. de superfætat. B. 4. b.* Herm. Frider. Teichmeyer. *instit. medicin. legal. cap. II. p. 74 seq.* Dionis *Traité des accouchem. lib. I. cap. 18. p. 116 seq.*

§. 9.

Superfoetationis modus

De modo & causis superfoetationis, sive qua ratione femina jam gravida post aliquot tempus denuo concipere, sicque binos foetus, alterum majorem, alterum minorem simul per tempus in utero gestare, demumque unum post alterum, quandoque post aliquot dierum, horarum vel etiam mensium præterlapsum spatium parere atque in lucem edere possit, varia equidem hætenus adduximus, restant tamen adhuc alia ex autoribus annectenda. Inquit scilicet Hippocrates *de superfætat. oper. sect. III. fol. 41.* superfoetant mulieres, in quibus uteri os post primum conceptum non ita valde clauditur. Et juxta Petr. Paul. Peredæ *schol. in Mich. Joan. Paschal. meth. cur. lib. I. cap. 55. p. 153. b.* causa superfoetationis non consistit in eo, quod orificium uteri sit apertum aliquantulum, quæ semper evenit orificio ita clauso, ut ne specilli cuspidem admittat: sed in uteri attractione, quæ tunc contingit, quia dilatatur in coitu a fricatione, & calore orificium uteri, & ita semen attractum potest uteri cavitatem subire. Et Cosmus

Viar-

Viardel de *part. mulier. lib. I. cap. 6. p. 24 seq.* ait: Es ist derjenigen Meynung am glaubwürdigsten, welche behaupten, daß die Überschwängerung bey denen Weibern, welche sehr blutreich sind, möglich seye. Dieweil selbige, ob sie schon empfangen, gleichwohl viel überflüssiges Geblüts haben, welches in der Mutter liegend, dieselbe erweitert, und oftmahls sich seiner zu entledigen nöthiget, daher es kömmet, daß viele Weiber, auch wohl so lange sie schwanger gehen, ihre ordentliche Zeit haben, und durch die Gefäße des Halses der Mutter sich reinigen, welches nicht geschehen könnte, wenn sich das innere Mundloch der Mutter nicht augenscheinlich eröffnete. Wenn nun eine Frau zu selbiger Zeit ihrem Manne beywohnet, so wird sie ohne Zweifel desselben Saamen in ihrer Mutter empfangen und ein neues Kind gezeuget werden, welches eigentlich eine Überschwängerung zu nennen ist &c. De causa su- & causa.

perfoetationis ita scribit Johannes Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. lib. VIII. tr. 2. cap. 3. p. 701.* Verum quidem est, & magnus declaravit Hippocrates, post conceptionem os uteri adeo connivere, ut vix acus specillum intromitti valeat. At non est hoc perpetuæ veritatis axioma, quandoquidem ob feminis aviditatem interdum penitus illud non occluditur, quare alterum semen uti famelicum excipere potest; quod si in utero congruam sanguinis reperiatur copiam, statim sequitur coagulatio, fermentatio prævia ad novam prolem; unde colligimus, superfœtationem ut plurimum, imo semper contingere apud mulieres sanguifluas, & quæ sunt multorum pilorum & multi sanguinis, propter multitudinem, caliditatis earum. Hujusmodi namque mulieres cum insuper ratione fervidæ temperiei plurimum in venere delectentur, ideo est, ut præ voluptate os uteri dehiscat semenque avidius ebibat &c. Idem sentit etiam Daniel Sennertus *prætic. lib. IV. part. II. sect. 4. cap. 6. p. 310.* Superfœtatio, inquit, accidit, dum mulier, quæ antea concepit, cum viro iterum coit, & ex voluptate, quam percipit, uteri orificium ad semen arripiendum avidum, non nihil iterum aperitur, semenque attrahit. Si tamen

uterque foetus vitalis esse debet, necesse est, ut id accidat a primo conceptus die usque ad quartum aut circiter, quando primus foetus adhuc exiguus est, ut non difficulter locum inveniat, necdum omnes venarum & arteriarum propagines a primo foetu sunt occupatae &c.

§. 10.

*Sententia
Cornelii
Solingen.*

De superfoetatione, Belgice Nabevrugtingh genaemt, ita loquitur Cornelius Solingen Vand' Ampt ende Plicht der Vroedvrouen *cap. 5. p. II. seq.* De Lyfmoeder blyft na de Ontfancknisse soo langh gefloten, dat een eytje of twee, ider een Kind of twee bevattende, soo groot is, of zyn geworden, dat der selwer Nageboortens so vast aen de Lyfmoeder, en der selver strengen so sterckzyn geworden, dat die voorfz Nageboorte, of Nageboortens niet ligt van de Baermoeder gefepareerd; of soo dat niet is, de strength of strengen, door het dickwils bekennen of arbeyden gebroken komen de werden: Dan kan het beter gebeuren, dat als die actie van wederzyde met groote lust en furie gepleegt werd, de Lyfmoeder sich opend; en insonderheyd in een Vrouwsperfoon, die gefond en happigh is, en geen verstoppinge van de deelen tot de generatie dienende heeft: soo dat sy alsdan voor de tweedemael ontfangt, ende na 't ontfangen Kind of Kinderen, van welcke laetste een exempel hebbe, eenige tyd na d' eerste kraem voor den dagh brengt. En was dat soo niet, dat de Baermoeder sich dan weder floot als vooren, soo soude veeltids de Vrouwen, als dickmaels lust hebbende gespyckert de werden, in conformité van 't selwige, soo veelmael superfoeteren, dat den Buyck voor alle de selve de kleyn soude werden. En was het dat de Baermoeder soo digt floot, dat die geen Zaet, noch des selfs damp door liet, soo soude noit een superfoetatie kunnen geschieden, en al't resteerende bywacken de vergeefs zyn. Wanneerder twee, drie, of vier dagen naden andern noch een Kind komt, schoon in syn eygen membra-

branen befloten, kan geen superfætatie gehieten werden; maer is mede een Kind van een en defelvige ontfanckenis; 't welck meesten tyd door onkunde van de Vroedvrouw, aldaer foo langh na 't voorige gehuysveft heeft. Maer de na ontfangene of superfætationes fchelen meest een maend, ses weken en meers oock komen die gene die steels gewys bekend zyn, een enckel-demael wel van twelingen en drielingen in de kraem, maer noit van een superfætatie. vid. etiam allegati Solingii versio Germanica p. 607 seq. Superfætationem ab utero bipartito derivare videtur Casparus Bauhinus inquiens: Anne mulieres eæ, quæ superfætare solent, aut plures foetus, quam duos, generant, bipartitum uterum habeant, quemadmodum canes, lepores, & similia animalia, quæ multos generant foetus, mihi dubium movit fratris mei charissimi, Johannis Bauhini, observatio, qui circa annum 1565. dum ordinarius esset Lugdunensium medicus, in quadam puella uterum bipartitum, qualem canes habent, observavit &c.

§. II.

Sicuti vero veteres medici circa ordinariam conceptionem *Ad priora responsio.* a modernis admodum dissentiunt, dum illi ad foetus formationem feminis virilis, mediante coitu in uteri cavitationem ejusque cum femine muliebri commiscelam præsupponunt, hi vero foetus materiam potius in ovulis muliebrium ovariorum, a spiritiosa feminis virilis parte imprægnatis quærunt; ita etiam circa superfætationem priores talem utriusque feminis mixturam necessariam judicantes, de uteri orificii interni, quod statim a conceptione arctissime occludi statuunt, nova apertura, pro novo feminis virilis ingressu seu injectione solliciti, modo dictum orificium primis a conceptione diebus apertum permanere, modo post aliquot tempus a materia quadam excernenda, vel etiam ab orgasmo venereo iterum aperiri, sicque, commisso simul coitu, mariti semen absorbere sive immittere defendunt. Quam tamen feminum commiscelam (ut ad superiores rationes paucis respon-

deam) recentiores physiologi non tantum negant, sed etiam conceptionem, in superfoetatione, minime ex liquore isto, qui tempore coitus a feminis quandoque ejicitur vulgoque semen muliebre vocatur, sed, uti modo dictum, ex ovulo a feminis virilis vi plastica, vel spiritu genitali, per parvam orificii aperturam, vel etiam per alias vias, v.g. per vasa sanguinea, vel per porositatem uteri ad ovarium penetrante dependere docent, ut adeo nec magna feminis virilis quantitas, neque orificii uterini apertura semper necessaria sit, cum clauso etiam uteri orificio, vel semine virili ad illud non pertingente, per dictam vim plasticam ovulum imprægnari possit; quamvis etiam in gravidis feminis, tam primis, quam ultimis gestationis mensibus, dictum orificium quandoque hiare concedamus, quod tamen non æque pro excipiendo novo femine virili, ac pro excernendis vitiosis humoribus absque foetus detrimento accidere potest. Huc pertinent verba Cornelii Stalpartii van der Wiel *observat. rar. cent. I. obs. 74. schol. p. 325.* Uteri os postremis mensibus aliquo modo aperitur, quoniam illius ob magnitudinem foetus extensi cervix contractione brevior fit, ut haud difficile sit per id tempus uteri os digito attingere, præsertim si pedibus gravidæ insistant. Nec metus est, ne aër subintrans foetui damnum afferat, nam uteri osculum, cum hiet in gravidis, obturatur crassa & lenta materia, quæ non solum impedit ingressum aëris in uterum, sed visciditate sua, partus tempore, uteri sinum & pudendum lubricat. Et Nicolaus Venette *de la generat. de l'homme part. II. cap. 3. art. 3. p. m. 126.* inquit: Quoy que la plus-part des medecins, après Hippocrate, disent, que la matrice est tellement fermée après la conception, qu'il n'est pas possible d'y faire entrer la pointe d'une aiguille, nous sommes pourtant persuadés du contraire. Car on fait, qu'elle se decharge souvent de ses humidités superflües: & que les femmes sont engrossées une seconde fois. Nous ne manquons pas des femmes, qui nous ont instruits des pertes rouges ou blanches, qu'elles font dans le premiers

miers mois de leur grossesse, & nous avons des exemples de superfœtations, & peut-être plus souvent, que nous ne le pensons, car les jumeaux, qui naissent enveloppez de membranes différentes, & qui sont attachez à un seul arrièrefais, sont pour l'ordinaire autant de superfœtations, dont on ne s'apperçoit pas. Sic statuit Hermannus Fridericus Teichmeyerus *Instit. medic. legal. cap. II. p. 76.* in iis subjectis superfœtationem fieri, quorum muscoli sphincteres uteri natura sunt relaxati. In his nempe virilis aura, per orificium tale apertum, transitum invenire potest, atque ulterius moveri ad ipsum ovarium, ovulumque ibi existens maturum irradiare, staminaque in illo contenta, commovere ac vivificare, & sic superfœtationem præstare.

§. 12.

Porro causam tam gemellationis, quam superfœtationis, in diversis uteri cellulis quærentes veteres anatome uteri refellit. *Uterum etiam uteri cavitas a prima conceptione & unico foetu adeo impleatur, ut nulla supersint loca, quibus posterior foetus, sive superfœtatus infans, adhærere aut propter compressionem commode accrescere possit, ex ea ratione in dubium vocatur, quia dantur gemelli atque trigemini peculiaribus dotati placentis; item ejusmodi superfœtati, qui paulo post primum coitum, & quidem primis statim diebus concipiuntur, atque cum duabus placentis uterinis sibi invicem coalitis eduntur; uti in bis geminis seu quatuor foetibus cum quadruplici placenta observavit Lucas Schrœckius M. N. C. Dec. II. an. 2. obs. 9. p. 26.* Si proinde quadrigeminis, omnibus partibus rite conformatis, singulisque spithamas duas longis, uteri cavitas satis capax fuit, non est ut de duobus infantibus superfœtatis sufficienti loco dubitemus, cum uteri substantia indies successive magis magisque dilatari atque expandi possit. In superfœtatis porro quilibet foetus peculiare habet chorion & involucra. Cum etiam plura sint venarum & articularum ora ad uterum attinentia, non est verisimile, prioris infantis chorion

chorion omnibus adhærere, sed quædam libera sunt, aut ad mensium vacationem, si ea necessaria sit, aut ad novos conceptus alendos, si coitu feminam uti contigerit, juxta Casp. Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. pract. obs.* 69. pag. 902. Annon etiam sanguis menstruus in gravidis potius per uteri vaginam, quam cavitatem effluat, sub judice lis est. Quamvis etiam, secundum Blasii supra allegata verba, nec Carolus Patinus, nec ipse Gerardus Blasius talem superfoetationem unquam viderint, inde tamen minime neganda, cum alii autores eandem vidisse testentur. Et licet juxta Andreæ Ottomari Gœlicke *loc. paulo supra alleg.* superfoetatio sit res rarissima, ut inter millies millenas imprægnationes vix semel atque iterum contingere soleat, sufficit tamen eandem contingere posse; Et quod idem addit, nullam scilicet femellam brutam superfoetare, sola muliere excepta, superfoetationem mulierum potius confirmat, quam negat; cum tamen alii autores, secundum hætenus dicta, superfoetationem aliis quoque animalibus brutis adscribant. Quod de uteri aviditate, attractione & suctione feminis hinc inde adducitur, fabulis non immerito annumerandum. Neque exclusio unius foetus semper alterius quoque simul expulsionem causatur, uti sæpius in gemellis perfectis, quandoque altero vel tertio die se invicem subsequenter, observare licet. Interim tamen quandoque etiam foetus superfoetatos sive posteriores, ex variis causis simul cum prioribus prodire, vel ejici aut extrahi posse, minime negamus.

§. 13.

Modernorum
sententia.

Ut itaque superfoetationis modum ad modernorum mentem paucis describam, sciendum, quod sicuti simplicis foetus formationem ex unico ovulo muliebri, virilis feminis spirituosâ parte imprægnato, recentiores derivant; duorum etiam vel trium foetuum, unico partu editorum, atque gemellorum vel trigeminarum nomine vulgo venientium, ex duobus vel tribus ovulis, pariter unico congressu simul foecundatis, deducunt, (uti in anteceden-

cedentibus capitibus monstravi) ita superfœtationem quoque ex duobus vel tribus, non tamen unico coitu, uti in gemellis, sed diversis atque differenti tempore celebratis cohabitationibus, imprægnatis ovulis muliebribus, derivant. Scilicet si post aliquot, a prima conceptione, dies, hebdomadas vel etiam menses, uxor iterum venereo orgasmo ad novum cum marito congressum stimulatur, id quod feminis, præ aliis animalibus, vulgare esse dicitur, tunc in ejusmodi coitu pariter fœcundo, iterum unum, quandoque etiam plura ovula in ovariis solito modo excitata ex ovario a tuba Fallopiana excepta per eandem ad uteri cavum propelluntur, eidemque, uti in priori fœtu factum, firmiter adhærentia novum embryonem ad perfectionem usque nutriendum continent, & usque ad legitimum partus tempus foveant. Cum proinde superfœtationum conceptio non uno eodemque coitu fiat, uti in gemellis, hinc etiam secundum tale fœcundarum cohabitationum differens tempus horum quoque fœtuum partus variat. Juxta verba Marci Gerbezii *Chronolog. medico-practic. An. 5. §. 26. p. 353.* in superfœtationibus res aliter ac in gemellatione accidit: illæ nimirum tunc fiunt, cum, postquam unum ovum fuit imprægnatum, accessit alter coitus, per quem rursus aliud ovum accidit imprægnari. De superfœtatione ejusque a gemellatione differentia ita scribit Johannes a Muralto *Hippocr. Helvet. p. 380.* Die Überschwängerung ist, so eine schwangere Frau durch grossen Gelust in den ersten Wochen oder Monaten, noch einmahl empfähet, und von männlichem Saamen fruchtbar gemacht wird, weil die Erfahrung bezeuget, daß nach der Genesung eines Kindes etwan ein ander unvollkommen, oder vollkommen zur Welt geböhren wird, muß man glauben, daß solches geschehen von Überschwängerung, dann Zwilling werden mit einander geböhren, dieweil von einem Beyschlaff zwey Eylein auf einmahl in die Bähr-Mutter gestürzet worden. In der Überschwängerung gehet erstlich ein Eylein, bey dem andern Beyschlaff aber das zweyte herunter, welches wohl möglich seyn kan, weil die Gebärmutter sich nicht so geheb

zuschliesset, wie man vor alten Zeiten gemeynet hat, und ist der spirituo-
se Saame kräftig genug ein ander Eylein herunter zu locken und sel-
biges zu vegetiren; Über das gehet iederweilen, obgleich die Frau
Schwanger, etwas schleimiger Materie und Fluß aus der Gebährmut-
ter, also daß der Weg nicht verschlossen, auch zu einem andern Em-
pfängniß. So nun diß geschehen, muß nothwendig eine iedere absonderlich
eine Nachgeburt haben, und an sonderlichem Ort im Grund der Gebähr-
mutter angeheftet seyn. Hanc sententiam confirmat Petrus Lin-
sing. *Institut. med. pag. 87. inquit, superfoetatio fit, dum facta fe-
mel conceptione uterus in concursu venereo noviter titillatur ac
irritatur, ita ut spiritus genitalis valvas ejusdem perrumpens de-
novo in ovario appellat ovulumque foecundet, nec non tuba ute-
rina a fibris sui ligamenti per novam ejusmodi foecundationem ir-
ritatis contracta illud suo infundibulo excipiat, rursusque in ute-
rum deferat. Et secundum Michael. Ettmüller. Oper. tom. II. fol.
1073. superfoetatio fit, quando ovulum unum & post aliquot septi-
manas vel menses, repetito denuo congressu, aliud foecundatur,
unde post partum primum aliquot septimanarum vel mensium
alius partus vitalis supervenit.*

§. 14.

*Ab uno
coitu.*

Aliam adhuc circa superfoetationem alii autores diversam ta-
men foveant sententiam, dum eandem non a duplici seu repetito,
sed ab unico congressu derivant, & quidem ut ab isto coitu unum
femen vel ovulum perfecte foecundetur, aliud vero a seminis viri-
lis vi plastica simul equidem ad imprægnationem, tardiores ta-
men stimuletur, quod Johannes Valverdus, Hispanus, per spicam
explicat. De hoc scribit Casparus Posnerus *Geneanthropolog. Tab. IV.*
Magnam speciem veri habere videtur discursus Valverdi, nempe
quod, veluti ex uno grano sive altero quovis semine spicæ plures
enascuntur, nec eodem tamen tempore omnes maturescunt, sic
etiam ex hominis semine multos foetus gigni, ac diversis tempori-
bus in lucem prodire contingat, indeque etiam si videamus, præ-
gnan-

gnantem semel enixam post mensem unum vel alterum iterum parere, tamen colligere atque adferere velle, prægnantem denuo concipere posse, esse ridiculum &c. Et juxta verba Johannis Muralti *Colleg. anat. lect. 12. p. 201.* Die Ursach der Uberschwängerung ist nicht wie in Zwillingen, da zwey Eylein auf einmahl durch die Trompeten vom Eyerstock herunter fallen, sondern hier machet das subtilste in des Mannes Saamen, oder die Stralen dessen Geistes, daß ein anders bald reiffes Eylein nach der ersten Empfängnis folgendes herunter fällt; da denn beyde Kindlein, weil sie absonderlich und zu unterschiedener Zeit formiret sind, auch absonderlich in ihren eigenen Häutlein liegen, und ein jedes seine unterschiedene Nabel-Gefässe hat, dadurch sie ihre Nahrung bekommen. Quibus verbis dictus Muraltus superfætationem non a duplici, sed simplici coitu, hujusque ovulum, non quidem plenarie, sed fere maturum, simul cum vere maturo, imprægnandi efficacia, a feminis virilis radiis adhuc remanente, derivare videtur. Superfætationem pariter uti simplicem conceptionem ex remanente aura viri feminali generari exinde probat Franciscus Zypæus *Fundam. medic. Part. II. cap. 7. art. 15. p. 231. seq.* quia gravidis feminis uteri osculum claudatur, ut non possit, nisi spirituosum quid, transire; nisi diceremus, illam auram una cum primo fœcundante injectam quidem esse, sed tardius fœcundasse, & in actum deductam esse, aut quidem ovum non fœcundasse tardius, sed fœtum ex illo generatum fuisse minus validum &c. Sic ait Michael Albert. *Jurisprud. med. cap. 5. §. 2. p. 102. seq.* Judiciose Zacchias *Quæst. med. leg. lib. I. tit. 3. qu. 3. n. 18.* concludit, quod sub novo & valde libidinoso coitu uteri orificium internum denuo reaserari queat; Ego vero judico, quod superfætatio contingere queat; siquidem ad concipiendum non æque necesse est, ut semen cavitatem uteri ingrediatur, & si aliquid immateriale fœcundationem efficere debet, non necesse est, ut orificium uteri internum aperiatur, sufficit, quod interna libido utriusque conjugis & intentio & propensio ad generandum singularis

satisfaciat, quippe quæ perinde ad gemellorum & trimellorum conceptum contribuit.

§. 15.

Superfœ-
tationis
tempus.

Differunt præterea superfœtationes ratione temporis, ita quidem, ut post unam alteramve horam vel etiam diem, duo fœtus concipiantur, quorum tamen stamina ob illorum molliem facillime sibi invicem coalescere possunt, ut postmodum in partu pro gemellis, sive unico coitu conceptis habeantur. Hinc inquit etiam Casparus Theophilus Bierlingius *Thesaur. theor. pract. cas. 69. p. 902.* si fiunt gemellationes intra tres quatuorve dies post primum conceptum, aut certe non longo post intervallo, uterque fœtus simul accrescere & excludi potest atque esse vitalis, parumque differt a gemellorum conceptione. Posse autem feminas non modo post aliquot dies, verum etiam septimanas & menses denuo imprægnari seu superfœtari, testantur partim autores, partim exempla. Scribit scilicet Daniel Sennertus *Pract. medic. lib. IV. part. II. sect. 4. cap. 6. p. 311.* superfœtationis aliquam esse differentiam, quæ præcipue ratione temporis accidit. Etenim interdum paulo post primum conceptum, vel eadem vel sequenti die, aut certe non longo intervallo nova conceptio accidit; interdum vero longiore post primum conceptum intervallo superfœtatio accidit &c. Andreas Laurentius *Histor. anat. lib. VIII. quest. 22. fol. m. 314.* ad quæstionem, an post primum aut secundum tertiumve primi conceptus mensem fieri possit superfœtatio, ut plerique & scriptis & exemplis illustrarint? posse, suo quidem iudicio, sed raro, respondet &c. Cornelio Stalpart. *Obs. Cent. II. obs. 74. sch. p. 326.* commodissimum superfœtationis tempus videntur primi esse menses, quia tunc fœtus nondum ita accrevit, secundum omnes uteri parietes, ut ovulo e tuba Fallopiana delapsuro ob nimiam ipsorum extensionem idoneus adhærescendi locus adimi posset, nam licet os matricis internum post conceptum claudatur, nihilominus interdum conceptio de novo fieri potest. vid. etiam Michael

chael. Albert. *jurisprud. medic. cap. 5. §. 3. p. 103 seq.* Juxta Petr. Paul. Pered *l. a. p. 153. b.* superfœtatio non solum in primo mense, sed & in quarto & quinto contingit. Superfœtationem non saltem tertio aut quarto post conceptionem die, sed secundo etiam aut tertio mense fieri posse, inquit Johannes Sperlingius de *format. homin. in uter. cap. 4. p. 80.* Franciscus Mauriceau de *morb. gravid. lib. I. cap. 9. p. 112.* statuit, superfœtationem tantummodo fieri a sexto conceptionis die vel circiter, ad tricesimum usque ad summum. vid. etiam Theoph. Bonet. *Polyalb. tom. III. lib. V. cap. 26. fol. 334.* Quocunque autem tempore hanc superfœtationem fieri posse, alii autores concedunt, e quibus Johannes Jacobus Harderus hæc habet: si de superfœtationis tempore loqui ausim, commodissimum illud primi menses esse videntur, non quod veterum heic adstipuler commento, superfœtationem irritam facientium, ni prius semen utriusque parentis probe fuerit commixtum & membranis investitum, quo effluere amplius non possit; superfœtatio nusquam sane ita contingeret, sed quia tum fœtus nondum ita accrevit, secundum omnes parietes uteri, ut ovulo denuo delabenti, ob nimiam ipsorum extensionem idoneus adhærescendi locus adimi posset. Quod si tamen quocunque tempore ovum adsit maturum, isque a liquore genitali spiritibus, & massæ humoralis matris motus semper imprimatur, quem pro conceptu, uti necessarium, ita determinatum, hætenus, existima- vi, conceptionem iterari posse quis inficiari auderet? &c. Plura de tempore superfœtationis Paul. Zacch. *quæst. med. leg. lib. I. tit. 3. qu. 4. f. 102. seq.* Georg. Franc. *Satyr. med. 13. p. 232.* Conrad. Phil. Hoffmann. *de puerperii temporib. cap. 2. p. 56.* Wilh. Hulder. Waldschm. *de superfœtat. D. b. seq.*

CAPUT II.

De Superfœtationis exemplis.

§. I.

Superfœta-
tio defendi-
tur autori-
tate,

exemplis.

Quam autem hætenus autorum rationibus probavimus superfœtationem, confirmant etiam eorundem observationes & exempla, qualia quidem nonnullis rarissime occurrere dicuntur, unde Martinus Weinrichius *comment. de ort. monstror. cap. 14. p. m. 129. b.* superfœtari quidem posse, sed raro, si tamen aliquando accidat, ut superfœtetur, perfici non posse, dicit. Secundum Joh. Bened. Sinibald. *geneanthrop. lib. VIII. tract. 2. cap. 3. pag. m. 700.* inter naturæ spectabilissima opera non infimum est illud superfœtationis, quæ, uti raro accidit, ita majorem sui contemplationem exposcit; neque illam aliquando accidere ambigendum est. Ex iis, quæ in re medica suspicienda veniunt, non est postremo loco reponenda superfœtationis historia, quæ certe raro contingens inter admiranda numerari meretur, inquit Marcellus Donatus *de medic. histor. mirab. lib. IV. cap. 16. p. 389.* Johannis Veslingii commentatori Gerardo Blasio *not. in cap. 7. p. 102.* nihil tam rarum videtur, quam vera superfœtatio. Nequaquam superfœtationem omnino in dubium revocat, at rarissimam existimat Theophilus Bonetus *l. a. f. 335.* nam maxima pars earum, quæ gemellos pariunt, unicam emittunt secundinam, utrique communem; unde certissime colligere licet, superfœtationem hic non adfuisse.

§. 2.

Alia exem-
pla.

Multa tamen tum apud veteres, tum recentiores autores reperiuntur superfœtationis exempla, quorum nonnulla, promiscue tamen, recensere liceat. Superfœtationi Aristoteles de *histor. animal. lib. VII. cap. 4. fol. m. 435.* adscribit, quod adultera quædam alterum fœtum suo marito, alterum adultero similem peperit. Jam &, pergit idem, cum geminos quædam ferret, tertium superfœtavit: & cum tempus pariendi justum jam esset, pri-
mos

mos vitales peperit, secundum quinto mense elisit, qui statim mortuus est. Altera cum primum septimo peperisset, qui mortuus est, mox duos justo mensium numero edidit, qui vixerunt. vid. etiam C. Plinius *hisor. natur. lib. VII. cap. 11. fol. 109.* quo loco adhuc ancillæ meminit, quæ ejusdem diei coitu alterum foetum domino similem, alterum procuratori ejus. Uxor cujusdam doctoris, qui Valentiaë regiaë cancellariaë præsidebat, Gallart appellati, post quatuor menses ab obitu viri filium peperit, & deinde nono mense alterum, vid. Petr. Paul. Peredæ *schol. in Mich. Joh. Paschal. method. curand. lib. I. cap. 55. pag. m. 153. b.* Temporibus papæ Hadriani mulier Romæ quatuor una vice suscepit liberos, quos partus infecutus, die quadragesimo post primum partum, quintus. vid. Conr. Phil. Hoffm. *l. a. p. 57.* conf. etiam Wilh. Hulder. Waldschmied *dissert. de superfæt. B. 4. b.* item C. 4. b. ex relationibus eruditis inquit: Coburgo perscribitur, doctorem Albrechtum referre, in pago Ahorn Catharinam Wolffiam, Ernesti Motschmanni conjugem, uno partu continuo edidisse in lucem quatuor filios, quorum tres, primus scilicet, tertius & quartus, secundum ordinem nativitatis, longitudine pedis unius cum dimidio vivi prodierint, quamvis post S. lavacrum statim obierint. Secundum in ordine fuisse embryonem, pedem dimidium vix æquantem. Inquit etiam Martinus Weinrichius *de ort. monstror. cap. 14. p. 129. b.* editus legitur infans nostris temporibus omnia perfectus, sed postridie alius, neque oculis, neque naribus, & ore cæterisque adhuc distinctis, quem tardius conceptum est verosimile. Vidit Andreas Laurentius nobilem quandam mulierem, gemellos gestantem, quæ puellum edidit primo noni mensis die mortuum, & septimo post eum partum die alterum vitalem enixa est, juxta ejusdem *hisor. anat. lib. VIII. qu. 22. fol. 314.* Franciscus Rossetus *de part. cesar. sect. VI. cap. 7. p. 135.* sequentia habet: Quoad naturales superfætationes, hoc verum esse, quod duo infantes, dierum aliquot interjecto numero, unus post alterum

rum

rum conceptus sit, sufficienter ostendunt, quod jam pridem Pithuneris semel observavi, in muliere quadam, quæ tribus septimanis post priorem partum (e cujus puerperio jam erat egressa) secundum infantem enixa est. Hanc rem historia dominæ de Malorthye comprobat, quæ ita se habet: Domina Maria e Novo Castro, cum ex Barone Cremalliensi novem liberos suscepisset, secundo contracto matrimonio cum D. de Malorthye, ex quo gravida reddita tres filios una utero gestavit, hinc factum (ut cum parvæ sit staturæ, sed tamen fertilis) ut adeo fuerit gravata, ut circiter quintum mensem ex filiis unum fuerit enixa. Quare, cum existimaret D. Theobaldus, medicus, alios duos filios, nihil aliud, quam lochia retenta esse, aut molas irritosve conceptus, ipsi post octavum ab ortu diem, forte medicamentum, ad hæc expurganda, adhibuit, quod sane abortum secundum duorum aliorum filiorum causavit: qui adeo integri & vivaces fuere, ut ipsemet medicus, quem consilii sui pœnitebat, testaretur, quod, nisi medicamentum purgans vim ipsis intulisset, licet prior abortum fuisset passus, absque dubio ad rectam pervenissent maturitatem. Item Casparus Bauhinus *append. in ejusdem Rosseti tractatum p. 220. seq.* aliquot superfoetationis exempla recenset, inquit: ante annos circiter triginta Joannis Pfliegers, rustici, uxor in Rixheim, Suntgaviæ pago, gemellos utero gestavit, quorum primus justum post partum annum unum supervixit: alter vero sex septimanis post fratrem suavissimam hanc primum aspexit lucem, qui non ita pridem adhuc in vivis fuit. Christiana Schlichtin, Michaelis Vogel, prætoris pagi Boellickheimensis uxor, priori marito, cum quo decem habuerat liberos, defuncto, prædicto prætori nupsit, & circa quinquagesimum circiter ætatis annum gravida facta est. Gestationis tempore completo, doloribus partus corripitur, puellamque feliciter enititur, quæ dies solum quindecim supervixit. Finito puerperio, eum ad consueta properaret munia, septimanis quinque & totidem diebus post primum partum, dum in vineis esset,

esset, nihil minus quam de altero partu cogitans novis doloribus partus corripitur: quare domum reversa filium, qui patri factus est cognominis, enixa est. Anno Christi 1584. postquam Philippus Ludovicus ab Hirshorn rebus humanis exemptus esset, neque ullum post se hæredem reliquisset; vidua interim ipsius uterum ferente: statim ipsius defuncti agnati, & feudorum successores (ut qui vehementer dubitarent, ferretne masculum gravida vidua, an potius femellam) non solum omne jus successionis feudorum, in omnem eventum, a feudorum dominis obtinuerant, verum etiam, quia libenter plenam & fundamentalem notitiam omnium feudorum & reddituum habuissent: ideo statim a morte prædicti nobilis superstitem ipsius viduam, adhuc immaturam, defuncti mariti mortem lugentem sua in domo operuerunt; ei-que claves ad cryptas & cellas e lumbis, non sine vi & vehementia detraxerunt. Quæ res adeo miseram & tristem viduam affecit, ut coniectis in verticem suum manibus, vociferari & ejulare magis coeperit: ut quæ graviter molesteque hujusmodi sævitiam & agendi modum ferret. Quin etiam interjectis paucis diebus tandem peperit, & quidem egregium puellum, sed mortuum & calvaria carentem. Cæterum cum agnati & hæredes defuncti nobilis ea de re certiores facti essent, persuaserunt sibi, suam ipsorum spem jam expletam, & ipsos sui compotes voti factos fuisse. Quare jus suum in utenda, fruenda hæreditate feudorum persecuti sunt. Sed Deus Opt. Max. velut e saxo alium partum masculum & paternorum bonorum hæredem viduæ illi mœstæ & desolatæ suscitavit atque donavit. Etsi enim non ita pridem puellum enixa esset, tamen subtumida a partu remansit: nihil aliud suspicata, quam vel tumorem præter naturam, vel aliquem morbum in suo residere corpore. Id quod etiam aliquibus medicis, (quorum consilium separatim requisitum & auditum est) visum fuit; quorumque consilio ad thermas fontis acidi ad Rhenum, ut vidua mœsta & orba, unica ancilla comitata profecta est. Verum

enim vero, ut tandem mense Julio 1584. eo loci venit, ob thermas, accidit, ut ibi inveniret electoris Saxoniae Augusti, (qui paulo ante in fata concesserat) viduam, nec non alios aliasque principes, qui ita loca occuparant, ut ipsamet in diverforio locum manendi non inveniret, praesertim cum nemini notum esset, quæ qualisve matrona foret, quæ unica tantum ancilla comitata venisset. Porro tandem ejus loci praefecto quænam esset significans, & suum ei casum, qui non ita pridem acciderat, commemorans, ægre ab ipso hospitium ad sequentem noctem obtinuit. At vero ea ipsa in nocte, cum jam decima ageretur hebdomada, a priori & proximo partu, Deus ipsam & mœstam atque afflictam, & apud peregrinos, pulcherrima prole mascula eaque viva ditavit; unde omne jus hæreditariæ successionis & feudorum ab aliis repetitum & huic ipsius filiolo, hæredi videlicet legitimo, restitutum est. Hanc observationem aliis circumstantiis ex Viresii *Theatro Historiarum* recenset etiam Cornelius Stalpart *observ. cent. I. p. 327. seq.* Porro Anna Cancerina, futoris uxor, cum jam annis aliquot fuisset in matrimonio, aliquoties gravida facta feliciter enixa est: deinde cum rursus utero gestaret, accedente debito partus tempore, posteaquam toto triduo levibus doloribus partus fuisset divexata, anno 1587. d. 25. Januarii hora sexta matutina casu embryonem e corpore elabi sensit, qui digiti unius longitudinem æquabat: verum eadem die vesperi ad horam sextam maximis conatibus partus divexata, alterum justo partu foetum perfectum & viventem exclusit. Hæc Bauhinus. Larissæa mulier prægnans decimo mense copiosum sanguinem quatuordecim diebus demisit, plurimum tamen tribus potissimum diebus, antequam puer in lucem ederetur. Decimo quarto puer mortuus utero excidit, cujus brachium dextrum lateri adhærescebat. vid. Hippocrat. *edit. Anat. Foef. de morb. vulgar. libr. V. sect. 7. fol. 236.* Et Cornelius Stalp. *observ. rar. cent. I. obs. 74. sch. p. 326.* ex eodem Hippocratis libro superfoetationis exemplum de muliere Larissæa adducit, quæ quadragesimo a primo partu die, quod præpostere con-

conceptum fuerat, exclusit. Inquit etiam Bernardus Gordonius *Lilii medicin. particul. 7. cap. 2. p. m. 757.* accidit, quod quædam mulier peperit unum filium pulchrum, qui assimilabatur viro suo; & post paucos dies peperit alium turpem, qui assimilabatur amasio suo turpi. In Cypro insula tempestate nostra feminam geminos peperisse accepimus, alterum octavo mense, alterum decimo nono macie confectum, utrinque dentatum; inquit Alexander Benedictus *de re med. lib. XXV. cap. 23. fol. m. 475.* Nobilis uxor filium peperit nono mense vivum & perfectum, octavo die a primo partu alium itidem & non omnino absolutum; post quindecim dies iterum alios duos. Et cum reconvaluisset, anno sequenti, cum iterum utero gereret, habuit eosdem omnino partus, & singuli eorum in propria tunica erant involuti. Cum tertio concepisset & filium edidisset primo, adhuc uterus esset filiis plenus, amplius parere non potuit & obiit; uti ex Hercul. Saxon. refert Daniel Sennert. *pract. med. lib. IV. part. II. sect. 4. cap. 6. p. 310.* Hunc Sennerti locum corrigit Georgius Francus *satyr. med. 13. §. 9. p. 229.* non nobilem, sed nautæ uxorem fuisse, inquiens.

§. 3.

Talia superfœtationis exempla annotarunt etiam recentiores medici v. g. Thomas Bartholinus *Cist. medic. locul. 38. p. 398.* inquit: In mea visitatione æstiva occurrit mihi hæc historia, quæ accidit in Nerögiel in districtu Nummedali: Uxor honesta viri habitat in Follensfierding in Nerögiel, in prædio quodam regis. Mariti nomen Siurdo, uxoris Siri. Illa enixa est filium die 31. Jul. 1637. qui lavacro baptismatis tinctus fuit, quia perfectus erat, & sufficientibus mensibus in utero gestatus. Anno 1638. nocte ad 9. Febr. iterum enixa est eadem mulier filiam adhuc superfœtitem, perfectam eodem modo, cui nomen est Annæ. Juxta relationem ejusdem auctoris *histor. anat. cent. IV. hist. 14. p. 238.* mira superfœtatio in Venda urbe Livoniæ mulieri honestæ supervenit seculo superiori; uterum scilicet primo conceperat, & instantibus partus legitimi doloribus nihil enixa est. Anno sequenti ite-

rum gravida, justo puerperii tempore masculum edidit. Anno demum insequente, morbo correpta primum conceptum exclusit, sed per partes, & ossibus per vicem exeuntibus. Superaret res fidem nostram, pergit Bartholinus, nisi publico instrumento magistratus autoritate sua firmasset, quod in pergamena sigillo publico munitum mihi exhuit Johannes Below, archiater magni Moschoviæ Ducis; quod ibidem communicatur. Idem quoque Thomas Bartholinus *de insolit. part. human. viis cap. i. p. 86.* nobilis cujusdam matronæ meminit, quæ post primum partum masculæ prolis quarta hebdomade alterum enitebatur vitalem, & utrumque diu satis superstitem, uno eodemque nomine insignitum. Sequens superfoetationis exemplum recenset Fridericus Ruyschius *observat. med. chirurg. 14. p. 20.* Uxor cujusdam chirurgi Amstelodamensis anno 1686. infantem robustum & viventem peperit. Sex horis post hunc partum in lucem quoque edidit embryonem minimum, juxta figuram ibidem delineatam. Feminas post trimestre aut quadrimestre spatium, mortuo jam conceptu & in utero putrescente paulatimque (ceu putridis lochiis) effluente tabo, superfoetasse, scribit Guilelmus Harveus *de part. p. m. 504.* item, famula quædam ab hero suo compressa, ut culpam tegeret, Septembri mense Londinum advolat, ubi clanculum peperit; & firmata valetudine, domum reversa est, Decembri autem sequente novo partu, (nam superfoetaverat) occultatum antea crimen divulgavit. vid. etiam Just. Schrader. *observat. ex Harveo p. 84.* Rustica filium enixa in pago quodam anno 1658. retentis secundinis, decimo septimo die a partu, nihil interea mali passa, alterum superfoetatione emisit cum secundinis propriis, quos mox secutæ priores penitus putrefactæ. Uterque infantum supervixit, & quotidie nunc adolefcit. vid. Georg. Hier. Velsch. *Hecatoest. II. obs. med. phys. obs. 3. p. 4.* Raram superfoetationis historiam ad Nicolaum Stenonem perscribit Thomas Bartholinus *epistol. medic. cent. IV. epist. 56. pag. 360.* his verbis Anna : mulier urbana, quæ

quæ in mitris mulierum nostrarum conficiendis occupatur, post festum Michaelis ultimum abortum exclusit, solitis doloribus prægressis, remanente tumore quodam, quem pro hypochondriaco affectu interpretabatur. Frustra ad putaticium morbum varia medicorum auxilia sollicitavit, cottidie enim aucto in majorem ventre, mense Aprili sequente sanum alium vivumque fœtum natum vidit. Sequentem observationem refert Johannes Christophorus Hertius *Ephemerid. acad. nat. cur. Cent. IX & X. obs. 24. p. 291.* Femina Anna Elisabetha Russut nomine, annum sexagesimum quintum agens, Anno 1713. sex ante festum paschatis septimanis, fœtum parvum & spithamam circiter longum in lucem edidit, quem die Jovis post dictum festum alter quoque secutus est. In secundo autem conjugio octodecim fere annos sterilis vixerat, donec circa festum Michaelis post subortum de novo menstruum sanguinis fluxum prægnantem se sensit, qui cum festo epiphaniæ appropinquante denuo eruperit & jugiter postea continuaverit, peperit tandem dicto tempore primum & post sex septimanas alterum quoque fœtum. Interrogata autem hæc femina a præfecto illius loci, quomodo fieri potuerit, ut sexagenaria major ad concipiendum tamen non inepta fuerit? id ei responsi dederat, *A: Herr Amtmann, so lange de Bohm blæhet, kann he ock Früchte dragen.* Wilhelmus Huldericus Waldschmid *Dissert. de superfœtat. c.* hanc observationem refert: Chirurgus Gallus & in arte obstetricandi versatissimus Paulus Portal, dans la pratique des accouchement, partum, cui præfuit, recenset, quo pariens enixa est partum vivum justo termino, ac duos alios, quorum alter extractus est, ut loquitur, instar halecis, juxta caudam apprehensæ, longitudine pedem regium circiter æquans: tertius adhuc minor priore, crassitie halecem passam seu fumo induratum longitudine vix sex aut septem pollices æquavit. Superfœtationum aliquot exempla ex propria observatione refert Olaus Borrichius in Thomæ Bartholini *Act. Hafniens. Ann. V. obs. 56. pag. 146.*

Tria, inquam, superfoetationum exempla observare mihi licuit, unum Lugduni in Batavis, hic duo, in omnibus ea foetuum diversitas, ut duo circiter menses inter primam secundamque conceptionem intercessisse viderentur. In ultimo exemplo hoc rarum, quod infans minor natu interfecerit majorem. Res ita gesta: Nobilis Germana, quæ per biennium Amstelredamenses medicos in curanda tabe pulmonibus infesta, experta erat, huc tandem ad maritum se transfert, & mox, ut fit, gravida inducias mali sibi spondet, ex persuasione vulgari, quamdiu parturiunt feminae, nullum esse a phthisi periculum. Non cessavit tamen occultus hostis, sed intra paucorum mensium lapsum invalescens ægram lecto affixit. Post aliquot tamen dies collegit sese iterum, & meliora coepit sperare, cum iterum tristi mortis filii, quanquam falsæ, denunciatione perturbata disrumpi involucra foetus sensit, & mox lectum aquis stagnare. Advolat obstetrix, & in tertium diem, cum male dispositis, ut referebat, foetus membris luctata tandem expedit puerperam, & primum quidem infantem masculum in lucem produxit septem circiter mensium, vivum quidem, sed qui unica post hora exspiravit; hinc fratrem minorem, itidem, ut prior, membranis propriis involutum, sed mortuum, immo foetentem. Putrida etiam visa involucra & infans fratre dimidio propemodum minor, qui foetore suo majorem natu infecerat, ut qui vivus quidem prodiit, sed misere languidus & cadaverosus. Consultissimi viri D. Joh. Chasse uxor adhuc juvenis statò naturæ termino peperit filiolum recte formatum, integrum & bene sanum: nono vero a partu die iterum enixa est, seu perdidit foetum adhuc immaturum, quem nondum trium mensium maturitatem complevisse conjecturabat, propria secunda involutum, cui neque oculi, neque aures, neque os patebant, licet sexus distingui posset; uti ex Lossii observationibus refert Cornelius Stalpartius van der Wiel *Obs.rar. Cent. I. obs. 74. schol. p. 327.*

§. 4.

Alia exempla.

Circa annum millesimum, quadringentesimum octuagesimum octavum habitarunt in oppidulo *Bœnnigkhaim* in Zabergovia territorii Wüttenbergici conjuges, Adamus Strotzmann & Barbara Schmotzerin, qui successive ex uno conjugio parentes fuerant liberorum quinquaginta trium, triginta quinque vicibus prognatorum in tali serie & tempore: Per vices octodecim unicum saltem infantem in lucem protulerat mulier, per quinque vices deinceps duos: quaterna vice tres. Postea iterum sex simul infantibus prægnans quarto mense eorum primo tres, in puerperio adhuc cubans die nono quartum, posthinc hebdomade undecima quintum, atque iterum elapsis septem septimanis sextum enixa est. Denuo & ultimo post nuperrimum puerperium septem simul infantibus gravida, gestationis hebdomade vigesima, eorum tres, abhinc septimanis tribus & dimidia rursus quatuor edidit; ultimus horum matri parturienti ingentes dolores & angores causaverat, quippe hæc per triduum in partu laboraverat, & desperabunda præ debilitate vix quenquam videbat & agnoscebat, sed Deo mire adjuvante periculum evasit: infans enim erat longitudine ulnæ unius ac transverforum digitorum trium, cum capite spithama virili grandiori &c. vid. Joh. Helwig. *Obs. phys. med.* 145. p. 389. Hujus partus multiplicis cum numerosa superfoetatione secundum liberorum seriem etiam meminit Georgius Hieronymus Velschius *Observ. medicin. episagmat.* 75. p. m. 47. Partus, inquit, multiplices & numerosi plurimis memorati sunt. Eosdem mira superfoetatione auctos haud vana relatione nobis constat, quam fidem propemodum omnem exsuperantem pari reddemus, qua accepimus. Puella annos nata quatuordecim, cui nomen Annæ erat, in oppido Binninga, duobus exiguis milliaribus Heilbronna distante, 1469. nupta est viro juveni annorum viginti septem, Adamo Schwarzmanno, primoque triennio nullos omnino liberos genuit. Anno autem ætatis suæ decimo octavo inci-

incipiens filiam peperit Elifabetham, quæ octennis mortua, & decimo nono filium Johannem, septennio superstitem. Initio postea vigesimi filiam edidit Apolloniam, eodem anno defunctam, quo tertiam Annam, enixa est, ipsam quoque haud multo post extinctam. Tum anno vigesimo primo gemellos mares peperit, Adami & Michaelis nominibus insignitos, haud procul Oppenheimio in pago, dicto Gunterbrunna, cum Binninga Moguntiam iter faceret, ut medicos de ingenti tumore ventris consularet, quem ultra tempus partui destinatum bimestri jam gestaverat, frustra suorum in patria & obstetricum ope implorata. Hos autem, quamvis absque periculo exclusi fuerint, mox præmatura morte, ut cæteros, amisit. At postea ab anno ætatis vigesimo primo usque ad trigesium sextum, foetus enixa est viginti tres, nunc uno partu tribus emissis, nunc duobus, nunc uno & solo, quorum nomina fere perierunt. Ipso denique anno trigesimo sexto filium edidit, Michaelem, & initio trigesimi octavi, iterum filium, Joannem, sub finem vero ejusdem anni, Michaelem denuo dictum alium, prioris demortui loco. Mox anno trigesimo nono unico partu septem in lucem tulit liberos, mares quinque, qui sacris undis lustrati, & femellas duas, sub ipsum egressum ex utero defunctas. Anno quadragesimo post filiam unicam, Annam, & quadragesimo secundo tres filios, unica secundina conclusos, quibus trium magorum, in sacris memoratorum, nomina vulgata indita, cumque jam novem dies puerpera decubuisset, ipso adscensionis festo denuo filiam peperit, eodemque anno die S. Francisco sacra, filium, Michaelem, confestim a baptismo mortuum, & nec dum puerperio egressa, festo SS. Simonis & Judæ, alium, Franciscum appellatum, nævoque caput vitulinum referente prope umbilicum insignem, quod cibum hunc impotentius exoptanti lanionis uxor denegasset. Postremum anno ætatis quadragesimo quarto, qui erat 1499. festo S. Dionysii tres filios uno partu enixa est, Bartholomæum, Andream & Matthæum,

um, qui mox extincti. Dum vero puerpera esset, die quadam dominica proxime antecedente festum S. Martini iterum filium edidit, Petrum & ipsum mox fato raptum, iterumque die S. Luciae sacra geminos mares, ita ut puerperium festo S. Dionysii coeptum usque ad diem conversionis S. Pauli continua serie extendetur, quo tempore finito, & uno circiter mense, aut quinque septimanis interjectis denuo filium peperit, ut inde a S. Dionysii festo anni 1499. usque ad Bacchanalia 1500. septem ediderit, viventes quidem omnes, sed paulo post mortuos & sepultos in coemeterio monachorum S. Francisci. Ex hisce ergo omnibus, qui numero erant quinquaginta tres, S. baptisinate initiati erant quadraginta quatuor, reliqui novem mortui, antequam baptizati essent, ita ut ab ætatis suæ anno decimo octavo usque ad trigesimum sextum, hoc est, octodecim annorum spatio eddiderit viginti novem, & a trigesimo sexto usque ad quadragesimum quartum, hoc est, octenni spatio, enixa sit viginti quatuor. E quibus mares erant octo & triginta, omnes sacratis lymphis tincti, & quindecim femellæ, quarum novem his caruere, morte præventæ. Ipsa mater fatis procera erat, vultuque hilaris, maritus autem staturæ brevioris, sed habitus carnosius, optimi. Uterque conjugum una cum liberis omnibus ad vivum depictus visebatur in templo monachorum S. Francisci, quos supra diximus, ut sua manu testabatur P. Jo. Krebs, Noribergensis, coenobiarcha, peculiari epistola, jussu generosæ matronæ, Agathæ, illustris viri, Viti Schwendii, conjugis, publica fide 1501. ad nobilem virum, Georgium Bessererum perscripta, quam nos habemus, inter reliqua Georgii Thanmülleri, medici & chirurgi quondam Augustæ experientissimi, repertam. Quæ sane facit, ne fabulam putemus. Hujus observationis & epitaphii meminit etiam Johannes Schenckius *Observ. medic. lib. IV. fol. 563.* item Johannes Christophorus Eisenmengerus *Epist. ad Job. Dan. Horstium de fæt. Mussipont. a Laurent. Straussio edit. p. 64 seq.* ubi rhytmos Germanos a versificatore quodam

dam antiquo modo simplici stylo & tenui vena versificatos, simulque a Serpio latine redditos reperies.

§. 5.

plura.

Antwerpiæ Johannis Edenlingii, lanionis, uxor, quæ jam aliquot annos absque ingravidatione in matrimonio vixerat, tres demum enixa est liberos; scilicet cum post sex hebdomadas, absoluto toto puerperio e templo rediret, subortis novis ad partum doloribus, binos adhuc liberos peperit, juxta Ægid. Daelmanni *Prax. med. cap. 16. p. 81 seq.* Et secundum verba Nicolai Venette *de la Generat. de l' homme Part. II. cap. 3. art. 3. p. m. 126.* toute la Rochelle a feu la superfetation de Mademoiselle Louveau, qui quelque temps après avoir accouché d' une fille, monta à cheval pour aller à la campagne, où elle accoucha d' un garçon vingt neuf jours après ses premieres couches. La fille vescut sept ans, & le garçon ne vescut que sept jours. Anno 1656. factoris cujusdam uxor mense Aprili peperit, relicto alio infante, quem demum bimestri post spatium vivum in lucem edidit, referente Vito Riedlino, parente *Obs. med. Cent. I. obs. 22. p. 20.* De nobili matrona, quæ post primum partum masculæ prolis quarta hebdomade alterum enitebatur vitalem, & utrumque diu satis superstitem, uno eodemque nomine insignitum, vid. Thom. Bartholin. *Cent. III. epist. 8. p. 29.* Superfoetationem reiteratam annotavit Casparus Theophilus Bierlingius *Thesaur. Theor. pract. obs. 69. p. 900.* Viri, inquit, cujusdam uxor, cui cura vestigalium nobilissimi domini Waldecks in *Steckenberg* demandata erat, tribus vicibus gravida semper superfoetationem, quam viginti quinque septimanis præterlapsis post priorem partum in lucem edidit, in utero materno gestavit. Ultimam superfoetationem mortuo marito, cum antecedentem infantem, illo adhuc in vita existente, enixa esset, peperit. Secretarius quidam Brunsvicensis a senatu Pragæ mittitur. Dum ibi hæret, hospita infantem enitur, quem ut ille de sacro fonte levaret, invitatur. Quod quidem ipse animo se luben-

lubenti facturum, non tantum pollicetur, sed & promissa præstat. Negotio in aula cæsarea confecto discedit. Paucas vero post septimanas rediens, in idem hospitium divertitur. Eo vero ipso die, quo advenit, hospita alterum quoque infantem edit, & pro eodem quoque fidem suam in S. baptismo, ut obstringeret, ab ipso precibus obtinet. Imo naviculatoris cujusdam Patavii al Portello conjux quovis anno superfœtationi fuit obnoxia, referente Johanne Rhodio *Obs. med. Cent. III. obs. 52. p. m. 146.* Nobilis quædam femina vigesima septima hebdomade post partum filiam omnibus membris absolutam, mutam tamen ac surdam in lucem edidit, quæ etiam pubertatis annos accepit, ac ab alio imprægnata fuit. Mater ejus ab aliis mulieribus sibi familiaribus interrogata, quomodo hoc fieret? responsum dedit, se solummodo altero die post ingressionem templi (*Kirchgang*) rem habuisse, uti ex cujusdam viri fide digni, relatione narrat Caspar Theophilus Bierliugius *l. a. p. 904.* Ex observatione Johannis van Düren sequentia superfœtationis exempla recenset Stephanus Blancardus *Collectan. medic. phys. Part. II. obs. 13. p. m. 19.* Matrona quædam Anglica, gravida justo tempore, & quidem die dominica filium pariebat bene formatum; hoc edito, tam ipsa puerpera, quam adstantes mulieres aliquid adhuc restare, animadvertabant, atque sequenti die dominica iterum filium edebat; sed nondum omnes foetus erant exclusi, sed tertio die solis tertium quoque enitebatur filium; Hi tres filii adolescebant omnes, adultique ob memorabilem partum a rege creabantur equites. Ibidem quoque annectit Blancardus, se duos novisse filios, quorum posterior post sextam a prioris partu hebdomadem editus erat. Bina adhuc exempla recenset idem autor *l. a. Part. III. obs. 8 & 9. pag. 15 & 16.* & quidem primo de femina quadam Amstelodamensi, quæ, cum post absolutum puerperium more solito templum frequentare vellet, viro suo, se non bene se gerere, nisi jamjam peperisset, partus tempus instans se credere, dicebat; atque post aliquot horas novum edebat infan-

tem. Deinde de femina, quæ Blancardo facta erat se gravidam fuisse, atque post nonum mensem foetum edidisse; durante autem hoc novem mensium tempore foetum quoque abortivum, duorum circiter vel trium mensium, rejecisse. Sequentem observationem de suis communicat Georgius Francus *Satyr. med.* 13. §. 9. p. 229. Ante annos quadraginta præter propter Montbelgar-
 di uxor scriniarii foetum vivum & incolumem edebat: quatuor inde septimanis post alium, sed mortuum, enixa est. Ex aliis autem prædictus Francus alias observationes addit, & quidem ex Joh. Seb. Güth Polygraphia Meinungenfi: Anno Christi 1462. *Nachdem Osterhilda, Enders am Bach, eines Meininger Bürgers Haus-Frau, am Tage Matthæi eines jungen Sohnes genesen, nach Ausgang der Sechs Wochen am 5. Novembr. wieder zur Kirchen gehen wollen, hat ihr der liebe Gott auch eine junge Tochter bescheret, welche zur Heil. Tauffe kommen und lange gelebet.* NB. Ein anderer setzet es ins Jahr 1478. und nennet das Weib Julianam; ob nun vielleicht dieses ein anders, als das vorige, ist mir unwissend. Item ex relationibus publicis Lipsiensibus den 25. Octobr. 1693. septiman. 43. n. 3. Bruxellis hæc referuntur: Von Ostende wird geschrieben, daß daselbst eines Notarii Frau, Namens Pille, 20. Jahr alt, zwo gesunde Töchter gebahren und sechs Tage hernach noch vier todte Töchter zur Welt gebracht. In relationibus ordinariis anno 1725. superfætationis mentio fiebat, sequentibus verbis: Lippstetter Zeitung den 4. Novembr. N. 90. Kiel den 26. Octobr. In dieser Nachbarschafft soll dieser sonderbahre Casus sich zuge-
 tragen haben, nemlich daß eine Bauers-Frau von Krevensdorff innerhalb 20. Wochen 2. gesunde Kinder zur Welt gebahren habe, als eine Tochter den 18. May, und hernach einen Sohn den 3. Octobr. dieses Jahrs, welche auch von dem Prediger der Gemeine zu Gottorp, Herrn Ludewig Ot-
 tens getaufft worden und annoch im Leben wæren. Jedoch sey das letzte Kind etwas zarter und kleiner als das erstere. Et secundum relationes Lipsienses im 2. Stük der 25. Woche den 15. Jul. 1728. Madrit vom 18. Maji. Allhier ist vor einigen Tagen von Covilla de Caraminal auf den Galli-

Gallicianischen Cüsten Nachricht eingelauffen, daß eine daselbst wohnende Frau, Dominica de Castro genannt, zwischen dem 8. Februar. und 30. Aprilis an verschiedenen Tagen 6. Söhne und eine Tochter zur Welt geböhren habe.

§. 6.

Sequentes superfoetationes recenset Gabriel Clauderus *M. Item. N. G. Dec. II. An. 7. obs. 165. p 319.* Femina viginti sex annorum, vegeta, foetum ex uteri ergastulo orbis amplitudini exhibitura, expectat quot horis, horam a primo ac cœlesti conjugii autore ipsi ad hoc opus destinatam & tandem parit filiolum methodo feminis consueta, sanum, hunc simul insequente sua secundina, ac lochiorum solitorum portione; Proinde hilari mente quoque sibi gratulatur de illo naturæ debito, absque majore molestia persoluto. Verum, quid fit? restat insignis abdominis tumor, motus inibi manifeste sensibilis, dolor alternans, lochiaque partim retenta; puerpera tamen vegeta obambulante. Obstetrix præfagit, e geminis alterum mox quoque esse prôditurum; sed statu uno eodemque per biduum ita perseverante; hæret Lucinæ cum consiliariis femininis aqua; propterea Clauderum accersiri curant. Puerpera præprimis ulteriorem partum expectans non sine cordolio queritur, quod quasi sola inter millenas mulieres peccaverit, dum non experiatur hilare illud fatum, gravidis ac puerperis alias commune. Sed bono animo eandem cum adstantibus esse iussit Clauderus, indicans, expectandum esse superius notatum superfoetationis finem, priore partu non minus jucundum futurum; addebat medicus, non minus joco serio, hæc animo eo generosiore esse toleranda, cum hujus suæ fortunæ ipsamet fuerit fabricatrix, per coitum foecundum scilicet uno plurem peractum vel admissum. Mente itaque sic composita ac tranquilla septimo demum a priore partu die exit alius puellus, hunc juxta mandatum naturæ insequente sua secundina, lochiisque residuis suum pensum absolventibus. Septimana hanc insequente in eadem platea

in domo jam dictæ feminæ e regione alia habitans idem plane experiebatur fatum; superfoetatione sexto ad septimum die itidem superveniente, sine aliquo incommodo. De superfoetatione foetui in utero corrupto atque clam latenti superveniente, vid. Theophil. Bonet. *Sepulchret. lib. III. sect. 37. fol. 1368.* Honesti cuiusdam civis uxor anno 1570. Decembr. die 7. hora decima vespertina filium plene gestatum peperit, succedentibus omnibus, quæ ad felicem partum requiri solent. Postridie vero, qui erat octavus eadem hora, præter expectationem obstetricis, ac sui ipsius, peperit eadem foetum alterum, sed nondum quadrimestrem, utpote cui neque oculi, neque nares, neque os paterent, quem idcirco post conceptum fuisse, satis manifestum, juxta Rembert. Dodon. *annotat. in Anton. Beniven. observ. medicin. cap. 3. p. 287. seq.* Uxor Zachariæ de Scarparia peperit masculum, & hinc ad tres menses peperit alium masculum, & bene vixerunt ambo, & unus fuit speciarius Florentiæ in burgo sancti Laurentii, uti ex Nicolo refert Johannes Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. lib. VIII. tr. 2. cap. 3. p. 701.* Scribit etiam Marcus Gerbezius *chronolog. medic. pract. an. V. §. 26. pag. m. 353. seq.* relatum sibi fuisse aliquando a fida matrona, quod noverit in domo sua ancillam, quæ tribus matutinis, consequenter singulis diebus unam prolem pepererat, asserendo, se tribus noctibus, consequenter singulis semel cum concubo suo rem habuisse. Bina superfoetationis exempla extant adhuc in Johann. Schenck. *observ. medic. lib. IV. fol. 532.* scilicet civis quædam in oppidulo Holsatiæ, Aperadio, quinque dierum interstitio geminos peperit. Et rustica quædam mulier in pago Smerka peperit filiam, deinde elapsis octo diebus, cum gravissima ventris tormina sentiret, & vicissim e vicino oppido obstetricem accerferet, denuo peperit filiam. Item Lælium in palatio vidisse mulierem liberam, quæ ab Alexandria perducta esset, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis: ex quibus quatuor eodem tempore enixa dicebatur; quintum post diem quadrage-

dragesimum, recenset Henricus Salmuth annotat. in Guidon. Pancirol. *rer. memorab. part. II. tit. 10. p. 213.* Gemellorum in ditione Itterenfi Hassiaca a matrona nobilissima anno 1715. intervallo trium septimanarum in lucem editorum & adhuc tum temporis viventium ex relatione Johannis Christophori Jæschii communicat Justus Fridericus Dillenius *ephemer. acad. N. C. cent. VII. & VIII. obs. 42. p. 89.* Quod tamen exemplum potius ad superfætationem referrem. Superfætationis exemplum recenset etiam Isbrandus de Diemerbr. *observ. 59. fol. 74.* Scilicet uxor militis cujusdam, habitantis Noviomagii, anno 1637. mense Octobri peperit filium bene sanum & plene gestatum seu novimestrem, quem ipsamet lactavit: post partum lochia debito modo fluxerunt, & puerpera toto puerperii tempore mediocriter valuit, instar aliarum puerperarum. Quarta septimana bene jam restituta, ad templum, Deo gratias actura, processit, atque exinde domestica munia more consueto peregit. Septima post hunc partum hebdomada, cum in templo forte concioni interesset, alteratio quædam uterina præter consuetudinem ipsamprehendit, ita ut citissime domum reverti cogeretur. Vocatur statim obstetrix, vocantur & aliæ feminæ, ex utero aquosa profluunt, accedunt parturientium labores: omnes mirantur: dubitant, anne in priore partu mola vel secundinæ aliqua pars in utero relicta fuerit, quam natura nunc expellere molliatur. Interea dum inter spemque metumque hærent, solutum est dubium, & præter omnium expectationem secundum enixa est filium, bene sanum & debitæ magnitudinis, quem cum priore lactavit, & postea ambo diu superstites fuerunt. Et secundum Georg. Hier. Velschii *hecatost. II. obs. 3. p. 4.* rustica filium enixa est anno 1658. retentis secundinis: Decimo septimo die a partu, nihil interea mali passa alterum superfætatione emisit cum secundinis propriis, quos mox secutæ priores penitus putrefactæ. Uterque infantum supervixit.

§. 7.

Superfœta-
tionis sce-
leta.

Veritatem superfœtationis etiam duobus sceletis probat Theodorus Kerckringius *spicileg. anatom. obs. 2. p. m. 4.* ubi inquit, nequaquam audienda esse illa speculationi suæ tam addicta ingenia, ut quæ ipsi, quomodo fiant, non percipiunt, audacter, dicam, an impudenter negent, omnemque denegent fidem viris quantumlibet probis, qui se, vel vidisse, vel expertos esse confirmant ea, quæ ipsorum excedunt scientiam. Cum ergo superfœtationem dari præter antiquos clament Laurentius, Sennertus, Nicolaus Florentinus, Paulus Pereda, innumerabilesque alii: & tamen pervicaces isti longe petitas, vel tantum auditu cognitatas ogganniant esse historias, volui hic etiam extare luculentum superfœtationis exemplum. Qui testimoniis tot & tantorum virorum non convincuntur, veniant & videant duo penes me sceleta geminorum uno partu editorum, quorum alter octo erat mensium, alter, quantum nunc ex ossibus apparet, & tunc cum carne vestita mihi offerebantur, ex toto corporis habitu apparebat, quartum mensem nondum attigerat: quod etiam figura apposita spectatorem liquido satis docebit.

§. 8.

Fœtus in
secundinis
latens.

Fortasse etiam ad superfœtationem pertinet, quod dans le Journal des Sçavans de l'an. 1679. tom. VII. p. 98. legitur, d'un fœtus trouvé dans l'arrirefaix d'une femme, qui venoit d'accoucher heureusement d'une fille. Ce fœtus estoit de la grandeur de la main. Il estoit encore enveloppé de ses membranes, & si fort applaty dans toute sa longueur, qu'à peine avoit-il un quart de pouce d'épaisseur, les os mêmes du crane ayant receu cette disposition au moyen des sutures. La peau & les chairs avoient à peu près la fermeté, qu'on remarque en un fœtus, qui a esté long temps dans l'esprit de vin, & a peine remarquoit-on dans les membranes mêmes aucune alteration. Eandem observationem recenset Nicolaus Blegny *Zodiac. med. gallic. an. I. Januar.*

obs.

obs 8. p. m. 8. his verbis: Mulier quædam puellam enixa est vivam beneque habitam. D. Amiens, chirurgus regius, tempore partui accitus est, qui secundinas perlustrans foetu edito, in iis latentem deprehendit foetum marem, manus longitudine, membranis propriis adhuc involutum, adeo tota sua longitudine compressum, ut vix crassitie quartam pollicis partem adæquaret; Ipsa etiamnum cranii ossa, futurarum ratione, eandem constitutionem adeptæ erant; cuti & carni eadem propemodum inerat soliditas, quæ in foetu diutius spiritui vini immerso deprehenditur, vix in membranis ipsis ulla alteratio animadversa.

§. 9.

Liceat etiam huic observationi annectere, quod ante tri- *Observatio.*
ginta & ultra annos in ephippiarii Dresdensis uxore observandum mihi contigit. Huic scilicet annum agenti decimum quintum nunquam, neque virgini, neque maritatæ fluxerant menses, nec ulla sanguinis guttula fontem ipsius muliebrem irrigarat, nisi in primo coitu, quo tempore paucissimam atque vix cognoscibilem ipsa senferat cruentationem. Post septimestre autem a nuptiis præterlapsum temporis spatium, nocte quadam dolores abdominis, imprimis infra umbilicum ingentes persentiens mensium prurptionem primam, vel diarrhœam superventuram metuebat. Loco vero sanguinis menstrui post aliquot horas magna satis aquæ copia, (uti alias ante partum accidere solet) ex utero in lectum profiliebat, pauca sanguinis quantitate subsequente. Quo facto illa tum alvi exonerandæ, tum torminum sedandorum gratia, noctu locum, secretum quidem dictum, omnibus tamen domus inquilinis communem, nihil mali metuens, petit, ibidemque ex improvviso post magnum nisum ex utero per muliebria aliquid magni satis ponderis prolabi sentit, nescia quid sibi contigerit. Sequenti die ipsius avia, obstetrix hujus loci primaria, nec inexperta, hæc resciscens rem indagat atque rimatur, postque sequentes plures dolores, altero die hora quinta pomeridiana se-

cundinam seu placentam uterinam disruptam instar marsupii aperti, quæ postea ad spithamæ longitudinem expandi poterat, ex utero protrahebat, in qua duo foramina deprehendebantur. Posthæc dicta obstetrix placentam hanc accuratius perscrutans, in ejusdem extremitate, circa locum disruptum tumorem ad nucis viridis magnitudinem, offendit, in quo, unguibus dilacerato, minutissimus embryo, vix minimum digiti articulum æquans, cum funiculo umbilicali atque placentula, inclusus jacebat. In hoc embryone, quem mihi cum tota placenta & membranis afferebat, præter duo puncta nigra oculorum, os late apertum cum lingua manifeste cernere licebat. Pectus & abdomen a dicta obstetrice, placentam perscrutante, in parte anteriore ita ungue erant dilacerata, ut vix arte melius aperiri potuissent, unde in iisdem corculum, respectu embryonis satis magnum, pulmones, diaphragma & contenta abdominis &c. elegantissime se visui offerebant. Et quidem longe melius hæc omnia, imo omnes minutissimæ dilaceratæ fibrillæ, tam nudo, quam armato oculo, videri atque cognosci poterant, quamdiu pupillulus ille adhuc aquæ, in qua obstetrix eundem mihi afferebat, per tempus supernatabat, quam postmodum, cum embryonem, conservationis gratia, spiritui vini immiseram; tunc enim non solum submergebatur, sed fibræ quoque minutissimæ magis magisque se contrahentes oculum fugiebant. Circa hanc observationem nullus dubito, foetum quendam aliquot jam jam mensium (quia hæc femina ante trimestre circiter temporis spatium, jamdum ante abortum, carnes & alia assumenta ferre non potuerat, id quod raro primo statim aut secundo mense fieri solet) ex secundina satis magna prorumpentem in locum secretum, ac profundum, quem firmiter saxis occlusum atque stercorebus repletum, ob sumtus & alias causas aperire nolebant, fuisse prolapsum. An vero alter hic minimus atque circa placentæ extremitatem adhærens casuque repertus embryo per eandem cum majori foetu conceptionem,

an vero per superfoetationem ortum suum traxerit, dubium equidem videtur; potius tamen hanc quam illam opinionem amplector. Priori equidem sententiæ favet, quod minimus hic embryo eidem majoris foetus placentæ adhæserit, indeque necessario hæc duo ovula simul & semel, uti in plurimis gemellis accidit, ex ovario in uterum descendisse videantur. Pro superfoetatione tamen adduci potest, quod in hoc embryunculo adeo subtili & parvo nullum plane corruptionis indicium fuerit observatum, quod tamen, si talis foetus unam eandemque cum majori conceptionem habuisset, atque post aliquot dies vel septimanas a prima formatione vivere iterum desiisset, absque dubio factum esset, siquidem intra ejusmodi temporis spatium subtilissimum hoc corpusculum facillime in mucilaginem, putredinem & nihilum redigi potuisset. Quantum autem superiorem objectionem, nimirum utriusque foetus per eandem placentam factam connexionem attinet; cur quæso minor hic embryo, in superfoetatione ex ovario ad uterum perveniens, non æque majoris foetus placentæ accrescere vel agglutinari potuisset, uti in ostrearum testis sæpissime minores majoribus adnatas reperimus? cum præterea minoris hujus foetus involucra & placentulam, reperto ejusdem coalitu, facillime a majori placenta separare liceret. Simile fere exemplum refert etiam Cornelius Stalpart van der Wiel *observat. rarior. cent. I. obs. 74. p. m. 323.* inquit: Elisabetha Tomboy, obstetrix e puerpera geminos excepit, quorum alterius membranæ amnio quoddam accreverat corpusculum, haud aliter, quam majoribus ostreis minus quandoque adhæret, quod funiculo quodam placentæ conjunctum erat, & in quo parvulus foetus digiti instar latebat. Hic autem masculus omnibus absolutus membris, altera pectori imposita manu, sed durus admodum, ac tanquam e latere cocto consisteret, reperiēbatur. Sequentem observationem his verbis commemorat Johannes Daniel Geyerus *M. N. C. Dec. II. an. 5. obs. 233. p. 457.* Honeſta femina Manhemii rediit

ex thermis Wisbadensibus, quibus ob singularem & inconsumetum ventris tumorem usa erat, atque tunc demum se gravidam sentiebat. Demum reversa læta, circa medium noctis ingentes patiebatur nifus & dolores, adeo ut lochia ante partum profluerent, ipso foetu cum sua placenta subsequente, qui vivus perfectusque in omnibus erat primo, sed, accepto prius sacro fonte, exspirabat. Quum vero penitus secundinam inspicerem, quæ non, uti fere plerumque, oblonga, sed plana & rotunda erat, inveni eam circumdatam tenaci membrana, inque hac inclusum alterum filiolum ad spithamæ longitudinem, cujus funiculus umbilicalis insertus erat propriæ placentæ, quæ alteri fortissime connexa erat. Hic embryo in omnibus erat perfectus, nisi quod ungues deficerent, interne cerebrum & hepar erant putrida, cor vero instar cordis alaudæ, renes instar phaseoli, funiculus umbilicalis instar pennæ insertus hepatis & vesicæ, pudenda, aures, oculi glauci, palpebræ, omnia salva. Hic inter obstetricem & mulieres adstantes orta erat quæstio, an uno eodemque tempore hæc conceptio facta fuerit, an contra? Dubio procul per superfœtationem. Quæ jam historiæ omnes luculenter probant, accessisse non raro uteris gravidis conceptus novos atque in his genitos foetus natos esse longo post prius conceptorum exclusionem tempore, aut si eadem cum his die vel hora, imperfectos & magnitudine & conformatione, ut hinc non aliter arguere liceat, quam esse eos juniores five serius conceptos.

§. 10.

Superfœtatio falsa.

Quandoque etiam observantur superfœtationes falsæ, dum loco foetus subsequuturi, post varios in utero vel abdomine motus vel mola, vel uteri inflatio, vel hydrops deprehenditur. Talem superfœtationem, quam mentitus est motus aquarum hydropicarum, annotavit Paulus Ammannus *M. N. C. Dec. I. an. 2. obs. 186. p. 284.* Edidit, inquit, anno 1657. intra primum ab urbe Lipsia lapidem, in pago *Marck-Cemberg*, mulier cujusdam rustici filium,

filium, & uti postea colligere licebat ex eventu, in hoc ipso puerperio reddita fuit hydropica, forsan propter suppressas purgationes puerperii, nec ipsa, nec marito illud animadvertente. Quid fit? elapso trimestri abdomen hujus paganæ in fastigiatum tollitur tumorem, non secus ac solet fieri, in ingravidatione; quo tumore conspecto ab obstetrice, manu leviter abdomen comprimit, & ex obscuro aquarum hydropicarum motu decepta exclamabat, restitare adhuc foetum in utero superfoetatione conceptum, & statim medicum cum chirurgis accersi jubet; interim moritur hydropica mulier. Ne autem putatitius foetus vitæ periculum aliquod pateretur, os gravidæ (ceu putabatur) imposita clavi apertum tenuerunt. Simulac vero corpus hydropicæ dissectum, statim post primam incisionem tam foetida humorum colluvies profiliit, ut adstantes abire coacti fuerint. Tam certum signum est rei cujusdam in abdomine motus, vel pro ingravidatione vel superfoetatione concludenda? siquidem tumor iste abdominis non ab expansione uteri sed a collectione feri hydropici proveniebat, qui ante sectionem obstetrici tantopere imposuit.

§. II.

An vero sola mulier superfoetet, dissentiunt autores, dum quidam superfoetationem in sola muliere, alii vero etiam in variis *An bruta superfoetet?* brutis annotari statuunt. Inquit enim Rodericus a Castro *de Natur. mulier. lib. III. cap. 13. p. 147.* sola mulier gravida virum admittit, ideoque huic soli superfoetatio contingit. Et Johannes Sperlingius *de Format. homin. in uter. cap. 6. pag. 80.* scribit: Superfoetat sola fere mulier, quia maxime libidinosa est, & sola ferme maris congressum, licet gravida sit, appetat. Secundum Aristotel. *de Generat. animal. lib. IV. cap. 5. fol. m. 583.* Animalium alia nunquam superfoetant, alia superfoetant, quorum quædam enutrire suos conceptus semper possunt, quædam interdum possunt, interdum nequeunt. Causa, ne superfoetent est, quod singu-

la pariunt. Solipedes enim, & quæ iis auctiores sunt animantes, nunquam superfoetant, facit enim earum magnitudo, ut excrementum omne in conceptum absumatur. Multipara ideo superfoetant, quoniam plures conceptus superfoetatus quidam, alter alteri sunt. Quæ autem ex his magnitudine prædita sunt, ut homo, si alter coitus proxime ab altero accessit, enutrire, quod superfoetatum est, possunt. Et de *Histor. animal. lib. VII. cap. 4. fol. 435.* inquit idem: Mulier & equa omnium maxime animalium gravidæ coitum patiuntur: cætera ubi gravida fuerint, fugiunt mares, en scilicet, quorum natura superfoetare more leporis recusat. Verum equa nunquam superfoetat, sed magna ex parte unum tantummodo generat. At vero in muliere raro quidem evenit, ut superfoetet, sed factum tamen aliquando est. Secundum Joannis Hucheri *Tr. de sterilitat. cap. 3. pag. m. 453.* est superfoetatio brutarum feminarum speciei familiaris, quarum uteri partibus duabus, veluti cornibus, divisi sunt: ambabus scilicet in plures cellulas ob multiplicem foetum discretis, quæ cum uno coitu omnes non impleantur, a vacuis semen masculum altero concubitu emissum excipi concipique frequenter contingit. Reliquis brutis, quibus, ut humanis, unico sinu uterus patet; secundam conceptionem ante prioris exitum supervenisse nunquam notatum est, ne in leporum quidem, aut equarum ordine, tametsi hæ prægnantes præter cæteras brutas maribus fruuntur, non ob uteri angustiam solam osculique uterini validam adstrictionem, primi conceptus asservandi gratia, sed ob feminis quoque menstruique penuriam, præ sicciori earum natura victu pariori sicciorique & vita valde ærumnosa: At vero humanis feminis secundam conceptionem, prima non sublata consuetam esse autores sunt Hippocrates & Aristoteles, iis scilicet, quibus per ardorem libidinis uteri os internum recluditur, semenque virile in id uteri latus reconditur, quod a priori conceptu liberum magisque vacuum relictum est. Ex mente Andreæ Laurentii *Histor. anat. lib.*

lib. VIII. quæst. 22. fol. m. 313. mulieres sæpius solent superfœtare, quia sola fere mulier post conceptum maris congressum appetit. Reliqua animalia gravida nunquam, aut saltem raro marem admittunt: cujus rei causam ibidem Laurentius perscrutatur, atque ex Aristotele adducit, mulieri frequentius, quam cæteris animalibus contingere solere, si lepores & fues exceperis. Et juxta Joh. Fernelii *Physiol. lib. VII. cap. 12. p. 190.* mulieri perquam raro, canibus autem & aliis plerisque animantibus frequentius accidit superfœtatio. Scribit etiam Thomas Bartholinus ad Nicolaum Stenonem *Epist. med. Centur. IV. epist. 56. p. 361.* se in brutorum genere crebriora vidisse exempla, cui multiplex fœtus familiar.

§. 12.

De lepore scribit Aristoteles *de Generat. animal. lib. IV. cap. 5. fol. 583.* hoc animal superfœtat, quippe quod nec magnum est & plura generat; multifidum enim est; tale autem quodvis plura generat. Semine etiam abundat, quod ejus hirsutie significatur. Copia enim pili exsuperat. Nam hoc unum pilos & sub pedibus habet & intra genas. Pili autem abundantia & hirsuties copiam indicat excrementi. Quam ob rem homines pilosi libidinosiores & seminis copiosiores sunt, quam læves. Lepus igitur sæpenu-mero fœtus alios imperfectos gestat, alios perfectos jam edit. Dasy- podes omni mense pariunt, & superfœtant, sicut lepores. A partu statim implentur, concipiunt quamvis ubera ficcante fœtu, juxta verba C. Plinii *Nat. Hist. lib. X. cap. 63. fol. m. 184.* De leporum coitu & superfœtatione ita scribit Christianus Franciscus Paullini *Lagograph. Sect. I. cap. 3. p. 76.* averse coeunt, quia membra eorum genitalia in posteriori corporis parte sita. Et femina non raro masculum prior supervenit. Quovis anni tempore, maxime tamen verno & coeunt & pariunt: dumque in utero habent, superfœtant, generantque singulis mensibus, sed fœtus non edunt universos, verum diebus interjectis partum peragunt.

Vel

Vel juxta Claud. Ælian. *de Animalib. lib. II. cap. 12. fol. m. 33.* Lepus uno & eodem tempore quædam in utero inchoata & imperfecta fert, alia parturit, alia modo peperit. Huc alludit poeta Quidam :

Prolis amans gignit foetus lactatque tenellos ;

Dumque superfoetat, dum parit, usque coit.

Et Wolfgangus Waldungus *Lagograph. cap. 28. p. m. 44.* inquit. Lepus uterum ferre potest quocunque tempore & copiosos generat foetus, quos non universos simul edit, sed interpositis diebus : lac ante partum habet, post partum statim coire & incipere potest. Plura de leporum & aliorum brutorum superfoetatione vid. Georg. Franci de Franckenau *Satyr. medic. 13. §. 6. p. m. 224 seq.* Ejusd. *Annotat. in Paul. Zacch. Quæst. med. legal. lib. I. tit. 3. quæst. 3. fol. 102.* Item Paullini *loc. all. p. 102.* ubi ait: Coit lepus, cum concepit & partui jam vicinior est, inque ipsis doloribus partus non renuit coitum. Alius extra ventrem foetus prodibit perfectus, alium vero intus debilem gestat. Et Oppianus inquit: Lepus superfoetat, aliud educans, aliud in utero pilis vestitum, aliud implume, vel impile, aliud inchoatum gerens pariter. Inquit etiam Wilhelmus Huldericus, Waldschmied *Dissert. de superfoet. c. 4. b seq.* Lepores sæpissime superfoetant, sunt enim animalia salacissima, & quanquam semel conceperint; coitum tamen celebrant unde contingit, ut semen in uterum conjectum a vasis capillaribus absorbeatur & ad ova deponatur. Vidi leporem feminam foetus utero gerentem, in ovariis restitantes cicatriculis, ab ovulorum foecundatione relictis, & ovulis aliis imprægnatis, orobi aut pisi majoris & minorum magnitudine &c. De vacca vitulum priorem in utero adhuc gerente, & nihilominus concipiente, sequens historia a Johanne Georgio Schenckio *Histor. monstror. p. m. III.* ex Bauhino recensetur. Vacca partus difficultate impedita cum foetum conceptum parere minime posset, nihil gravius passa, post tempus aliquod rursus concepit & exacto tem-

tempore vitulum vivum & sceleton prioris ^{vi-} Mi-
rum sane, potuisse vaccam ^{an-} corruptionem perferre, &
rursum ossibus ^{an-} vituli retentis concipere nihilominus.
superfœtationem equæ observavit electoris Bavarici equarum
præfectus: Cum enim equa quædam gemellos edidisset, alterum
adhuc sanum & incolumem, alterum imbecillem admodum &
statim post partum extinctum; & ipse præfectus in rei causam, in
libro, in quo tempus admissionis equarum notatur, inquisivisset,
invenit, illam equam intra sex hebdomadarum spatium marem
admisisse, indeque sine dubio prima vice sanum & incolumem, se-
cunda vero mollem, uti vocabat, & imbellem concepisse judicavit.
vid. Vit. Riedlin. *Linear. med. an. 1695. mens. Jul. 25. p. 218 seq.* De
gallina superfœtante extat in *M. N. C. Dec. II. an. 8. obs. 117. p. 259.*
ex communicatione Bartholomæi Johannis Ottonis Hanne-
manni sequens observatio: in pago Hohen-Westede rustici cu-
jusdam gallina una cum ovo ordinario viginti quatuor alia ova,
perdicis ova magnitudine æquantia, perfecta atque putamine ob-
ducta uno partu peperit.

CAPUT III.

De diagnosi & prognosi superfœtationis.

§. I.

Circa superfœtationis diagnosin eadem fere, quæ circa gemel- ^{Superfæ-}
lationem occurrunt, signa notanda veniunt. Sicuti enim a ^{tationis di-}
gemellis uterus atque abdomen nimis expanduntur, ultimisque ^{agnosis.}
gestationis mensibus ambo foetus, eidem adhuc inclusi, nonnun-
quam tactu judicari possunt, dum alter ut plurimum in dextro, al-
ter in sinistro latere situm habet, ibidemque tumorem causatur,
remanente in abdominis medio quasi spatio seu fovea, ita etiam
in superfœtatione, si præsertim post breve a primo conceptu in-
tervallum facta sit, similes tumores observantur, quibus tamen
superfœtatio a gemellis non discernitur; Ubi vero posterior con-
ceptio non statim a primo coitu, sed post aliquot demum septima-

facta fuerit, tunc in altero latere major, in altero minor tangitur tumore. Talis tumorum differentia, ob varias causas (verbi gratia, ob alterius robur & debilitatem, vel si huic foetui præ illo minus nutrimenti advehitur) in gemellis uno eodemque congressu conceptis, etiam accidere possit. Præterea etiam tam in gemellis, quam superfoetatis, motus quidam observatur & quidem ultimis mensibus vel fortis, vel debilis, ex quo si in utroque latere tumor sit magnus & motus simul fortis, tunc gemellos, vel etiam binos foetus, post breve temporis intervallum superfoetatos, in utero latere judicari posset; contra vero si in una parte tumor magnus & motus fortis, in altera vero tumor parvus & motus debilis sentiatur, tunc in minori tumore vel debilis gemellus, vel tardior superfoetatio, foetus item debilis & ad partum nondum maturus subesse judicandus erit. Talem tumorem atque motum in gravidæ utero etiam post alterius foetus exclusionem bene observet obstetrix, an scilicet post illius partum alter tumor in suo loco permaneat, vel locum mutet, item an ipsius motus sit fortis an debilis, an penitus cesset; nec statim alterum foetum omninifera extrahere allaboret, ne forte loco alterius gemelli superfoetatum infantem, ad partum nondum satis maturum, vel etiam adhuc imperfectum, ante tempus legitimum, expellendo, partum causetur abortivum.

§. 2.

*Partus tem-
pus.*

Deinde etiam pro diagnosi considerandus est, tam gemellorum, quam superfoetatorum, partus ejusque terminus. Sicuti enim gemelli proprie sic dicti unico coitu vel eadem nocte concipiuntur, ita eodem quoque partu simul vel paulo post excluduntur; Contra uti superfoetatio post aliquot a prima conceptione dies, septimanas vel etiam menses fieri solet, pari quoque distantia superfoetatorum infantum partus differt. Interim libenter concedimus, quandoque etiam binos foetus superfoetatos, post longum etiam temporis spatium a se invicem conceptos, eodem tem-

tempore nasci atque excludi; tunc autem pro vera superfætatione dignoscenda tales foetus bene sunt considerandi, an ambo inter se sint æquales, perfecti, maturi & sani, an vero a se invicem differentes. Siquidem si alter est major, alter minor; alter maturus & perfectus, alter immaturus & imperfectus, tunc alter foetus pro abortu est judicandus.

§. 3.

Porro ratione membranarum, geminos & superfætatos involventium, notandum, illos cominuni, hos peculiari membranæ seu involucri inclusos in lucem prodire, de gemellis enim inquit Hippocrates *de superfætat. oper. Sect. III. fol. m. 43.* quæ gemellos utero gestat, eodem die, velut concepit, parit; uno autem involucri utrumque foetum continet. Quod si proinde duo foetus eodem partu editi, licet non sint ejusdem magnitudinis, eadem membrana inclusi reperiantur, non pro superfætatis, sed pro geminis sunt æstimandi, cum secundum hæcenus dicta, superfætati non eodem tempore concipiantur, hinc etiam uno eodemque involucri minime contineri possint, cum quodlibet ovulum propria membrana gaudeat. Et quamvis etiam interdum, ex obstetricis ignorantia vel alia causa, duo superfætati foetus simul prodeant, minime tamen communi sed proprio involucri reperiuntur inclusi, neque ejusdem sunt magnitudinis, quippe quæ ratione termini conceptionis in iisdem variat, nisi forte prior conceptus sit debilis atque morbosus, posterior vero sanus. Sicuti etiam ex unica placenta uterina dignoscuntur gemelli, ita quoque, ex duobus placentis bini judicantur superfætati. Quod confirmat Franciscus Mauricæus *de Morb. gravid. lib. I. cap. 9. edit. Germ. p. 114.* cujus verba latine ita reddidit Theophilus Bonetus *Polyalth. Tom. III. lib. V. cap. 26. fol. 335.* ante decennium (juxta Mauriceau, sexennium) circiter ad fui partui mulieris, legitimo tempore parientis, ex cujus utero eduxi puellam crassam viventem, pedes arripiens, depravato enim illo situ se offerebat; post-

Superfætatorum involucria.

modum secundinam educturus una eduxi alterum foetum, matrem mortuum, duplo minorem dicta filia, qui respectu magnitudinis quadrimestris aut quinquemestris esse videbatur, etsi uterque unius concubitus progenies esset, id quod dignoscere licebat, quod unica involverentur tunica, utrique communi (vel juxta Mauricæi verba germanica, *weil sie für alle beede nur eben ein Bürdlein oder Nachgeburt hatten*) quæ verissima & legitima est nota. Hic postremus foetus adeo parvus erat, ut simul & semel ipsum eduxerim una cum secundina propriisque membranis adhuc involutum, quas illico dissecai, ut de vita constaret, sed jam pridem mortuum esse ostendebat ipsius corruptio. Ibidem etiam de foetuum superfoetatorum membranis Bonetus cum Mauricæo ita sentit: Si plures adfuerint foetus, factaque superfoetatio, revera quidem per membranas secernentur, ac carebunt membrana communi, sed unusquisque foetus proprio involucro gaudebit, neque ejusdem futuri sunt magnitudinis; quia is, qui per superfoetationem genitus fuerit, multo minor futurus est ac debilior primogenito, qui robore fretus maximam alimenti partem ad se attraxerit; id quod nobis conspiciere datur in fructibus elegantibus, & majoribus, qui juxta se minimos habent, quasi abortivos, eo quod qui primus efformatus est, nutrimentum reliquis præripit: Nonnunquam tamen accidit, gemellos disparis esse magnitudinis, id quod contingit ob inæqualitatem roboris, propter quod unus vel alter plus alimenti attrahit. vid. etiam Rod. a Castr. *de Natur. mulier. lib. III. cap. 13. pag. 147.* Joh. Jacob. Harder. *Apiar. obs. 92. p. 350.* Th. Bartholin. *Histor. anat. Cent. IV. hist. 14. p. 245.* ubi inquit: in superfoetationibus, quando interjecto tempore & conceptus fit, & partus, singuli foetus suis membranis includuntur, uterique loco separato adhærent, ut excludi unus possit, remanente altero, secus ac contingit in gemellorum partu, qui sola membrana acquiescunt unoque loco juncti includuntur. Hæc tamen signa ad demonstrandam superfoetationem non sufficere scripsit Thiermeyerus *l. a. p. 77. seq.*

§. 4.

Quoad prognosin superfætationis evolvatur Hippocrates, *Prognosis* qui *tract. de superfæt. oper. sect. III fol. 41.* ita scribit: Cum mulier superfætaret, si quidem primus foetus in medio utero contineatur, superfætatum quoque a priore expulsum prolabitur. Quod si in altero cornu præpostere conceptum contineat, ipsum postea partu ejicit, minime vitalem, postquam vitali foetu liberatus uterus laxatus & humectatus fuerit. Nisi vero superfætatum confestim secedat, dolores excitat, fluxum graveolentem & febrem, faciem, tibias & pedes tumor prehendit, qui si dissolvatur, cibum averfatur, quoad exciderit, &c. Sic Martinus Weinrichius *de ort. monstror. p. 129. b.* inquit: Superfoetari quidem potest, sed raro, si tamen aliquando accidat, ut superføtetur, perfici non potest. Ergo si imperfectio a superfætatione etiam monstra: Igitur editus legitur infans nostris temporibus omnia perfectus, sed postridie alius neque oculis, neque naribus, & ore cæterisque adhuc distinctis, quem tardius conceptum est verisimile. Et juxta Dan. Sennert. *præct. lib. IV. part. II. sect. 4. cap. 6. p. 311.* si longiore post primam conceptionem intervallo superfætatio accidat, matri plerumque non parva pericula attrahuntur. Aut enim foetus, ultimo conceptus, cum vix vitalis esse incipit, abortum concitat, & sibi & priori foetui interitum parat; aut si primo conceptus vitalis sit, partu tamen difficili labores & dolores gravidæ attrahuntur, & magna hæmorrhagia plerumque sequitur, ac feminæ vires dejiciuntur. Si autem post breve intervallum superfætatio fiat, & uterque foetus vitalis est, eadem fere ratio est, quæ gemellorum, nisi quod duplicis secundinæ extracto facile largiorem sanguinis profusionem excitare potest. Secundum Joannis Junckeri *Conspect. medicin. tab. 112. pag. 709.* a superfætatione utrique foetui, & grandiori & superinducto recentiori abortus periculum impendet. vid. etiam Joh. Bened. Sinibald. *geneanthrop. lib. VIII. tr. 2. cap. 3. p. 700. seqq.* Talia pericula autem feminæ

evitare, atque superfoetationem declinare poterunt, si post primam conceptionem ab ulteriori concubitu abstrahant; Inde etiam dicit Daniel Sennertus *l. a. p. 312.* tutissimum est, feminas cavere, ne facile superfoetent, & proinde, ubi se concepisse animadvertunt, coitum & amplexus lasciviores vitare. Et juxta Joh. Sperling. *de homin. format. in uter. cap. 4. p. 80.* tutius est congressum omittere, quam cum periculo coire. Item Theophilus Bonetus *Polyalth. tom. III. lib. V. c. 26. fol. 335.* ex ejusmodi rationibus colligit, penes feminam esse superfoetationem declinare, si a concubitu prioribus mensibus facta conceptione abstineat. In illius autem potestate non esse, ut gemellos non pariat.

§. 5.

*Quæstio
med. legalis
casus.*

Quam hætenus tractavimus superfoetationem non modo in foro medico, verum etiam juridico disceptandi ansam præbere, jam supra cap. 2. §. 2. vidimus in observatione de Philippi Ludovici ab Hirtshorn uxore, quæ post mariti, viri nobilis admodum divitis, obitum testamento hæres instituta in mariti bona allodialia successerat, feudis, quæ amplissima possederat, deficiente prole mascula, ad agnatos proximos perventuris. Cum itaque hæc femina mortis conjugis sui tempore gravidam sese esse suspicaretur, nec tamen certo sciret, feudorum possessionem agnati invadere, nec quicquam obtinente vidua, atque, ut id temporis, quo infans nasci posset, præterlabi sinerent, postulante. Cum vero aliquandiu post pareret, mortuus prodiit: eoque insolentiores facti proximi, tanquam jure, feuda inter sese partiti sunt atque iis etiam viduam intervertere cœpere, quæ ad ipsam testamenti vi pertinebant. Cum vero huic venter post partum illum etiamnum tumeret valde, ut balnea Badensia peteret, consulere medici, hydropicam ipsam judicantes. Illa itaque Badenam profecta, degentibus id temporis ibi forte Moguntino & Saxone electoribus, secundo post adventum die parturientis labores sibi supervenire sensit, advocataque obstetrice, pulcrum valentemque opti-

optime edidit filium, qui octavo post genitoris obitum mense, undecimaque post ultimum partum prodiit hebdomada. Miræ satis rei fama illico ad electorum pervenit aures, voluitque Moguntinus infanti, cum sacro baptismatis lavaretur fonte, adesse compater: Saxo eidem mille Imperiales donavit, deditque Heidelbergam ad Palatinum literas, ut ipse avidos illos, rei que non suæ inhiantes nimium, possessione feudorum dimoveat, viduæque illa, utpote Ferdinandi recens nati vasalli matri restituat; quod etiam factum fuit. Nec sua tantum damna noxia cupiditate orta doluere agnati, sed, quod longe durius malum, cachinni dolores auxere.

§. 6.

Huic historiæ persimilem refert etiam Paulus Zacchias *quæst. Alius casus. med. leg. cons. 66. op. tom. III. fol. 125. seq.* cujus hoc est argumentum: Johannes Nicolaus Sobrejus in rixa occumbens reliquerat Lauretam Polymniam ejus uxorem, mulierem optimi habitus & staturæ prægrandis, in utero habentem, quæ statò tempore, nempe octavo a mariti excessu filium peperit, & non detumesciente ventre, & obstetrice alium foetum adesse firmante, non potuit quantocunque nixu, illum ab utero tunc expellere; sed transacto integro fere mense, imò uno aut altero die adjecto, denuo partus doloribus conflictata, illum edidit, qui & bene validus ac optime formatus prodiit, cum prior in ipso ortu decessisset & nullum vitæ signum præbuisset, ita ut ne baptizatus quidem fuerit, ac præterea esset male conformatus & non omnino absolutus. Oppositum est a Johannis Nicolai propinquis, qui ejus hæreditati inhiant, quod secundus hic conceptus esset superfœtatus, & ex alio viro, quam ex Johanne Nicolao conceptus, & idcirco non deberet ad patris putativi, nempe prædicti Joannis Nicolai hæreditatem admitti, unde Lauretæ pudicitia mirum in modum deturpata remanebat. Duo ergo puncta discutienda offerebantur: Primum an hic secundus foetus superfœtatus esset? Secundum, an

an Lauretæ honestas ex hoc esset suspecta? At quæ quid loco allegato respondeat Paulus Zacchias benevolus lector evolvat.

§. 7.

*Mola pro
gemellis ha-
bita.*

De mola pro gemellis superfoetatis habita sequentem casum communicat Michael Bernhardus Valentini *novell. med. legal. cas. 14. pag. 286.* Persona muliebris Rudestadiensis, Martha Dingelstadtia vocata, cælebs adhuc, quæ per aliquot temporis spatium in ædibus Johannis Sturmii vixit, ejusque uxori mutuam sæpe operam præstitit, die 7. Aprilis a. 1700. juxta depositionem obstetricis juratæ infantulum peperit, quem supradictus Sturmio interfecisse & in profluentem abjecisse dicebatur. Quod cum Dingelstadtia confiteri nollet, torturæ subjecta fuit: quo facto, die 27. Julii a. c. viventem partum enixa fuit, Sturmio ob præsumptionem infanticidii, quod negabat, ad torturam condemnato, a qua tamen per Johannis Andreæ Fischeri responsum medicum, in Valentini novellis annexum, liberabatur, prævio juramento purgatorio ratione adulterii commissi. Imprimis autem prædictus medicus in judicio suo medicinali ad duo puncta respondet: 1) An substantia a Dingelstadtia, inquisita, die 7. Apr. anno 1700. edita partus verus & vitalis, & consequenter gemellus superfoetatus aut abortus, respectu illius infantis, qui die 27. Julii ab ipsa in lucem edebatur, fuerit? 2) An a Sturmio administrata remedia pellentia abortum, & quidem sub imprægnatione sex mensium, procurare potuerint? Quoad primum punctum, (quod ad nostram intentionem pertinet) refert: quod licet circumstantiæ in actis relatæ tum suspicionem partus superfoetati, tum conceptionis gemellorum, quorum alter per abortum nominato tempore abactus fuerit, præ se ferant, neutrum tamen de substantia quæstionis, salvis rationibus medico-physiologicis atque experientia dici possit, siquidem casus superfoetationis vel eam ob causam hic locum habere non potest, multo minus applicabilis est, quoniam proportio temporis inter primum & secundum foetum
feu

seu partum, a maxima medicorum parte statuti, cum historia plane non concordat, secundum quam partus ultimus die 27. Julii neutiquam priorem die 7. Aprilis anni ejusdem sequi potuisset. Quemadmodum enim causa superfœtationis communiter in hiatu osculi interni uterini, per primos quadraginta dies a conceptione tantum observabili, locatur, vid. Hippocr. *de superfœt. & lib. 5. epidem.* Laurent. *anat. lib. VIII. q. 25.* Post illud tempus autem arctior uteri clausura nullam amplius imprægnationem admittit, vid. Hippocr. *lib. de nat. mulier. §. 31.* Ita partus superfœtatus ultra quadraginta dies extendi nequit, qui saltem quinque hebdomadas cum quinque diebus, neutiquam vero quatuor menses integros efficiunt &c.

§. 8.

Utrum vero superfœtationis causa revera in orificii uterini hiatu vel nova apertura, feminisque virilis cum muliebri commiscela, vel annon potius in ovulis muliebribus a spirituosâ feminis virilis parte imprægnatis, consistat; Item annon, secundum hanc a modernis autoribus defensam de conceptione sententiam, talis ovuli fœcundatio seu superfœtatio, tam quarto & quinto a prima conceptionis mense, quam post unum vel alterum tantummodo diem vel etiam mensem, fieri possit, paulo ante autoritate, atque exemplis monstravimus. Quod confirmat etiam Felix Accorambonus, Italus Bononiæ, ajens, nostra ætate nobilis femina nupta quotannis bis & ter pariebat, & perfectos producebat fœtus ex superfœtatione; qui vivebant & adhuc aliqui eorum sunt superstites. Nam genito priori fœtu semper remanebat prægnans adhuc ex superfœtatione trium vel quatuor mensium, ita ut post primum partum quatuor vel quinque mensibus elapsis, & interdum tribus vel sex, iterum pariebat perfectum fœtum, & post illum alium post tres vel quatuor menses, & sic deinceps quatuor vel quinque perfectos partus edidit. Unde ab tot partus adeo extenuata & debilitata remansit mulier illa, ut de consilio medicorum

per aliquot menses vir ejus abstinuerit ab ejus incubitu, ut illa posset vires resumere & restaurari. Sed cum postea ad viri concubitum redierit, iterum superfoetabat, ut prius. Iterum ideo opus fuit, ut a concubitu abstineret. Et hæc Bononiæ est notum omnibus. Quam Accoramboni observationem Casparus Posnerus *Geneanthropolog. tabul. IV.* recenset.

§. 9.

Casus peculiaris.

An ad superfoetationem aliquatenus referri debeat observatio Johannis Baptistæ Wenckh, *M. N. C. Dec. III. an. 4. obs. 87. p. 184. seq.* de muliere, quæ existente in utero officulorum congerie ex mortuo foetu relicta, denuo bis concepit feliciterque peperit, nemini obtrudam. Observatio autem hæc est: Maria Neubauerin anno 1682. furtivo thoro imprægnata fuit; increfcebat indies uterus, successu temporis etiam alacer & vivax in utero quotidie agitare sese infans a matre sentiebatur, donec ad quartam aut quintam ante puerperii solitum tempus hebdomadam ventum, ubi foetus commotio penitus cessavit, uterus concidit, ita tamen, ut circa umbilicum tumor quidam trium digitorum transversorum altus remanserit, citra tamen uteri dolorem, qui fervili suo operi impedimento esse potuisset, præterquam quod ex tunc foetida quædam sanies ad instar corrupti profluvii menstrui per vulvam stillabat, quo durante profluvio, multo capitis dolore, calore et siti vexata fuit: trium tamen septimanarum spatio elapso cessant symptomata, convalescit tumorifera, ad consuetos labores graviores etiam peridonea; redeunt menses duobus mensibus obstructi, minus tamen servato effluvii ordine & regula ordinaria. Interim animadvertunt vicini, actu præteriisse tempus parturitionis Mariæ, ventrisque intumescentiam evanuisse penitus, infantem tamen nec vivum nec mortuum hucusque comparuisse, proin eam de clam subducto aut occiso fructu suspectam ad tribunal accusant. Citata se sistit, captivitati mancipatur, acerbis inter minas rigorosius, quo fructus devenisset,

nisset, exquiratur, responsoque reponit constanter, divanuisse per se ventris ingravidationem, nec aliud remansisse, quam residuam tumidam hæmisphærulam circa umbilicum, omnis doloris expertem. Post hæc visitur a chirurgis & obstetricibus, sed innocens reperta, libera abire permittitur. Transactis posthæc duobus annis prælibata Maria cum Christiano Neubauer, ecclesiastico ritu copulata post duos annos puellam perfectam peperit, quætamen post dimidium annum iterum mortua est. Terminum duorum sequentium annorum evolutum concepit iterum & consueto tempore noviter filium peperit, qui tertio post die exspiravit. Undecimo tandem post hæc amo tumor ille doloribus feminam affligere incepit. Demum supra umbilicum novum ulcus apparuit, ex quo caput coxulæ prominebat. Postmodum duo illa ulcèra chirurgus conscindebat, & inibi officula seu sceleton, jam in decimum tertium annum hærentia, successive de die in diem extrahebat; In hujus feminæ paulo post defunctæ extracto utero foramen, atque in uteri cavitate ossei digitorum articuli inhærentes inveniebantur.

§. 10.

Non immerito etiam adhuc annexenda est relatio de superfætatione falso prætenso, quam Wilhelmus Huldericus Waldschmied in dissertatione de hac materia recenset, ad Christianum Joachimum Lossau ita perscribens: Nosti, vir experientissime, quæ de superfætatione in vicinia nostra currente anno 1725. acta fuisse non vago rumore, sed testibus & circumstantiis omni exceptione majoribus divulgabantur. Pauperculam ante triennium abortum passam, ante biennium vero filiam vivacem enixam, anno supradicto die 18. mensis Maji peperisse filiam, & tertio Octobris ejusdem anni, fausta Lucina, filium, utrosque justo & naturali termino editos, perfectos & vitales. Rem ut oppido raram, in programmate intimatorio inauguralis tuæ, de valore medicinæ & chemiæ, historice & physice, sed breviter, ut scopus & charta

Superfætatio falso prætenso.

ferre poterant, eruditis proposueram. Mirabatur orbis eruditus rem insolitam, & de veritate ejus solliciti medicorum celebrium plurimi, per literas certiores reddi a me cupiebant, quibus communicato programmata rem, ut acta erat, perscribebam. Sed, ut fit in rebus humanis, licet omnis adhibeatur circumscriptio, omnesque circumstantiæ perpendantur quam diligentissime, & quicquid præcautionis adhibeamus, tamen nonnunquam decipimur; fallere enim & falli non est alienum ab hominis ingenio. Ecquis fraudis quicquam hic subesse vel suspicari poterat? Mulier paupercola, uxor rustici tenuissimæ conditionis, mater filiæ ante biennium progeneratæ, cui victum vix suppeditare poterat, se denuo sentit gravidam, accedit pastorem loci & confessionarium, virum ut eruditum, ita fane prudentem, ipsique aperit, se esse imprægnatam, confitetur peccata sua & obtenta absolutione ad sacram cœnam admittitur, seque deinde publicis precibus per verbi divini ministrum singulis dominicis commendat. Postquam vero tempus partus, quod instituto calculo sibi præfixerat, per plures septimanas præterlapsum erat, fraudem cogitavit, nulla alia de causa, quam ut vexationes & irrisiones vicinorum & vicinarum evitaret; nam ignominia & dedecori cedere existimabat mulieri nuptæ, si unquam se gravidam esse frustra sibi fuerit imaginata. Occasione igitur ita ferente, meretricis, itidem egenæ, infantem recens natum pro suo venditat, & marito, totius rei ignaro, ut filiam, ab ipso conceptam obtrudit, firmiter persuasa, se non amplius esse gravidam. Sed quæ alios decipiebat, illa egregie iterum decepta est: sensit enim post aliquot septimanas, se utero gestare & revera esse gravidam; id quod rumori de superfoetatione primam dedit occasionem cum hoc marito, agnatis, vicini, pastoribus loci & domino prædii patefaceret, fraudemque priorem callide cunctis occultaret, ita, ut post viginti septimanarum a primo prætenso partu spatio, filium ediderit, ut omnes credebant superfoetatum. Atque hæc tota est illa historia, quam mirati sunt

sunt omnes, quamque nemo, cui circumstantiæ notæ erant, in dubium vocare ausus fuerit, nisi meretrix ista, cujus prior & supposititius erat infans, eundem repetere voluisset & sibi vendicare, & hoc ipso detectioni fraudis & inquisitioni judiciali ansam præbisset; testantibus actorum excerptis hic adjectis, unde & circumstantiæ cunctæ, & mulieris vafrities, imposturæ, mendacia, horumque pœna per judicis sententiam promulgata, pluribus curiosis pateat.

§. II.

De superfætationis suspitione hanc observationem communicavit Johannes Melchior Welschius: Femina quædam triginta quinque annorum filiam peperit vivam & alacrem, solitis doloribus prægressis, remanente in utero secundina, & alio foetu sese hinc inde movente. Puerpera optime sese habente, cessantibus etiam ad partum indiciis, aliam puellam communi placentæ involutam latitare suspicabatur. Biduo vero elapso puella diarrhœam admodum molestam & supervenientibus doloribus, licet lenioribus, debilitatem sat magnam persentiebat. Interim parturiente medicamentis confortantibus corroborata & leniter pellentibus sublevata, profiliebat vesica aqua plena, puella alia, debilis quidem, post vero vivida nascebatur, & secundinæ binæ separatæ æqualiter recentes nullumque foetorem (licet altera ad tertium post partum diem in utero latitaret) de sese spirantes, sequebantur, vid. Rosin. *Lentil. Miscellan. med. pract. Part. III. pag. 301.*

Superfætationis suspicio.

§. 12.

Casum de superfætatione sive quæstione, an communicatio feminis in gravida efficax & fructuosa sit? cum responso facultatis medicæ Halensis communicat Fridericus Hoffmannus *Medicin. consultator. Part. III. cas. 9. p. 52.* quod responsum sic sonat: *Cajus hat in einem an unsere Facultat überschikten Schreiben referiret, wie Titius, ein Ehemann mit einer gemeinen Hure, einen vollkommenen Beyschlaff gepflogen, welche nach 15. Wochen zwey frische und ge-*

Cajus alius.

sunde Kinder gebahren. Da nun Cajus ex sententia JCtorum, quod qui aliqua causa impeditus semen non immiscuit, neque delictum consummavit, cum ordinaria poena non sit advertendus & puniendus, und hingegen ex asserto medicorum, quod post medium gestationis tempus ob uteri occlusionem nulla feminis commixtio succedat, in einigen Zweifel gesetzt ist; so hat selbiger über solchen Umstand von unserm Collegio einige Information erfordert; absonderlich diese Frage zu erleutern vorgeleget: Ob bey einem Weibe, welche schon einige Zeit gravida ist, noch cum fructu und mit einer zur conception gehærigen Wirckung das Semen communiciret werde, oder ob solche communicatio seminis bey solcher Zeit sterilis und infructuosa sey? Hierauff geben wir zur Nachricht, daß nach einmahliger conception eine weitere communicatio seminis weder næthig noch kræfftig sey. Und ob wohl unter denen Medicis forensibus aus der observatione Hippocratis von der superfætatione viel redens und discurrens ist, so ist doch ein solcher Casus nicht nur sehr selten, sondern es kan auch die Materie de superfætatione auf des Titii casum nicht appliciret werden. Ja obwohl des Hippocratis Meynung von der Verschliessung der Mutter nach geschehener conception nicht allzurichtig ist, da auch nach solcher ersten conception nicht allein bisweilen superfætationes erfolget, sondern auch bey vielen gravidis nach solcher conception ein und mehrmahlen die menses continuiren, so kœnnen doch solche Umstände der Haupt-quæstion nichts præjudiciren, wie dieses an unterschiedenen Orten Drelincurtius, Harvæus, Schwammerdammius, Regnerus de Graaf, in Tract. de foetu, de generatione, de organis mulierum an und ausgeführet. Da nun 1) die superfætatio nicht so gemein gemacht werden kan, sondern als ein seltener casus anzusehen ist, da auch zum 2) nach einer einmahligen conception es der Ordnung der Natur nicht gemæß ist, mit einer neuen und spätern conception die erste zu turbiren, und 3) da auch so vielmahl ohne alle Frucht nach geschehener conception das semen bey Ehe-Leuten communiciret wird. Da 4) ferner die gemelli an der maturitate corporis einander gleich sind: 5) Dabey obig gedachter Weibs-Person

son schon über die Helffte die beyden Kinder getragen worden. 6) Da diese beyde Kinder frisch und gesund, und *ratione temporis* einander nicht ungleich gewesen. 7) Dagegen die Helffte der *imprægnation* und nach solcher Zeit der *uterus* gewöhnlich etwas genauer verschlossen wird. Da 8) um so viel weniger, bey einer *gravida*, wo *gemelli* schon vorhanden, theils eine *superfœtatio*, 9) theils in folgenden Zeiten eine *fructuosa seminis communicatio* kan *præsumiret* oder erweislich gemacht werden; 10) weil ohne dem die Natur bey einer schon längstens mit *gemellis imprægnata* ihre gnugsame *occupation* hat, daher auch nicht von einem *semine*, so lange hernach beygebracht ist, *alteriret* wird, auch diejenigen *motus*, welche *ad formationem fœtus* gehören, *ad præsentem embryonem dirigiret* sind. So urtheilen wir aus solchen Gründen, daß das *semen*, welches nach so langer Zeit bey einer *gravida* *insinuiret* wird, *quoad consequentem effectum infœcundum*, und bey solchen angeführten Umständen unnütze sey. Daher auch manche *feminae*, wenn sie einmahl *concupiret* haben, von fernerer *communicatione seminis* empfindliche *passiones* ausstehen müssen. Unrkündlich haben wir dieses unser in *ratione & observatione physica, anatomica und medica* gegründetes Urtheil mit unserm *Facultæts-Siegel*, bekräftiget und ausgefertigt.

§. 13.

Hunc casum etiam in Michaelis Alberti *Systemat. Jurisprud. medic. Part. poster. cas. 2. p. 21 seq.* cum sequenti *epicrisi* communicatum reperimus. *Negotium generationis est mysterium in natura: tantum vero liquet, quod cum semine patris communicetur causa illa, quæ corpus struit, & illa causa est immaterialis & rationalis. Principalissime in hoc processu divina concurrit directio & potestas, alias talis communicatio fieri haud posset: equidem ex variis argumentis adseverare possem, quod non cum quolibet seminis emissionem illa spiritualis causa propagetur, sed quod sæpius illud semen sine hac causa generante profundatur, ob id ex parte non omnis concubitus est fœcundus: quid quod ex probabili*

Epicrisis in hunc casum.

bili argumentor, quod in maribus torpidi, timidi, abjecti, segnis, averfantis, a carnali libidine alieni animi ut plurimum nudum sperma sine hoc principio generante profundatur (id quod quidem adsertum aliqua demonstratione indigeret, quam vero plurimis argumentis si occasio postularret, & necessitas hoc loco requireret, subministrare possem) hinc melancholici & phlegmatici mares, aut quibus alias capita sunt confusa, minus foecundi sunt. Unica itaque communicatio principii illius formantis satisfacit ad imprægnationem, quando præcipue ex parte matris concurrunt illæ circumstantiæ, quæ conceptionem admittunt, & adjuvant, haud vero excludunt & respuunt; quid vero dissensus matris in negotio generationis extinguendo valeat, passim a me, præcipue in physiologia, demonstratum fuit. Quando itaque conceptio unica contigit, tunc principaliora ad generationis processum requisita sufficiunt, ne ob singularem, inconsuetam & valde raram libidinem internam feminæ, ferotinus quidam ac secundus conceptus superveniat, qui superfoetationis nomine venire solet; quod si itaque rarus ille effectus secundæ conceptionis sive superfoetationis evenerit, tunc partus duplicatus & tempore & robore separatus atque discretus hanc præsumptionem testari debet: Duo aut plures mares non possunt per naturam rei unius prolis parentes esse; quare unicus sufficit pro tali imprægnatione perficienda: Quod si etiam femina, quædam semel conceperit, tunc alter congressus, vel cum priore mare continuatus, vel cum alio minus foecundus existit, quoniam jam actus ille conceptionis legitime & naturaliter præcessit: Hinc femina a primo marito imprægnari potest, licet hic post paucos dies emoriatur, & vidua mox clanculum cum alio perfecte cohabitaret; unde infans, qui futuro partu excluditur, posthumus est. Caveant vero astuti defensores, ne hanc observationem illotis arripiant manibus, & rabulisticis suis artificiis intermiscere audeant, quoniam adhuc varia fontica momenta in hac consideratione inferi & commendari possunt:

possunt: Et si nunc primo fœcundo coitu illud principium formans legitime communicatum & conceptum fuerit, tunc alia vice, imo brevi post denuo ab alio individuo mare in muliebria propagatum, aut rectius translatum tale principium, minime de novo imprægnat, quia ordini naturæ repugnat: aut enim cum priori, & ratione temporis maturiori illo principio coalescere deberet postliminio communicatum illud principium, ut deinde ardua decisio ventilanda esset, an hic an ille infantis parens sit dijudicandus? aut novam individualement imprægnationem causari debuerit, quod posterius ipso eventu judiciose explorando decidi poterit.

SECTIO IV.

CAPUT I.

De embryotokia seu fœtu prægnante & pariente

§. 1.

HActenus de gemellorum & superfœtatorum conceptione egimus, restat adhuc alia & quidem longe rarior conceptionis species, quando nimirum in recens natæ puellæ ventre vel utero statim, vel paulo post partum, alius longe minor fœtus latitans vel suo motu deprehenditur, vel etiam novo partu ex recens nato infante excluditur. Quos fœtus sive gemellis, si *Fœtus in fœtu.* ve superfœtatis annumeres, mihi perinde est, quamvis cum absque dubio tales fœtus unico coitu concipiantur, atque a matre simul excludantur, eosdem pro gemellis habere mallet, siquæ mihi ejusmodi exemplum videndi daretur occasio; quippe quæ rarissimæ sunt observationis; unde etiam juxta Casp. Posneri *Geneanthropolog. Tab. IV.* nuper nata est quæstio, quo nomine ejusmodi fœtus, in ventribus aut uteris aliorum fœtuum contenti sint vocandi?

§. 2.

Imo non dubito fore plurimos, qui tales conceptiones par-

Syllepsilogia.

ss

tus-

an dentur

tusque fabulis anilibus annumerant, cum ipse Thomas Bartholinus *Histor. anat. Cent. VI. histor. 100. p. 383.* ubi embryonem prægnantem sistit, hanc observationem ita incipiat: Terrebit lectores historiæ titulus. Certe ipse mihi non satis credo, dum hæc perituræ chartæ illino, quæ nulla unquam ætas vidit vel audivit: Embryonem nempe alio embryone prægnantem fuisse. Indorum historiæ testantur, bimulas puellas peperisse. Sed plus est, quod refero, cui fidem omnis posteritas denegabit, & ego invitus potui assensum præbere, nisi dignis testibus essem convictus. Et Casparus Posnerus *l. a.* de hac Bartholini historia ita scribit: sicuti, utrum judicium hoc multorum adsensum sit impetraturum, valde dubitamus, sic tutius ituros putamus, qui veritatem historiæ in medio linquentes, illa Galeni responderint: præter admirationem de hac nihil scimus. Nam secundum tritum verbum: Sapientiæ humanæ pars est, multa ignorare. Sique talis embryonis concipiendi rationem considero, potius negativæ, quam affirmativæ sententiæ subscriberem, nisi ab autoribus fide dignis traderentur, atque in omnibus tribus regnis medicis fœtus in fœtu occurrerent.

§. 3.

An ad gemellos an superfætatos referendi?

Utrum vero talis conceptio ad gemellationem, an ad superfætationem, referri debeat, paucis ut respondeam, proprie neque ad hanc, neque ad illam pertinet; quamvis enim bini tales embryones a prima puerpera, sive a matre & avia, simul & unico coitu concipiantur, unico etiam partu nascantur, atque hac ratione gemelli vocari possent, differentia tamen in eo occurrit, quod mater unicam tantum filiam, hæc autem alium embryonem enitatur, sicque filia & mater simul appellari mereatur. Omnium minime fœtus prægnantes gemellorum titulum mereri, defendit etiam Christianus Fridericus Garmannus *Disc. phys. med. de gemell. & Part. numeros. cap. 1. §. 5.* Ad superfætationem etiam talis conceptio referri non potest, quia hujus matris partus seu exclusio

sio una tantum, non binis vicibus, uti in superfoetatione absolutus est. Interim libenter concedimus, in prima conceptione bina ovula, uti in gemellatione, simul imprægnata fuisse, ex quibus dubio procul, nisi impedimenta accessissent, ab una matre tanquam gemelli nasci debuissent. Quod etiam statuit Thomas Bartholinus, *l. a. p. 386.* inquit: si meæ conjecturæ locus, existimo, gemellas hic molitam esse naturam, sed errore quodam alteram in alterius abdomen inducta cuticula detrufam. Sed admirationem conjecturæ prætendo, aliis naturæ secreta rimandi traditurus occasionem. Huic sententiæ, utpote veritatem olenti, suum adponit calculum Gabriel Clauderus *M. N. C. Dec. II. An. 3. obs. 72. p. 165.*

§. 4.

De hac conceptione ita scribit Antonius Deusingius *de fœtu* Deusingii
sententia. *Musſipont. p. 21.* Ex Thomæ Bartholini *Cent. VI. hist. 100.* relatione de embryo prægnante liquere potest, fœtum illum embryonis non fuisse embryonis prægnantis sororem, utpote cum in fœtu jam genito, seu ex utero mulieris exempto, alius fœtus in loco consueto, scilicet utero ipso inventus sit. Utique si gemellæ sorores fuissent uterque fœtus, nulla ratio est, qua potuisset altera soror in alterius uterum devenire, cum nequaquam, uti abdomen, ita quoque uterus in embryonibus apertus sit ac hiet. Si quæras, quomodo potuerit embryo, dum esset in utero materno, concipere prolem, ac prægnans fieri? ne plane nihil dicam, inquit, de tali miraculo, ea quæ dixero aliorum judiciis melioribus submissurus dicam: Apparere saltem (supposita historiæ memoratæ veritate) seminis alicujus masculini corpulentia ad constituendum conceptum nequaquam esse opus: Sed virtutem illius seu efficaciam sufficere, femineo semini communicatam: fieri ergo potest, ut virtus a paterno semine communicata ipsi semini matris, unde embryo primum constituebatur, ita efficax fuerit, ut succo alicui seminali embryonis, ad hujusce uterum confluenti (ut frequens

Ss 2

est,

est, foetus femineos recens natos fluxum album pati, seu feminalis alicujus materiæ ad uterum confluxum atque ex utero effluxum) efficaciam addiderit, qua ad fermentationem, seu spiritus ac naturæ, quæ in semine insunt, exsuscitationem potuerit concitari. Sic ergo foret femininus ille foetus prægnantis embryonis & filia hujusce ex embryone nimirum ceu e matre genita, & interim quoque soror ejusdem, utpote unius ejusdemque patris efficaci virtute una cum sua matre prognata. Hanc tamen rem longe melius per ova muliebria, quæ ante annos aliquot ab accuratioribus quibusdam anatomix indagatoribus reperta sunt, exponi posse, favente imprimis ovi in ovo inventi exemplo, credit Cornelius Stalpart. van der Wiel *Obs. rar. Cent. II. obs. 49. schol. p. 479.*

§. 5.

*Autoris
sententia.*

Ut proinde de miraculosa hac conceptione meam quoque aperiam conjecturam, ex capite tertio de gemellatione patet, gemellos vel ex uno eodemque ovulo geminato, sive in quo duorum embryonum stamina, per tenuissimam membranam distincta, latent, vel ex duobus ovulis sibi invicem annexis, vel etiam ex aliis binis, sive in eodem, sive in ambobus ovariis detentis ovulis, uno eodemque coitu simul foecundatis, concipi atque generari; aliquando etiam a binis ejusmodi ovulis sibi invicem annexis, atque disrupta tenuissima ipsorum membranula interjacente, inter se commixtis monstra oriri. Sicuti autem in monstris quandoque bina ovula, vel potius in ipsis latentia stamina, dum adhuc sunt mollia, ita sibi agglutinantur, & uniuntur, ut omnes fere alterius embryonis partes ab altero obtegantur, atque ita concrecant, ut externe unicus tantum quasi foetus appareat, de altero autem una solum, vel altera pars, v. g. manus, pes, caput &c. supersit, interne vero viscera, v. g. cor, epar, lien, ventriculus & intestina, duplicia reperiantur, imo interdum simplicia deprehendantur; Ita pariter statim circa principium conceptionis, & dum stamina adhuc sunt mollia, quasque mucilaginosæ, alterum ovulorum, sibi

sibi invicem adhærentium, integrum ab altero assumi, includi quasque absorberi, conservari, foveri, per vascula apta nutriri atque maturari, & quia in excretioni apto, & quidem ordinario loco, utero scilicet, latet, binique embryones simul concepti sunt, proxime post priorem fœtum, & ab eodem tanquam matercula, per uterum excludi potest. Facilius adhuc embryonis in & cum embryone fœcundatio fieri poterit, si unum horum ovulorum alterum ita in se inclusum contineret, uti in ovis gallinaceis (de quibus mox dicemus) sæpius observare licet. Qua ratione autem alterum ovulum non ad alium locum, nisi in alterius embryonis uterum, perveniat, ex quo postmodum prodire queat & utrum hoc casu fiat, vel an a natura sic dicta, vel ab anima hodierna, ita dirigatur; ut fatear, nescio. Fortasse etiam accidere posset, ut tale ovulum in alio ovulo occultum latens simulque cum alio imprægnatum, non æque in uterum, sed alium locum vel cavitatem includatur, in quo talis embryonis stamina vel, ob denegatum nutrimentum, brevi destruantur & annihilentur, vel in cavitatem quandam delata, ad perfectionem usque conserventur, talisque demum fœtus casu, post sectionem seu aperturam, reperiantur. Hacque ratione explicari posse videtur, quod Julius Obsequens de *Prodig. C. Valerio, M. Herennio Coss. num. 112. p. m. 105.* de mare vitulo refert, quod scilicet, cum ipsius exta demerentur, gemini vitelli in alvo ejus fuerint inventi. Scribit etiam Johannes Langius *Epistol. medicin. lib. I. epist. 70. p. 376.* in utero cervi, quem illustrissimus princeps Henricus comes Palatinus prope Oelwagh ceperat, cornigeri, dum evisceraretur, repertum fuisse hinnulum, membranulis circumseptum. Scilicet juxta Thomæ Bartholini de *insolit. Part. viis cap. 16. pag. 128.* sententiam, in alvo seu abdomine a prima nativitate hæserant vitelli & hinnulus, patrisque sui fratres dici possunt, simul geniti; id quod Bartholinus etiam de fœtus prægnantis fœtu, supra recensito, suspicatus est. Cum autem, ut certo scio, hæc mea conjectura tibi, bene-

vole lector, non sufficiat, & juxta Anton. Deusing. *de fœt. Mussipont.* p. 21. alter gemellus plane intra alterius corpus includi non possit, *vid. etiam p. 110.* concedas precor, ut C. Plinii Cæcilii Secundi verbis ex *epistol. libr. IV. epist. 30 p. m. 304.* te alloquar : Scrutare tu causas (potes enim) quæ tantum miraculum efficiunt. Mihi abunde est, si satis expressi, quod efficitur.

§. 6.

Exempla.

Non possum itaque, quin talia exempla, licet paucissima colligere mihi licuerit, adducam, quæ nisi ab autoribus non credulis traderentur, incredibilia fere habenda essent. Scilicet fœtum recens natum alio fœtu fuisse gravidum seu prægnantem, recenset Thomas Bartholinus, cujus ipsissima verba ex *Histor. anatom. Cent. VI. obs. 100. p. 384 seqq.* exscribere liceat: Plusculis abhinc annis in oppido Fionix nostræ Affuentz læss in parochia Uleßovia-na prope Neoburgum, matrona quædam Johanna, uxor coloni Nicolai Petri parturientis dolores aliquot dies experta, parere non potuit, quanquam binas obstetrices plebejas sibi præsentis habuerit. Unde tertiam ex vicinia majoris famæ, & experientiæ, nomine Sisseliam, advocavit, quæ magna difficultate tantum tandem promovit, ut onere ventris prægnans levaretur & a morte vindicaretur, sed fœtu mortuo sequioris sexus excluso. Dum cadaver hujus ab obstetrice hac & matre puerperæ ablueretur, & ad sepulturam præpararetur, mirantur tumidum fœtus ventrem, in quo ad tactum videbatur quasi osseum quid delitescere, unde, consilio inito, parvo cultello avia aperuit ventrem, & mirum dictu, inventus in fœtu alius fœtus sexus feminini, in loco consueto situs, perfectus omnibus membris, circiter spithamam longus unguibus & pilis donatus, ad morem fœtus perfecti; & sicut prior fœtus ex matre editus vivebat, & caro ejus nigricabat, quemadmodum fœtus mortui solent; ita hic minor fœtus candicabat & carne sana præditus erat, ut ex omnibus indiciis concluderet avia, vitalem fuisse. Nec deerant huic secundæ, quibus in embryo-

nis utero alligabatur. Hæc sancta fide asseveravit & juramento confirmavit obstetrix Sisselia, nuper quæ actæ rei seriem enarravit. &c. De hac observatione ita scribit idem Thomas Bartholinus *Epistol. med. cent. III. epist. 28. p. 102 seq.* Res mira est & dubii plena foetus alio foetu prægnans. Certum id obstetricis nostræ Sisseliæ fide accepi. An assensum multorum sit impetratura, dubito, interim rem actam juramento confirmat. Inquit autem idem autor *de insolit. Part. viis cap. 16. p. 125.* quod, cum ex clementissimo regis majestatis mandato dicta Johanna a præfectis de partu suo interrogaretur, ea, quæ obstetrix & palpaverat & viderat, strenue negaverit; siue ea ipsa non fuerit, de qua obstetrix narraverat, siue metu territa, ne famam aut fortunas suas ea confessione prostitueret, quod inaudita passa esset, quasi illa misella naturæ ludentis culpam præstare deberet. vid. etiam Corn. Stalp. van der Wiel *Obs. rar. cent. post. obs. 49. sch. p. 478 seq.* Simile exemplum in humano partu a nullo autore annotatum reperiri credit Philippus Joh. Sachs a Lewenheim *de Lap. natur. p. 54.*

§. 7.

Interim foetum non modo prægnantem, sed etiam parientem, tanquam rarissimum & curiosissimum quid adducit Gabriel Clauderus, medicus Altenburgensis, cujus verba *M. N. C. Dec. II. an. 3. obs. 72. p. 164.* sic sonant: Similis Bartholiniano plane casus contigit anno 1672. in vicina nostra Thuringia prope Naumburgum, in ditione nobilissimi a Breitenbauch; veluti hæc quidem accepi ex ore ipsius focrus, generosi aulæ nostræ Marefchalli a Timpling, relictæ viduæ; dum scilicet in pago Bezgendorff uxor molitoris debito tempore parit filiolum, cætera sanam, nisi quod abdomine præter solitum tumido fuerit dotata. Exclusa hæc filiola, exclusus hic foetus, elapso primo vitæ suæ octiduo corripitur improvise torminibus magnis (quod continui fletus, continua inquietudo & jectigationes testatum ibant) postea pudendo exit aqua cruenta, mox succedit filiola vivens; hanc insequitur

secun-

Aliud.

secundina, imo lochia fluunt, & omnia fiunt, quæ legitimo in partu fieri solent ac debent. Filiolæ istius recens natæ hæc adhuc recentius nata filiola digitum medium erat longa; & quia vivebat, perfectumque præ se ferebat homuncionem, sacro imbuebatur baptismo. Altero vero statim die mundo valedicebat tenerri- ma hæc filiola, cum tenerriima sua matre quasi superfoetante. A- via vero earum, hoc est, genuina & primaria puerpera (molitoris nimirum uxore) manente superstiti. Hanc observationem con- firmat etiam, differentibus tamen annis, sequens manuscriptum ab amico mihi communicatum:

Excerptum aus dem Kirchen-Buche zu Neumarck in der Superin- tendur Freyburg in Thüringen.

Nunc arrige aures Pamphile! Den 27. Maji 1645. ist Margaretha, des Brücken-Müllers bey Neumarck, Meister Georg Opels, Tochter begraben worden, welche den 21. May zuvor die Tauffe erlanget hatte. Dieses Kind hat im Bade mit grossen Ringen und Sæmmern eine kleine Leibes- Frueht übernatürlicher Weise geboren, welches etliche Jahr verschwie- gen blieben, endlich aber ausgebrochen, so vor dem Herrn Superinten- denten und mir (sunt verba Michaelis Richteri) dem Pfarr die alte Be- ckerin, als gewesene Kind-Mutter, bey ihrem guten Gewissen ausgesagt. Addit Richter: Die Ursache ist Gott im Himmel am besten bewußt. Item alio loco: Novum aliquid & stupendum: Man sagt, daß diese Müllerin mit einem von B. adulterium getrieben, und unter den Paten der Margaretha stehet im Kirchen Buche Juncker H. G. v. B.

§. 8.

Aliud ex-
emplum.

Aliud adhuc exemplum infantis in utero prægnantis in Isi- bordi ab Amelunxen *Breviar. rer. memorabil.* legimus, scribit enim: Cum anno 1088 in monte S. Petri Erfurti degerem, incidi in vetu- stum & illegibilem codicem, e quo hoc tantum decerpfi: Anno 896. puella 19. annorum ob ingravitationem famosa ideoque coram iudice accusata, negabat omnia dicens: Si ego gravida sum, faxit Deus, ut & infans in utero meo talis sit! Paulo post peperit puel- lam mortuam, ventre nimis prætumido, ut jamjam rumpi vide- retur.

retur. Mulierculæ rem insolitam mirantes judici indicant ordinario. Aperto corpusculo ecce alia puella in puella modo nata, etiam mortua, omnibus tamen membrulis bene conformata. An fabula sit nescio, addit Isibordus, *vid. M. N. C. Dec. II. an. 4. app. p. 198.* vid. etiam Christian. Franc. Paullini *Observat. medic. Cent. I. obs. 70. p. 86.* ubi addit: Ephemerides erudit. Galliæ auno 1676. simile suppeditare exemplum.

CAPUT II.

De fœtu in brutis.

§. I.

Non autem tantum in homine, sed brutis quoque ejusmodi fœtus prægnantes observatos legimus. v. g. vaccam in Hungaria 1663. vitulam edidisse abdomine maxime distento, & in hac vitula prægnante aliam vitulam inventam fuisse, omnibus numeris absolutam, Leutschovia Philippo Jacobo Sachsis a Lewenheim confirmavit David Spilenbergerus, illius loci physicus. v. *M. N. C. Dec. I. An. 1. obs. 36. schol. p. 121 sq.* Ipsius Spilenbergeri verba idem Sachsius *de mir. Lapid. nat. p. 57.* communicat: Cum nuper a cura Palatini nostri Weselini redux ad comitem quendam Hungariæ vocarer, nobilis e vicinia comiti per literas significat, paucis ante diebus vaccam in ipsius stabulo vitulam edidisse abdomine maxime distento, quo dissecto in vitula hac prægnante aliam vitulam inventam fuisse, quamvis priore ventricosa multo minorem, quod, ne omen sit irruentium Turcarum & Tartarorum, Deum deprecamur. vid. etiam Georg. Franci de Franck. *Satyr. Med. IV. pag. 79.* D'une Genisse d'Angleterre, qui selon les apparences estoit venue pleine dès le ventre de sa mere, v. *Journ. des Sçavans Tom. XII. 242.*

Exemplum
in vitula.

§. 2.

Equam in Hispania mulam peperisse mortuam, in cujus alvo aperta alia mula inventa est, ex Torquemada refert Casparus a Reies *Camp. Elys. Quæst. 36. n. 28. p. m. 434.* vid. etiam Phil. Jac. Sachs. *Syllepsilogia.*

In mula.

l. a. p. 55 57. ubi addit, se hoc in Eusebii Nierenbergii Historia naturali legisse, sed nescire, an propria vel aliena fide id narretur, cum pauca alioquin suæ naturali historiæ ex propria experientia interferat. vid. etiam Sachs. Gammarolog. cap. 8. p. 144. & Chr. Franc. Paullini Zeitverk. erbaul. Lust p. 32 seq. ita scribit: Anton von Torquemada spricht: Ich habe dieses um eines Exempels willen, welches sehr wunderbar ist, dergleichen ihr vielleicht nicht gehört habt, daß an einem Orte nicht weit von hier, eine Mæhre oder Stute traghaftig gewesen, der der Bauch so dicke worden, daß, wie die Zeit kommen, daß sie ihre Frucht bringen sollen, ein schwanger Maul-Esel heraus gekommen, welcher so bald gestorben ist, der eben so einen dicken Bauch hatte, als die Mutter. Darum derjenige, dem sie zustunde, wissen wolte, was die Ursach sey, und ließ den Maul Esel aufschneiden, da fand man noch einen andern Maul-Esel darinn, davon er schwanger gewesen. Ich weiß, daß es gewiß wahr ist. M. N. C. Dec. I. An. I. Obs. 36. schol. p. 121.

§. 3.

*Vermes
prægnantes.*

Ab homine sæpissime pari vel excerni vermes seu lumbricos prægnantes, præter quotidianam experientiam testatur Dominicus Panarolus *Pentec. V. Obs. 15. p. m. 151.* mirandum dictu, inquiens, in humano corpore vermes prolifici redditi crescunt & multiplicantur. Sed quid dico, statim audire licebit philosophos aliquos, qui id impossibile tenent. Attamen dum ipsi philosophantur, vermes prolificos & viviparos intueri licebit. Bis tantum observavi; primo in adolescente quodam hic Romæ, annorum sedecim; secundo in juvene, fratre uxoris Caroli Ossarti Capitolini, Romano, annorum circiter triginta, qui infinitis adhibitis contra vermes & putredinem, præsidiis obiere. In utroque expulsi fuerunt vermes colore carneo, longitudine circa sexdecim digitos, qui prægnantes erant, & ligno collisi cum fuissent, apparuerunt vermes parvi, subtiles, albi, longitudine sex digitorum, prope innumeri, qui tanquam serpentes parvi movebantur. Hoc idem observavit Amatus Lusitanus *Cent. V. Curat. 46.* his verbis:

Puel-

Puella Scarinthi cum vermibus laboraret, & illi tarde medicamentum datum esset, unum permagnum egressit vermem rotundum; hujus cum pater caput pede calcasset, ex eo alii prodire vermes, puella brevi tamen mortua est. Vermes & lumbricos prægnantes aliis vermibus editos fuisse, Philippo Jacob. Sachs *de mirand. Lap. natur. p. 57.* non adeo mirum videtur, cum in insectis facilius abludat natura. Utrum vero unquam sit visus lumbricus lumbrico fœtus? Olao Borrichio parum verisimile apparet, & quidem ob varias causas, cum ipse nonnunquam in exenteratis lumbricis visus sit, sibi videre plures vermiculos, sed re accuratius examinata deprehenderit omnia alia. vid. Thom. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 54. p. 157.* ubi ita pergit: Inter cætera, cum ante annum ex puero trienni lumbricum rotundum pedalem exegissem, utraque extremitate acutum sine ulla certa capitis nota, credidi me videre per ventrem bestiolarum tralucens alios sed minores vermes. Ceterum aperto ejus corpore notavi fila illa alben-
tia non vermes, sed intestina esse, eaque alia aliis crassiora, sed sibi cohærentia, licet varie intorta. &c. Lumbricum ex humano corpore expulsum lumbricis aliis scatentem invenisse Borellum ex Bartholino refert Ant. Deusingius *Vindic. de fœt. Mussipont. p. 13.*

§. 4.

Rara etiam est observatio de cane prægnante, quam autor de *Canicula la Clef du cabinet l' An. C. 1711. p. 294.* refert: Une petite chienne, *prægnans.* qui n'avoit qu'environ deux mois, a fait un chien, qu'elle avoit porté du ventre de sa mère. Cet embryon est chez moy dans une bouteille d'eau de vie où l'on peut voir, non seulement la tête, le corps, les jambes, la queue, mais mêmes les ongles de pates se distinguent du premier coup d'œils. Chacun fait, que les chiennes portent ordinairement neuf semaines; Il est à remarquer, que dans la neuvième semaine, que cette petite chienne fut sortie du ventre de sa mère, elle amis bas (avec douleur) ce petit chien. Canis femina bis admissa cane, instante partus termino a primo

congressu peperit septem quidem catulos perfectos & totidem imperfectos; non utique posteriores priorum uteris contentos, sed seorsim alios extra alios existentes in utero matris, vid. Ant. Deusing. *Vindic. de fœt. Mussipont.* p. 13.

§. 5.

In gliribus.

In Hispaniæ littore cum naufragæ navis cistæ & tabulæ in ædes capitanei maritimi deferrentur, tanta inde glirium copia exivit, ut insigniter tota domus infestaretur. Inter cæteros captus unus monstroso ventre, qui apertus fœtum edebat iusta magnitudine muris. Hic cum & ipse dissecaretur, utero catulos gerere manifestissime formatos visus est. vid. Georg. Franc. de Frankenau *Satyr. Medic.* 4. p. 77.

§. 6.

In muribus.

De murium prægnantium fœtibus in utero pariter alios fœtus gerentibus ita scribit Aristoteles *Histor. Animal. Lib. VI. cap. 37. fol. 432.* Terræ Persicæ parte quadam mure femina rescissa, fœtus feminini prægnantes comperiuntur. Juxta Claud. Ælian. *de Animalib. Lib. XVII. cap. 17. fol. m. 352.* Hoc in muribus admiratio- na dignum est; si mus prægnans capta dissecetur, & eximatur fœtus, in eo quoque dissecto fœtus reperietur alter. vid. etiam C. Plinii *Histor. nat. Lib. X. cap. 65. fol. 185.* Johann. Hornung. *Cist. Medic. Epist.* 256. p. 459. Joh. Jonston. *Thaummatograph. Class. VII. cap. 27. p. m. 318.* Joh. Georg. Schenck *Histor. Monstr.* p. 132. Ant. Deusing. *Vindic. de fœt. Mussipont. Sect. I. p. 12 seqq.* Fortunius Licetus *de spontaneo Vivent. ort. Lib. III. cap. 50. fol. m. 240.* inquit: mures, qui prægnantes in utero matris rescissæ comperti sunt, duplicem generationem habere possunt; altera quidem est non spontanea, quia viventis muris anima in utero matris materie viscidæ in suo uterulo degentis animam sibi consimilem generet, ac indat, eo modo, quo in piscium genere passeris, rubelliones & hiatulæ apud Aristotelem sine usu maris omnes feminæ ex se pariunt, intra se quum genuerint ova prolifica: Altera vero eorundem mu-
rium

rium generatio spontanea est, quia in uterulis fœtuum muris rescillæ prægnantium materia contineatur, sive a parentum, sive a fœtuum corpore effluxa; in qua, velut in vase portio sentientis animæ pristini viventis delitescat: cui materiei ab ambientis calore, ubi per coctionem dispositiones ad vitam congruentes, advenierint, statim animam illam sibi componit in formam essentialem novi muris constitutricem, &c. Hanc tamen de muribus in utero materno jamjam prægnantibus quasi per traducem propagatam sententiam impugnat Arnoldus Sengverdus in literis ad Thomam Bartholinum exaratis, in quibus scribit: Ælium & Plinium multa ex Aristotele desumpsisse, quæ spectant animalia, uti etiam plures narrare fabulas; item Plinium aliquoties errasse ex linguæ græcæ imperitia; unde factum, ut Aristotele non bene intellecto, quandoque ornato stylo proponat, quæ veritati non parimodo consentiunt. Deinde Sengverdus græca Aristotelis verba τῆς δὲ Περσικῆς ἐν τινὶ τόπῳ ἀναχίζομένων τῶν ἐμβρύων, τὰ θήλεα οἶον κύοντα φαίνεσθαι, ita vertit: Terræ Persicæ parte quadam discissis embryonibus feminei sexus (sc. mures) tanquam prægnantes apparent. Longe alius sensus horum verborum est, quam vulgaris interpretis. Non dicit philosophus, fœtus prægnantes comperiri; sed utitur voce φαίνεσθαι, apparent, videntur, & expresse addit vocem οἶον, tanquam, quasi prægnantes. &c. v. Th. Bartholin. *de insolit. Part. viis cap. 16. p. 133. seq. 137 seq.* ubi plura de hac materia reperies. Et Lambertus Velthufius *Tr. de Generat. cap. 5. p. m. 122. & Oper. Tom. I. fol. 1307.* id quod de muribus feminis narrant, quas in utero matris, & antequam editæ essent, prægnantes repertas esse referunt, putat præter fidem traditum memoriæ, & excogitatum ad exaggerandam murium fœcunditatem. De incredibili murium fœcunditate vid. Joh. Bened. Sinibald. *Geneanthrop. Lib. I. Tr. 3. cap. 6. p. 54 & 57.*

§. 7.

De cancro in cancro sequentia refert Georgius Wolffgangus

T t 3

De cancro
Wede. in cancro.

Wedelius *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs. 122. p. 160.* Cancrum in cancro repertum & quidem in masculo omnino rarum esse duco, præcipue cum ex oviparorum genere & femellas esse constet. Tale vero videndum se obtulit viro integerrimo Christophoro Zillingio J. U. D. & Practico Lipsiensi, cujus relationem e literis ad me d. 5. Sept. 1674. hic adducam: Emerat, scribit, conjux mea can-cros, quorum unus major reliquis, isque masculus alium quadru-plo minorem intus continebat. Hic ob loci angustiam ventrem versus utramque chelyn & caudam ita tamen compressam verte-bat, ut fracta quasi videretur. Stomachus majoris vacuus erat, & in medio cancri ad caudam minoris situs. Minor intus recens quidem, sed carnis fere expers præter caudam erat. Cauda ipsa in medio paulisper contusa, de cætero vero cancer ipse totus at-que perfectus erat, & quoad magnitudinem digitum minorem æquabat. Omnibus, quibus hucusque retuli, res insolens vide-tur, nec, me judice, aliam quis affert rationem, quam si cancrum minorem vix ovo exclusum a majore devoratum dixerit; eum vero deglutitum fuisse, vix credibile est. Sive ergo hunc insoli-tum embryonem in altero genitum dicamus, sive ab altero captum & deglutitum, seu denique læsione fortuita majoris prævia factum esse, ut chelys ceu operculum & integumentum commune pauli-sper hians minori quasi latibulum quærenti hospitium concesserit, hicque ex hospite incola factus sit, quod videtur vero similis, non tamen res caret difficultatibus, præcipue quoad hujus nutrimen-tum, vestis extimæ mutationem aliaque, adeoque hoc ipsum dis-quisitione ulteriori non indignum est.

§. 8.

De ovo in
ovo.

Ovum prægnans, seu in quo aliud ovum fuit repertum, Anno 1669. rusticus quidam Thomæ Bartholino ostendit, interius au-tem ovum litui figuram habuit. *vid. M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 36. p. 120.* quo loco etiam ovum prægnans in techniotheca regis Da-niæ servari addit. Ovum, cui aliud ovum inclusum, in serenissi-

mi regis Daniæ museo affervari, refert idem Thomas Bartholinus *Epist. Med. Cent. III. Epist. 42. p. 158. Item Cent. IV. Epist. 63. p. 386.* inquit, sibi serenissimum regem in augusto suo museo ovum gal-
linaceum alio ovo gravidum, monstrasse. In ædibus Cosmi Bor-
manni gallina mense Augusto 1679. exclusit ovum alio ovo præ-
gnans, quod ad Thomam Bartholinum misit iste Professor regius,
ipsius curiositati gratificaturus, utrumque fuit perfectum & gran-
diusculum. In extremo ovo albumen & vitellus circa internum
circumfusa erant. Similia alia alias vidit Bartholinus, sed sicca.
v. Act. Hafniens. Vol. V. Obs. 17. p. 72. Hafniæ in ædibus Olai Wor-
mii anno 1624. inter alia ova gallinacea, in nido inventum est
ovum monstrosum, subventaneo simile, magnitudine ovi anseri-
ni, crusta duriore carens, cujus tamen rudimenta aderant. Inte-
grum dum erat, licet exterius molle, interius tamen durum quid
tactu in eo deprehendere licuit. Hoc Wormius aperuit, ac pri-
mo in eo materiam quandam mucosam instar albuminis ovi de-
prehendit, cui innatabat aliud ovum subventaneum, longum
contortum. Quod fractum etiam albumine sine vitello erat re-
fertum. vid. Olai Worm. *Museum Lib. III. cap. 21. fol. m. 311.* O-
vum in ovo alio servabat quondam Ludovicus Guetius in ditissi-
ma pinacotheca sua. Tale etiam peregregium serenissimo Guil-
elmo Baviariæ duci olim obtulit Abbas Alerspergensis, quod ho-
dieque superesse debet in cimeliarcheo Electorali, nisi forte dif-
fractum perierit, uti recenset Georgius Hieronymus Velschius
M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 32. p. 51. Aliud exemplum ovi ovo præ-
gnantis annotavit Georgius Sebastianus Jung, *ibidem An. 2. Obs.*
250. p. 348. inquit, dum ancilla mea 19. Junii currentis anni 1671.
ova quædam butyro incoquenda frangeret, inter cætera unum
quoque aperuit, in cujus albumine præter vitellum pulcherrimi
coloris, perexiguum aliud latitabat ovum, exterius testa seu cor-
tice candido ac duro aliorum ovorum more, munitum, interius
albumine & exiguo vitello, binis signato chalazis præditum adeo-
que

que excepta magnitudine ab ordinariis nihil discrepans. Scribit etiam Guilelmus Harvæus *de Generat. animal. Exercit. II. p. m. 53.* se vidisse ovum perexiguum crusta tectum intra aliud gallinæ ovum majus, perfectum & cortice circum circa obductum, contineri. Quod ovum serenissimo regi Britanniae Carolo, multis aliis coram spectandum præbuisse addit. Simile ovum oblongius grandiusque intra duos cortices, invicem discretos, duosque clausum inter rariora Friderici Tertii regis Daniæ se vidisse refert Thomas Bartholinus *Histor. Anat. Cent. V. Hist. 95. p. 177.* Ad Johannem Sigismundum Elsholtium consiliarius quidam ovulum misit nucem avellanam æquans, & in alio ovo majore inventum. Nimirum in ædibus ipsius, cum pro usu culinario ova aliquot gallinacea rumperentur, in albumine unius prope vitellum ovum aliud parvum jacebat, *μαλακόδερμον*, sive molli cute aut membrana tectum. Erat ea similis prorsus & colore & teneritate pelliculæ ovorum interiori, qua ipsa antea, quam putamen testaceum acquirunt, obvelantur, & quæ deinceps sub isto putamine perdurat. Postquam cuticulam hanc per latus unum dissecuisset Elsholtius reperit intus albuginem debiti coloris & consistentiæ, nec minus ad cuspidem alteram punctum illud candidum, quod semen galli vulgus nuncupat. Vitelli vero vestigium apparuit nullum. *vid. M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs. 80. p. 115.* Sequentem observationem annotavit Petrus Rivalieiz: Occurrit mihi forte Majo mense 1682. gallinaceum ovum vitello & albumine instar ovorum communium perfecte instructum, in quo ovum aliud columbini magnitudine continebatur. Situm erat in majoris ovi medio, putamen inter & vitellum, cui paulisper adhærebat, mediante materia quadam viscida, quæ non impedivit, quo minus ab illo facile avelleretur, illæsa, qui vitellum majoris ovi continebat, membrana. Contenti istius minoris ovi testa imperfecta nec solida, facile a substrata, seu ovi substantias succingente tunica, quatenus friabilis, separata fuit. Hac autem aperta membrana, prodiit primo liquor albumineus, intus & extra candidis filamentis conspers-

spersus, quique albuminis proprie dicti haud dubie loco erat. E-
 merfit deinde substantia quædam mucilaginea, crySTALLINA soli-
 diorique consistentia donata. Primo liquori, ut vitellus albumini
 cohærebat & ab illo pari negotio separata fuit. Sphæricam figu-
 ram tenacissime servabat, pisi magnitudine. In ipsius medio al-
 bæ fibrillæ conspiciebantur, quæ illam præ se ferebant configura-
 tionem, quam a vario continentis istius crySTALLINÆ substantiæ situ
 mutuabantur, cum nempe in plano collocabantur, in longum
 porrigebantur, cum vero sphæricam rursus figuram repetebat,
 contrahebantur. Microscopio examini tradita, punctula quæ-
 dam crySTALLINA, nullo ordine constituta, filamentaque candida
 perlucidaque in ipsius circumferentia, quædamque etiam minus
 lucida punctula observabantur; Utraque substantia in aquam in-
 jecta fuit. Liquidior quæque primo prodierat, supernatavit:
 posterior autem, sive sphærica fundum petiit. Igni traditæ in-
 duruere; Illa extensa & diffusa fuit: hæc vere rotunda sphærica
 solidaque. In utraque dissecta nihil heterogeneum adfuit. vid.
 Act. Erudit. Lipsiens. An. 1683. Maj. p. 221. Ovulum in alio ovo
 Gœttingæ repertum, cum plura pro oleo ovorum parando con-
 fringerentur, Physicus Gœttingensis, Triumphus, Georgio
 Wolffgango Wedelio dono misit. v. M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs.
 122. p. 160. Gorlicii aliquoties peperit gallina ova duplici vitello
 prædita tantæque magnitudinis, ut anserum æquarent ova, ob-
 servante Ehrenfrido Hagendornio M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 141.
 p. 342. Societatis Indiæ orientalis chirurgus quidam in regno A-
 racan observabat gallinam aliquando insolitæ molis ovum exclu-
 disse: id cum aperuisset chirurgus, invenit in ejus vitello aliud
 ovum sua testa septum suoque vitello similiter præditum, licet di-
 midio minus, teste Andrea Cleyero, M. N. C. Dec. II. An. 1. Obs.
 17. p. 38 seq. Ibidem Obs. 44. p. 122. Aliud ovi in ovo exemplum
 annotavit Johannes Georgius Sommerus. Matrona scilicet no-
 bilissima coquum suum ex ovis gallinarum Indicarum cibum præ-

parare jubebat, quæ cum frangerentur, in uno aliud ovum continentis ovi vitello & albugine circumdatum inveniebatur, columbino majus, quod dictus Sommerus reservavit. De ovo intra aliud ovum incluso a Perault observato, vid. Joh. Baptist. du Hamel *Histor. Reg. scient. Acad. Lib. III. Sect. 3. cap. 2. §. 7. p. m. 271.* Ovum gallinaceum parvum in ovo gallinaceo repertum a se observatum depingit Fridericus Ruyschius *Thesaur. Anatom. III. Tom. 3. p. m. 67. & Thesaur. IV. p. 21.* Ovulum gallinæ, ex ovulo gallinaceo exemplum in phiala sicca sistit. Item *Thesaur. VIII. p. 24.* in phiala sicca duorum murium sceleta monstrat, quorum alterum pedem figit super ovum gallinaceum, ex ovo gallinaceo majore, inter forbendum inventum & desumptum. Cornelio Stalpart van der Wiel confanguineorum quidam ovum dedit, intra quod, cum comedendum frangeretur, aliud quoddam ovulum, dura etiam obductum testa, magnitudine ovi columbini aut olivæ reperiiebatur, quod vitello carens in medio majoris ovi vitello situm erat, uti ipse refert Stalpartius *Obs. rarior. Centur. poster. Obs. 49. p. 475.* In Christiani Wolffii Musæo sive Catalogo Auctionis sub No. 100. p. 6. prostabat ovum in ovulo oder ein kleines Hüner-Ey, so beym Einschlagen aus dem Vitello in Leipzig 1683. herausgefallen. Scribit etiam Jacobus Verberg ad Stephanum Blancardum: *Als ich den 26. Maji 1681. einen Patienten besuchte, hørte ich ihn mir erzehlen, daß vor etlichen Tagen seine Kinder aus dem Hüner-Neste ein übergewöhnlich grosses Ey gebracht: dessen schærffstes Ende krumm war. Als man aber solches zerbrach, fand man darinne ein ander Ey, eben so krumm wie das vorige. Dieses hatte auch eine harte und weisse Schale, wie das Ey, darinn es eingeschlossen war. Als man das inwendige Ey zerbrach, so war das weisse und der Dotter darinne, wie in einem andern Eye.* vid. Steph. Blancard. *Collectan. Med. phys. Cent. VI. Obs. 45. p. 277 seq.* Et juxta Georg. Franc. de Franckenau *Satyr. Med. 4. §. 4. p. 78 seq.* personatus Aletophilus im Eytelkeiten-Calender von 1681. zu Nürnberg gedruckt inquit: *Ein solches Ey haben wir vor kurtzer Zeit allhier gesehen,*

sehen, welches eröffnet ward, und innerhalb seiner Schalen ein anderes kleines Eylein mit begriffen hat. Item Johannes Mævius in Kayser Ferdinandi I. Tafel Reden ait: Wir sahen auch ein kleines Hüner-Ey, welches in ein rechtes und vollkommenes Ey mit seiner Schale geschlossen war. Ibidem etiam addit idem Francus: Anno 1685. den 7 Aug. Heidelbergæ in ædibus illustrissimi Domini de Stein-Callefels, aulæ Marecalli, gallina Indica ovum edidit, quod intus aliud parvum crusta quodammodo aspera inductum continuit, quantitate nucis moschatae majoris, quod adhuc in museo meo asservo. Sequenti an. 1686. d. 29. Julii simile eadem in domo edebatur ovum. Ejusmodi ovum gallinaceum prægans, cujus scilicet vitello minus, facileque separabile, ovum erat inclusum, medico Haynensi, Joh. Wilhelmo Gottfrido oblatum fuit, uti ante aliquot annos ad me perscripsit. Et mihi ipsi bina ejusmodi ova, alterum, in quo interioris ovi testa nimis mollis, alterum, cujus cortex pariter satis durus erat, ex mea culina observare licuit. Huc referendum etiam, quod Collectores Actorum Erudit. Lipsiens. an. 1713. mens. Octobr. p. 435 & 442. de Johannis Morton Histor. natural. recensent: Ovum in ovo se oculis usurpasse, docuerat Cl. Manselius, at noster quoque se asservare tradit exiguae molis ovum gallinaceum, quod includit aliud ovi putamen, forma & magnitudine ad glandis quercinae calicem accedens, quod ovum, postquam aliquot annos integrum servavit, tandem foramine pertudit, atque contentam aliam testam retexit, præter naturæ ordinem vitello & albumine vacuam, quæ tractu temporis exhalasse conjectura est. Georgius Dethardingius inquit, se in rarithecio suo servare bina ova, non sese, quod aliquando contingere novit, includentia, sed sibi invicem beneficio tendinis apte cohærentia. vid. Ephemerid. Acad. N. G. Cent. I & II. App. p. 198.

§. 9.

De bombyce scribit Godofredus Benjaminus Preussius Big. *De bombyce.*
Observ. medic. in Ephemerid. Acad. Nat. Cur. Cent. VII. & VIII. Append. byce.

p. 95. Animal in animali sibi non prorsus homogeneo quærentibus, curiosum vel unicus bombyx dat spectaculum. Velut enim in ovulis bombycum distincte bombycem ipsum contineri oculatissimus Leuwenhœckius armato oculo vidit (*vid. Epist. ejus 4. ad Reg. Societ. Londin.*) sic papilionem certa quadam & insita prædispositione exilissimis rudimentis in bombyce jam latere, exinde probandum videtur, quod ex mortuo bombyce (cum prius semet in domuncula e serico contexta sepeliverit) prodeat & admirabili metamorphosi procreetur novum istud animalculum papilio; quam metamorphosin curatius depingunt Acta Anglicana ab anno 1665 1670. p. 67. & c.

§. 10.

De cornu
in cornu.

De cornu in cornu vel potius dente in dente curiosa reperitur observatio in S. von V. *Descript. Grænland. Lib. I. cap. 10 & 11. p. 29, 30 & 36.* quibus locis etiam probatur, unicornua sic dicta Grælandica non cornua, sed dentes piscium esse. De tali autem dente in dente auctoris verba, sic sonant: *Der Kænig von Dænnemarck wolte einst ein Stück dieser Hærner weg schencken, derhalben gab er Befehl, daß solches sehr schön und sauber seyn, und man zu dem Ende ein gantzes durchsägen solte, und zwar am dicksten und schönsten Orte, nemlich beym Stumpff der Wurtzel. Als man nun ein Stück von demselben Horn, das man gewiß für fest gehalten, abgesägt, ward es hohl befunden. Darneben sich ieder man nicht wenig verwunderte, als man in der Holigkeit eines kleinen Horns, so von ebenmäßiger Gestalt und Wesen war, als das grosse, ansichtig wurde. Hierauf gieng der Säger fort in seinem Werck und schnitte das grosse Horn, ohne Verletzung des kleinen, rings umher ab; endlich sahe man, daß das kleine im grossen stuck, so weit als die Hæle gieng. Das übrige des grossen Horns war dicht und feste. Dieses gab mir eine starcke Einbildung, daß diese gehærnte Fische ihre Hærner abwürffen, wie die Hirsche zu thun pflegen; so daß ihnen die alten abfielen und wieder junge an derer Stelle wüchsen: Und eben darum so viel Hærner von denen Hauptern abgesondert aus*
Græn-

Grænland nach Eysland auf dem Eise getrieben kämen. Allein so bald ich den Schedel angeschauet, und die Länge der Wurtzel, welche im Kienbackenstacke, wardich überwunden und kunte nicht mehr widersprechen, daßes ein Zahn seyn solte &c.

CAPUT III.

De vegetabilibus prægnantibus.

§. I.

PRæter hæc ex regno animali adducta embryonum prægnantium exempla observantur etiam in regno vegetabili foetus seu fructus prægnantes. In limone enim majore dissecto limonem alium perfectum, sed perexiguum, flavo cortice obductum se reperisse scribit, idque crebro in Italia contingere addit Gulielmus Harvæus *de Generat. Animal. Exercit. II. p. 53.* Aliud exemplum pomi limonii prænantis, quod in se, parte ea, quæ petiolo dotatur & ramo nectitur, aliud continebat pomum exiguum, avellanæ magnitudine, exteriori cortice flavo, medulla albicante, & succo suis distincto loculis, omni ex parte majori respondens se tenere scribit Olaus Wormius *Musei Libr. II. cap. 28. fol. m. 206.* quo loco etiam, se duos ejusmodi fructus minutos, quos ex alvo materna extraxerit, adhuc inter loculamenta asservare ait. Licet autem, secundum dictum autorem, mala limonia & citria tam magnitudine, quam succi & pulpæ quantitate ac sapore, corticum quoque crassitie & viribus multum inter se distent, limoniis tamen vulgo citriorum titulus dari solet, hinc etiam hoc loco. Pomorum citriorum prænantium exempla promiscue adducere libet, quale recenset Leonhardus Doldius in Joann. Hornung *Cist. Med. Epistol. 245. p. m. 438.* de pharmacopola citrum magnum aperiente & in medio aliud pomum, suo cortice eleganter obductum reperiente; in parvo tamen nulla fuerunt semina. Malum citrium prægnans, exsiccum tamen, apud Johannem Schonerum se vidisse testatur Christianus Willichius. Dixit autem Schonerus,

hoc pomum tum plane exsuccum & aridum, antea fuisse justæ magnitudinis; cum vero dissecuisset, in meditullio quasi in cellula aliqua invenisse minorem ejusdem arboris fructum, suo etiam peculiari cortice vestitum, & plane a priori alium, ita ut majoris stius quasi foetus appareret. v. Thom. Bartholin. *Epist. medic. Cent. III. Ep. 41. p. 154. Et Cent. IV. Epist. 63. p. 386.* inquit Bartholinus, se limonium prægnans vidisse. Sequentem observationem communicat Johannes Daniel Major *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 241. p. 432 seq.* Anni 1672, mense Januario, amicus quidam Kiliæ Holfatorum emit limonia, vel poma citrea aliquot, ex Hispaniis Hamburgum, indeque eo ad nundinas translata: atque ad usus futuros in cella servat. Mense Aprili dein unum eorum dissecans invenit inhærere illi tanquam foetum in animali, citrum alium perfectæ flavedinis & vividi odoris, magnitudine castaneæ, sed figuræ anomalæ, pondere drachmarum trium cum media. In neutro nuclei: nisi quod in minore obscurum aliquod rudimentum nuclei conspiceretur. Ibidem etiam in scholio *p. 433.* Johannes Baptista Ferrarius refert, superfoetationem hanc genuinam esse limoni citrato primæ notæ a se (vulgo cedrino) dicto, quam speciem pomorum vocat nobilissimam suavissimamque; Provenire limonem hunc in Hetruria quidem universa, sed qua extremitatem ejus in agro, Petræ Sanctæ oppido adjacente: Arbuscula ut flore assiduo ver agere æternum, sic pomis esse formam sæpe obtusior, interdum quoque turbinatior. Pomo aliquo a summo ad imum in plura segmina conciso, limonem alterum interiorem apparere, qui pariter dissectus post auream cutem candidamque carnem albidam medullam tertio non raro pomo pomive rudimento foetam exhibeat; quin etiam ex incisura fere strata exterioris pomi minutorum pomorum polluviam prospicere; interdum sponte exterius pomum rumpi, ac instar uteri plures fraterculos parturire, quanquam non pariat &c. vid. etiam Theoph. Bonet. *Medic. septentr. Part. II. f. 982.* De malo citrio præ-

prægante triplicato narrat Andreas Cnoëffelius, se anno 1671. observasse jucundam prægaturam mali citrii, quod in medio dissectum non solum simile plane pomum citrium omni cute & colore citrino perfectum, sed intrinsece semine plenum: a parte superiori adhuc novum germen, quasi tertium pomum conficiendo, exhibebat. Multi hoc ad stuporem usque in his locis apprehenderunt. Fidissimi testes hujus triplicati imprægati pomi sunt proconsul civitatis Mariæburgensis David Fadenrecht & judex & pharmacopœus Casparus Pyrus, a quo primo mihi erat donatum. *vid. M. N. C. Dec. I. An. 4 & 5. Obs. 54. p. 46.* Vratislaviæ pomum citrium alio prægans deprehensum fuisse, majori illo solitam figuram servante, incluso vero altero minori dimidia sui parte in diversos processus abeunte; ad Lucam Schroëckium scripsit Gothofredus Schultzius, *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 11. p. 34.* Ejusmodi malum citrium prægans, sive in quo aliud minus latebat, hic Dresdæ apud mercatorem videre mihi contigit. Olaus Borrichius in Hodœporico suo MSC. anno 1661. d. 9. Sept. Leidæ notavit sequentia: Vidi in dissecto malo citrio aliud malum citrium minus innatum, suis etiam feminibus prægans, sed nullo cortice, nisi quod corticis complicati initia cernerentur ab interiori parte jam incipere. Hærebat malum hoc non in infimo majoris mali circa pediculum, sed pene in summo, protendebat autem ad pediculum ramos sui pediculi, hinc ab uno pediculo utrique nutrimentum. *vid. Georg. Franc. de Francken. Satyr. Med. IV. §. 4 p. m. 80 seq. Et pag. 79. refert idem Francus, Cratonem binos ejusmodi fructus in unico pomo citrio vidisse.* Varia ejusmodi exempla congeffit etiam Godofredus Benjamin Preussius *Ephem. Acad. N. C. Cent. VII & VIII App. pag 91.* inquit, citrum multiplici & sextuplici fœtu prægans depingit Volckamerus *Hesperid. Noric. Tom. 1. p. 173.* Citrum in citro elegantissimum Vratislaviæ semet conspexisse, testabatur Johannes Christophorus L. B. a Rommerskirch, Canonicus Vratislaviensis. De limone
citrate

citrato pyriformi Paduano prægnante, alias Bergamotto foetifero da Padova dicto, ejusque intimiori consideratione, *vid. ibid. p. 92.*

§. 2.

*De citro in
citro.*

Rara etiam est observatio Johannis Ludovici Apini de citro in citro *M. N. C. Dec. III. An. 4. Obs. 24. p. 66.* ita scribentis: Citra in citris malis omnibus numeris absoluta, nec minus citri germina in ipsis citro adhuc conclusis feminibus plus semel reperta, nemo est qui non noverit ex curiosorum nostrorum ephemeridibus. Sed ne effoetam putes nostris esse temporibus naturæ vim, en jam sistitur citrus in citro, seu germen citri adeo perfectum & conspicuum, finiente superiore anno in discisso pomo citreo notatum, ut non tam futuræ citri primum germinantia rudimenta, (ut quod adeo rarum esse non solet & sæpius a pharmacopœis & rei culinariæ deditis observatur) quam potius absolutissimum citri arbusculum me videre existimarem, cujus iconem, cum nullus adhuc dum in Miscellaneis his extet, nunc simul exhibere operæ pretium duxi. Vacua enim jacente siliqua, jamque penitus consumpto utriusque labi feminalis alibili succo, conspiciebam eleganti virore, non pallido, sed plene gramineo, pronascentem plantulam, non nihil in illa nutricis suæ angustia inflexam, eo vero loco, quam feminalem apicem perruperat, mox in altum tendentem & foliola bina pulcherrime explicantem, cum interim radiculam ex eadem cicatricula emergentem profunde demitteret, ad ipsum citri petiolum; argumento non improbabili, si longius ab arbore pendere licuisset, per hanc viam affluente jugiter humore nutritio, futurum fuisse, ut vegetatione amplius provecta ex hoc tenello germine tandem etiam fructus enasceretur, ut in citreis similibusque pomis exoticis observatum fuisse constat &c.

§. 3.

*De malo
aurantio.*

Mali aurantii foetiferi ex Johanne Baptista Ferrario meminit Johannes Sigismundus Elsholtius *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs. 80.*

pag. 115. Mala aurantia foetifera, quibus confinia lacus Benaci (vulgo *Gard-See*) abundant, enumerat Volckamerus, juxta Godofredi Benjam. Preussii *l. a. p. 93.* Malum aurantium citro prægnans a patre Boccone depingi allegat Michael Bernhardus Valentini *M. N. C. Dec. III. An. 2. Obs. 118. p. 182.* Hujus occasione ^{de malo Sinensi.} etiam Valentini reticere non vult recentem eamque curiosissimam observationem, quæ serenissimo Hassiæ Landgravio contigit, qui malum Sinense aureum (vulgo *Apffel-Sina* dictum) incidens, cavitatem ejus alio & minore malo refertum invenit. Hinc mira novæ & insolitæ prorsus rei delectatione captus, malum illud cum incisura foetum detegente manu artificis depictum in bibliotheca principali Darmstatina in perpetuam rei memoriam aservari jussit; cujus intuitu & occasione philiatè quidam Darmstatinus anno 1694. disputationem publicam de malo Sinensi aureo Lugduni Batavorum ventilavit.

§. 4.

In pomo communi idem annotavit Michael Dœringius physicus quondam Vratislaviensis, qui in epistola ad Danielelem Sennertum anno 1637. scripta ita ait: Rem miram antehac vix visam vel auditam cape: Pusillum pomum colore, odore & figura majori communi pomo per omnia simile, in hujus meditullio singulari pediculo enatum dedit unum atque alterum ante mensem pharmacopœus noster Petrus Callenbergerus. vid. Phil. Jac. Sachs a Lewenheimb *Schol. in Thom. Bartholin. Observat. M. N. C. Dec. I. An. Obs. 36. p. 121.* item Sachsii *Gammarolog. Ltb. I. cap. 7. p. 144.* Poma Adami prægnantia & pomum citratum cum pediculo (qui ex umbilici centro prodit) & quidem foetiferum, vel pomum Paradisi a Judæis vulgo appellatum, ex Volckamero adducit Georgius Benjamin Preussius *l. a.* Pomi mirabilis meminit Johannes Olorinus *Centur. Arbor. mirabil. n. 4. p. m. 11.* ^{de pomo communi.} In der Provintz Malabaycalchi. ^{de pomo} stehet ein Baum, welchen die Inwohner Cachi oder Cicara nennen; derselbige trägt alle Jahr nur einen einigen Apffel, und keinen mehr.

Dieser Apffel wachset nicht wie die andern Aepffel, von den Zweigen, sondern unten an dem Stamm, und ist so groß, daß ein starcker Mensch gnug daran zu tragen hat. Er hat aber, wie die Tannæpffel, inwendig eine Frucht, in 300. unterschiedenen Häutlein, welcher eine iede so groß ist, als unsere Aepffel sind. Und wiederum seynd in diesen Aepffeln noch andere Aepffel, wie in der stachlichten Haut die Castanien sitzen. Hanc relationem ex Joh. Michaelæ Dilherro recenset Georgius Francus *Satyr. med. 4. p. m. 80.*

§. 5.

De pyro.

Pyrum pyro innatum observavit Olaus Borrichius secundum Thomæ Bartholini *Act. Hafniens. Vol. II. Obs. 60. p. 163.* ubi inquit: Attulit mihi amicus ex horto Kitzeroviano pyrum ex duobus integris in fructum unum monstrose coalescens. Cauda cum dimidiato fructu alterum constituebat pyrum, superior illa & amplior pars alterum. In medio fructus corpore folia utrinque eminebant, & illa inter se ita per harmoniam coierant, ut folium unum diversis incisuris distinctum apparerent. Interiora ita sibi cohærebant, ut fructus non nisi unicus videretur, sed fibræ hinc inde errabundæ & semina confusis disposita locis vitium tacite loquebantur. Item dans le *Journal des Sçavans de l' an 1675. p. 174.* secundum observationem domini Perault. il y avoit une poire, qui sembloit en enfanter une autre par sa tête: car cette tête s'ouvrant & s'elargissant laissoit sortir une autre poire, qui ne fortoit qu'à demy; & cette seconde poire jettoit de sa tête une brouche & plusieurs feuilles. Une autre poire plus petite ne produisoit point une seconde poire, mais seulement une branche & des feuilles de meme que l'autre. Ces fruits ayant esté ouverts en long par la moitié, l'on a trouvé, qu'ils n'avoient point de pepins, mais que leur chair estoit solide par tout, & que les fibres ligneuses, que la queue a coustume de jetter dans l'endroit, ou elle est attachée à la chair, continuoient & passoient outre au travers de l'une & de l'autre poire, pour aller produire la petite branche & les

feuil-

feuilles, qui fortoient de la teste dela derniere poire. Ou remarquoit encore la separation dela chair dela premiere poire, qu estoit comme la mere, d' avec la chair dela partie posterieure de l' autre, qui en naissoit, & qui n'estoit pas entierement sortie, estant encore attachée à la mere. De pyris florentibus vid. *Ephemer. Acad. N. C. Cent. III & IV. Obs. 155. p. 351 seqq. item M. N. C. Dec. I. An 6 & 7. Obs. 239. p. 347.* De pyro ex alio pyro procreato vid. *Joh. Bapt. du Hamel Histor. Reg. scient. Academ. Lib. III. cap. 2. p. 271.*

§. 6.

Dari etiam flores prolificos, variorum autorum testantur observationes; De rosa enim prolifera sequentia scribit Sigismundus Grassius *M. N. C. Dec. I. An 4 & 5. Obs. 94. p. 94.* Rosarum purpurearum species est, quas horticultores vocant Gallicas, *Frantzæ. sische Rosen.* Fruticis ramulos armant spinulæ rarissimæ, ut partim sint glabri, partim potius hispidi, quam aculeati. Ex his una vel altera mihi nata est prolifera, ita ut ex medio antheræ croceo propullulaverit cauliculus viridis cum calice roseo barbato: aliquando etiam caliculus tantum foliosus sine calice, seu furculus ad longitudinem digiti foliolis exiguis viridibus satis dense stipatus &c. Veruntamen non hæc tantum rosa superbit hoc luxu, quamvis forsitan frequentius. In saccharina pauciflora simillimam proliferationis fecunditatem anno 1672. monstravit ex hortulo suo fautor & amicus quidam, rerum hortensium cultor curiosissimus. Eandem in centifolia Batavica proliferationem exhibuit annus hujus seculi septuagesimus tertius; calicem nimirum roseum e centro centifoliæ natum in Roseto Petrisylvano vidit, & testis oculatus recensuit aulæ Gelhornianæ præfectus, illustr. Baro de Logau. Propaginem autem foliosam digitum longam, ex eadem enatam ipse reperi in horto amici suburbano. Calicem tandem hujusmodi roseum floris nondum explicati, ex alba rosa luxuriantem in hortulo suo se decerpisse gloriatur chirurgorum nostratium

Flores pro-
liferi.

Rosæ.

quidam primarius. Hæc Grassius. Ibidem etiam aliam florentissimæ iconem rosæ, quæ Altenburgi in horto Richteriano provenit, insertam videmus, quippe quæ triplici flore perfecto spectabilis fuit. De rosis plenifloris proliferis Reinholdus Wagnerus in *Nov. Literar. Mar. Balhic. an. 1700. mens. Februar. p. 51.* sequentia communicat: Tanta, pluviosis ast simul fœcundis superioris anni tempestatibus, rosarum fuit luxuries, ut non tantum integer frutex proliferis rosis albis in horto illustris Dn. Harboe superbierit, ita ut una rosa ex altera, rarissimo amœnitatis exemplo, ex alabastrorum viridium coronis, atque e medio alterius, tanquam matre foliosa, prognata fuerit, quales cum calicibus roseis ex rosis albis luxuriantes exhibet *Tab. II. Fig. 1.* sed & proliferationis similem fœcunditatem in rosa rubra florentissima animadvertimus, quæ in Tusculano D. Masii trium instar rosarum, floribus diversæ magnitudinis & plenitudinis se in conspectum dedit; cujus iconem videre licet *Tab. II. Fig. 2.* Ibidem etiam alius rosæ proliferæ mentionem facit, quam Johannes Nolto, polia-ter Lubecensis ipsi obtulit. Rosam triplicatam annotavit Andreas Cnœffelius *ibid. Obs. 55. p. 46.* Fœcunda, inquit, tempestas 1672. die 20. Augusti, luxuriantem nobis rosam provincialem, ut vocant, triplicatam, exhibuit in horto proconsulis Erasmi a *Lünden.* Iconem hujus rosæ ibidem reperies. Aliam quoque rosæ, pro multiflora habitæ atque Pragæ in horto P. P. Bernardinorum die 10. August. anno 1647. repertæ iconem ibidem videbis. Rosæ proliferæ observationem ejusque iconem communicat *M. N. C. Dec. III. An. 9 & 10. Obs. 132. p. 249.* Johannes Henricus Hottingerus, rosa hæc colore ab aliis hujus speciei (fuit scilicet rosa rubra pallidior Bauhino dicta) non differebat, paucioribus ornata foliolis, verum latioribus, non ita fortem & svavem ac aliæ, spirabat odorem; Involucrum seu calicem apertum, quo nitebatur, quinque folia constituebant, ejusdem ac in caule figuræ; Ex umbilico, seu medio antheræ assurgebat cauliculus tener, foliolis sub-

subtilibus instructus, cui impositus calix roseus, ejusdem albo-viridescentis cum caule coloris, ex quo rubedo quædam, rosæ nondum evolutæ intus contentæ, emicabat. Aspectu sane jucundum! Caulis foliis latioribus gaudebat, spinis majoribus carebat, minoribus tamen armatus erat. &c. Partum matri rosæ proliferæ fatalem, edidit Georg. Benjam. Preussius *Ephemerid. Academ. Nat. Curios. Cent. VII & VIII. Append. p. 83 seq.* ubi ejusmodi rosam proliferam prolixè & accurate describit atque depingit: Medio scilicet Junii mense frutex in locum meridianis solis radiis, per plures dies continuo pluvias excipientibus obvium transferebatur, interdum per intervalla, & aqua pluviali irrorabatur potius successive, quam imbribus committebatur. Quo facto signum quasi ad perrumpenda calicum claustra subito rosarum agmini, per solis activitatem erectum videbatur. Imprimis se commendabat fruticis brevior quidam furculus vel caulis spinoso hispidus reliquis crassior capaciorque. Quatuor foliis fruticis subviridibus, profunde laciniatis, sublongis, mollibus, exterius parum lanuginosis instructus. His valde vicinus aderat nudus & calice destitutus globulus, ut ita appellem, rosæ conniventis solito capacior, cujus foliola numerosissima arcte invicem compacta & conglomerata velut verticillum repræsentabant; quem in principio folia dicta laciniata loco calicis amplexabantur & leviter obtegebant. Rosa hæc matris proliferæ nomine non immerito insignienda venit, eo quod ex ejusdem nondum dehiscentis sinu & centro prodire & nasci observabatur priori continuus cauliculus ad digiti longitudinem protensus, non spinosus, sed plus minus lanuginosus, crassior molliorque nullis foliis herbaceis ornatus, cujus apex in calicem seu globulum rosæ pariter conniventis & plenifloræ plane regularem terminabatur, quem rosæ filiæ, partus velut ex matre rosa producti titulo hic denotandum duxi. Interea ab amplexu foliorum lacinatorum sponte se nunc reclinantium liberatus globulus nostræ rosæ matris intra sinum suum sensi-

biliter intumescere & in amplius spatium se extendere moliebatur. Foliola erant colore incarnato magis, quam purpurascete, odore grato non prorsus destituta. Præsertim vero circularem rosæ extremitatem color vividus per viginti circiter horas animabat: minime tamen in majorem ambitum, quam figura ipsa monstrat, explicabatur verticillatus hic globulus roseus, adeoque nec discum, nec antheram, vel stamina & luteos apices, nec semen (ob calicis defectum) quod tamen rosis aliis proprium est, exhibebat. Vix per dictum brevissimum tempus mater prolifera vitam & colorem oculis qualitercunque concesserat, cum non nisi unica die & nocte tardior rosa filia dehiscere, odoremque & colorem matre longe perfectiorem præbere observaretur. Fatalem en partum! nam quo magis virtute & vividitate per horas singulas increfceret, se expanderet & augeretur rosa filia, nulli reliquarum amœnitate secunda, eo magis per easdem horas & fere momenta rosa mater colore & vividitate decrescebat, se contrahabat & imminuebatur &c.

§. 7.

*Caryophyl-
li.*

Rosis succedant caryophylli hortenses, quorum dignitas in hortorum regno, cum rosæ purpura certat. Tales caryophyllos anno 1683. præter solitum prolificos esse factos, erumpente ex medio floris novo calice, refert Güntherus Christophorus Schelhammerus *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 110. p. 210.* qui non unum tantum, sed quinque sex septemve numeravit: verum tunc nullo ex his flore perfecto. Uno vero tantum emergente, non raro ad justam magnitudinem pervenit, aut paulo minorem, & in serum autumnum floruit. Hoc maxime quidem Schelhammerus in caryophyllo candido maximo, quem Hierosolymitanum hortulanorum licentiosa etymologia insignivit, evenisse vidit, in aliis tamen etiam. Caryophyllos variarum specierum in hortis olim Vratislaviæ propriis ante plures annos se aluisse, quorum ex medio unus pluresve calices eruperint, Georgio Benjamini Preussio retulit.

retulit generosus dominus de Baumann, eques Silesius. v. Preuss. l. a p. 87. Caryophyllum ex uno alio enatum annotavit Sigismundus Schnitzerus in Joann. Hornung. *Cist. medic. Epist. 33. p. 84.* In horto Caspari Koellichen enatus est flos caryophylleus, varii coloris, qui, cum divideretur, alterum simillimum florem gremio suo innatum ostendit, uti refert Olaus Borrichius *Act. Hafniens. Vol. I. Obs. 67. p. 127 seq.* Caryophyllum hortensem prægnantem, five ex quo alius ejusmodi flos excreverat, a mercatore nostrate, Johanne Georgio Schucharto, anno 1718. accipiebam.

§. 8.

De ceraso pleniflora prolifera sequentem observationem narrat Sigismundus Grassius *M. N. C. Dec. I. An. 4 & 5. Obs. 95. p. 95 seq.* Anni 1613. Majo fere finiente cum cerasus pleniflora jam deflorere inciperet, flores quosdam vegetiores conquirebam decerpandos & amico rosæ albæ loco monstrandos. Inveni multos, qui e medio novos flosculos e suis alabastris viridibus læte prognatos, & matre foliosa multo eminentiores, modo unum, modo plures, denso foliorum stipatu unum quasi florem mentientes exhibebant, cum tamen e pluribus alabastrorum viridum coronis, intuitu penitus totidem flosculorum ostenderent progeniem. Cerasus hæc, eo quod omnis foecunditas absumatur, in flores, aut nullos producit fructus, aut certe rarissimos, ut oculos ita saturet magis, quam palatum. Aliæ autem plenifloræ, in quibus luxuriam hanc prolificantem nondum observavi, fructibus abundant satis frequentibus, quibus non raro gemelli uni insident pediculo.

Cerasus.

§. 9.

Tulipam ex uno eodemque stemmate gemellam, monstruosam itidem foliorum agglutinatione ac inosculatione oppido raram a Johanne Noltone medico Lubecensi se accepisse refert Reinholdus Wagnerus in *Nov. Literar. maris Baltici. An. 1700. mens. Februar. p. 52.* Tulipas ob numerosissima folia variegata talem in modum plenifloras, ut propter folia exteriora permulta, mole interior-

Tulipa.

teriorum depressa & reclinata deorsum, relicto etiam caulis interstitio sat notabili & distincto, tulipam ex tulipa exacte retulerint, se vidisse refert idem Preussius *l. a. p. 87.* ubi etiam florum papaveris variegatos & prolificos, item jasmini flosculum ex alterius sinu distincte onatum adducit; Scabiosæ quoque proliferæ, quæ ex uno flore medio plures flosculos distinctis invicem pediculis protrudit ex Tabernæmontano ibidem meminit.

§. 10.

Corona imperialis.

Coronam imperialem duplicem, sive superiorem ex altera inferiore exsurgentem adeoque proliferam, celeberrimus Bosianus hortus anno circiter 1703. 1704. Lipsiæ exhibuit, ab horti præfecto tunc temporis plurimis ostensam. v. G. Benj. Preuss. *l. a. p. 87.* ubi etiam jasmini flosculum ex alterius sinu distincte enatum adducit; item daturam Ægyptiacam flore plenissimo triplici, uno ex altero ascendente tam coloribus variegatis, quam altitudine ipsa speciosissimam in icone sistit Volckamerus. Et in datura alia Contareni calicem florem triplicem, unum ex altero prognatum, nec non in calendula decem flores supra elevatos vidit F. Imperatus &c. *vid. Preuss. l. a. p. 88 seq.*

§. II.

Causæ.

Causas autem ejusmodi vegetabilium prolificorum & foetiferorum perpendens modo allegatus autor *pag. 98 seq.* sequentes adducit 1) Idiosyncrasiam vegetabilium. 2) Tempus anni consueto magis proliferum. 3) Soli & regionis per naturam ad fecunditatem dispositionem. 4) Nutritionis consuetæ adeoque & nutritionis luxuriosæ sive proliferationis materiam seminosam ab aqueis & terreis particulis simul, ejusque modum per succi ascensionem & circulationem. 5) Efflorescentiæ modum. 6) Causas occultas. 7) Terræ sive agri conditionem, cui vegetabilia immatriculata sunt. 8) Vas circumdans frutices. 9) Aquam naturalem, pluvialem, vel artificialem, irrigationi destinatam. 10) Solem, tam orientalem, quam meridianum, & locum um-
bro-

brofum pariter ac apricum & lætum. ii) Artem & culturam fo-
lertiolem, naturæ supervenientem vel eam ftimulantem. De
quibus caufis, & aliis ad copiofum florum & fructuum proventum
facientibus ibidem prolixè agit. vid. etiam le Journal des Sçavans
de l'an 1675. p. 176 feq.

CAPUT IV.

De Lapidibus prægnantibus.

§. I.

IN regno denique minerali varii quoque lapides, aliis lapidibus
prægnantes, reperiuntur, v. g. ætites, qui etiam, juxta Joh.
Laurent. Bansch. *de Lapid. Ætit. cap. i. p. 15.* lapis prægnans appella-
tur, vel quod intus, velut in utero, lapillum alterum aut aliud
quid, tanquam embryonem vel foetum, inclusum habeat; vel
quod prægnantibus proffit; vel quia, secundum Guilielm. Lau-
remberg. *descript. Ætit. lit. B. 5.* alio lapillo quasi foecundus est;
& *lit. D.* certi ætitæ, gemonides dicti, & prægnantes fiunt, & al-
terum pariunt lapidem; siquidem talis lapis in parte latiori nigram
habet maculam, cum exigua quadam rimula, cui forma muliebri
non absimilis membro, per quam etiam singulis mensibus foetum
enititur. vid. *lit. E.* Quamvis autem prægnans vocetur, non tamen
parit; atque in ætitis cavitate continetur vel lapillus, vel terra vel
arena. Lapis variat colore & duritie, aliquando enim est ex parte
translucens, ex parte colorem nubilum cæruleum ostentat, quan-
doque candidissimus, quandoque niger est. Ratione duritiei ta-
lis lapillus interdum est friabilis, interdum instar filicis durus,
Scribit etiam Philippus Jacobus Sachs a Lewenheim *Gammaro-
log. Lib. I. cap. 8. p. m. 145.* lapides inveniri in regno minerali prægnan-
tes. In veteri enim Marchia ad ostium Tangræ, Christophorus
Encelius invenit lapides prægnantes chelonitibus tribus vel qua-
tuor perfectis, tanquam in matrice. Vidit Goropius Becanus in

Ætites.

Syllepsilogia.

Y y

filice

filice durissimo Bethunis advecto, quo viæ sternuntur, conchulas totas lapideas & conclusis valvulis integras, ut cemento quasi aliquo compactæ judicarentur. Tales lapides conchites prægnantes creberrime in Alsatia prope Buxovillam inveniri, testis est Salomon Reifelius. Describit etiam Georgius Agricola *de Natur. Fossil. Lib. VII. cap. 17. p. m. 649.* certa saxa, quæ interdum continent margam, interdum filices, potissimum nigros, qui etiam ipsi ferro percussi exiliunt, interdum lapillos gemmis simillimos, qui ut primo ad ornatum videantur decori, post excidentes saxa relinquunt cavernulis plena. Inquit etiam Johannes Laurentius Banschius *l. a. p. 71.* est, apud nos, circa Svinfurtum Franconiæ, non rarum, saxum quoddam calcarium (*wackestein*) e quo calx conficitur, & quo viæ plateæque sternuntur, cui includuntur, sicut pisa lapidea stalagmiti, lapides opaci, colore cinereo vel subfusco læves, longiusculi, in dorsum elati seu convexi, altera parte magis plani, mucrone aliquo modo intus replicato. Durities iis silicea, cui etiam quoad substantiam similes. Hos ex alveolis extractos vulgus nostrum *Krætenstein* appellat, argento includit, & ad quem usum nescio) de collo suspendit. Et quamvis lapillos hos saxo, tanquam matrici, inclusos ante oculos habeat & pedibus terat, non tamen animadvertit, sed pro peregrinis aut lapidibus bufonum habet. Copiose quoque reperiuntur hi lapilli in rivulo prope oppidulum Rodach, diœcesis Coburgensis.

§. 2.

*Priapoli-
thi.*

Curiosa etiam est observatio Petri Borelli, quam *Histor. med. Physic. Cent. III. Obs. 85. p. 262 seq.* recenset: Reperiuntur, inquit, juxta Castrensem urbem lapides subalbi; rotundi & oblongi, figuram penis & quandoque vulvæ habentes, & aliquando, sed rarius, testiculis instructi sunt & balano, in medio vero eorum percurrit vena crystalli purissimi, adeo ut totus lapis, ut cepa cuticulis variis constructus videretur tantum ex ejus impuritatibus & excrementis ejectis vel scoriis constare, ni manifeste perciperetur,

tur,

tur, lapides illos augeri non solum, sed etiam similes sibi procreare. Reperiuntur enim primo aciculæ magnitudine tantum, sed tamen non sunt crystallo destitutæ; reperiuntur etiam majores, & usque ad crassitiem fœmoris, saxi quandoque inclusi; sunt autem in monticulo, qui totus iis confitus est, adeo ut nulli illic alii lapides reperiantur. Sed in magnis reperitur aliquoties terra rubra loco crystallo parvulis priapolithis intus generatis pleni, adeo ut videantur matres fœtibus prægnantes, & si non ante tempus aperiantur; sponte sua aperiantur & quasi parturiunt. Quod aliquo pacto confirmare videtur, quæ apud multos physicos de adamantibus alios adamantes parturientibus leguntur. Memorantur etiam lapides Indici, qui, dum maturantur, crepitu aperiantur & diffiliunt gemmas producentes &c.

§. 3.

De lapidibus prægnantibus & gemmis in gemmis sequentia exempla recenset Georgius Hieronymus Velschius *M. N. C. Dec.* *Lapides prægnantes*
I. An. 3. Obs. 32. p. 50 seq. Adamantem in smaragdo perquam pretiosum habuit olim Philippus Heinhoferus, patritius Augustanus, quem Philippo II. Pomeraniæ duci obtulit. Smaragdum in crystallo vidimus Florentiæ in cimeliarcheo magni ducis Etruriæ. Crystallos, quarum ventre muscus & plantæ capillares concretæ apparebant, arena item & ductilibus auri filis per naturam gravidas aliquot possedit Ludovicus Guetius Sulcensis. Malachiten in cyaneo, ovi fere anserini figura & magnitudine, rarissima fœtura, miraque in coeruleo saturo viridis coloris gratia apud amicum nobilissimum sæpius vidimus. Corallia in achate, ut vocant silvestri, id est, minus puro aut elegante servantur in tameo theca Electorali Monacensi. Nobis ipsis amethystus est in crystallo manus propemodum nostræ longitudine duorumque pollicum crassitie insignis: Et jaspis Chalcedonius, minor quidem, sed tricolor pulcherrimus, rotundo schemate, in cujus medio Crystallos rhomboides inclusa spectatur, cujus pars aquam pellucidam,

pellucidam, reliqua glaciale & angulosam, tanquam in minimas stirias concretam jucundissimo adspectu repræsentat. Si enim natura crystalli fuerit, ut omnia omnino hexagona esse debeat, hæc sane non crystallus sed aqua potius in lapidem glaciata vocanda erit. De lapide bezoartico prægnante, item de silicibus in filice, vid. Georg. Franc. *Satyr. med.* 4. §. 4. p. 79.

§. 4.

Calculi humani.

Quamvis sequens observatio non ad regnum minerale, sed potius animale referenda sit, quia tamen hoc loco de lapidibus prægnantibus egimus, liceat nobis eandem annexere: scilicet cum regi Galliæ Carolo tres calculi simul extracti, colore albi, singuli ovi gallinacei crassitie, & simul duodecim uncias pendentes, oblatis essent, unum malleolo confregit, in eoque medio alius inventus est colore castaneo, cæteraque nuci mali Persici similis, uti refert Ambrosius Paræus *Lib. XXIV. cap. 19. fol. 568.* Plura adhuc alia tam in calculis humanis, quam aliis lapidibus reperiuntur, quæ tamen huc non pertinent; Evolvere interim potest Philipp. Jacob. Sachs. *Gammamol. Lib. I. c. 8. §. 3 seq. p. 143 seqq.* quo loco primo varia lapidum prægnantium, deinde lapidum animalibus mortuis & vivis prægnantium, item cancerorum, bufonum, ranarum, pisciculorum & squillarum in lapidibus repertorum exempla recenset. Calculum humanum non alio calculo, sed globulo plumbeo, qualem capere solent bombardæ minores, prægnantem, in civis cujusdam Basiliensis vesica repertum, Georgio Segero ostendit Johannes Casparus Bauhinus, vid. Th. Bartholin. *Epistol. med. Cent. III. Ep. 35. p. 128* ubi hujus calculi & globuli figuram reperies. vid. etiam *Ephemer. Miscellan. Natur. Curiosor. Cent. VII & VIII. append. p. 96 seqq.*

SECTIO V.

CAPUT I.

De graviditatis signis.

§. I.

CUM autem non quemlibet coitum insequatur conceptio vel ^{Gravidi-} ^{tatis certi-} ^{tudo inda-} ^{gatur.}
feminarum ingravidatio, plerumque feminae tam nuper
maritatae atque in licito conjugio viventes, quam etiam
extra vinculum sacerdotale coitum illicitum admittentes, de
graviditate sunt sollicitae, & quidem illae ob prolis desiderium, haec
vere ob furtivi amoris timendam poenam, modo a medicis, modo
a vetulis & obstetricibus expiscari nituntur, utrum ipsae revera ^{ejusdem si-} ^{gna sunt in-} ^{daganda.}
gravidae sint, nec ne? quanquam aliae adhuc dentur causae atque
occasiones, ob quas medici de certarum feminarum graviditate
sententiam suam ex officio ferre tenentur, siquidem secundum
Fortunat. Fidelis *de Relation. Medicor. Lib. III. Sect. 4. cap. 1. p. 408.*
feminas uteri gestationem dissimulare, ac deinde alieno supposito ^{ob femina-} ^{rum frau-} ^{des.}
infante partum mentiri, aliquando compertum est: sive ad hoc
spe futurae successionis, sive alio ducantur consilio. Nec minus
etiam constat, nonnullas, ut tormenta aut commeritas alias poenas
subterfugerent, falso eundem statum simulasse. Quanquam mul-
tae etiam sint, quae, cum utero gerant; id tamen, ut impudicitiae
notam evitent, omnino detestantur. Quod autem hoc loco de
dissimulata vel potius de simulata uteri gestatione atque infante
suppositio scribit Fidelis, idem ante triginta annos in nobilissima,
quadam uxore de E. accidebat, quippe quae non modo gravida ^{Observatio.}
tem sed etiam ipsum partum variis astutiis, ope cujusdam obstetri-
cis simulabat. De his feminarum astutiis scribit etiam Nicol. Ve-
nette *de la Generat. de l'homme Lib. III. cap. 3. p. 374 seq.* Il y a, in-
quiens, tant de suppleesses parmi le sexe, qu'il faut estre bien fin
pour n' y estre pas surpris, quand il veut nous en imposer. Car
Yy 3 lorsqu'

lorsqu' une femme a dessein de paroistre feconde, pour estre plus aymée de son mary, ou pour recevoir quelque chose de son amant, il n'y a point de ruses, qu'elle n'invente pour paroistre grosse. Il en est de la grossesse comme des écritures, on ne peut connoistre celles-là veritables & celles cy fausses, que par conjecture: Ce ne sont pas les premiers enfants, qui ont esté supposez après que l'on est demeuré d' accord de la grossesse d' une femme. Lepida fut condamnée pour en avoir usé de la sorte, & il ne se trouve aujourd' huy, que trop de femmes, qui se font fort, ou de feindre leur grossesse, ou de supposer un enfant.

§. 2.

a Medicis.

Imprimis autem sæpissime impudicæ ac defloratæ feminæ virginitatem simulantes, metu imprægnationis, sub mensium plerumque suppressionis nomine, a medicis ad eorum reserationem fortia & efficacia medicamenta efflagitant; Hinc nihil in medicina adeo necessarium foret, inquit, Casparus a Reies *Camp. Elys. Qu. 49. p. 605.* quam quod medici certa conceptus signa haberent; cum præsertim ipsi non levi famæ & opinionis jactura turpiter sæpius hallucinentur & ab impudicis quibusdam feminis, quæ deperditam virginitatem simulare student, non raro fallantur; quæ plerumque sub mensium defectu, ad quorum reditum remedia perquirunt, incautos decipiant, ut in maximos errores labi proinde contingat, in poenitenda foetuum immatura exclusionem; cum nulli non notum sit, quantum piaculum sit, si imprudenter hoc fiat aut pretio aliquo committatur. Et juxta Mich. Ernest. Ettmüllerum dantur exempla mulierum, quæ ex furtiva venere conceperunt, ac etiam si foetus motum manifeste percipiant, id tamen constanter negant, sicque studio imponentes medico, hydropicas se fingunt. *vid. Ephemer. Acad. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 44. p. 113.* Item inquit Paulus Zacchias *Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. III. Qu. 1. n. 45. fol. 91.* conceptus dies & hora nescitur & ipsasmet mulieres latet, ut ita neque ipsis mulieribus credatur asserentibus,

tibus, se esse vel non esse gravidas. Quodsi proinde medicus nihil mali de tali persona ominans, ab eadem se persuaderi vel etiam imprudenter aut aliquo pretio decipi patiatur, atque per exhibita medicamenta immaturam foetus exclusionem sive abortum promoveat, magnum sane committet piaculum. Ne proinde medicus imprægnatam loco virginis curet, juxta Caspari Theophili Bierlingii *Thesaur. theor. pract. Obs. 37. Schol. §. 4. p. 517.* admonitionem, in titulo tenus virginibus magnam circumspeditionem adhibere debet, ne ab illis Circis circumveniantur, & loco morbi simulati vitale concreditum pignus extirpet. Itæ Sirenes dulce quidem canunt, sed mel in ore, fel in corde habent. Multas & multas novi, qui factum constanter pernegarunt, imo juramento confirmarunt, se non esse imprægnatas, cum tamen eventus deinde nos aliter informaverit, ut infantes vel interfecerint, vel alio modo ex oculis hominum subduxerint. Illarum enim verbis nulla fides habenda. Talis erat, quæ per plures annos in domo quadam licentiori vita vivebat, quoniam vero plenus venter facillime in libidinem despumare solet, ita & succubæ munere fungebatur. Exinde vero optime faginata, licet ab hera non solummodo, sed & ab aliis de subitanea contracta pinguedine examinaretur, nihil tamen est falsa, sed constanter negative respondit. Insuper etiam, quia in summa heræ versabatur familiaritate, medicos non solum, sed & agyrtos in consilium adhibuit. Omnes tamen, Deo sic volente, nihil effecerunt, donec natura farcinam deposuit. Quo facto in lucem editum infantem & crudeliter interfectum in cella abscondidit. Ad heram reversa maximo gaudio tripudioque innocentiam suam fluxu sanguinis indicavit. Quæ inde exhilarata magnum triumphum contra inimicos in animo suo concepit, ita ut ad demonstrandam ancillæ innocentiam vicinis & amicis opiparam instituere coenam promiserit, & autores malæ famæ diris afficere poënis sibi proposuerit. At Deus omniscius justusque judex hanc comœdiam in tragoediam transfigurabat.

bat. Paulo post enim factum divulgabatur, & infanticida a lictore capite mulstabatur.

§. 3.

a Juris peritis.

Deinde etiam jurisperiti de signis ingravidationis sunt solliciti; siquidem secundum Paul. Zacch. *Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. fol. 86.* circa prægnantiam sæpe in dubium vertere illis occurrit, utrum prægnans mulier sit nec ne; præsertim cum marito ab intestato decedente ac uxore prægnante relicta, vel quæ prægnantem se esse dicat, proximi in hæreditatem admitti cupiunt ipsius defuncti, quæ tamen, si mulierem vere prægnantem esse deprehendatur, ad ipsum uterum procul dubio pertinet. *l. cum quidam ff. de I. acquir. hæred. & casus proponitur a cognato in l. si quis prægn ff. de reg. Jur. Tom. 3.* Quin etiam ubi torqueri mulierem oporteat, minus illud executioni demandari potest, ea grvida existente, *l. prægnantis ff. de Pœnis.* Clar. in §. fin. *Quæst. 64. num. 22.* Menoch. *de Arbitr. Jud. lib. I. Quæst. 86. num. 10.* Farinac. *Var. Quæst. & opin. crimin. Quæst. 4. num. 78.* quod ampliat, ut neque verbis minitabundis terreri possit. *num. 84.* sic & ubi damnari debeat ad ultimum supplicium, vel etiam ad corporalem aliquam pœnam, minus fieri potest, quamdiu utero gerit & differri executionem jubent leg. Clar. *ubi supra, Quæst. 57. num. 5.* Covarr. *Var. resolut. Lib. III. cap. 4 Tom. 2.* Huc pertinet, quod de graviditate seu imprægnatione affectata, & simulata proponit Hermannus Fridericus Teichmeyerus *Institut. Medicin. legal. Cap. 4. p. 40.* feminas scilicet diversis ex causis utero se gerere nonnunquam fingere 1) ut supposito postmodum infante, partum mentiantur. 2) ut sterilitatem dissimulent. 3) quandoque spe successionis, imprimis quando maritus subito apoplexia vel alio acutissimo morbo, mortuus est, 4) cum ad hæreditatem proximi admitti cupit 5) ut tormenta & pœnas corporis afflictivas, ultimum imprimis supplicium, subterfugiant; vel 6) ut post divortium se ex marito prægnantem affirmet. Cum itaque delictum hoc a Jctis falsi criminibus annumeretur, & capitale dicatur; imo cum præ-

præsumptionibus solis fidendum non sit, medicorum idcirco iudicio in auxilium vocant. Quænam autem potissimum sint signa, quibus affectata dignosci possit imprægnatio, *l. a.* idem autor pluribus docet. Et Andreas Petermannus *Cas. med. legal. Decad. II. p. 59.* inquit: *Die Untersuchung, ob ein Weibes-Bild schwanger sey, ist sonderlich von nöthen 1) wenn solches soll gemartert, oder 2) ihr sonst eine poena corporis afflictiva angethan, oder gar 3) ums Leben gebracht werden. Dann auf solchen Fall muß alles biß nach ihrer Niederkunft verschoben bleiben. 4) Bey angethanen real-Injurien derjenigen Conditio viel deterior wird, welcher eine schwangere Frau schläget. 5) Bey Erbschaften.*

§. 4.

Cum vero in his & aliis ejusmodi casibus domini jurisperiti & qui justitiam administrant, totam quæstionem, an talis femina de-
Gravida-
tatis signa
incerta.
 linquens gravida sit nec ne? medicis ut plurimum decidendam relinquant, maxime sane necessarium atque optandum esset, ut in medicina certa & infallibilia conceptus sive in gravidationis signa reperirentur. Quamvis enim tum veteres tum recentiores non pauci, varia atque infallibilia prægnantiæ signa adduxerint, v. g. ipse Hippocrates *de Carnib. Oper. Sect. III. fol. m. 35.* inquit: Liquido constat, quod mulier, ubi concepit, statim inhorrescit, & incalescit, ac dentibus stridet, & articulum reliquumque corpus convulsio prehendit, & uterum torpor, idque iis, quæ puræ sunt, accidit. Quæ vero crassæ & mucosæ istud experiuntur, earum pleræque hoc non sentiunt. Ac sane, quantum illæ mihi ita indicarunt, tantum etiam me scire profiteor. Huc pertinet etiam quod *Sect. I. cap. IX. §. 12 seq.* de conceptionis signis inferuimus: vix tamen hæc signa omnibus neotericis videntur satis evidentia; unde inquit Fortunatus Fidelis *l. a. pag. 409.* non ignoro, quam difficile sit, prægnantium feminarum statum certo dignoscere: ac præsertim, si ab invitis extorquere veritatem oporteat. Nam quæ hujus rei propria reputantur, plerumque etiam alias corpo-

ris dispositiones sequuntur. Etenim & ipsa menstruæ purgationis interceptio, ventris tumor, turgidæ mammillæ, ac lacte nunquam refertæ, motus in utero ac similia quædam non raro in feminis conspiciuntur, tametsi utero non gerant. Quo circa de his omnibus ita loquar, ut vix per se aliquid necessarii sim traditurus, sed quædam tantum probabilia, & quæ rem ipsam ut plurimum assequantur, &c. Et Ludovicus Bonaciolus *de fœtus format. cap. 4. p. m. 245.* conceptionis notas vocat falsissimas, & quibus minus credendum sit, quandoquidem complures ac prope omnes, omnem citra graviditatem, menstruis recrementis suppressis, evenire queant. Juxta Nicol. Venette *de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 3. p. 375.* l' on ne doit jamais affirmer positivement, qu'une femme est grosse, puisque tous les signes, dont on peut se servir, sont incertains, & que la femme mesme, qui en doit plutost estre le juge que nous, s' y trompe fort souvent.

§. 5.

Signa a
conjugum
constituti-
one.

Defumi autem solent imprægnationis signa vel a prioribus, vel posterioribus graviditatis mensibus, quorum illa difficilioris, hæc vero facilioris cognitionis judicantur, vid. Paul. Zacch. *l. a. fol. 87.* Juxta Joann. Riolani *Anthropograph. Lib. II. cap. 34. fol. 176.* in muliere prægnante ex primo conceptu nullum discrimen apparet in partibus genitalibus externis, nisi instante partu, & post partum propter summam istarum partium dilatationem &c. Inquit etiam Nicolaus Venette *l. ell. p. 363.* On fait, que la grossesse est ordinairement de neuf mois accomplis les signes pour la decouvrir dans les premiers mois nous servent de conjectures, & ceux dans les derniers, nous la rendent plus certaine. Ante omnia autem, circa in gravidationis signa, consideranda erit utriusque personæ, tam maris, quam feminæ, ad coitum fœcundum & generationem apta atque conveniens ætas, de qua jam sectione de conceptione egimus. Quibus annectenda reliqua verba Nicolai Venette, qui *l. a.* inquit: On doit observer dans le mary & dans

dans la femme d' autres circonstances, qui servent de conjectures pour établir la connoissance, que nous pouvons avoir de la grossesse d' une femme. Car si le mary n' est ny trop jeune, ny trop vieux, que son temperament soit robuste, & ses parties principales bien saines, qu' il ne soit ny trop gras, ny trop maigre; & qu' il ait les parties de la generation bien faites & bien disposées: que d' ailleurs la femme ayt aussi les mesmes dispositions, qu' elle soit dans la fleur de son âge, & qu' elle jouisse d' une santé parfaite; qu' elle ne soit ny trop grande, ny trop petite, & que ses regles ayent accoutumé de couler selon les loix de la nature: je ne doute point, que s' il y a les moindres marques, que la femme soit grosse, on ne doive se le persuader, après tant de dispositions d' un costé & d' autre. Ad conceptionem seu ingravidationem a Roderico a Castro de Natur. Mulier. Lib. III. cap. 1. pag. 123 seq. requiritur proba uteri commodatio, recens mensium purgatio, idonea ætas, appositus congressus; In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad calidum præsertim & humidum inclinans, feminis prolifici copia valida, & virilis ætas cum robore virium conjuncta, membri genitalis optima structura, concubitus moderatus, & plena victus ratio. Deinde in ipso coitu signum conceptionis peti potest ex dolore quodam compressivo & contorquente, quem in coitu fœcundo omnes feminæ, præcipue in eo loco, ubi testium tubarumque deprehenditur situs, notabiliter sentiunt.

§. 6.

Nonnulli exinde conceptionis & graviditatis signum desumunt, quando post coitum partes seminæ genitales sicca deprehenduntur; Inquit enim Aristoteles *Histor. Animal. Lib. VII. cap. 3. fol. 434.* Indicium est, mulierem jam concepisse, cum statim a coitu locus siccescit. Quam partium siccitatem inde dependere statuebant veteres, quando semen virile post coitum non iterum efflueret, sed pro fœtus materia & formatione in utero retineretur. Unde Hippocrates de Genitar. Oper. Sect. III. fol. 12. inquit:

a Siccitate
partium ge-
nitalium.

Post coitum siquidem mulier minime conceptura sit; semen ab utrisque emissum, pro more, foras cum volet, profluet; quod si conceptura sit, semen minime profluit, sed in ipso utero manet. Et *fol. 13.* inquit, quod si mulier partum aliquando experta fuerit & animadverterit, quod genitura non exciderit, sed intus remanserit, sciet, qua die conceperit. Sic quoque se res habet. Item Galenus *de Semin. Lib. I. cap. 2. fol. m. 126.* non modo ex aliorum relatione sed propria quoque experientia & observatione docet nullum animal ex his, quæ semen excernunt, concipere se deprehendisse, & omnia, quæ continent, gravida fieri vidisse. Signum etiam graviditatis judicatur, si obstetricis manus pudenda contingens non solum sicca offendat, sed matricis quoque collum angustum & clausum, & matricem sursum retractam vid. *Casp. a Reies Quæst. 49. n. 3. p. 606.* Secundum verba Nicolai Venette *de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 3. p. m. 364.* on a lieu de croire, qu'une femme a conçu, lorsqu'après s'être divertie avec un homme, elle demeure sèche, & qu'elle ne rend point ce qu'elle a reçu, & qu'avec cela un homme se retire sans être beaucoup humide. Et *p. 371.* ait: il y a de signes, qui nous rendent plus certains, que les signes de l'urine, de la grosseur d'une femme, car la sécheresse de ses parties après les caresses amoureuses n'est qu'une conjecture. Ex hac partium genitalium post coitum humectatione concludit Fridericus Ruyschius, virile semen materialiter ad conceptionem concurrere; vid. *Thesaur. Anatom. VI. p. m. 16.* quo loco scribit: Cum consideramus, mulieres affirmare, sese (si non semper, saltem ut plurimum) factas esse gravidas, aut concepisse, cum sentiunt semen maxima parte remansisse in utero, & contra in coitu improlifico semen exitum sibi quærere, percipiant: Quid hinc aliud concludendum, quam quod non solum aura feminalis, verum etiam substantia ipsa ad conceptionem sit necessaria. Dixerit forsan aliquis, reperiri mulieres, quæ dicunt, sese concepisse, quamvis semen non retinuerint, Resp. credibile esse illas saltem

tantum

tantum retinuisse seminis, quantum requirebatur ad conceptionem prolificam, de qua materia alibi egimus.

§. 7.

Huc pertinet etiam stricta orificii uteri interni clausura. Si quidem, teste Hippocrate *Aphor. 51. Sect. 5.* quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est. Juxta versionem Johannis Heurnii *p. 383.* Quæcunque sunt gravidæ illis os uteri connivet: quo loco hanc addit rationem: ne aer subeat & semen corrumpat, uterique ne calor evanescat, quo utitur potissimum ad foetus conformationem, si scilicet conniveat sine dolore & renixu &c. Hinc ait Ludovicus Bonaciolus *de fæt. format. cap. 4. p. m. 248.* Mulieris utero gravis vel præcipuum indicium est, quoties obstetrix perspicaci intelligentia, salutarem digitum submittens, vulvæ os pertingens concretum, obseptum ac denique sigillatum noverit. At quum hac oris arctatione & uteri moles quæpiam præter naturam indicari possit, ejus rei discretionem scabricie internoscas. Nam per graviditatem tenerum & molle extat, & modum naturæ modicum observat. Quibus vero inflammatio duritudine sua id infestaverit, duriusculum persentitur. Sic Fortunato Fideli *de Relat. medic. Lib. III. Sect. 4. cap. 2. p. 411.* secundum graviditatis signum est, si internum uteri os arctissime claudatur: ne quid nimirum seminis inde excidat. Ita enim illud prægnationis tempore connivet, ut ne styli quidem mucronem recipiat: nam & Galenus (*l. 3. cap. 3. de N. T.*) retentricis, inquit, virtutis opus est, prægnantium uteros undique contrahere: ut non immerito contrectantibus obstetricibus os earum connivere videatur. Jam vero pergit Fortunatus Fidelis, prægnantes ipsæ primis diebus, potissimumque eo momento, quo semen est conceptum, moveri, ac in seipsum concurrere uterum sentiunt. Quod si ambo hæc incidunt; ut & os uteri citra phlegmonem, aliumve affectum conniveat, & sentiatur deinde succedere uteri in seipsum motus, jam semen a mare coepisse, se mulieres existimant & retinere censent.

Atque hoc ego signum, ut verum, ita observatu difficile esse arbitror: non enim semper promptum est, ut obstetrix, immisso digito, interni oris dispositionem explorare satis possit. Et quamquam scio, medicos omnes in exploranda gravidatione rem omnem obstetricibus committere solere: quæ nimirum digiti testimonio de re ipsa certiores fiant. Attamen nequaquam id mihi semper est satis: etenim pudendi muliebris longitudo longe cujusvis digiti longitudinem excedit: quare difficulter ad internum uteri os pervenire illum unquam crediderim. Advertit hoc etiam Galenus (*l. 5. Aph. 51.*) aitque, maximum quidem esse mulieris, quæ concepit, indicium, si obstetrix potuerit, immisso digito, os uteri tangere. Ergo quia difficultatem agnovit, prudenter adjecit, si obstetrix potuerit. Cæterum, fateor tamen, si femina, dum supina jacet, coxas sursum elevet, cruribus interim demissis: aut si etiam cervice, manibusque terræ innixis, clunes sustollat; hoc situ ad exteriora uterum plurimum converti: & exploranti fieri promptiorem: ut hac ratione non inutile, obstetricis tangendi studium esse putem. Atque hoc etiam est, quod Lucretius (*Lib. IV. in fine*) talem feminæ positionem ad faciliorem seminis in uterum ingressum commendat:

- - - - - Nam more ferarum,
 Quadrupedumque magis ritu plerumque putantur
 Concipere uxores: quoniam loca sumere possunt
 Pectoribus positis sublatis semina lumbis &c.

Et Dominicus Panarolus *Iatrolog. Pentec. III. Obs. 20. p. 78.* ait: Gravidarum signa incerta sunt omnia, fallacia & varia principio-gestationis. Unum tantum post longas observationes a nobis factas habuimus, videlicet uteri clausuram, quæ digito immisso ab obstetrice diligenti & docta in anatomica sectione, in mulieris vulvam, cognosci poterit; si enim uterus refferatus est, foveam quandam parvam, vel sinum parvum rotundum in digiti extremo persentiet; si vero clausus sit uterus, nulla fovea, nullus sinus

tangitur. Sed advertendum insuper est, aliquas, non omnes, mulieres primo & secundo mense, etiamsi utero gerant, tamen os uteri clausum omnino non habere: sed elapso secundo mense postmodum clauditur, & facillime cognosci poterit ab ipsamet muliere, præcipue si fuerit ex numero earum, quæ iudicium & ingenium aliquod habent. Secundum Theodor. Zwinger. *Theatr. Prax. med. Part. prior. p. 437.* uteri cervix in principio imprægnationis percipietur longa & arcte clausa, in progressu nonnihil brevior evadit, in fine tandem, appropinquante partu plana valde, & quasi una cum utero rotunditas globosa redditur. De hoc signo ita scribit Henricus a Deventer *Art. Obstetric. cap. XV. p. m. 54 seq.* Volunt quidam, primo post conceptum bimestri imprægnatum uterum arctissime claudi, unde magis acuminatus, durior & solidior evadit; neque tamen scirrhusa durities illa est, quæ facile a naturali duritie vel solida substantia potest discerni: Forma simillimum senties tum os uteri rostrato catuli recens nati; ad hanc mutationem probe discernendam exercitatissima manus requiritur, quam tamen nonnunquam adhuc falli posse opinor. Interjecto autem tempore, quo magis infans accrescit partusque appropinquat, eo brevius, planius atque tenuius fit uteri jam intumescantis orificium: hoc autem facile dignosci potest, in feminis maxime, quibus frequens est facilis partus; his enim os uteri eousque complanatur, mollescit & attenuatur, ut plerumque sexto vel septimo post imprægnationem mense dehiscere incipiat, ex quo foetum moventem licet persentire; id quod certissimum & infallibile imprægnationis argumentum est. De quæstione, an in gravidis os uteri exacte claudatur, nec ne? ita scribit Regnerus de Graaf *de Organ. Mulier. cap. 8. p. m. 236.* Spigelius *Lib. VIII. cap. 23.* confidenter scribit, uteri os interius gravidis hiare, tantoque magis, quanto sunt partui viciniore: cujus opinionem etiam confirmare videtur Hippocrates *Sect. V. Aphor. 51.* quæ uterum ferunt, iis os uteri connivet. Quem locum alii aliter interpretantes,

tes, uterum accuratissime claudi statuunt: Sed ut nostram de hac quæstione sententiam paucis exponamus, dicemus, utramque sententiam maxima probabilitate niti: Hiat enim, quatenus primis gestationis mensibus eandem apertionem servat, & clauditur, quatenus materia instar glutinis viscida quam accuratissime obturatur, nec etiam inficias ibimus, os illud postremis gestationis diebus paulatim magis & magis dilatari, quandoquidem illud explorasse se digitis suis cum Spigelio nobis obstetrices affirmaverunt. Juxta Michael. Ettmüller. *Oper. Vol. II. fol. 1073.* in mulieribus non gravidis, dum percutiuntur cæstro libidinis aut fricantur genitalia, aut furore vexantur genitalium, orificium uteri internum solet hiscere instar pisi; foveam enim quasi quandam repræsentat, uterus non clausus; & si non concepit, efformat circa orificium foraminulum, *ein klein Grübgen, wie eine aufgehende Nelcke*: quod si vero firmiter claudatur, post factam scilicet conceptionem, nulla fovea aut sinus tunc reperitur. Et hoc signum fere ex primariis habetur. In gravidis etiam uteri vaginam admodum elongari talemque elongationem in exploratione indice facta inter graviditatis signa haberi, docet Fridericus Ruyschius *Thesaur. Anat. 8. p. m. 9 seq.*

§. 8.

Horror,
lassitudo
&c.

Porro ab hac uteri ejusque orificii interni contractione in feminis gravidis paulo post conceptionem, horrorem seu horripilationem, incalescientiam, gravitatem seu lassitudinem & alia symptomata oriri, docent autores; Inquit enim Hippocrates *de Carnib. Oper. Sect. III. fol. 35.* Liquido constat, harum rerum peritis, quod mulier, ubi concepit, statim inhorrescit & incalescit ac dentibus stridet, & articulum reliquumque corpus convulsio prehendit, & uterum torpor, idque iis, quæ puræ sunt, accidit &c. Secundum verba Nicolai Venette *l. a. p. 364.* au mesme temps, qu'une femme a conçu, ressent comme de petits frissons semblables à ceux, qui nous arrivent après avoir mangé. Elle souffre quel-
que

que fois des foibleſſes & des evanoüiſſemens, dans le moment, que la ſemence de l'homme eſt dardée vers le fond de ſa matrice, & qu'elle eſt receuë dans l'une de ſes cornes pour ſe joindre avec la ſemence de cette femme & y faire le conception. La matrice, comme ſi elle avoit de la joye d'avoir receu l'humeur, qui luy eſt propre, ſe reſerre pour la retenir, ce qui cauſe à la femme, je ne ſay, quel mouvement dans ſes parties naturelles, du quel elle reſſent du chatouillement & du plaſir; & fait, qu'elle recherche alors plus ardemment la compagnie d'un homme. Hoc ſignum etiam approbat Fortunatus Fidelis *l. a. p. 413 ſeq.* quod dum grvida ſit mulier, quidam horror per corpus, ſeſe utero contrahente, manifeſte ſentiatur, neque mirum ſit, ſi contracto utero, neque ex naturæ inſtituto ſeſe dimovente, totum etiam conſentiat corpus: nam uterus per nervos, quibus multis refertus eſt, & cerebro & toti corpori manifeſte conſociatur. Hinc autem rigoris ſenſus vix primum conceptionis diem excedit: diutius tamen durat exiguus quidam dolor circa umbilicum, atque hypogaſtrium: quem illæ præſertim experiuntur, quæ tunc primum prægnantes ſunt: quod ſi manum prementem ægre ferat mulier, ac dolor ob id ingraveſcat, hoc erit inter præcipua indicia, ſi quando exploranda ea eſt gravidatio, quam feminæ mentiuntur. Scribit etiam Galenus *de Semin. c. 2. Oper. Claſſ. I. fol. 126 ſeq.* Dixerunt mihi mulieres, ubi ſemen conceperint, quandam ſe in vulva motionem ſentire, quæ quaſi convellat, ac paulatim in ſe illam contrahat. Vulvam in conceptione ad ſeſe attrahere ſemen illud complecti ac continere dixit Plato. Id quod etiam viris ipsis non raro contingit evidenter percipere, cum cucurbitulæ medicæ inſtar attrahere intro membrum ſuum illas ſentiunt. Quod præcipue fit, cum modo ceſſarunt menſes, quo maxime tempore genituram uteri concipiunt. Andreæ Ottomaro Gœlicke *Med. forenſ. Specim. IV. p. 49.* ſignum pathognomomicum conſiſtit partim in ſubtili & exquisito ſenſu horridulo corpus percuſſante, quem

post congressum maritalem & factam inde conceptionem experiuntur suo in corpore mulierculæ, partim in singulari alteratione, sensum istum insequente cum veneris fastidio, & torpore corporis & animi insolito, ciborumque nausea. Sic juxta verba Michael. Ettmulleri *l. a. fol. 1074.* primis post congressum diebus subinde horror aut horripilatio quædam, aut vagus frigoris sensus, corpus seu potius corporis peripheriam sine manifesta causa pererrare percipitur: aut saltem ipsæ mulieres dicunt, se sentire, nescio quid? in corpore, *sie wissen nicht, wie ihnen im Leibe oder auf der Haut ist*: ut plurimum tamen ille frigoris, sensus & horror seu horripilatio percipitur post conceptionem.

§. 9.

*a mensum
suppressio-
ne.*

Ex menstrui quoque ordinarii emansione, sive retentione prægnantiam evidenter dignosci, veteres defendunt medici, & quidem ex ea ratione, quia ex superfluo hoc, sive menstruo sanguine foetus in utero materno non modo generari, nutriri atque augeri, sed postmodum etiam editi foetus nutrimentum sive lac exinde fieri vel præparari credebant. Quam sententiam ex recentioribus quoque non pauci defendunt; Gravitationis enim indicia exinde desumit Fortunatus Fidelis *l. a. p. 414.* quod menstruæ purgationes prorsus retineantur: cum inde nutriendus sit foetus. Atque hoc indicium etsi incertum plerumque est, si tamen illis, quæ legitime ante purgari solebant, repente ac sine alia causa supprimantur purgationes, magnum hoc fuerit prægnationis indicium, præsertim si cibi fastidium, nausea ac similia quædam accesserint. Quamvis etiam recentiores in sanguine menstruo neque foetus formationem, neque sustentationem quærant, ex ipsius nihilominus retentione in gravitationis signum desumunt. Inquit enim Nicolaus Venette *l. a. p. 366 seq.* Si les regles manquent à une femme sans qu'elle soit attaquée par des frissons, ou par une facheuse fièvre, que le ventre luy devienne plus plat & plus resserré, qu'auparavant; selon le proverbe des sages femmes,

en ventre plat, enfant y a, que principalement après avoir mangé, elle soit lente & qu' elle ne puisse se toucher le ventre sans douleur, ce sont aussi des marques de conception. De causa, cur gravidæ catameniis plerumque destituantur? prolixè ita scribit Gualterus Charleton *de Caus. Catamen. cap 2. p. 126 seq.* Cum ex provido naturæ instituto magna succi alimentaris copia in uterum dispensetur, in eum solummodo finem, ut quocumque tempore concepto foetui alimentum inde suppeditetur; cum in nondum prægnantibus succus ille tamdiu in tubulis uterinis sensim congestus restet, donec suo æstu effervescent ac in orgasmum erumpens, non solum illorum, sed & arteriolarum in iisdem terminatarum ostiola distendendo aperiat unaque cum sanguine foras extrudatur; cumque in prægnantibus idem succus neque unquam stagnet, neque (per consequentiam) æstuarè ac effervescent potest; indies enim exhauritur, & in foetus nutritum impenditur: his inquam, serio perpensis, nil mirum videri debet, quod in gravidis menstruæ purgationes cessare soleant. Talibus nimirum desunt catameniorum & materialis causa & efficiens: succi nempe nutritii redundantia & ejusdem effervescentia. Fieri quidem potest, nec raro contingit, ut mulieres in utero gerentes, primis præsertim duobus vel tribus a conceptione mensibus, consuetas patiantur purgationes. Id vero & semper cum permagno *ἐκπρωμαῖος* discrimine conjungitur, & præter naturæ leges contingit &c.

§. 10.

Post mensium suppressionem varia in prægnantibus oriuntur symptomata, a quibus nonnulli certa graviditatis signa petere solent; Inquit enim Fortunatus Fidelis *l. a. p. 415.* Quoniam puriorem ad se sanguinem trahit foetus, hinc multa etiam indicia de promas licet: nam (ut ait Hippocrates *Lib. I. de Morb. Mul.*) prægnans tota fit cum virore pallida, puriore sanguine quotidie in foetus alimentum destillante: Et cum paucus in corpore sanguis supersit, qui nimirum bonæ conditionis sit: ideo pallescit femina,

a symptomatibus ex oculis &c.

ac debilis redditur, hinc etiam saliva plenæ sunt: Ventriculo scilicet naturali colore aliqua ex parte destituto: item oris ventris morfus, ubique fastidium apprehendit. Et quia vitiosi succi etiam in habitum corporis ac cutaneas regiones sese diffundunt: ideo maculam quandam solarem in facie habere prægnantes observavit Hippocrates, nunc autem varos enasci sæpe videmus: itemque citrinas aut lividas maculas, vel lentigines quoque. Præterea distrahuntur etiam oculi & caviores fiunt: atque eorum candidum in lividius vergit, atque albedinis naturam non habent. Nec mirum est affecto utero consentire oculos, nam & in venerea delectatione manifeste illi immutantur atque languescunt. Et juxta Ludov. Bonaciol. *de Fæt. format. cap. 4. p. 246.* & ex hoc Casp. Bravo. de Sobremont. *Consult. med. Disp. Sect. V. p. 200 seq.* si nosse libuerit, an horda sit, diligenti adhibito examine cuncta hæc scrutabere: si a conceptu decimo sole aut ferius, prout magis minusve ex supervacua materia tentatur, capitis dolores inquieteque infestant, si supervenit caliginosa vertigo, oculorum tenebræ, aut hebetudo, pupillarum immutatio, ampliatio pupillæ, oculi cruore turgeant, si candicans particula amplior fiat vel flavescat, ocelli concaventur, palpebræ molliantur, aspectus sit ingratus, si inunctis medicamine oculis saliva inficiatur, si pannus rufæq; lenticulæ faciem deforment; si inter oculorum angulos & nares venæ sitæ conspicuæ magis appareant, si sub lingua vena virescat, si cervix calidior, tergus algidius, si colli venæ arteriæque extendantur & turgeant magis, si pectoris venæ nigricent ac tandem virides glaucæque reddantur; si mammæ obdurescant, extuberent, perdoleant; si papillarum color in ruborem demutetur; si merum, aut quæ libuerit algida res epota in mammas recto tramite calgore suo illa comitante) interea permeare videatur, dum sorbetur. Denique si in eduliis superveniat fastidium, pica, malacia aut depravatus appetitus, vomitus, ructus acidus, aut perturbatus pulsus; si ocysissime lætetur ocysissimeque tristetur mulier; si alvum

ac potissimum umbilicum tormina fatigent; si renum coxendicumque gravitas vexet; si ilia pleniora compareant &c. Eadem verba quoque habet Casparus a Reies *Camp. Elyf. Quæst. 49. n. 4. p. 606 seq.* vid. etiam Dav. Herlic. *de Curat. Gravid. cap. 3. p. 22 seq.* Inquit etiam Nicolaus Venette *de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 3. p. 364 seq.* L'on ne se contente pas d'avoir des signes communs, on fait encore quantité d'experiences à l'imitation de l'antiquité pour découvrir la grossesse d'une femme. Les uns frottent d'un rouge les yeux de celle, que l'on soupçonne grosse, & si la chaleur penetre la paupiere, on ne doute plus après cela, que cette femme ne soit enceinte: Juxta Michael. Ettmüller. *Oper. Vol. II. fol. m. 1074.* primis mensibus gravitas capitis & vagæ vertigines, imo sæpe etiam dolor dentium, admodum molestus, & similia superveniunt. Item mulieribus, imprimis, quæ aliququaliter sunt cacochymicæ, vel quæ inclinant ad scorbutum, facta conceptione, superveniunt sæpius hyfterici dicti affectus, licet alias nunquam fuerint obnoxia huic passioni: adeo ut gravia abdominis tormina cum respiratione non nihil impedita, ac superveniente vomitu & simili, post partum e contra nihil de affectibus hisce patiantur: Idque præsertim fit circa primos tantum menses, quæ tamen symptomata postmodum circa medium gestationis tempus sponte cessant. Ibidem loci dictus autor alia adhuc symptomata successive succedere ait, & quidem circa stomachum ac digestionem: nempe primo appetitus est dejectus, hinc vomitus omni mane, adjunguntur picæ, fastidium alimentorum, in specie carnis, & nausea ingens esculentorum alias consuetorum, ita ut ne quidem odorem carnis, imprimis coctæ, subinde perferre possint, *wenns Bier nicht schmecket.* In locum hujus appetitus ordinarii deperditi, succedere solet pica & appetitus plane insolitus aut intensior circa esculenta ordinaria. Hæc symptomata mox primis mensibus superveniunt, non ob sanguinem menstruum retentum aut plethoram, hinc incusandam, ut vulgo existimant, sed pro-

pter motum fermentativum menstruum humoribus adhuc impressum &c. Juxta Roder. a Castr. *de Morb. Mulier. Lib. III. cap. 17. p. m. 413.* prioribus tribus mensibus solent fieri utero gerentibus vomitiones, nausæ, picacei appetitus, ventriculo cum utero consentiente: tumores vero pedum lividitates & alia hujuscemodi non ante quartum aut quintum &c. Liceat etiam ex Valesc. de Tarant. *Philon. Pharmaceut. Lib. VI. cap. 16. p. m. 690.* sequentes Ægidii versus annectere:

Matrix sicca, venus sopita, retentio fluxus,
 Discolor affectus, vomitus, compressio virgæ,
 Mammæ grassities, & perturbatio ventris
 Ex melicrato: conceptus signa probantur.

Hæc & alia symptomata refert etiam Nicolaus Venette *l. a. pag. 367 seq.* les regles, inquiens, retenues pour la generation luy causent ordinairement des amertumes de bouche, des rapports âpres ou aigres, des eblouissemens, des langueurs, des lassitudes, des douleurs de teste & de reins, de chagrins ou des transports de joye, dont elle ne fait pas elle-mesme la cause, des taches au visage ou dans quelque autre lieu du corps, des assoupissemens, enfin, le plus souvent un appetit deregle, car il s'en est veu, qui ont mangé des charbons, de la cendre &c. v. etiam Bartholin. *Perdulg. Univ. Medicin. Lib. I. Physiol. Sect. V. cap. 5. p. 113 seq.* Quamvis autem juxta modo allegata Ettmülleri verba, ex gravidarum circa primos menses odontalgia nonnulli certum conceptionis signum desumant, imprimis cum dolor dentium circa illud tempus vulgo spes gentium dicatur atque inter conceptionis signa numeretur; contrarium tamen probat Johannes Ludovicus Hannemannus *Act. Hassniens. Vol. III. Obs. 17. p. 30.* inquiens: Uxor mea hac dentium tortura, plurimum, quando non gravida est, laborat, gravidæ facta, dolor hic evanescit, neque prius redit, quam quando peperit.

§. II.

Alia adhuc pro meliori conceptus cognitione experimenta *a mulsa.* alii commendant, ipse scilicet Hippocrates *Secl. V. Aphor. 41.* inquit: Mulierem si velis cognoscere, an prægnans sit, ubi dormitura est, (incoenata,) aquam mulsam bibendam dato. Et siquidem tormen habeat circa ventrem, prægnans est: si vero minus, prægnans non est. Est autem mulsa vel mulsum mixtura ex melle & aqua, vel vino vid. Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. fol. 91.* Johannes Michael Savonarola *Pract. canon. de Urin. Rubr. 10. pag 688.* inquit: Mulierem si vis scire si conceperit, melicratum da ei bibere, verbi gratia R. Aqu. pluvial. ℥ viij. Mell. ℥ iiij. bulliant ad consumptionem tertiæ plartis. Et cum mulier vadit dormitum, da ei bibere uncias sex. Si itaque sentiat dolorem fortem & torsionem in ventre, judicium erit de imprægnatione: si vero non, non. Et Theodorus Zwingerus *Theatr. Prax. medic. Part. prior. p. 437.* ait: nonnulli medici ex Hippocrate didicerunt, feminam, si cubitum itura cochleare plenum mellis in aqua pluviali solutum deglutiat, ac postridie mane nausea, vomitu, torminibus atque tensione abdominis affligatur, certo gravidam esse. Juxta Nicol. Venet. *l. a. p. 365.* il y a, qui donnent à la femme, que l'on soupçonne grosse, à boire cinq ou six onces d'hydromel simple ou anisé, en se mettant au lit, & ils jugent de la conception par les trenchées, que cette boisson cause à la femme. D'autres luy donnent encore une ou deux onces de suc de Seneçon melé avec un peu d'eau de pluye, & s'imaginent, qu'elle est grosse, si elle ne la vomit point. Sequentia conceptionis signa refert Petrus Bayrus *Venimec. Lib. XV. cap. 4. p. 434 seq.* Si capitella mamillarum suffusa & amplexata videantur, ipsa quoque colore variato, oculis profundis, acie oculorum acuta, albugine plena atque turgida: hæc prægnantem declarant. Item, extrahantur ex dextro latere mulieris duæ vel tres guttæ sanguinis & positæ in aquam fontis vivi, si petant fundum, signum est, quod conceperit: si vero non,

non

non concepit. Mulier in lecto resupina jacens, si ambas manus extendat super ventrem lateraliter ab umbilico diligenter, attendens, si prægnans est, sentiet sub manibus ejus motum quasi araneæ transitum & percussione, etiamsi ex modico tempore esset prægnans. Cui experimento contradicit Casp. a Reies *l. a. p. 607.* Aliis conceptus facti signis, apud autores legendis, solum addit Johannes Jacobus Franciscus Vicarius *Bas. Univers. Medicin. Lib. I. cap. 3. p. 31.* quod mulieres a conceptione facta non raro insigniter toto corpore alterari videantur, eo quod non tam sanguis, quam etiam spiritus multum (forte etiam a cicatricula ovarii, & devolutione ovi maturi foecundati subsequente) alterentur a semine virili, non mutuus & corporeus omnino feminum amplexus fiat, necesse est, sufficit tamen etiam, si spiritiuosa pars communicatur.

§. 12.

ab urina.

Sicuti etiam in omnibus fere morbis tum medici, tum medicastri certum sibi signum ex urina promittunt, ita pariter ex eadem imprægnationem dignosci posse statuunt. e. g. Johannes Fernelius *Patholog. Lib. VI. cap. 17. p. m. 205.* inquit: Urina citreo aut sublivido est colore, crassiuscula ac subturbida, quæ leviter concussa bullulas vel granula e summa corona demittit: in hac quod per quietem subsidet, innatatve, crassiusculum est & male cohærens, carptæ lanæ non absimile: Urina vini albi permistione similis evadit elixarum fabarum juscule. Juxta Lud. Bonaciol. *de Format. fœt. cap. 4. p. 251.* lotium alii triduo vitreo vasculo apprime obsepto in umbra asservari volunt; exinde perpurgato linteo subcolari. Quod si minutissima animalia pediculis similia in eo offenderis, conceptum plane præmonstrant: quæ si rufa extiterint, marem, candicantia, feminam indicant: Simili modo & acum æreo malluvio matulave urinæ collectæ per noctem infundunt, quæ simul atque pernoctaverit, si minutissimas notulas (orbiculorum instar) puniceas contraxerit, mulier gravida est: sin ærugo incesserit, minime. Sunt qui chalybeam novam acum patinæ no-

væ ligneæ infigunt, atque urinam feminæ superfundunt, cumque dein nubecula quædam acui adhærebit, prægnantem esse audacter pronunciant. Idem significari volunt, quando similis acus in lebetæ aurichalceo per noctem urinæ feminæ immerfa, nulla vel rubigine vel nigredine tingitur, sed non nihil rubella deprehenditur. vid. Theod. Zwinger. *Theatr. Prax. med. Part. I. p. 436 seqq.* Eadem signa Nicolaus Venette *l. a. p. 365 seq.* sequentibus verbis describit: Il y a, inquit, qui font diverses experiences sur l'urine. Ils considerent cette liqueur dès qu'on la rend, & après l'avoir trouvée trouble & de couleur de l'écorce de citron meur avec de petits atomes, qui s'y elevent & qui y descendent, ils disent, qu'elle a conçu. D'autres laissent l'urine, pendant la nuit, dans un bassin de cuivre, où l'on a mis une eguille fine, & s'ils observent le matin quelques points rouges sur l'éguille, ils ne doutent plus de la grossesse. Quelques autres prennent parties égales d'urine & de vin blanc, si l'urine, après avoir esté agitée, paroist semblable à du bouillon de fèves, ils assurent, que la femme est grosse. Les autres laissent pendant trois jours reposer à l'ombre dans un vaisseau de verre bien bouché l'urine d'une femme, & après l'avoir coulée par un taffetas clair, s'ils rencontrent de petits animaux sur le taffetas, ils ne font pas difficulté d'affirmer, que la femme est grosse. Sequentia communicat Rodericus à Castro *de Nat. mulier. Lib. III. cap. 7. p. 124.* ex lotio fieri etiam posse de uteri gestatione judicium, sunt qui credunt, ductore Avicenna; alii existimant vana hæc & commentitia plane esse, quia talia imprægnationis signa Hippocrates & Galenus non adduxissent. Cæterum cum in venis & sanguine mulieris magnæ etiam permutationes per conceptum fiant, aliquando nos certi aliquid ex earundem lotio elicere posse, non est omnino rationi dissentaneum. Prolixe etiam de coloribus urinæ prægnantium agit Johannes Michael Savonarola *Pract. Canon. de urin. Rubr. 10. p. m. 685 seq.*

§. 13.

a varicibus &c.

Post priores quatuor graviditatis menses alia adhuc superveniunt symptomata, ex quibus nonnulli non sine ratione certiora prægnantiæ signa deducunt. A superfluo enim antequam conceptionem menstruo tempore ordinarie evacuato, tunc autem retento sanguine vasa sanguifera hinc inde magis magisque expanduntur, ut quibusdam in locis sanguis ipse stagnet, vel ex eodem serum vel alius liquor secernatur, indeque in gravidarum pedibus & cruribus modo varices, modo etiam, imprimis in gemellos gerentibus, tumores ad partum usque appareant. Insuper etiam in mammis sensim indurescentibus tumor dolorosus, demumque lactis secretio seu elaboratio atque effluxus a prægnantibus observatur; & in ipso gravidæ utero atque abdomine, a medio prægnantiæ tempore indies fere increscens, ipsiusque intumescencia foetus primo lentus sensimque auctus motus in utero materno, ab ipsa matre sentitur, ab adstantibus autem admota manu explorari potest.

§. 14.

a sanguine & pulsa.

Quod autem modo de sanguine dixi, idem confirmat etiam Nicolaus Venette *l. a. p. 367.* Le sang, inquit, qui croist tous les jours dans les venes d'une femme grosse, pour l'usage de l'enfant, qui en a alors plus de besoin, leur apporte plusieurs petites desordres, qui nous instruisent de l'estat, où elles sont. Il se jette sur la gorge, & leur cause, aux unes plutôt, & aux autres plus tard, des douleurs, & de duretés aux mammelles, lorsque le lait commence à s'y former, & que le mammelon avec son cercle devient rouge aux blanches, & noir aux brunes. Leur voix commerce alors à devenir plus grosse par la chaleur naturelle, qui se multiplie, & leur salive est plus abondante: car on n'a jamais guère vu de femmes grosses, au moins de celles, qui jouissent d'un embonpoint, qui ne fussent de grandes cracheuses. Il paroist mesme aux jambes & aux cuisses des plus sanguines des veines enflées de
diverse

diverse couleur, que nous appellons varices, car on les remarque bleuës aux blanches & noires aux brunes, par la varieté de leur temperament. De pulsu etiam gravidarum, ita scribit idem autor p. 369. si l' on observe le pous des femmes grosses, on trouve qu' il est beaucoup plus prompt & plus eslevé, que dans un autre temps, aussi ont-elles alors du sang & de la chaleur avant que deux personnes, & des medecins peu experimentés à toucher le pous de ces femmes s' imagineroient aisement, qu' elles ont la fievre.

§. 15.

Ex mammis lacte turgentibus desumptum graviditatis signum ^{a lacte & mammis.} non solum obstetricibus, sed nonnullis quoque medicis adeo fir-
mum videtur, ut in quacunque femina lac repererint, eandem vel adhuc gravidam esse, vel proxime ante peperisse statuunt. Cui sententiæ affirmativæ favere videtur Aristoteles *Histor. Animal. Lib. III. cap. 20. fol. m. 383.* nulli, inquit, fere animalium lac fieri solet, antequam uterum ferat. Quem Aristotelis locum explicans, Jacobus Hasebardus scribit: videte, quam arcte hæc philosophus inter se conjungat, lac generari & uterum ferre, ut vel invitatus quis statuat necesse, lac ut verum conceptionis sit κριτήριον, ita & læsæ virginitatis esse signum. vid. Thom. Bartholin. *Cist. Medic. Locul. 23. p. m. 243.* Idem Hasebardus *l. a.* verba Hippocratis: ἐν τοῖσι τῶν θοῶν γάλα ἐκ ἐκγίνεσθαι, in mammis lac nullum generatur, ita explicat: perinde est, quasi diceret; si cuiquam mulierum uterum intumescere videas, neque alia conceptionis indicia appareant, mammillas illius, an lac habeant, explora; id si expresse-
ris, uterum eam ferre, verum est argumentum, sin minus, nihil præter molam. Et secundum Andr. Laurent. *Histor. Anat. Lib. IX. Quest. 2. fol. 341.* lactis generatio certissimum est Hippocrati veræ conceptionis signum; hincque vulgares logici conclusiones suas hauserunt; Lac habet, ergo peperit, aut saltem cum viro rem habuit. Secundum Baldum, femina præsumitur esse prægnans, si habet lac. vid. Henric. Kornmann. *de Virginit. cap. 9. p. m. 43 seq.*

quo loco ipse autor eandem sententiam fovet, amplius, inquires, haud virgo censenda, in cuius uberibus lac invenitur, dura etenim & tenuia virginum ubera esse convenit. Indicium enim esse putant corruptæ feminæ, gravidæ aut puerperæ, si lactarias habet mammæ. Lactaria enim mammæ certum dicuntur indicium, corruptam esse feminam & gravidam, & puerperam, nec amplius virginem; cum lactis effectus sit defloratæ, vitiatæ & gravidæ feminæ aut puerperæ. Ab aliis quoque jureconsultis lac in mammillis & earum tumefactio pro signo graviditatis habetur, vid. Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Quæst. 1. n. 20. fol. 88.* quo loco etiam Georgius Francus plures autores allegat. Secundum Joh. Bened. Sinibald. *Geneanthrop. Lib. IV. Tr. 2. cap. 6. p. 465.* non solum lac in virginum mammis collectum, sed mammæ ipsas nimium protuberantes volunt multi deflorationem attestari, illud quidem scientifice, seu demonstrative, has vero contingenter & probabiliter. Nituntur autem non alia ratione probare ac fulcire sententiam, quam ipsa rei experientia, qua, ut ajunt, manifeste apparet, neque lac in mulieribus, neque earundem luxuriosas fieri mammillas, quamdiu penis expertes existunt & ab omni viro- rum voluptuoso commercio & familiaritate vivunt alienæ. Mammæ etenim tunc extuberare ajunt, cum in venereis amplexibus attrectantur lasciveque tentantur; & ratio est in promptu, quoniam lasciva manu prolectantur ad mammæ & spiritus & sanguis, quibus luxuriari contingit easdem. Lac vero tunc solum congeri existimant, quando uterus incipit femine respergi: & ratio peti potest ex eo, quo manifestum est, nullas omnium animalium feminas ante coitum, immo etiam ante conceptionem vel partum lac in mammis gestare.

§. 16.

ab Uteri
intumescen-
tia.

Maximum etiam prægnantiæ signum ab uteri intumescencia vulgus atque obstetrices desumere solent, imprimis cum nulla detur gravida femina, cui non ultimis mensibus uterus cum abdo- mine,

mine, ob foetus & placentæ quotidianum incrementum magis magisque intumescat, quanquam in nonnullis etiam feminis talis tumor circa medios gestationis menses observetur. Siquidem in S. Scriptura *Genes. cap. 38. vers. 18 & 24.* juxta versionem vulgatam legimus, quod Thamar ad unum coitum conceperit, ipsique post tres menses uterus intumuerit. Verba autem sic sonant: Ecce autem post tres menses (a coitu) nunciaverunt Judæ dicentes: Fornicata est Thamar nurus tua, & videtur uterus illius intumescere. Quod B. Lutherus reddidit: *Deine Schnur Thamar hat gehuret, dazu siehe, sie ist von Hurerey schwanger worden.* Talem abdominis intumescentiam ad prægnantiam & partum præsupponit etiam adolescens quidam, Dinarchus, apud Plaut. *Truculent. Act. I. Scen. 2. p. m. 818.* inquiens:

Quid ais tu? quæ nunquam fuit prægnans, qui parere potuit?

Name equidem uterum illi nunquam extumere sensi.

Et juxta Casp. Brav. de Sobrem. *Consult. med. Disp. apolog. Sect. V. Resolut. 8. p. 198.* idem confirmat communis experientia, quæ nobis in prægnantibus commonstrat ventris intumescentiam, convincit ratio: quia cum superaddatur in augmento foetus nova causa, ut venter augeatur, illius augmentum signum manifestum debet judicari foetus & prægnantiæ. Juxta Johannis Juncker. *Conspect. Medicin. Tab. 112. p. 699.* est ventris intumescentia non complanata nec inæqualis, sed globosa, & præcipue circa umbilici regionem summitatem hæmi sphærii efformans. Placidum & successivum hujus intumescentiæ augmentum, pedibus a tumoribus liberis: rarissime enim morbidus tumor in abdomine directe incipit. Inquit etiam Michael Ettmüllerus *Oper. Tom. I. fol. m. 593.* Sunt qui instituunt *δοκιμασίαν*, pro cognoscenda femina, si habeat tumidum abdomen, an gravis sit, vel non; propinant enim haustum vini, infusum per diem & noctem super quatuor vel quinque baccas lauri, & dicunt, quod, si vomat, sit signum, quod sit gravis; si vero non vomat, illam non esse gravidam perhibent. Hy-

dropica quædam femina, cum in utero & circa uterum turgentia quædam cum gravitatis sensu oriretur, decepta est, ut se conce-
pisse putaret, & eo magis, quia venter ab umbilico infra extende-
batur, quod præ ceteris uti certæ gravidationis signum a multis
statuitur, juxta Georg. Franc. *Annot. in Paul. Zacch. Quæst. med. leg.*
Lib. I. Tit. 3. Qu. i. n. 17. fol. 87.

§. 17.

ab Uteri
& fœtus
motu.

Certissimum denique graviditatis signum tam ipsæ prægnan-
tes & obstetrices, quam medici a fœtus in utero motu sibi promit-
tunt. Inquit enim Johannes Fernelius *Patholog. Lib. VI. cap. 17.*
p. m. 205. postremum & minime fallax indicium est, quum jam fœ-
tus loco dimoveri cœperit, quod vel tardissimum accidit medio
prægnationis tempore. Moveri autem incipit, non ut mola, gra-
vi molestoque pondere, non rugientis aut evagantis flatus specie,
sed leni, blando ordinatoque impulsu, aut quasi muscæ volatu,
quem sæpe calens manus imposita animadvertit. Johannis Jun-
ckeri verba *l. a.* hæc sunt: Motus fœtus circa vigesimam circiter
septimanam contingens luculentissimum est signum, modo a bor-
borygmis & aliis flatulentis volutationibus perite distinguatur,
sensu scilicet sub hypogastrico altiore. Dissimulante autem matre,
manus aliena, bene calida tepido ventri, vel frigida calenti im-
posita motum quidem fœtus aliquando percipere, rem tamen cer-
tius definire non potest. Sic etiam in tali casu femina quædam
perita, oculari ventris inspectione, majorem vel minorem proba-
bilitatem detegere valet. Et Michael Ettmüllerus *Oper. med.*
Part. II. fol. m. 1074. scribit: Circa medium gestationis tempus
tertio & quarto mense percipitur motus infantis, isque modo in
hac, modo in ista parte, præsertim quarto, aut in principio quinti
mensis; qui motus est in principio saltem obscurus & subsulto-
rius, successive tamen magis fit manifestus. Secundum Nicol.
Venett. *de la Generat. de l'homme p. 368.* après tout, l'un de signes
les plus assurez, qui non peuvent decouvrir la grossesse d'une
fem-

me, c'est le mouvement de l'enfant; car si l'on met la main sur son ventre, & qu'on l'y tiene fort long-temps, l'on s'apperçoit, vers le quatrieme ou le cinquieme mois, d'un mouvement doux, & sur la fin de la grossesse d'un mouvement un peu plus fort, qui vient de haut en bas, & vers le devant du ventre de la femme, quand elle est couchée. Le fardeau ne se meut point de la sorte, il suit le mouvement du corps, & il tombe comme du plomb du coste, qu'il se panche. Les vents ont aussi un mouvement different. Ils se font sentir inegalement tantost d'un costé & tantost de l'autre, & leur mouvement ne se fait pas vers le devant du ventre, comme dans une veritable grossesse, mais on le sent le long de boyaux, quel'on entend quelque fois gronder.

CAPUT II.

De dubiis contra hæc signa.

§. I.

OMnia tamen hucusque ex autoribus recensita graviditatis signa aliis minime sufficientia satisque robusta, quartove modo prægnantiæ propria, sed incerta saltemque probabilia judicantur, quorum rationes eadem serie adducemus. De maris enim atque feminæ ad generationem apta ætate aliisque dispositionibus & circumstantiis non semper ab externo aspectu judicari potest; siquidem multi, alias satis robusti, eorumque partes genitales externæ ad opus matrimoniale optime constitutæ videntur, quorum tamen omnis labor atque conatus, ex alia & invisibili impotentia causa, plane frustraneus est; & ita pariter de feminis, in quibus quandoque occulta sterilitatis causa latet. Deinde dolor compressivus & contorquens, quem a feminis in coitu circa ovariorum tubarumque regionem sentire posse nonnulli statuunt, in actu venereo ob ejusdem dulcedinem vix attenditur.

*Contra
externam
constitutionem.*

§. 2. Quod

§. 2.

Dubium
contra si-
gnum a sic-
citate par-
tium geni-
talium.

Quoad graviditatis signum ex partium muliebrium genitalium siccitate & humiditate desumendum, responderi potest, quod licet, secundum Aristotelem, statim a coitu feminæ locus siccescere dicatur, ut plurimum tamen, secundum Fortunat. Fidel. *de Relat. medic. Lib. III. Sect. 4 c. 2. p. 411.* labitur & defluit semen: quod quidem si in septimum diem intus permaneat, conceptum jam esse, certum est: nam quæ effluxiones vocantur, infra tot numero dies fieri solent. Quare necessaria hæc fuerit prægnantium affectio, quamvis non ita ab omnibus deprehensa: Ergo hætenus incertum etiam hoc signum fuerit: eoque magis, quod Hippocrates morbosas aliquas uteri constitutiones meminit: in quibus & contineri genituram, & nullam tamen prægnationem resultare ait, stomacho scilicet uteri præter naturam hiantes: unde & plures menses, quam convenit, & humidiores prodire affirmat: quapropter & id, quod a femina prodit semen, ad foetificationem non concipitur: & uteri genitura insuper accedens corrumpitur. Et Paulus Zacchias *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Quæst. 1. n. 46. fol. m. 91.* inquit: etiamsi vulva a concubitu sicca remanens fidem facere possit jam celebratæ conceptionis, scimus tamen, conceptionem non nisi tunc vere posse dici factam ex Hippocrate, cum semen in uteris septem diebus permanserit: plurimis enim ac pluries uterus a coitu siccus remanet, & semen quidem attractum retinetur, quod tamen non multo post foras prolabitur. Causa autem, cur partes genitales muliebres, juxta veterum sententiam, post coitum foecundum credantur siccae, post infœcundum autem humidæ, absque dubio hæc est, quod imprægnationem a seminis virilis in uteri cavitatem injectione ejusque cum femine muliebri, sic dicto, ibidem facta commiscela derivarint, sicque semen virile, tanquam foetus materiam, pro congressu foecundo in utero manere autumarint. Quamdiu proinde hoc semen post coitum in utero maneret, tamdiu etiam feminæ partes genitales depre-

deprehenderentur siccae; simulac vero semen hoc iterum elaboreretur, tunc etiam ab ejusdem effluxu dictae partes irrigarentur. Cum vero, secundum recentiores physiologos, viri semen ad in-gravitationem non materialiter, sed potius virtualiter, sive per vim plasticam sive spiritum vitalem in femine latentem, concurrat, atque rarissime substantialiter in uteri cavitationem injiciatur; sed plerumque in vagina uteri per tempus remaneat, interdum etiam paulo post cohabitationem iterum prolabatur; sane dubitandum non est, ipso coitus momento per spirituosam rejecti seminis partem ovulum in ovario imprægnare posse, ut adeo nihil referat, sive semen hoc citius sive serius ex uteri vagina relabatur. Deinde quoque notum est, liquorem a feminis post cohabitationem excretum, non solum viri vel feminæ semen esse, sed commisceri simul serum quoddam, ex glandulis dictæ vaginæ, ejusque lacunis exsudans, quod non modo in ipso congressu, sed aliquando etiam a lasciva recordatione vel titillatione, magna sæpe copia excerni solet, atque veteribus semen muliebrem dicebatur. Ut proinde ex hujus feri vel etiam feminis retentione sive excretionem nullum graviditatis infallibile signum desumi posset. Quod confirmat Nicolaus Venette *l. a. p. 372.* si nous, inquit, examinons en particulier tous les signes, que l'on croit être les plus propres à nous rendre certains de la grossesse d'une femme, nous verrons clairement, qu'ils sont tous douteux ou équivoques: car de demeurer sèche après avoir été embrassée, cela peut venir de la complexion de la femme & de la chaleur excessive de ses parties.

§. 3.

Orificium uteri internum in gravidis claudi vel connivere equidem supra ex Hippocrate vidimus, rationem vero quam ibi *Contra u-* dem Heurnius addit, nimirum ne aer subeat & semen corrumpat; *teri orificio* sufficiens mihi non videtur, quia, secundum paragrapho antecedente dicta, foetus non ex femine formatur, sed ex & in ovulo, quod primis diebus nondum est in utero, sed septimo demum vel *clausuram.*

octavo post conceptionem die, ex ovario per tubas Fallopianas ad uteri cavitatem protruditur. Hanc etiam uteri clausuram nullum graviditatis præbere signum, exinde patet, quia etiam in virginibus orificium uteri internum connivet; deinde, quia interdum proxime post conceptionem vel etiam post aliquod temporis spatium nova accidit conceptio seu superfoetatio. Inquit enim Johannes Heurnius in *Aphor. Hippocr. Sect. V. Aph. 51. pag. 383.* ubi de omnimoda uteri occlusione, tanquam signo conceptionis, agit: Sed quæres, cum constet superfoetationes fieri, an igitur post conceptum uterus aliquando aperiatur? Maxime id evenit primis mensibus, cum uterus avidissime alterum semen excipit. Cæterum hoc signum intelligitur de illis mulieribus, quæ operam dant liberis, nam in virginibus etiam connivet. Repeti hoc etiam potest, quod supra ex Domin. Panaral. *Pentecost. III. Obs. 20. p. 78.* adduximus, nimirum aliquas tantum, non omnes mulieres primo & secundo mense, etiamsi utero gerant, tamen os uteri clausum omnino non habere: Sed elapso secundo mense postmodum claudi, & facillime ab ipsamet muliere cognosci posse. Insuper etiam quandoque uterini orificii clausuræ proba seu cognitio difficilis atque incerta est, cum interne interdum adeo lateat, ut digito non semper attingi queat. Licet enim os uteri in conceptionis principio facile tangatur & absque manifesta duritie connivere videatur: succedente vero tempore, juxta Paul. Zacch. *l. a. Qu. 2. n. 16. fol. 94.* difficilior ac multo magis, quam extra prægnantiam, uteri os tangere licet, remanente quippe ad superiora utero & circa conceptum foetum sese recolligente. Quandoque etiam in sterilibus internum uteri orificium penitus est occlusum, unde ait Nicolaus Venette *l. a. p. 373.* il y a des femmes steriles, qui ont naturellement la matrice fermée, & il s'en trouve d'autres, qui ont son orifice dur & calleux, qui ne sont pas grosses pour cela.

§. 4.

Imprimis autem circa graviditatis signa menstruorum fluxus obser-

observari, atque mulieribus noviter maritatis & ipsorum defectu, Contra
 statim imprægnatio, ab apparentia autem contrarium, uti paulo mensium
 ante dictum a vetulis & obstetricibus prænunciari solet, absque ta- suppressio-
 men fundamento, siquidem non modo virginibus illibatis, sed et- nem.
 iam uxoribus tale tributum lunare absq; conceptione emanere vel
 supprimi potest, imprimis quarum massa sanguinea est nimis crassa
 & viscida, unde menstrua sanguinis turgescencia vel motus impe-
 ditur; quod malum etiam plerumque a diæta & rebus non naturali-
 bus, non rite observatis, contrahitur. A cibis enim crudis, crassis,
 fumo induratis, a piscibus & lacticiniis suppressos menses annota-
 vit Baldassar Timæus a *Güldenkle* Lib. IV. Cas. 8. p. 205. a lacte, tempo-
 re mensium fluxus, assumpto v. Casp. Theoph. Bierling. *Adversar.*
curios. Cas. 39. p. 71. a devoratis magna copia prunis, v. Joh. Schenck.
Obs. med. Lib. IV. fol. 631. Ab esu placentæ cerasorum adhuc cali-
 dæ tempore primæ menstruationis a virgine comestæ. v. Casp.
 Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. pract.* Obs. 82. p. 1043 seq. a pane
 calido. v. Joh. Michael. *Prax. Clinic. Part. I. Lib. V. cap. 26.* p. 238.
 Simon. Paul. *Quadrip. Botanic. Class.* 3. p. 484. Item a potu frigido
 post nimium motum & sudorem v. Bald. Tim. a *Güldenkl. l. a.* a po-
 tu e vino aqua diluto cum saccharo & citro, limonade dicto, post
 choreas immodicas, ingurgitato. v. M. N. C. Dec. II. An. 3. Obs. 11.
 p. 49. a medicamentis refrigerantibus v. Rod. a Castr. *de Morb. Mul.*
Lib. I. cap. 4. p. 14. a refrigeratione. v. Forest. *Obs. med.* Lib. XXVIII.
 fol. 627. ab animi affectibus. vid. *Histor. Morb. Vratislav. an. 1702.* p.
 68 seq. Lazar. Rivet. *Obs. med.* Lib. IV. p. 32. M. N. C. Dec. III. An. 7.
 & 8. Obs. 34. p. 56 seq. Paul. Spindler. *Obs.* 70. p. 130. Wolffg. Gabel-
 chov. *Curat. Cent. I. Cur. 81. Annot.* p. 156. Amat. Lusit. *Curat. med.*
Cent. 7. Cur. 44. p. 744. ab iracundia. v. Nicol. Tulp. *Obs. med.* Lib. I.
 cap. 28. p. 61. a viso funere. v. Ehrenfr. Hagendorn. *Histor. med. phys.*
Cent. II. Hist. 85. p. 264. M. N. C. Dec. II. An. 9. Obs. 37. pag. 72. ab
 odore lupuli. *Ibid.* An. 8. *Observ.* 87. p. 200. ab amore. *Ibid.* Dec. I.
 An. 9 & 10. Obs. 58. p. 147 seq. Unde ad quæstionem, an persona

coelebs, cui menses deficient, & quæ crassa in corpore appareat & sine magno impedimento negotia sua perficere possit, prægnans æstimanda? certi medici requisiti, ita respondent; non statim ex deficientibus mensibus imprægnatio est judicanda, quia id ipsum etiam illibatis personis, quæ a sanitatis statu deflectunt, & quæ impuram matricem sanguinemque crassum & impurum habent, accidere potest, quæ retentio mensium deinceps coacervationem materiæ vitiosæ in corpore causatur, a qua ad ipsum tumescit, & pro ratione complexionis unam & alteram magis minusve afficit, ita ut quædam in lecto decumbant, aliæ vero morbosæ in ædibus oberrent &c. vid. Eberh. Gœckel. *Consil. & Observ. medic. decad. sex. Cons. 18. p. 194 seq.* Quamvis autem a mensium suppressione non statim ad graviditatem sit concludendum, suspectæ tamen ejusmodi cælibes ratione imprægnationis esse possunt, hinc juxta autorem allegatum p. 97 seqq. medicis inferendo judicio aliæ adhuc sunt observandæ circumstantiæ. Ad propriam experientiam provocat Andreas Ottomarus Gœlicke *Medicin. Forens. Specim. V. §. 4. p. 83.* sancte, inquit, testor, quamplurimas suspectas puellas de menstruorum suppressione me consuluisse, de quarum conditione, ut certi quippiam determinarem, sæpissime hæsitavi, dubius, an ita mensium emanatio graviditatem, ut alias solet, comitaretur, an vero a quacunque alia causa suam derivaret originem. Imo novit etiam Guilielmus Harveus (*de Part. p. 506.*) matronam nobilem, quæ plus decies enixa fuerat, quamque menstruorum suppressio citra prægnationem nunquam fefellerat. Postea autem alteri denupta, præter alia signa solita, ex motu quoque (quem ipsa sororque ejus juxta cubans, sæpe noctu sentiebant, sese gravidam judicabat; neque ab ea opinione ullis argumentis dimoveri poterat: donec tandem spes omnis in flatum & pinguedinem facesseret.

§. 5.

Neque etiam ab omni modo mensium defectu semper sterilitatis

tatis signum defumi potest, siquidem apud autores varia leguntur exempla feminarum, quibus neque a pubertate ut virginibus, neque etiam in matrimonio iamjam viventibus, menses unquam comparuerunt, quæ tamen nihilominus aliquoties conceperunt, nonnunquam etiam sine lochiorum evacuatione pepererunt; qualia conceptionis sine ullo mensium fluxu factæ exempla plurima in *Parthenol. Sect. II. cap. 7. §. 6. p. 193.* item supra *Sect. I. cap. 8.* recensuimus, quæ prolixitatis vitandæ gratia hoc loco repetere nolumus. Liquet proinde, juxta Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Quæst. 1. n. 28. fol. 89.* defectum menstruorum pro signo graviditatis adductum omnium esse fallacissimum; siquidem non solum ex menstruorum defectu non possit certo affirmari, mulierem in utero habere, sed neque ex eorum apparentia pro certo judicari posse, illam utero non gerere, cum & quædam sint, quæ & prægnantes menstruantur; & vice versa aliæ sint, quæ nunquam aut raro menstruantur & concipiunt. Juxta Casp. Brav. de Sobremont *l. a. p. 199.* neque ex supervenientibus menstruis infertur defectus prægnantiæ, nec ex illis deficientibus prægnantia patet. Sic Nicolaus Venette *de la Generat. de l'homme Part. III. cap. 3. p. m. 373.* circa hoc conceptionis seu graviditatis signum ita scribit: Les regles manquent souvent aux filles, sans aucune soupçon, qu'elles soient enceintes. Il y a de femmes grosses, qui sont réglées les premiers mois de leur grossesse, & j'en connois mesme, qui l'estoient regulierement pendent presque tout le temps, qu'elles estoient enceintes: Et d'autres, qui ne le font, ny avant, ny après la conception, comme il arriva a la femme de Gorgias, selon le temoignage d'Hippocrate, qui n'ayant point ses regles, ne laissa pas de devenir grosse, & d'en manquer après, comme avant la conception.

§. 6.

Circa prægnantes itaque ratione menstruationis porro notandum, quod, quamvis ordinario menses a tempore conceptionis

Contra
mensium
cessationem.

nis cessent, hæc tamen observatio, juxta Michael. Albert. *Introduct. in univers. Medicin. cap. 2. §. 75 seq. p. 37.* etiam in multis feminis variat, ut videlicet quædam post conceptionem semel aut bis adhuc menstruum fluxum experiantur. vid. etiam ejusdem Alberti *Jurispr. Med. cap. IV. §. 13. p. 87 seq.* Fallit itaque interdum hoc signum, quando ab hac mensium cessatione conceptionis tempus computare & ad partus tempus calculare volunt feminæ. Quod confirmat etiam Mich. Ettmüll. *Op. Part. II. Coll. pract. f. 1073 seq.* dantur, inquit, exempla mulierum, quibus etiam primis gestationis mensibus menses adhuc ordinario fluxerunt; nempe sanguine ferofiore, item copiosiore & spirituosiore abundantibus, quin & quibusdam toto gestationis tempore menses fluxisse, observatum est. Non autem solummodo prioribus graviditatis mensibus, sed etiam posterioribus, imo per totum prægnantiæ tempus menses ordinario in quibusdam feminis recurrere, multis exemplis in *Mulier. Part. I. cap. 5. §. 3. seq.* monstravi, vid. etiam Georg. Franc. *Alleg. in Paul. Zacch. l. a.* quo loco Zacchias sequentem observationem recenset: Mulierem, inquit, tractavi, quæ septem filios peperit; hæc multum purgabatur & assidue, tamen non concipiebat, nisi per tres aut quatuor menses illi menstrua destitissent, tunc concipiens filios obefulos carnososque edebat, & nono quidem mense vere pariebat; nam a defectu menstruorum semper ad diem partus duodecim aut tredecim menses intercedebant. De prægnantibus menstruatis inquit etiam Nicolaus Venette *l. a. p. 373.* Il y a des femmes grosses, qui sont réglées les premiers mois de leur grossesse, & j'en connois mesme, qui l'estoient regulierement pendant presque tout le temps, qu'elles estoient enceintes. v. etiam Casp. a Reies *Qu. 49. n. 20. p. 614.*

§. 7.

Contra
hæmorrhagiam.

Quamvis autem in gravidis, præsertim ultimis gestationis mensibus, ejusmodi mensium fluxus vel hæmorrhagia uteri tam matri, quam foetui, sæpissime fatalis esse soleat, & quidem juxta

Hippo-

Hippocratis *Secl. V. Aphor. 60.* si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, foetum sanum esse impossibile, vel juxta Joh. Heurnii versionem: si mulier gravida sit menstrualis, non potest foetus esse sanus. Nihilominus tamen, juxta haecenus allegata exempla, gravidæ nonnunquam modo prioribus, modo posterioribus graviditatis mensibus atque per totum gestationis tempus, modo cum, modo etiam sine matris & foetus detrimento menses ordinarie patiuntur. Imo nonnullis etiam feminis, imprimis plethoricis, ab initio imprægnationis fluunt, quæ juxta Georg. Philipp. Netter. *Physiolog. cap. 4. Membr. 4. Art. 2. p. m. 187.* bona admodum hinc fruuntur valetudine; cum e contra reliquæ, quæ tale quid non experiuntur, ab initio variis malis, tamdiu durantibus, affligantur, donec foetus grandior redditus majorem nutrimenti copiam postulet, & hoc ipso plethoram imminuat & varias stagnationes sanguinis impediat. Sic, juxta verba Lucæ Schrœckii, in plethoricis ex tali mensium extraordinaria excretionē nulla in embryonem noxa redundat, sed potius in ipsius salutem, a copia sanguinis alias facile suffocandi aut alia in gravissima symptomata conjiciendi. vid. Joh. Hellwig. *Obs. 141. Schol. p. 383.* Et Michael Ernestus Ettmüllerus *Ephem. Acad. N. C. Cent. I & II. Obs. 45. p. 116.* inquit: quotidiana docet experientia, solvere quasdam mulieres tributum lunare, non primis solum mensibus, sed per totum quandoque gestationis tempus, absque ullo tamen abortus metu. Tale exemplum recenset Thomas Bartholinus *Hist. Anat. Cent. III. Hist. 13. p. m. 32.* his verbis: Novi ego mulierem juvenculam, Hafnienſis mercatoris uxorem, quæ, quoties uterum gerit, ordinarios patitur mensium fluxus adeo copiosos, ut lecto affixa imbecillitati suæ consulat. Subsistit is stato tempore, nec a primo conceptionis mense ad ultimum statas vices intermittit. Foetus nihil inde mali patiuntur, quos masculos & robustos feliciter solet eniti. Et pag. 34 pergit idem: Novi quam plurimas prægnantes, quæ modo ter, modo bis, modo semel expurgantur, sine foetus

tus detrimento, & id pro certo conceptionis signo interpretantur. Curavit etiam Paulus Zacchias juvenculam satis venustam, Juliam nomine, cujusdam scribæ vel tabellarii uxorem, quæ, cum, antequam conciperet, non bene purgaretur, dehinc utero gerens indefinenter purgabatur, ita ut quotidie, & non menstruatim, ut in cæteris, sanguinem, atque illum quidem non improbandum ab utero redderet. Est autem temperamento prædita bilioso, puella vero, quam ex ea prægnantia peperit, bene compacta & obesula est, & bene valet, ita ut hinc colligere facile liceat, quam vana sit ea graviditatis præsumptio, quæ ex defectu menstruorum elicitur. vid. Paul. Zacch. *Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. n. 31. f. 89.* Plura ejusmodi gravidarum menstruationem passarum exempla in *Tract. nostr. de menstr. Sect. II. §. 3.* recensuimus, quibus, adhuc sequentia annecti possunt: Illustrissimæ dominæ comitissæ, Franciscæ Elisabethæ a Fürstenberg 1655. Viennæ circa medium gestationis tempus menses impetuose satis eruperunt, ut omni ingenio suppressendi foetusque conservandus fuerit; statò tamen partus tempore promptius an unquam puellam sanam enixa est, uti Johannes Jacobus Wepfferus, ad fontem Danubii in arce Doneschingen ad Th. Bartholinum perscripsit. vid. hujus *Epist. med. Cent. IV. Epist. 43. p. 47 seq.* Quædam gravida profluvium menstruorum in majori quantitate, quam aliis temporibus, patiebatur, & sanitatem non obnubilavit, scribit Reinerus Solenander *Cons. med. Sect. V. Cons. 15 fol. 472 §. 38.* Et *§. seq.* ita pergit: Similem ego novi & curæ interfui, prope Grevenbruchum, quæ jam vicina partus patiebatur gravissimum profluvium menstruum, ut magna concreti nigrique sanguinis frustra excernerentur, & tandem convaluit. Illustrissima quædam comitissa gestationis tempore sæpe fluxum sanguinis ex utero inordinatum passæ est, qui remediis convenientibus interceptus multoties; Idem eandem tempore legitimi partus adoritur copiosissimus, ita ut post partum, quamvis felicissime & sine magna difficultate editum, diutius continuans, paulò post exspi-

expiraverit, juxta Paul. Spindler. *Obs.* 67. p. 125. Anno 1669. Lugduni Batavorum plurimis matribus, ob peculiarem siderum aut atmosphæræ καὶ ἀστὴν toto graviditatis tempore menses fluebant, sed æquo ordine, nonnullis etiam paucis ante partum mensibus. Illæ autem feminae, quæ sic affectæ erant, a morbo epidemio, qui eo anno luctuosissimo totam urbem sine discrimine vastabat, degebant immunes, cum alias ejus sexus ferè omnes laborarent, annotante Johanne Nicolao Pechlino *Obs. phys. med. Lib. I. Obs.* 36. p. 84 seq. vid. etiam *M. N. C. Dec. I. An. 9 & 10. Obs.* 29. p. 86. Præcipua etiam matrona, extra Hollandiam degens, plethorica admodum & corpore tenui, ab ipso usque imprægnationis initio, continuo sanguinis fluxui fuit obnoxia, qui singulis itidem mensibus novo augebatur genitali effluvio. Plurimi itaque consulti medici gravidam non credidere: ipsa tamen paulo post septem mensium fœtum edidit, juxta Corn. Stalp. van der Wiel *Obs. rar. Cent. prior. Obs.* 76. p. 332 seq. Cum autem ab ejusmodi gravidarum fluxu menstruo vel hæmorrhagia uterina, secundum hoc exemplum, maxime metuendus sit abortus, non immerito medici practici, pro impediendo hoc infortunio, mature gravidis, imprimis si fuerint plethoricæ, venæsectionem in brachio suadent; de qua alibi, de abortu, plura videbimus.

§. 8.

Nonnunquam etiam occurrunt exempla mulierum, quæ *Menses non nunquam, nisi gravidæ fuerint, menstruum fluxum sunt expertæ. nisi in gravidis.* Scribit scilicet Henricus Snelle *Theor. mechan. Delineat. Part. II. p. m. 106.* imprægnatas & lactantes mulieres semper deficere in menstruatione, falsissimum est; plurimæ enim ad ultima usque partus instantis tempora hosce patiuntur fluxus, persistente fœtus & matris integerrima sanitate, adeoque falsus est Hippocratis *Aphorismus 60. Sect. V.* Imo aliquæ menstruis suppressis detentæ præter morem vulgarem, tunc & non ante hæc admittunt, postquam imprægnatæ fuerint, ut mihi retulere viri in re medica versati-

tissimi. Tale exemplum refert etiam Christophorus Roeslerus *M. N. C. Dec. I. An. 3. Observ. 348. p. m. 555.* Nimptschii, molitoris uxor est annorum viginti quatuor, ea hoc anno 1597. octo annos habuit maritum, & illi nunquam fluxerunt menses, nisi cum prægnans esset, & cum fluere inciperent, jam certa erat, quod esset prægnans. Aliud exemplum generosæ matronæ, tanquam de infallibili imprægnationis signo, communicat Johannes Georgius Hoyerus *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. V & VI. Obs. 75. p. 335.* Femina scilicet in diæta laute vivens menses quidem in virginitatis adhuc annis ordinarie observarat, quos vero post matrimonium contractum, & in illo nunquam extra imprægnationis statum, cum optima tamen dereliquo euphoria & sanitate non experta, sed tantum gravida aliquoties facta, tanquam certissimum imprægnationis & conceptionis inchoatæ signum, menses per totum gestationis tempus, legitimo tempore, ad felicem usque partum passa est; quo partu præterlapso & lactatione peracta menses iterum sine ullo futuro sanitatis incommodo unquam porro fluere & continuare, sed contra potius dictum factum sponte subsistere annotavit. Optime etiam Johannes Jacobus Harderus *Apiar. Obs. 84. Schol. p. 321.* tyrones & chirurgos admonet, comparente sanguinis tali profluvio, ad enitendum feminas temere adigendas non esse, foetu etiam maturo existente, sed expectandum tantisper, ne ejus fluxum concitato spirituum motu magis promoveamus; neque etiam noviter nuptas, isto comparente, non concepisse imprudentius dicere debere; novimus enim, addit, quibus reapse gravidis sanguis ex utero manavit, & quidem aliquibus ad medium usque gestationis tempus.

§. 9.

Contra
maculas faciei &c.

Nil quoque certi de graviditate a signis, tam externis, quam internis, post uteri orificii interni occlusionem menstruique sanguinis suppressionem apparentibus, concludi poterit, cum talia symptomata aliis quoque feminis, non gravidis, sed sola mensium

obstructione, ventriculi vitiis, cachexia &c. laborantibus vulgaria esse soleant. His signis annumerantur maculae in facie, ephe- lides dictae; quod signum inter potiora a Cagnolo relatum, juxta Paul. Zacch. *Quaest. med. legal. Lib. 1. Tit. 3. Qu. 1. n. 32. fol. m. 90.* si quod aliud vanum ac fallacissimum est, & quod non modo certi aliquid promittere non potest, sed neque quicquam probabilis; cum & plurimae gravidarum tales maculas non habeant, ut quae mares gerunt, imo neque omnes quae femellas in utero habent; & multae non praegnantium iis maculis deturpentur, praesertim quae aut non debito modo, aut non sufficienter purgantur. Et secundum Georgii Franci *Annotat. in b. l.* recte hoc refutat Sancto- rius, cum signum hoc neque omnibus, neque semper competit. & per consequens nullum nexum necessarium & per se cum praegnantibus habet. Quare cum lentigines nunc sint in praegnantibus, nunc absint, nunc invadant mulieres ob retentos menses, nunc cacochymicas & melancholicas tantum, nexum ne- cessarium cum utero gerente habebunt, quantum luna cum cru- staceis. Item Casparus Bravo de Sobremont *l. a. p. 200.* inquit: Hippocrates asserens, non reperiri tales maculas, dum foetus est masculus, comprobatur, non esse necessarium praegnantiae signum, & quod in sanis, & non redundantibus cacochymis succis adhuc nec in femellis accidat, & quod superveniat ex succis cacochymicis in obstructis viris & feminis, & in valetudinariis sine praegnantia, & cum fiant a pravis humoribus maculae, sicut & vitiligo & alii fa- ciei mutati colores, dicendum non esse accidens quarto modo praegnantiae proprium, sed ob alias causas commune. Nec mi- nus ventriculi vitia, parva digestio & vomitus, rerum incongrua- rum appetitus seu pica & malacia, nausea & antipathia, faciei co- lor albidus &c. fallacissimum sunt impraegnationis signum, quia ta- lia symptomata non solum puellis ante menstruationem, sed etiam virginibus illibatis, post mensium suppressionem & chlorosi la- borantibus, quandoque etiam ipsis maribus, post stomachi totius.

ve corporis morbos obvenire solent superveniente nunc horrore, nunc incalescentia, cum gravitate capitis & variis supra recensitis symptomatibus, quæ etiam nec solis, nec omnibus gravidis feminis, sed iis tantum feminis ac maribus, in quorum ventriculis varii vitiosi humores sunt collecti, observantur.

§. 10.

Contra
mulsam.

Neque ex Hippocratis pro agnoscendo graviditatis signo propinata mulsa certum signum desumi potest, quia flatus & tormina in intestinis excitat, quod periculosum est; hinc scribit Paulus Zacchias *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. n. 49. fol. 91.* hoc experimentum, ut cæteris quibusque securius, a cæteris omnibus posterioribus proponitur, cum tamen adeo incertum & fallax sit, ut in non assuetis mulieribus, & in iis, quæ obstructione laborant, facillime tormina provocare valeat, præsertim si a cœna propine- tur, ut jubet Hippocrates. Præterea quam periculosum sit, tor- mina in prægnantibus excitare, vel ipsæ obstetriculæ noverunt, cum ex his facili negotio subsequi possit abortus. Adde quod mulsa per se etiam menstrua provocat, nam & urinam ciet; quæ vero urinam cient, etiam menstrua provocare possunt, & quæ menstrua provocant, abortum absque dubio causare solent.

§. 11.

Contra u-
rinam.

Quantum pro signo prægnantiæ supra ex urina desumptis ex- perimentis fidendum sit, menstrat Ludovicus Bonaciolus *l. a. p. 257.* His ego, inquit, experimentis sæpius egregia hercle fru- stratione usus (vel quia indiligenter exercuerim, vel forte, quia res ita sese habet) irrita fallaciosaque comperi. Quæ & alia plera- que, quanquam in universum omnibus horis hominis vita credi- derit (nec credere senserit) viritim tamen sapientissimi cujusque fides plane respuit. Johannes Varandæus *de Morb. Mulier. Lib. II. cap. 2. Oper. fol. m. 584 seq.* de dubio hoc signo sequentia habet: U- rina ex Avicennæ placito primis quatuor mensibus cruda, aquosa vel decolorata profunditur; sequentibus vero spissa, colorata & quasi

quasi ignita. Practici superioris ævi, quibus cura fuit ex urinarum contemplatione omnia augurari, imprægnationem statim deprehendunt ex urina albicante, in cujus medio apparet nubecula subalbida vel ei inspersa sunt velut fragmenta & flosculi bombacis vel lanæ recens carptæ. Alii dicunt in summo urinæ apparere circulum versicolore inftar iridis &c. Sed hæc cum multis affectibus possunt esse communia. De quæstione, an ex urina possibile sit, gravidam esse mulierem, certo agnoscere? prolixè agit, variis tamen rationibus atque autoritatibus negativam defendit Casparus a Reies *Camp. Elys. Quæst. 49. p. 605. 612 seqq.* Secundum Nicol. Venette *l. a. p. 37 seq.* L'urine ne nous peut donner tout au plus, que des marques de l'estat des parties, d'ou elle vient, & dela disposition de celles, par où elle passe. Comme elle ne traverse pas la matrice, & qu'elle ne fait, qu'effleurer son cou, quelles conjectures peut-on faire par cet excrement, si ce n'est dela disposition de la vessie, des reins & des parties superieures? Toutes les experiences, que l'on fait ordinairement avec de l'urine, sont superstitieuses, tout ce que l'on met dans la matrice, est dangereux, &c. Et *p. 370.* inquit idem: de tous les signes il y en a de très-legers & de très-ridicules, car de penser, que l'on puisse découvrir la grossesse d'une femme par ses urines, c'est ce que je ne saurois me persuader. Je sçay bien jusques où l'avarice des hommes a poussé cette curiosité, mais les différentes opinions, où ils sont sur ce sujet, me font justement douter de la verité de leurs experiences. Ad quæstionem, an uromantæ graviditatem ex urina videre possint? ita respondet Theodorus Craan *Tr. de Homin. Cap. 162 p. 715.* Graviditatem uromantæ ex urina noscere & prædicere se posse non parum gloriantur, si autem partes consideramus, ex quibus urina provenit, nec non particularum diversitatem, ex quibus constat, ejusque separandi modum, impossibile esse putamus, ut graviditas ex ea nosci possit; alia deprehenditur via esse, quæ ad vesicam, alia, quæ ad uterum tendit; non attingit

urina partes generationi inservientes, nec cum iis ullam communionem habet, quomodo igitur potest urina indicare graviditatem? Ex nostris principiis posset signum peti, propter spiritum feminis masculini, sanguinem feminæ imprægnantem, qui aliquam posset in urina differentiam ponere, ex qua posset signum graviditatis peti, sed dicimus, exiguam quantitatem spiritus feminis masculini distributam per totam massam sanguinis feminini, lege circulationis, non posse crassis oculis uromantam in urina conspicere: illi inspiciunt quasi urinas, per totum graviditatis tempus etiam redditas, ex iisque hoc concludunt, sed quomodo hoc fieri potest, cum tam exigua copia spiritus feminis masculini non possit tam diu urinas inficere, ut inde signum petant de graviditate? Sed quid multis opus est? experientia ipsos satis confundit, nec non pudore suffundit. Fatetur equidem Georgius Francus, se multoties in gravidarum, cætera sanarum, urinis, maxime posterioribus mensibus, observasse, quod superficiei in urina corona quasi quædam pinguior & oleosa innataverit: Id quod ipsum raro fefellerit &c. vid. ejusdem *Annot. in Paul. Zacch. Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. 3. Qu. 2. n. 25. p. 95.* quo loco tamen ipse Zacchias ita pergit: De urinarum fallacia pluribus agere, inanis opera esset, veluti inane est, quicquid ex earum qualitate deprehendendum nobis promittunt nonnulli auctores; non minus enim ex urinis prægnantem esse mulierem, quis unquam cognoscet, quam si ex iisdem urinis intimas atque occultas ejusdem mulieris cogitationes expiscari velit; & deridendi sunt tanquam falsi impostores, audaces illi ac omnino imperiti medici, qui ex urinæ solius inspectione tale quid se conjicere jactant; quibus tamen si nesciis urinas virorum aut brutorum conspiciendas objicies, prægnantiam etiam in viris aut brutorum maribus præsentem esse judicabunt. Utrum ex urina conceptu, uti vulgo creditur, possit dijudicari? contradicit Felix Platerus *Quæst. medic. parod. Semeiot. n. 69. p. m. 106.* vid. etiam Franc. Valles. *Controv. med. Lib. III. cap. 28. fol. m. 168 seq.*

Conr.

Conr. Barthold. *Behrns Tr. de Constitut. Rei med. Lib. III. Tit. 2. p. 167 seq.* Joh. Christ. Bitterkrauts *Klag-Thræn. der Artzney-Kunst. cap. 10. p. m. 300 seqq.*

S. 12.

Lac in mammis pro signo prægnantiæ vulgo haberi, supra adduximus, cui tamen sententiæ a veteribus & neotericis medicis contradicitur, & quidem ex ea ratione, quia interdum etiam feminae illibatae, multoque minus utero gerentes, lac in mammis habere deprehenduntur. Primo enim ex infantium utriusque sexus recens natorum papillis aquosum lac sæpe numero exstillare præter experientiam docet Thomas Cornelius, *Consent. Pro-gymn. phys. 6. p. m. 222.* De lacte puellulæ papillis emulso refert Joannes Rhodius *Obs. med. Cent. II. Obs. 37. p. 72.* quod anno 1624. calendis Februarii in Theatro anatomico, Spigellii jussu obstetrix puellæ octo dies natæ papillis lac expresserit. Julius Cæsar Baricellus in duobus filiis suis, in primis diebus a partu observavit, ab obstetrice mamillas contrectatas lac impulsu (magno multorum stupore) emisisse: Idque in aliis etiam observavit, *vid. ipsius Hortul. genial. p. m. 323 seq.* Prodeuntes nuper infantes serosum liquorem lacteum ex papillis profundere, scribit Thomas Bartholinus *Anatom. renovat. Lib. II. cap. 1. p. 333.* Mulieris cujusdam puel-
lum enixæ, qui per mensem integrum plurimam lactis copiam turgidis papillulis reddebat, ex Cardano meminit idem Bartholinus *Epistol. med. Cent. III. Epist. 38. p. 142.* Filiolæ duarum septimanarum papillæ per octo & amplius dies album præbebant liquorem lactis æmulum, teste Johanne Schmidio *M. N. C. Dec. I. An. 8. Obs. 86. p. 144.* Sequentem observationem refert Daniel Crügerus *M. N. C. Dec. II. An. 9. Obs. 139. p. 241.* Vocatus sum nuper ad mulierem quandam infantem sexus feminei lactantem, ut infantem hanc curarem, quæ & ipsa lac copiosum in mammis habebat; mammx hujus infantis pomum Borsdorffianum magnitudine æquabant, e quibus sponte sua quotidie lac promanabat, imo
si

Contra lac,

quia repe-
ritur in in-
fantibus.

si subsisteret, coacti sunt illud exprimere, & quidem ad uncias tres vel quatuor; Infans erat octodecim septimanarum, imo mater sæpius lacin adstantium faciem petulanter ejaculabatur. In infantulis recenter natis ex uberibus lac effluxisse, sibi obstetrices retulisse, ait Johannes de Muralt. *in suo Vademec. Exercit. I. p. 15.* item Josephus Lanzonus *M. N. C. Dec. II. An. 10. Obs. 144. p. 231.* Femina quindecim annos sterilis infantem masculum peperit, qui primo mense lac copiosum e papillis emisit, quod obstetrices, dum inepte repellentibus avertere tentarunt, per vomitum eduxerunt, uti ex Cardano refert Olaus Wormius in Thom. Bartholin. *Cist. med. Locul. 23. p. 251.* Inquit etiam Jacobus Primrosius *Destruct. Fundam. medic. Plemp. Sect. III. cap. 4. p. m. 58.* se in pueris guttulas, quæ colore, consistentia, sapore fuerint verum lac. Et Antonius Deusingius *Dissert. de Lact. Sect. I. §. 17. p. 326.* ait: Notum quoque est, infantibus recens natis, non femellis modo, sed & masculis, lac in uberibus per aliquot dies quandoque septimanas colligi, quod nisi recte curetur, quandoque gravia symptomata, inflammationes vel suppurationes aliaque incommoda infert: ut non semel mihi observare contigit; ac præterito quidem anno in filiola recens nata, cui ex lacte in mamilla restagnante suppuratione gravi oborta universa mamilla glandulosa substantia periit.

§. 13.

In virgini-
bus.

Deinde etiam adultiores puellæ sive virgines, quæ neque coitum neque conceptionem sunt perpessæ, lac in mammis habuisse sunt observatæ. Miraculis enim annumeratur in vita S. Christinæ, quod, cum a necessariis contemneretur, hique ipsi cibum negarent, propriis ab uberibus, tametsi virginalibus lacte se nutrierit, neque in parvo temporis intervallo, nam ad hebdomadas novem suo hujusmodi virginali & admirando lacte alia est, uti ex Surio recenset Simon Majolus *Dier. Canicul. Colloqu. IV. fol. m. 50 seq.* Extra miraculum, & quidem a mensium suppressione in virginum

mam-

mammis lac generari, concedit Hippocrates *Sect. V. Aphor. 39.* Si mulier, inquit, quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt, vel juxta Heurnii versionem: si mulier neque prægnans neque puerpera lac habeat, huic suppressa sunt menstrua. Ex eo lacte, pergit Heurnius, *p. 370.* significatio est boni sanguinis & integræ mammarum partis, quæ lac facit. Bonus is est sanguis, qui est dulcis, purpureus, mediocriter crassus. Hinc adeo accidit, ut si virgines hujusmodi sanguine abundant, & ab ea sanguinis copia menses supprimantur, nisi ejusmodi plethora aut sanguinis emissionem, vel vomitu, vel per hæmorrhagiam, aut per hæmorrhoides, vel per dysenteriam haimatoden excernatur: & si his mammæ calidiores fuerint & atterantur, eo aliquando is poterit decumbere & in lac converti. Quin interdum attritu papillarum viris lac etiam nascitur, ubi ea sanguinis supellex. Nam lac solum est elegantior pars sanguinis, quæ a glandulis mammarum in alborem abit. Sed non ita copiosum id lac manat, quod mulieribus extra graviditatem ac lactationem evenit. Quod tamen rarum est in virginibus, nam providentia naturæ (quæ vis quædam est a Deo insita) gignitur lac in mammis, foetus causa. Hippocrati consentit etiam Avicenna, qui secundum Caspar. de Sobremont *l. a. p. 199.* & Casp. a Reies *Quæst. 47. p. 575.* inquit: Quandoque aggregatur lac in mammillis puellarum absque imprægnatione, & absque eo, quod genuerint, & hoc proprie, quando retinentur menstrua. Ast secundum meam editionem verba Avicen. *Lib. III. Tom. XII. cap. 3. fol. 287. b.* ita sonant: quandoque aggregatur lac in mammilla, absque prægnatione, & proprie, quando retinentur menstrua.

§. 14.

Quoad exempla virginum, quarum in mammis lac deprehenditur, refert Alexander Benedictus *de Partib. Corp. human. sive Anatom. Lib. III. cap. 4. Oper. p. m. 595.* se vidisse mulierem, cui etiam, cum virgo esset, quoniam infœcunda erat, menses sub-

Exempla.

Syllepsilogia.

Eec

terant,

terant, lacte semper diffluentem. Sequentem observationem recenset Christophorus a Vega *Commentar. in Hippocr. Aphor. Lib. V. Aphor. 39. fol. m. 646.* Vidimus puellam Burghensem, cui mensibus suppressis lac mammis inerat. Medicus vero, cui res fuit commissa (accusabatur enim ab hero) constantissime affirmabat: Ipsam gravidam esse, quam ego coram hero & aliis defendi, fieri posse dicens, ut lac habeat mulier ex sola mensium retentione, citra conceptionem. Tempore tamen novem mensium transactio manifeste constitit, mulierem honeste vixisse & virginem esse, cui aliquibus postea diebus menses profluxerunt. De virgine lactante observationem annotavit Philippus Salmuth *Cent. I. Obs. 92. p. 55 seq.* Serva quædam curam agit infantis, atque illum in eodem secum lecto reponit: ac, prout petulcæ quandoque solent esse, mammam sugendam frequenter exhibet. Sistuntur menses: lac vero in mammis gignit, lactat. Rodericus a Castro, Lusitanus, vidit & curavit Hamburgi probis & inculpatis moribus virginem, cui & menses suppressi erant, & tamen alba ac multa purgamenta ex utero fluebant, & ex mammillis lac copiosum, ita ut ipsius cognatæ de integritate etiam dubitarent, quas tamen rationibus placavit Rodericus, cujus *vid. Medic. Politic. Lib. IV. cap. 12. p. m. 260.* Teste Petro Foresto *Obs. med. Lib. XXVIII. Obs. 77. Schol. f. m. 761.* Hugo medicus semel se lac in virgine vidisse affirmabat: Et Ericius, Foresti collega, se ter hoc ipsum observasse referebat. In Bleckingia Scaniæ provincia puella quædam nubilis stupri accusabatur expositique infantis mater traducebatur. Videbatur suspicionem conceptam lac augere; quo mammæ fororiantes diffuebant. Illa vero ad causæ æquitatem & innocentiam provocatura unico argumento iudicum sententiam suspendit. Naturalem enim sibi lactis esse proventum prætendebat, & a primis incunabulis semper familiarem. Puellæ fidem firmavit frater illius minorrennis, qui pari ubertate turgidas lacte papillas produxit. Magistratus iussu res ad medicos Hafnienses devoluta est, qui & exemplis

plis & rationibus inducti virginibus nonnullis incorruptis lac as-
feruerunt, adeoque puellam intentato crimine liberandam uno
ore censuerunt, referente Thoma Bartholino *Histor. Anatom. Cent.*
I. Histor. 27. p. m. 38. vid. etiam *ejusdem Anatom. renov. Lib. II. cap. 1.*
p. 33. Ancilla quædam post mortem dominæ suæ infanti relicto
ejulanti quandoque mammas porrexit, sicque tempore per suctum
infantis lac ipsius nutrimento sufficiens habuit. vid. Christoph.
Helwig. *Obs. med. Part. IV. p. 242.* Simile fere exemplum refert
Nicolaus Venette *de la Generation de l'homme Part. II. cap. 1. Art. 3.*
p. m. 91. his verbis: L'an 1670. Madame la Perere fille de Monsieur
Desperence, qui avoit une petite fille de deux mois à la mammelle
de sa nourrice, s'embarqua avec precipitation avec son enfant,
croyant, que sa nourrice s'étoit embarquée auparavant. Mais
n'ayant pas trouvé sa nourrice, qui étoit volontairement demeu-
rée à terre, elle fut obligée de nourrir son enfant avec du biscuit,
du sucre & de l'eau, dont elle faisoit une pappe. Cette enfant ne
se contantoit pas de cet aliment. Elle incommodoit par ses cris
tout l'équipage, principalement dans la nuit. Pour cela on
conseilla à la mere de faire amuser son enfant au teton d'une jeune
negresse son esclave de 16. ou de 18. ans. Mais l'enfant ne l'eut pas
plûtôt têtée pendant deux jours, qu'elle luy fit venir suffisam-
ment du lait, pour se nourrir. Et cette enfant avoit toujours esté
nourrie par le lait de la negresse vierge. Mater quædam illustris
ob omnimodum papillarum in mammillis, legitime alias consti-
tutis, defectum infantem suum nolens volens nutricibus merce-
nariis per quatuor mensium spatium exponere cogeatur. Per-
tæsa hinc pessimæ hujus farinæ hominibus, pulmentis, jusculis ex
cerevisia & lacte coctis aliisq; alimentis accommodatis infantem a-
lere decernebat. Amita vero ipsius, virgo, septendecim præterpro-
pter annorum, cum ipsa habitans ejulatus infantilis juste miserta
infantem clandestino mammillis suis sororiantibus applicavit, ex
quibus quidem puerulus sufficiens lac elicuit, herniam vero ex-

inde gravissimam & brevi ex ileo lethalem accersivit, teste Ambrosio Stegmanno *M. N. C. Dec. III. An. 4. Obs. 107. p. 225 seq.* Isbrandus de Diemberbroec *Anatom. Lib. II. cap. 2. fol. m. 249.* inquit: Lascivæ & prurientes nonnullæ virgines, libidinosis cogitationibus totæ intentæ atque hinc mammas suas sæpe contrectantes, ac cum titilloso pruritu fricantes, interdum virginitate illæsa, lactiferæ evadunt, quales indubitata pudicitia lactiferas virgines mihi bis videre contigit. Absque dubio etiam tempus, & orgasmus menstruationis absque graviditate ad lactis generationem aliquid contribuere potest; uti ex Johannis Ludovici Hannemanni observatione de periodica lactis in mammis mulierculæ non gravidæ, neque lactantis præsentia colligere licet. Mulier scilicet quædam marito juncta vivebat, ex quo ante quinquennium puerum susceperat & enixa erat. Hæc quoties menstruorum patiebatur fluxum, etiam mammæ ejus magna lactis copia turgebant, ut illud exinde in longum spatium ejaculari ac emulgere quiret. Menstruorum autem fluxu desinente, & ille lactis fons exarescebat, vid. Nov. Literar. maris Balthic. *An. 1700. mens. Februar. p. 55.*

§. 15.

in vetulis.

Vetulas etiam quandoque, quibus prolem suscipiendi nulla spes superest, per suctionem iterum lac in mammis recipere, ita ut etiam infantibus illud præbere possint, autores annotarunt. Inquit enim Aristoteles *de Hist. Anim. Lib. III. cap. 20. f. 383.* non prægnantibus aliquando, sed raro, eduliis quibusdam efficitur, ut lactescant, etiam quibusdam mulieribus natu majoribus, sucu frequentiore lac prodiit & copia tanta, ut infantem enutrire potuerint. Id quod etiam recentiores autores confirmant. Teste etiam Henrico ab Heer *Obs. 14. p. 146.* femina quædam Odo Josaii in tertio partu extincta vivum pupillum relinquebat. Johanna Odæ mater, quinquagenaria major, miserata nepotulam ejulantem, aridas jamdudum ab undecim annis mammas ori ejus applicat, fugit infans, cum immani omnium stupore, lactis magnam copiam elicit,

elicit, idque multis post mensibus continuat, dum adolefceret, commodeque alios cibos potumque admitteret. Vianæ in diverforio ante portam sito, cui caput porcinum pro insigni est, mulier caupona, non diu post obitum mariti, peperit, atque brevi post puerperium extincta est, superstitem relinquens infantem suum sanum: Cumque illi res angustissima domi superesset, ejus mater, nominata Johanna Vuyltuyt, etsi & ipsa egena præ paupertate nutricem conducere non posset, tamen infantis filiae suæ miserta, eundem enutriendum suscepit ætatis suæ anno sexagesimo sexto: cum autem eum vagientem, summa cum miseratione, mammis suis aliquoties apposuisset eique papillam fugendam obtulisset, per fortem illam imaginationem, & desideriosam de nutriendo infante cogitationem, mammae lac dare cœperunt, idque paucis diebus tanta copia, quæ nutriendo infanti abunde sufficeret, ita ut vix aliis alimentis indigeret: atque sic cum omnium admiratione infans lacte hujus vetulæ (cujus mammae a plurimis annis exaruerant & conciderant, jamque rursus, tanquam juvenculæ, de novo intumuerant) optime nutritus fuit: Cujus rei memoria hodie apud multos dicti oppidi cives superest; uti refert Isbrandus de Diemberbroec. Amato Lusitano *Curat. medic. Lib. I. Cur. 47. fol. m. 81.* visæ sunt mulieres, quibus menses ob ætatem grandiore suppressi erant, & tamen illis lac copiosissimum ad mamillas devenit, solo puerorum sucu, quos postea lactarunt, & ad annum & plus, ac si pepererint, eos tractarunt. Ex iis autem mulieribus una Ferrariensis ætatis quinque super quinquaginta annorum fuit; altera vero nobilis apud Lusitanos Santarenensis, nata annos prope sexaginta. De lacte solius sucus ope in mammas excito sequentem observationem refert Franciscus Bouchardus *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 10. p. 14.* Sunt aliquot anni, cum in vico rusticana quædam, ac certe piissima vidua, prope sexagenaria, bimestris infantuli repertitii nutritionem apud se motu charitatis aggressa, suas quondam flaccidas, ad ejus sedandos

vagitus, primis diebus accommodarat ita mammillas, ut lacte paulo post frequentis & avidi suctus occasione tandem excito, septem illum ad hebdomadas aluerit, & plures, opinor, ad menses aluisset, alienigenum nisi casus alumnus submovisset. Meminit etiam Johannes Muraltus *Colleg. Anat. Lect. 3. p. m. 55 seq.* se novisse feminam sexaginta quatuor annorum, quæ quotidie in conspectu hominum ex mammis suis lac exprimere non erubescibat. vid. etiam *ejusdem Hippocrat. Helvet. p. 317.* Cognovit etiam Julius Cæsar Baricellus mulierem, Victoriam nomine, eamque honestam & bene morigeratam; huic in anno quadragesimo quinto menstrua cessarunt, & ipsa fausta valetudine vixit. Cum autem sexagesimum fere annum attingeret, ecce illi menses rubei bonique coloris rediere, uberaque, quæ prius flaccida erant, more virginum, turgidula facta sunt lactisque tanta copia impleta, ut impulsu ferretur: quare ut puerulum filiæ suæ lactaret a Baricello admonita est. vid. *ejusd. Hortul. genial. pag. m. 349 seq.* In Loyse Bourgeoise *Hebammen-Buche Part. I. cap. 1. p. m. 26.* mentio fit feminæ quinquagenariæ, per totam vitam nunquam gravidæ, lac nihilominus in mammis habentis. De avia quadam, quæ mortua filia neptem uberibus admovit fugereque permisit, ac tandem nutrit abunde, cum tamen admodum vetula & siccissima esset, uti ex Bodino refert Casparus a Reies *Quæst. 47. n. 6. p. 576 seq.* v. etiam Steph. Blancard. *Collect. Cent. II. Obs. 83. p. 245.* De lacte ex mammis non gravidæ, nec puerperæ nec lactantis observationem communicat Ehrenfried Hagendorn *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 136. p. 246.*

§. 16.

in mari-
bus.

Imo non solum in mulierum non gravidarum vel parientium, sed etiam in viroum diversæ ætatis mammis lac apparere præter exempla de infantibus maribus, lac habentibus, varii testantur autores: Vidit enim Hieronymus Cardanus Jannæ Antonium Benzum ex oppido portus Mauricii, annum agentem trigessimum quartum pallidum, barba rara, pingui habitu, e cujus mam-

mammillis lactis tantum profluebat, ut infantem ferme lactare potuisset: nec solum effluebat, sed impulsu ferebatur. Miles hic erat, & non levia tota vita passus incommoda, uti refert Cardanus *de Subtilit. cap. 12. fol. m. 366.* In maribus etiam lac fieri posse, scribit Aristoteles *de Histor. Animal. Lib. I. cap. 12. fol. 357.* De juvene, cui mammillæ præter sexus naturam adeo turgebant, ut quandoque libuerit, merum lac ex illis guttatim exprimere potuerit, vid. Johann. Helwig. *Obs. 135. p. m. 369.* & Lucas Schroëckius in scholis ejusdem observationis, obesi & quadrati habitus juvenem in academia Salana nosse refert, qui prominentibus e mammis suis lac exprimere poterat. Alii studioso & quidem medicinæ fere per anni spatium e sinistræ mammæ papilla lacteus liquor quotidie sine ullo dolore & acrimonia sponte exstillabat, quod Simon Scholzius oculis suis vidisse testatur, *v. M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 135. p. 218.* & Theoph. Bonet. *Medicin. septentr. Part. II. fol. 163.* Vidit etiam Johannes Schmidius tale exemplum in juvene quodam *τέτραγονώ*, Joachimo Christophoro Riccio, cognato suo, cui mammæ protuberantes compressæ lac reddebant copiosum, aquosum tamen; sæpius etiam spontaneo fluxu indusia madefaciens. *vid. M. N. C. Dec. I. An. 8. Obs. 86. p. 143.* de viro quodam mammoso Tubingæ lac emittente, vid. Georg. Hieron. Velsch. *Exotic. Curat. Chiliad. II, Obs. 302. p. m. 325.* Refert etiam Emmanuel Stupanus *Aphor. physiolog. pag. m. 53.* sibi quoque sedecim circiter annorum fuisse fratrem, cui, per certa intervalla, ex mammillis, leviuscule compressis, lacti simillima profluxerit substantia, albida copiosa. Et Petrus Borellus ait *Histor. med. Cent. I. Obs. 49. p. 55.* se agnovisse hominem, qui lac e mammis coram se effuderit. De quibusdam, qui purgationes muliebres ordinata vicissitudine patiebantur ac lac in mammillis gignebant, vid. Thom. Bartholin. *Cent. V. Hist. 33. p. 55.* Lac nonnullis viris post pubem exprimi & per suctum frequentiore crebramque ac multam contrectationem prodiisse, non semel se conspexisse ait Andreas

dreas Vesalius *de Corpor. hum. Fabric. Lib. V. cap. 18. fol. m. 424.* Sy-
 rum quendam, cuius filius infans mortua conjuge supererat, ubera
 sæpius admovisse, ut famem filii vagientis frustraret, continuato-
 que suctu lacte manasse papillam, quo exinde nutritus est magno
 totius urbis miraculo, ex traditione M. Maripetri sacri ordinis
 equestris, recenset Alexander Benedictus *de Part. Corp. hum. Lib.*
III. cap. 4. Oper. fol. m. 395. Exemplum etiam viri lactiferi, qui
 satis obesus & pinguis continua pressione mammarum ita easdem
 assuefecit, ut lac funderent, quoties voluerit, sæpe cum adstan-
 tium muliercularum risu & admiratione, refert Abrahamus Cy-
 prianus *Epistol. de Pœt. tubar. p. m. 23.* Accepit etiam Santorius
 a Quinto Bononianne, præceptore suo, se novisse quendam Ca-
 labrum, qui mortua uxore, cum præinopia nutricem non valeret
 conducere, suo lacte prolem propriam aluit. vid. Albert. Kyper.
Anthropol. sive univers. Medicin. contract. Lib. I. p. 490. Et Isbr. de
 Diemerb. *Anat. Lib. II. c. 2. f. 249.* In tota quadam profapia in
 Dania tam viros, quam virgines copiosum lac ex mammis fudisse,
 ex Thoma Bartholino refert Theodorus Craan *de Homine cap. 165.*
p. 727. vid. Th. Bartholin. *Hist. anat. Cent. I. Hist. 27. p. 333.* Vidit
 etiam Hieronymus Eugubius aliquando viros, qui in uberibus ha-
 bebant lac, quod exprimendo mittebatur, uti ex ejusdem libel-
 lo de lacte allegat Antonius Deusingius *Dissert. de Lact. §. 19. p. 327.*
 Commemorat etiam Petrus Laurenbergius *Acerr. Philolog. Cent.*
III. Hist. 82. p. m. 489. se anno 1610. Parisiis contubernalem quen-
 dam Gallum habuisse, qui ex mammis suis, quoties ipsi placuerit,
 tantam albi atque perfecti lactis copiam exprimere poterat, quan-
 ta ad aliquot vascula stannea minora, *Commentchen* dicta implenda
 requirebatur. Fortasse est eadem observatio, quam refert Johan-
 nes Helwigius, *Obs. 135. p. 369.* inquit: Cum Monspeli in Gal-
 lia studio medico vacarem, narravit mihi Gothofredus Zehmen,
 Schleusingensis, vir juvenis doctus pius & fide dignus, quod Pa-
 risiis juvenem viderit, cujus mamillæ præter sexus naturam ad-

eo turgebant, ut &, quodcumque libuerit, merum lac ex illis guttatim expresferit. Et Nicolaus Venette *de la Generat. de l'homme Part. II. Art 3. p. m. 90 seq.* idem confirmat his verbis: J'ay demeuré plus de quatre ans a Paris avec un honnête homme medecin, qui s'appelloit Roinette. Il étoit sanguin de temperament, & il étoit agé d'environ 30. ou 35. ans. Quand il pressoit la mamelle & le mamelon, il en faisoit sortir de cueillerées d'une humeur blanchâtre & laitée, qui eust peu sans doute nourrir un enfant, si elle eut esté succée. Judæo cuidam, cum, uxore mortua, nutricem ob pauperiem conducere nequiret, ex speciali gratia Deum proprias mammas lacte sufficienti implevisse, ex Buxtorfio refert Rosinus Lentilius *Fatromnemat. Part. II. cap. 23. p. 489.* Quendam militem in oppido *Wansleben* infantem, mortua conjuge, lactasse, ex relatione Andreæ Ernesti Evers communicat Johannes Ludovicus Hannemannus *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 120. Sch. p. 239.* Et de sexagenario lactante sequentem historiam *ibid. App. p. 60.* recenset Christianus Franciscus Paullini; scilicet Parochus quidam paganus, vir devotus, ex nundinis hebdomadariis aliquando rediturus, prope pagum suum, sub crepusculo, retro dumetum audiit vagitum infantis. Accessit propius &, Christiana misericordia tactus, expositum pusionem tollit, rens, forte a puellis, quarum curæ commissus, ludos inter, ex negligentia derelictum esse. Fama ocyus omnes casas pervolitante mater desiderabatur. Altero die de cathedra publice annunciat suis, monens, ut vicinos interrogent, quo suæ redderetur matri. Bonus interim senex de alimento puellæ pie sollicitus, obtestatur quasdam lactantes in villa feminas, ut & misellæ huc & famelicæ ubera charitatis alternatim præberent. Volentes nequibant, quæ poterant nolebant. Sic ipse, ut potest, lacte caprino nutrit alumnam suam, & aliquando noctu in lectum suum reponit flentemque more mulierum pectori admovet. Infans papillas senis sentiens fugit, omni vagitu cessante, subridens ille crebrius hoc

strategemate vagientem permulcet. Tandem creberrimo fuctu lac fati copiosum provocatur, non sine singulari providentia, quæ cuncta gubernat. De viris mammosis & lactantibus Johannes Rhodius *Not. ad Scribon. Larg. Composit. med. p. 143.* ita scribit: Naturæ portento. Viri quandoque mammosi, qualem mihi adolescentulo sub philosophiæ mitiorisque litteraturæ tirocinio Cantabrigiæ hospitem videre licuit ætatis mediæ fuscum ac troffulum. Viros etiam lactantes in Ægypto conspexit Veslingius, dum Cairi quinquennium commoraretur. Hæc & alia virorum lac in mammis habentium vel etiam lactantium exempla allegant etiam Thomas Bartholin. *Vindic. Anat. p. m. 32. item Anatom. Lib. II. cap. 1, p. 333.* Joh. Helwig. *Obs. 135. p. 369.* Gualter. Charleton. *Oeconom. animal. Exercit. 3. p. 32.* Joh. Schenck. *Obs. med. Lib. II. f. 305.* Marcell. Donat. *de med. Histor. mirab. Lib. VI. cap. 2. p. 610.* J. C. Bitterkraut *Threnod. Medic. cap. 10. p. 312.* Georg. Franc. *Annot. in Paul. Zacch. Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. 2. Qu. 1. f. 88.* Joh. Bened. Sinibald. *Geneanthrop. Lib. IV. Tr. 2. cap. 6. p. 456 seq.* Casp. Brav. de Sobremont *Consult. Disp. apolog. p. 199.* Casp. Theoph. Bierling. *Advers. curios. Cas. 34. p. 64.* Casp. a Reies Camp. *Elys. Qu. 47. p. 578 seq.* Chr. Franc. Paullin. *Cynograph. Sect. I. cap. 3. p. 52.* M. N. C. *Dec. I. An. 2. Obs. 135. Schol. p. 218 seq.*

§. 17.

*in viris in
novo orbe.*

Imo in novo orbe & in regionibus orientalibus Africæ secundum quorundam historicorum relationem totæ gentes reperiuntur, apud quas omnes pene viri magna lactis copia abundant, ideoque propriam prolem lacte suo alere solent, vid. Gualth. Charlet. *Oeconom. anim. Exercit. 3. p. 32 seq.* Inquit etiam Johannes Jonstonus *Thaummatograph. natural. admirand. homin. cap. 5. Art. 2. p. m. 465.* qui novum lustrarunt orbem, narrant, viros pæne omnes maxima lactis abundare copia. vid. etiam Andr. Laurent. *Anat. Lib. IX. Qu. 2. f. 341.* Et secundum Nicol. Venett. *de la Generat. de l'homme Part. II. cap. 1. Art. 3. p. m. 90.* dans l' Orient d' Afrique du côté de Mon-

Monzambique & du pays des Caffres, si nous en croyons les historiens, plusieurs hommes nourrissent leurs enfans du lait de leurs mammelles. In quadam Brasiliæ provincia, Cumucajatam gentem virorum esse tam amplis mammis lacte turgentibus præditam, ut infantibus alendis lactandisque sufficiant, mulieribus illorum econtra parvis virilibusque mammis donatis, ex Cysato refert Casparus a Reies *l. a. p. 579.* quod etiam ex Jacobo Carpenfi ibidem confirmat: ex Brasiliensis nostris literis cognovimus gentem quandam inventam, ubi viri, non feminæ lactant infantes; his enim mammas esse parvas & vacuas, illis magnas & lactis plenas. vid. etiam *Bitterkraut l. a. cap. 10. p. 314.* item Rosinus Lentilius *Iatromnem. Part. alt. cap. 23. p. 489.* qui tamen non immerito de ejusmodi historicorum relatione dubitat; talia certe, inquiens, qui proderere non erubescant, in urbe Mentiris dignitatem consulatus jam diu pro meriti sunt. Cur enim moderna itineraria de his taceant? Denique tradant alii, quod sine risu (at, ubi, non recorder) legere non potui, monialem carceri inclusam exsuctis propriis mammis per tempus bene longum servatam fuisse. Citius asinos volasse crediderim &c.

§. 18.

Non autem tantummodo in viris & juvenibus hominibus, sed etiam in maribus brutis interdum lac deprehensum legitur. *in maribus brutis.* Catulos enim duos, ex genere, quos *ἰχθυόδαι* græci vocant, id est, *in canibus.* indagatores, frequenti suctu, ex grandioris canis maris papillis lac evocasse, ita ut ille non sine magna omnium admiratione matris vice educationis munere perfunctus sit, uti ex Cælio Calcagnino refert Marcellus Donatus *de Med. Histor. mirab. Lib. VI. cap. 2. p. 611.* Canis Anglicæ virginis, quæ non prægnans lac habebat, quod ipsa exfugebat, meminit Sigismundus Schnitzerus in Epistola ad Andr. Libavium, in Joann. Hornung. *Cist. medic. Epist. 45. p. 152.* Cui Libavius *Epist. 47. p. 155.* ita respondet: Historiola canis Anglicæ,

næ, seipsam lactantis sui virginis lacte placet. Virginibus euchymis & bene habitis multum crebro id contingere notum est. Canis illa sua ubera sugendo lactis materiam attraxit, & forte ab his, in quorum deliciis est, sæpius est attrectata, cumque affluxum congestionem sensit, tanquam seipsam curatura, quod glutit. Narrat etiam Regnerus de Graaf *de viror. organ. p. m. 93.* historiam decane admodum pingui, ex cujus mammis felis per aliquot annos lac exfuxit tam copiosum, ut inde fere nutriretur, idque per multos annos, absque quod unquam generasset, imo, quod magis est, coivisset; nam toto tempore, quo eadem coitum appetere animadverterent, illam diligenter custodiebant: nihilominus tandem aliquando canis aliquis domum intrans cum illa coivit, & ab illo tempore felis nunquam lac, quemadmodum antea, ex mammis exfugere voluit. Sequentem observationem de lacte in canicula virgine reperta refert Theodorus Kerckringius *Spicileg. Anatom. Obs. 21. p. m. 50.* In domo alicujus mihi cognatæ alebatur, ut sit, ad delicias canis quædam Melitæa, forma inter paucas commendata; huic, ut sic dicam, coalumna erat felis domestica, quæ quotidiana consuetudine caniculæ facta familiarior, dum, cum illa petulanter ludit, coepit ore papillas ejus apprehendere, fugere, & eo se lusu sæpius de die oblectare. Canicula omnium, qui in domo erant, testimonio, nunquam mater, nunquam gravida fuerat, & tamen quotidiano isto suctu (quis credat, nisi viderit? ego vidi & ideo narro) papillæ tandem manare coeperunt lacte candidissimo, quo se felis quotidie pascebat, tanta inter utrumque animal petulantia, ut oculi domesticorum castiores diutius non ferentes situs & gestus, quo ludebant, lasciviam, utrumque e domo ejecerint. Prodibat tandem lac istud tanta copia, ut quilibet emulgere digitis e papillis posset; Erat autem gustui, quod curiositatis causa expertus sum, non ingratum lac istud virginicum. Simillimum huic exemplum caniculæ Italicæ, adhuc virginis, felem parvam lactantis, ante viginti aliquot annos apud mer-

Observatio.

mercatores Dresdensis, nomine Thile, observare mihi licebat, hac tamen differentia, ut felis five catellæ pili, antea admodum tenues atque, pro more, molles post aliquot septimanas admodum spissi & crassi, instarque pilorum caninorum evaderent.

§. 19.

De capris lac in mammis habentibus hinc inde etiam fit mentio, siquidem juxta Aristotel. *de Histor. Animal. Lib. III. cap. 20. fol. m. 383.* in Lemno insula capro ex mammis, quas geminas juxta genitale gerit, tantum lactis emulgebatur, ut colostrum inde conficerent; quod idem etiam proli masculæ capri illius evenisse accepimus. Nec ab Aristotele tantum narrata hæc audimus, quippe, secundum Casp. a Reies *Camp. Elys. Quest. 47. p. 580.* Franciscus Xaverius Societatis Jesu fidelis & veridicus testis, & ex eo Aldrovandus refert, in India Orientali apud Ambrinum suis se oculis conspexisse hircum lacte suo parvos alentem hædos, & ex ubere, quod unicum habebat, tantum reddebat lactis quotidie, quantum scutella capere posset; addit, honestum quendam Lusitanum hunc hircum eo consilio secum asportasse, ut in Lusitaniam mitteret. Tres hircos uno eodemque tempore in Bohemia diversis in locis repertos fuisse, qui ex uberibus lac copiosum reddiderint, ad Casparum Peucerum scripsit Petrus Andreas Matthiolus *Epistol. Lib. III. fol. m. 141.* Juxta Caspari Schwenckfeld. *Theriotroph. Stiles. p. m. 98.* anno 1602. villicus quidam in pago *Fischbach*, hircum aluit, qui lac ex ubere reddidit papillis duabus. Idem etiam in Pleswiz accidisse, simul commemorat. Refert etiam Johannes Ludovicus Hannemannus, consiliarium quendam regni Suediæ aluisse hircum, qui tantum fudit lactis, ut mulgere fuerit necesse; ex lacte eo curavit confici caseum, quem suis hospitibus, tanquam rarum aliquem cibum, in conviviis dabat comedendum. *vid. M. N. C. Dec. II. An. 8. Obs. 91. p. 206. ubi pag. 207.* addit, Johannem Sophronum Kozack Dresdæ vidisse hircum, cujus testibus adnata fuerint ubera lac copiosius stillantia. Annectere adhuc liceat

verba Thomæ Bartholini *Epist. medic. Cent. III. Epist. 38. p. m. 142 seq.* rustici, inquietis, cujusdam mei pullus equinus lact tanta copia profundit, ut pro ipso alendo satis esset. Item, in ovilibus nostris res notissima est, frequenti contrectatione papilla agnellos mulgeri posse.

§. 20.

*Lactis præ-
sentia nul-
lum signum.*

Cum proinde secundum hætenus dicta tam in non gravidis, quam prægnantibus feminis, item in maribus diversæ ætatis, imo in infantibus utriusque sexus, quandoque lactis copia mammas impleat, ejusdem sane præsentia pro signo violatæ pudicitiae maxime fallaci merito habenda erit; hinc etiam Paulus Zacchias *Quæst. med. leg. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. n. 23. fol. 88.* inquit, ex his patet, conjecturam, quæ ex collectione lactis in mammis sumitur, esse satis fallacem & nulla ex parte certam. Olaus Wormius ad quæstionem: an lac in mammis mulierum sit sufficiens conceptionis indicium Jacobo Hasebardo ita respondet: Cum & ratio & auctoritatum majestas & infallibilis experientiae momenta abunde evincant, tam in virginibus, quam in mulieribus sterilibus, tam in masculis rationalibus, quam irrationalibus, lac copiosum existere posse, & extitisse, quis unquam sanus pro infallibili conceptus signo illud acceptavit? v. Thom. Bartholin. *Cist. med. Locul. 23. pag. 251.* Et *pag. 256.* addit: nemo sanus verum lac esse, quod infantes nutrire potest, lactis veri habet substantiam, qualitates & vires, negabit unquam: nemo cordatus illud, quod exstringi pro lubitu in assidentium faciem potest, & infanti nutriendo & educando sufficit, parcum esse affirmabit. Sic Casparus Bravo de Sobrem. *l. a. pag. 198.* ait: Licet naturali instituto lac fiat in prægnante, dum sanguis ad mammas recurrit, ut lac generetur & tempore perficiatur, ut post partum valeat statim foetum alere, nec sine fine & necessitate, nisi in gravidis illud ante partum præstaret natura; potest tamen a præternaturali ordine everti ordo, & redundans ob alias causas sanguis refluere in mammas. Andreas Laurentius

Histor.

Histor. anat. Lib. IX. Qu. 2. fol. 341. duplicem lactis differentiam facit demumque concludit, lac verum & exquisite coctum ante conceptionem generari non posse; crudum vero & dilutissimum ex reliquiis alimenti proprii confectum, interdum posse. Quid jam olim de hoc graviditatis signo senserit facultas medica Hassnienensis, Andreas Ottomarus Goëlicke *Medicin. forens. Specim. IV. §. 6. p. 53.* adducit: quandoquidem experientia demonstret; & multis variorum exemplis ostensum sit, quod non in pueris tantum utriusque sexus in mammillis possit lac album observari, sed etiam in puellis, de quibus nulla dubitatio fuit, imo etiam in viris tam abundans, ut infantes eo lacte potuerint nutrire, & faciem eorum conspergere, qui affidebant; Præterea & Hippocrates & alii medici antiqui satis probarint & explicarint, quomodo id fieri possit: Non possumus non perspicere, qua ratione possit hoc signum pro indubitato censer, quod femina vel prægnans sit vel pepererit. De lacte in feminæ cujusdam, a consanguineis falso pro gravida habitæ, mammis propullulante observationem refert Georgius Dethardingius *M. N. C. Dec. III. A. 5 & 6. Append. p. 147.*

§. 21.

Sicuti autem lactis in virginum & viduarum mammis præsentia nihil certi de earundem prægnantia promittit, imprimis cum etiam in ipsis gravidis lac ordinarie non statim prioribus ab imprægnatione mensibus, sed postremo tempore demum appareat; in multis etiam mulieribus nec ultimis gestationis temporibus lac inveniatur, nec nisi post tertium a partu diem, ante quod tempus, juxta Alberti Kyperi *Anthropolog. Lib. I. p. 490.* sæpe nec infantem ad sugendum apponunt, nec alii mammas ad sugendum præbent, ita pariter ex lactis absentia seu defectu, nec primis nec ultimis gestationis mensibus, certum aliquod signum, quod nimirum talis femina utero non gerat, desumi poterit; siquidem interdum etiam neque in gravidis, neque puerperis mammæ lacte repletæ, sed vacuæ penitus deprehenduntur, & quidem vel ob materiæ chylosæ in sanguine penuriam, vel ob totius massæ, vel
mam-

*Sine lacte
graviditas.*

mammarum earumque glandularum atque porulorum vitium; plures enim uxores mihi notæ fuere, quibus neque tempore gestationis, neque post partum ne guttula quidem lactis in mammis apparuit, neque ex illis exprimi potuit. De lactis defectu ex animi mœrore observationem recenset Guilielmus Fabricius Hildanus, *Observ. Chir. Cent. IV. Obs. 27. p. 310.* de matrona Hildensi, cui juvenculæ adhuc in primo puerperio, cum propter res adversas in summam tristitiam & mœrorem incidisset, mammae ita exaruerunt, ut ne guttulam quidem exfugere posset infans. De muliere satis extenuata & graciles mammas habente, ex defectu lactis laborante, v. Petr. Forest. *Obs. med. Lib. XVII. Obs. 17. fol. m. 122.* Uxor Henrici Lewis, militis prætoriani, Hermentie ton Boom vocabulo Belgico appellata, annos circiter triginta duos nata, & cessantibus menstruis jam tertium imprægnata ad nonum usque mensem se experta est quoad omnia in gravidationis signa in eodem statu, ac dum alias utero gereret, hoc uno excepto, quod toto illo tempore nihil lactis in mammis apparuerit &c. v. Abrah.

Observatio. Cyprian. *Epistol. de Fæt. tubar. p. 5 & p. 16.* Ante triginta circiter annos carpentarii aulici, uxor, postquam jam tres a se editos infantes suis mammis lactasset, quarta vice gravida omnia equidem imprægnationis signa in se observans ultimis gestationis mensibus de graviditate sua fere dubitasset, & quidem ex ea ratione, quia ex mammis suis sensim flaccescentibus, contra consuetudinem, ne guttulam quidem lactis exprimere valebat; Et quamvis postmodum legitimo tempore dicta femina foetum eniteretur, pariter tamen quoque post partum eundem lactis defectum experiebatur, neque foetui, ut antea, lac præbere poterat. Quem lactis defectum dicta femina, postmodum ter adhuc gravida facta, tam ante quam post partum semper patiebatur, nec unquam amplius lac in mammis habebat. Aliud exemplum anno 1723. in cuiusdam colonelli locumtenentis uxore, annum circiter trigesimum octavum agente, observare mihi contigit. Postquam enim antea
jam

alia obser-
vatio.

jam septem liberos enixa fuerat, a frequentibus maximisque ter-
roribus, mœrore atque excandescents, varia symptomata feбри-
lia cum summis anxietatibus, frequentibus lipothymiis & mensi-
um suppressione incurrebat; ex quibus ingravidationem ipsi præ-
dicebam; quod ipsa vero primo tempore non solum negabat, sed
postmodum etiam, cum post dimidium solitæ graviditatis tempus,
nec in utero motum infantis, neque etiam in mammis, antea sem-
per admodum turgidis, lactis indicium sentiret, sed has potius in-
dies sensim detumescere & exarescere observaret, nihilque lactis
ex ipsis exprimere valeret, minime credere volebat, imprimis
cum posterioribus mensibus, nocte quadam, audito prius sonitu,
ac si membrana in ipsius abdomine disrumperetur, magna aquæ
copia ex utero ipsius evacuetur; qualis evacuatio post quatuor
circiter hebdomadas, & quidem multo largior atque ad cantharos
circiter quatuor vel quinque, ex improvviso & unico quasi impe-
tu iterum proruebat, unde tam ipsa gravida, quam obstetrix at-
que adstantes de vera ingravidatione dubitabat, cum præsertim
etiam post tantam aquæ effusionem in utero nullus foetus motus
ab ipsa femina sentiri neque etiam a marito & obstetrice lactu ex-
plorati posset. Licet etiam obstetrix aliquot ante partum dies,
digito in feminæ uterum immisso, se nullum infantem ejusve ca-
put, sed tantummodo aliquid molle, instar membranæ vel pul-
monis cujusdam tangere serio affirmaret, paulo tamen post vivum
sequioris sexus foetum, cum ingente mola, magnisque congruma-
ti sanguinis frustis, enitebatur, quem partum secundâ & tertiâ
septimana variæ membranæ minores & majores sequebantur.
Unde sane, neque lactis præsentiam neque defectum certum gra-
viditatis signum, indicare liquet.

§. 22.

Porro ad reliqua graviditatis signa ut progrediamur, neque
etiam ex abdominis vel ipsius uteri intumescencia, certum præ-
gnantiæ signum desumi potest, quia talis abdominis intumescen-
tia

Syllepsilogia.

Ggg

Dubium
contra ab-
dominis in-
tumescen-
tia tiam.

tia in statu quoque feminarum morboſo, v. g. a menſium defectu vel ſuppreſſione, cachexia, Hydrope, a flatibus, ab induratione glandularum atque membranarum, vel alia ingravidatione falſa oriri poſſe confirmant autores Inquit enim Caſparus a Reies *Camp. Elyſ. Qu. 49. n. 19. p. 614.* Ventris tumorem & menſium retentionem plures decipere, cum in hydropem flatuoſumve alium tumorem ſœpe deſinant & aliquando in matricis aut alterius partis apoſtoma. Poſteſt etiam mulier juxta Zacch. Luſit. *de Prax. med. adm. l. 2. Obſ. 148. f. 79.* geſtare molam, ventum, aquam, pus, mucorem foetidum, viſcoſam lentamque pituitam, & vi caloris in utero globi inſtar duratam, quæ omnia uterum elevaſſe, & poſtea excreta fuiſſe, citra ſperatum foetum, auctorum lectione comperimus. Et ſecundum Caſp. Brav. *de Sobrem. l. a. p. 198.* hoc ſignum nihil convincit neceſſario: nam poſteſt intumeſcentia ab aliis cauſis fieri: & ideo nec eſt ſignum nec acciſdens quarto modo proveniens a prægnantia &c. Poſteſt enim hæc intumeſcentia fieri ex retentis menſtruis, ex morbo, ex hydrope, ex flatibus. Item Paulus Zacchias *Quæſt. med. leg. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. n. 17 & 18. fol. 87.* idem confirmat, quod ventris turgentia ex aliquo morbo, & præcipue ex menſtruorum retentione, ex hydrope, ex ventofitate, facile provenire poſſit. Quamobrem merito a cæteris D.D. hoc ſignum reſpuitur, neque ex eo probari poſſe prægnantiam aſſerunt. Neque dicat quis hanc ventris tumefactionem diverſo penitus modo fieri ab ea, quæ ex morbo cauſatur, & viſu etiam apparere diverſam, quia in prægnantia paulatim, & ordine quodam procedit venter indies creſcendo, in morbo vero vel aſſatim, vel nullo ſervato ordine; & in prægnantia quidem tumorem apparere non durum ut ex viſcerum ſcirrho, non mollem, ut in hydrope, ſed modice renitentem, neque expanſum & diffuſum, ut in aquoſo, vel ventoſo tumore, ſed leviter acuminatum. Nam hæc tam ſubtiles, immo potius tenues ſpeculationes, ac animadverſiones bene quidem in libris explanantur, in practico tamen actu omnino in auras, ob eorum tenuitatem, evaneſcunt; non ergo hæc aliquid certi

certi promittere possunt, nec illud operari valent, ut indubitato sententiam nostram de ea re proferre liceat. Quinimo in conclusione uteri tam similis est hæc tumefactio ventris ei, quæ ex prægnantia provenit, ut Hippocrates ventrem non solum intumescere dixerit. Sed pro temporis ratione, ut in prægnantibus fieri solet, incrementum, quod ad septimum vel octavum etiam mensem mulieres fallere consuevit; inexpertæ enim, ut ipse dicebat, ex hoc utero se gerere credunt. Juxta Andr. Ottom. Goelicke *Medic. forens. Spec. IV. p. 51.* intumescencia & detumescencia abdominis hydropico lasciticis & tympaniticis & diuturna menstruum suppressione laborantibus communis est, & aliis quoque de causis, facta scilicet humorum hucusque retentorum evacuatione remittere solet. Inquit etiam Michael Alberti *Jurispr. med. cap. IV. §. 14. p. 89.* Successiva ventris intumescencia omnino graviditatem comitari solet, licet illam astutiores feminæ sæpe sub laxioribus & amplioribus vestimentis, præcipue *unter denen Reiff-Ræcken* celare queant, quæ tamen intumescencia iterum a morbosa ventris inflatione distinguenda est, ut interdum ipsæ feminæ, quæ sibi persuadent gravidas se esse, cum illo signo decipiantur; quare nonnulli doctores hoc signum propter suam æquivocationem respicere solent. Quod si vero hæc intumescencia provide inquiretur, tunc omnino prægnantiæ testimonium perhibet: Specialiora vero hujus protuberantiæ signa sunt 1) ut successive increbescat, 2) quo eminentes desint causæ morbosæ, 3) ut ab imo ad summum vergat & circa umbilicum se exferat, 4) quo sit æqualis, 5) ut lumbi una attollantur, 6) ut tumor sit colore & densitate naturalis a flatulentis & humidis expansionibus liber & modice renitens, 7) ut sit circa umbilicum leniter acuminatus, 8) ut nunquam remittat, sed indies accrescat, 9) ut aliis imprægnationis respondeat, 10) neque molestæ gravitatis sensum causetur. Secundum facultatis medicæ Halensis responsum, *kan eine Frauens-Person, die noch niemals gebähret hat, allein auf die Dicke des Leibes und Regung in dem-*

selben, daß sie schwanger, nicht unfehlbarlich versichert seyn, wenn sie ihre Menfes darbey, ordentlich, beständig und genugsam hat. So sie aber solche unbeständig und wenig, oder doch allein wenig hat, auch concubitus sich bewußt ist, so kan zwar auch sie oder iemand anders nicht unfehlbar versichert seyn, iedoch sehr wahrscheinlich dessen vermuthen seyn, und thut solchen falls nichts darzu, daß sie auch niemahls gebahren, indem sie desgleichen sich leicht erkundigen kan. vid. Frid. Hoffmann. *Medicin. consult. Part. II. Cas. 5. p. 39 seq.* De veræ & falsæ graviditatis signo a ventris intumescencia &c. desumpto ita scribit Dionis *des Accouchem. Lib. II. c. 1. p. 125.* dans une bonne grossesse le ventre de la femme se foutient, sa grosseur est éminente & se porte en devant; le nombril est élevé & fort en dehors; si l'on touche l'orifice interne de la matrice, on la trouvera humectée & d'une substance souple & mollasse sans dureté, & les mammelles s'emplissent de lait, qui est un temoignage assuré de la bonne grossesse. Dans la fausse grossesse le ventre est également tendu de tous côtez; si la femme se couche sur un côté, son ventre tombe une boulle pesante du meme côté; elle a son nombril enfoncé, & l'orifice interne de la matrice est dur & petit; il ne se porte point à ses mammelles du veritable lait, ce n'est qu'une serosité provenant de la suppression de ses menstres, & quoy qu'il ait plusieurs mois qu'elle se croye grosse, parce qu'elle n'est point réglée, elle ne sent rien remuer. vid. etiam paulo infra *Cap. V. §. 3 seq.*

§. 23.

Contra
motum fœ-
tus.

Non autem solummodo abdominis intumescencia, sed ipsius quoque fœtus in abdomine vel utero perceptus motus incertum graviditatis signum exhibet; cum talis motus non semper a fœtu, sed ab aliis quoq; causis & quidem vel in utero ipso, v.g. a mola &c. vel in abdomine tantum existentibus falsamq; conceptionem seu graviditatem causantibus dependeat; Quamvis etiam talis motus revera a fœtu oriatur, non tamen eodem gestationis mense vel tempore a gravida sentitur. Unde etiam scribit Michael Ettmüllerus

lerus *Oper. Tom. II. fol. m. 1074*. Motus hic non semper successive magis fit manifestus; sunt enim mulieres; quæ motum percipiunt citius, & aliæ, quæ tardius: Sic quædam tertio mense, quædam nono saltem mense, foetus motum demum percipiunt, & nihilo minus tamen brevi post feliciter pariunt. Contingit hoc imprimis iis, quæ sunt ferofiores & aquosiores, in quibus copiosus chylus nutritivus transcolatur per uterum. In his ex abundantia talium aquarum uberiorum, ut vocant, seu liquorum, quibus foetus includitur, quarum copia uterus ita impleri & distendi potest, ut mater motum foetus non percipiat; imprimis si hic ipse forsan simul debilior paulo fuerit; Tale exemplum in femina in paragrapho paulo antecedente de lacte, adducta observare mihi licuit, quippe quæ per totum gestationis tempus ne minimum quidem foetus motum sensisse sancte affirmabat, ante partum autem magnam aquæ quantitatem excernebat. Secundum Mich. Albert. *Jurispr. med. cap. IV. §. 15. p. 90*. discernendus est embryonis motus a flatibus vel manifestis vel obscuris, a spasmis, mensium vitia comitantibus, a motibus hysteriis, nec non a commotionibus irregularibus uteri molam prosequentibus &c. Embryonis motum etiam a febre retardari docet Thomas Bartholinus *Histor. anat. Cent. I. Histor. 96. pag. m. 136 seq.* Tardius, inquit, movetur in utero foetus, si uterum gerens prægnans febre corripiatur. Motum enim celerem vires utriusque promovent, in febre fractæ. In vicinia nostra febricitabat gravida mulier, jam hebdomadæ septem & viginti effluxerant flaccido ventre & sine ullo concepti foetus certo motu, ut sensum de graviditate cœperit dubitare. Exinde tamen obscurus embryonis motus deprehensus ad septimam usque hebdomadam, qua tenerrimum in lucem edidit puerulum, angustæ manicæ includi aptum. Foetus tamen vitali luce donatus & bene antea nutritus videbatur & motus tarditatem postea expeditiori compensavit. In feminis etiam pinguibus accidit, ut motum foetus minus vel tardius percipiant, uti refert idem Thomas Bartholinus *l. a. Cent. V. Histor. 78. p. m. 155. sub-*

inde, inquit, foetus, licet vivat & bene valeat, ante partus horam, non movetur, quod pinguiusculis feminis notavi accidisse. Idem Bartholinus etiam *Tract. de insolit. Partus viis Cap. 2. p. 16.* inquit, sibi Hafniæ notas fuisse gravidas, quæ ante imminentem partum nullum embryonis motum observarint, adeoque se uterum gerere ignorarint, priusquam utero exortis doloribus Lucinæ opem implorarent: Quantum autem autorum de signo, ex foetus motu in utero desumendo sententiam attinet, scribit Paulus Zacchias *l. a. fol. 90. n. 35 seq.* Ultimum signum, cui plurimum tribuit Cagnolus, est, quando mulier sentit foetum in utero moveri; ac bene quidem se res haberet, si mulier certa esset, motum illum a foetu excitari, sed de hoc quomodo certa esse potest? Motus enim in utero aliquando ex humoribus, ex ventositate, ex mola excitari potest. Jure ergo Fortunatus Fidelis etiam hunc motum in utero factum, pro infallibili graviditatis signo respuit: neque enim certam habet significationem: unde inter alia, quæ ipsas prægnantes mulieres non modo, sed & obstetrices ac medicos decipere solent, hic motus est, teste Hippocrate 2. *Præd.* At quæcunque, inquit, se concepisse existimant, neque conceperunt, & multis mensibus decipiuntur, quod menstrua non compareant, & venter turgescere ac moveri videatur &c. quod quidem in mola fit: Præterea absque eo, quod quicquam tales motus persentiat mulier, interdum gravida est, & plures indies cernuntur, quæ etiam septimum mensem prætergressæ adhuc se gravidas esse non didicerunt; imo & non postremis mensibus. Et licet sciam, non parum differre motum foetus ab eo, quem excitat mola, vel ventositas; nam ventositatis motus neque continuus est, neque ordinatus, & mola non movetur ex se, sed ad motum mulieris, & in summa non minima intercedit differentia inter unum & alium motum, ut docet Fernelius, tamen ego experientiæ majorem fidem adhibeo, cum viderim doctissimos, ac primi nominis medicos atque chirurgos; & expertissimas obstetrices in ea re falli non se-

semel aut bis, & tamen cum principibus personis agebatur. Quod absque dubio indubitata fides nobis facere debet, tale prægnantiæ signum esse, ut reliqua omnia, dubium ac fallax. Talem motum cum graviditate frustrata annotavit Georgius Hannæus in puella, nondum viginti annos nata, sed Pamphili compressu gravida, jam ante biennium facta. Hæc circa festum Martini anno 1684. observavit in alvo suo volutari globosum corpus, magnitudine pomi decumani. Quatuor ante Paschatos festum 1685. quasi in furias acta delirare cœpit cum tremore & ferali cordis coarctatione cum aliis symptomatibus. Interea pendet natura inexpectatum lunare tributum, novem ante Pascha diebus, ipsa autem feria secunda factus est maximus aquarum (quales profundunt parturientes) æstus; insequentibus intensissimis doloribus. Neque tamen sua levata est sarcina infelix ista, sed cœpit ab eo tempore liberius respirare. Tandem rediit quodam die cursus menstruus, & proxima luce fudit novum laticem amnios, per novem dies continuos, sed nullus sive foetus, sive molæ, consecutus est exitus. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 167. pag. 342 seq.* Cum femina quædam leprosa tumorem in ventre haberet, qui prægnationem ostendere videretur, & accederet motus interior ventris talis, qualis in vera imprægnatione adesse solet, embryone in utero sese primo movente, judicatum fuit, gravidam esse hanc; Tandem in demortuæ cadavere uterus ab aqua tumidus deprehendebatur. vid. Theoph. Bonet. *Sepulchret. Lib. III. Sect. 24. f. 1140.* Inquit etiam Nicôlaus Venette *de la Generation de l'homme Part. III. cap. 3. p. 374.* le lait & le mouvement de l'enfant, qui semblent estre les marques les plus assûrees de la grossesse. ne le sont pas plus, que les autres. Le mouvement, qu'elles sentent dans le ventre, peut estre excité par des vents ou par des humeurs: & les exemples des femmes, qui s'y sont trompées, ne sont pas rares, quelques savans medecins y ont mesme esté surpris. vid. etiam Casp. Brav. de Sobremont *l. a. p. 200.* item Thom. Bartholin. *de insolit. Part.*

viis cap. 2. p. 14 seq. Guil. Harv. de Part. p. m. 506. Falsum graviditatis ex foetus motu desumptum signum paulo infra cap. IV. §. 8. ex Harveo reperies, & §. 10. ex Heerii Obs. 14. aliud exemplum videbis.

§. 24.

non ex reliquis signis.

Quoad denique reliqua graviditatis signa, quæ v.g. a pica, nausea seu fastidio, capitis dolore; vertigine caliginosa, flavedine oculorum, vario faciei colore, venarum tumore & nigredine, item a torminibus circa umbilicum, tumore crurum, pulsusque mutatione &c. desumi solent, non a sola ingravidatione, sed etiam a mensium suppressione, ventriculi vitio, cachexia, febribus &c. oriri possunt. Ex lipothymiis equidem & vomitu certum facti conceptus signum statuit Theodorus Craan *Dissert. de Homin. cap. 64. p. m. 722 seq.* quæ tamen etiam in plurimis affectibus occurrunt, ut adeo ex prædictis Paulus Zacchias *l. a. fol. 91 seq.* optime concludat, quod certa prægnantiæ cognitio ex nullis signis indubitato haberi possit, sed bene conjecturalis ac dubia; nullum enim signum tam proprium prægnantiæ habemus, quod ex aliqua alia præternaturali causa originem habere non possit, neque ullum tam certum ac tutum experimentum, ut illi indubitatam fidem præstare liceat. Hæc autem omnia universaliter sunt intelligenda, nam bene in casibus particularibus usu venit, ut certo certius prægnantia deprehendatur. Sed ex particularibus non possunt elici conclusiones universales: itaque universalis eorum plurima, quæ diximus, veritatem habent. Imo omnia adducta signa esse falsissima, testantur etiam observationes de ingravidatione falsa paulo post sequentes.

§. 25.

non ex simul junctis.

Statuunt etiam nonnulli, quod horum quidem signorum singula per se sint absque dubio incerta ac fallacia simul tamen juncta possint plenam ac infallibilem prægnantiæ probationem facere, his tamen Paulus Zacchias *l. a. fol. 90. n. 42.* respondet, sciendum esse,

esse, omnia hæc simul; iuncta cum aliis quam plurimis ab aliis relat-
tis signis posse ex morbo ac præternaturali causa originem habere;
nam pone mihi mulierem, cui menstrua ex alia causa, quam ex
prægnantia aut ætate defecerint, huic profecto & ciborum pote-
runt esse fastidia & proclivitas ad vomitum, & ventris tumefactio,
& lac in mammillis, & maculæ in facie & motus excitatio in ventre
& color totius corporis pallidus, & si quæ alia referri possunt pro
signis prægnantiæ: omnia enim ac singula communia sunt tam
prægnantiæ, quam menstruorum retentioni. Et Nicolaus Ve-
nette *l. a. p. 371 seq.* ita loquitur: Si la matrice est fermée, que les
regles soient retenues, que le ventre s'applatisse d'abord, & qu'
il s'enfle dans la suite, que l'on s'apperçoive du lait, qui se forme
dans les mammelles, & qu'enfin on sente dans son flanc un mou-
vement, qui ne peut venir, que de l'agitation de l'enfant, qui est,
si je puis parler ainsi, une partie des entrailles de sa mere: tous ces
signes dis-je joints ensemble paroissent d'assez fortes preuves
pour nous persuader, qu'une femme est grosse. Mais, à dire le
vray, il n'y a pas plus d'assurance à la croire grosse, qu'à deviner,
si elle a une pierre dans la vessie lorsqu'on a quelques marques.
Tant de signes qu'il vous plaira de la grosseur d'une femme, ce
ne sont pourtant que des conjectures, qui nous peuvent quelques
fois tromper, & que des moyens de confusion pour un medecin,
qui s'y assure avec trop de confiance. J'avouë que l'on est assuré
de la pierre, quand on la touche avec la sonde; & que l'on est aussi
persuadé de la verité de la grosseur, lorsque l'on touche de la main
la teste d'un enfant, qui est dans le pas. Et quanquam Andreas
Ottomarus Goëlicke *Medicin. forens. Specim. IV. §. 15. p. 60.* existi-
met, quod si omnia enarrata indicia non seorsim sed collective su-
mantur, imprimis vero cum signis pathognomonicis conjungan-
tur, non sit dubitandum, quin de prægnantia mulieris medico
constare possit: Tanto magis, si indicia quædam concurrant, ex
ipsa oculari corporum inspectione haurienda. Et §. 29. p. 73. scri-

biti) falli, quotquot pręgnantiam mulierum nullo unquam tempore per certa, infallibilia, pathognomonica ac vere demonstrativa indicia cognosci posse existimant; atque adeo in meras tandem conjecturas atque probabilitates universum negotium resolvunt. 2) causam incertitudinis pręgnantię non latere in re ipsa, sed tantummodo in incuria & inadvertentia mulierum: Alias enim sequeretur, naturam femellas humanas prę illis brutorum in longe infeliciorem conditionem detrussisse, cum his impręgnationis tempus exactissime cognitum atque perspectum sit; Nam ex quo conceperunt, nullum amplius masculum non tantum non admittunt, sed & vi quadam a se depellunt. Sequeretur etiam, mulieres juvenculas noviter nuptas in dijudicanda pręgnantia doctiores esse illis, quę jam aliquoties peperere, cum rarissime, gravidas sese judicando, fallantur. Maxime tamen dubiam adhuc Goelickianam hanc sententiam reddit praxis quotidiana; licet enim in gravidationem citius & melius ipsis pręgnantibus feminis, quam viris & medicis innotescere, ab illis etiam interdum ob varias rationes quocumque modo & astutia negari & occultari concedamus, sæpiissime tamen etiam tam noviter nuptę, quam aliquot jamjam fœtus enixę, pręsertim primis graviditatis mensibus, status sui sunt incertissimę, nisi forsitan aliquę certum quoddam sibi que proprium pręgnantię signum aliquoties jamjam observaverint; ut adeo etiam medici, quorum quandoque judicium de hujus vel illius feminę in gravidatione a magistratu requiritur, ab astutis feminis facillime decipi queant. Et juxta verba Guilielmi Harvei *de Part. p. m. 506.* interdum certissima gravidationis signa non modo ignoras mulieres, sed obstetrices expertes, & peritos etiam medicos atque attentos fefellerunt. Quapropter, cum pręter dolos muliebres varia sint pręgnationis falsa indicia, de partu inordinato ante septimum mensem, aut post undecimum haud temere statuendum est. De incerto in gravidationis signo vid. etiam Mich. Bernh. Valentin. *Pandect. med. leg. Part. I. Sect. 1. Cas. 15. pag. 44 seq.*

§. 26.

Dari autem quandoque certa signa, quibusdam individuís ^{Dantur} propria & peculiaria, ex quibus imprægnationem certo sibi pro- ^{signa pro-} mittere possunt, testantur autores, quale certum & infallibile im- ^{pria certa.} prægnationis signum communicat Michael Ernestus Ettmüllerus *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. I & II. Obs. 45. p. 114.* Anna Maria, Pauli Heerbeck's, calceis refarciendis operam navantis, uxor, quotiescunque concepit, & antequam alia ingravidationis signa compareant, sanguinem ex bregmate sinistro exstillare percipit, qui fluxus licet sat copiosus sit, innoxie tamen eundem ad partus usque tempus fert, ubi sponte cessat. Prægnantiæ signum infallibile in nobili quadam muliere observavit Dominicus Panarolus *Pentec. V. mens. Obs. 46. p. m. 173.* in hac scilicet muliere, quoties utero gerebat, statim primis mensibus, vena tumens in femoris interna parte, prope genu apparebat, ex compressione forsitan venarum ab utero facta, ex qua similis vena tumorem elevabatur. Paulus Zacchias, uti *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Qu. 2. n. 14. fol. 93.* refert, mulierem vidit, quæ, cum antequam utero gereret, vinum, ut aliæ fastidiant, amaret, prægnans facta ab eo ita alienata est, ut jam per multos annos ne odorem quidem illius persentire valeat. Aliam novit, quæ omnia salita odio habebat, cum tamen in prægnantia non nisi salitis cibaretur. Diarrhœam singulis mensibus in gravida innoxie recurrentem annotavit Petr. Rommelius in mercatoris Ulmen'sis uxore, quæ trium jam prolium mater, præ aliis feminis hoc peculiare habebat, quod gravida facta, statim a primo conceptionis mense usque ad ultimum gestationis diem, singulis mensibus, diarrhœa & quidem diuturna ac vehementiori corripere-
^{Diarrhœa.} tur, cum doloribus & torminibus ventris sat gravidis atque molestis. Postea tamen menstruam hanc diarrhœam semper & sibi & foetui innoxiam fuisse experta est, eamque jam pro indubitato graviditatis signo habebat, si nempe menstruo spatio exacto loco catameniorum, alvi profluvium adveniret, quod deinde

singulis mensibus stato tempore rediens septem vel octo subinde diebus continuis durare solebat, illamque singulis diebus vices, ad minimum vero quatuordecies vel quindecies ad fellas patroclynias secedere ibidemque copiose alvum exonerare cogebat. vid.

*Somnus
meridianus.*

M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 149. p. 304. Mulieri cuidam tum sæpe somnus meridianus conceptionis signum erat, ut eodem nolenti obrepente de certa conceptione amplius nunquam dubitaret, juxta Viti Riedlin. filii, *Obs. 98. p. 229* Sutoris Quedlinburgensis uxor sana & vegeta, ubi corpus a motu vel lassumpto sudorifero calefie-

*Sudor uni-
us lateris.*

bat, in singulis sinistri lateris partibus a capite ad calcem usque sudorem profundebat largissimum; in dextro vero latere ne minima sudoris gutta nec mador unquam erumpebat, quod nunquam aliter contigit. Quoties vero hæc femina ex marito concipiebat, statim toto gestationis tempore sudor per corporis partes in utroque latere ordinarie prorumpebat. Exantlatis vero partus laboribus, eo ipso momento dextri lateris pori concidebant, ac firmissime iterum claudebantur, adeo ut ipsa sudorem totius corporis pro infallibili conceptionis indicio haberet, & quasi pro pathognomonico imprægnationis signo in se jam agnosceret, secundum observationem Jacobi Schmidii *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 126. p.*

ptyalismus.

287. In femina quadam robustæ constitutionis gravida ptyalismum observavit Johannes Georgius Hoyerus. v. *M. N. C. Dec. III. An. 3. Obs. 50. p. 57.* Femina quædam præcipuæ conditionis, incipientibus singulis imprægnationibus, præter alia molestissima symptomata, conflictabatur crebris vomitionibus: quæ sequentibus & partui propioribus mensibus quotidie exasperabantur, adeo ut nonnunquam diei noctisque spatio ad quindecim vel viginti vices plus minus vomitionibus affligeretur, atque non sine maxima angustia, summo conatu, & suffocationis periculo, atque intolerabili stomachi sive superioris orificii ardore. Materia illarum vomitionum purpureo erat colore, subcrassa & copiosa, sic ut pelvim mediocrem vel etiam duas una vice repleret &c. Quæ

vomi-

vomitiones dies noctesque continuabant, donec ipsa concepto foetus onere liberabatur; tuncque omnia, confestim & quasi in momento cedere confueverint, secundum observationem Philippi Salmuthi *Obs. med. Cent. II. Obs. 54. p. 82 seq.* De nobilissima quadam femina, quæ quoties uterum gerebat, hanc autem singulis annis tumentem habebat, toties primis mensibus vel lienis obstructione & dolore vel ophthalmia laborabat, cum sternutatione singulis diebus repetente. vid. Thom. Bartholin. *Cent. VI. Hist 31. p. 254.* Herniam uterinam graviditatis tantum tempore manifestam tandemque lethalem in pistoris cujusdam uxore annotavit chirurgus quidam Saufselius, vide Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. 3. Mens. April. Obs. 2. p. 52.* Nobilis quædam Basiliensis, quoties uterum gerebat, in ascitem incidebat, & paulo ante destinatum partus tempus abortiebat. Tandem cum illud quater quinquiesve factum fuisset, in abortu extinguebatur, teste Felice Platero *Obs. Lib. III. p. m. 638.* Mulieris gravidæ antipathiam cum anguillis annotavit Josephus Lanzonus *M. N. C. Dec. II. An. 9. Obs. 208. p. 379.* inquit: est hic Ferrariæ uxor cujusdam civis, annorum triginta trium, quæ dum utero gerit, statim antipathia cum anguillis laborare incipit, ita ut hoc solo signo se gravidam esse judicet. Tunc enim nec edere nec videre anguillas potest, ad earum solummodo præsentiam in vomitum incidens. Post partum autem hæc cessat antipathia, imo eisdem coctis, tandem delicato ferculo ipsa utitur. Idem etiam in juvencula primipara, cujusdam fabri uxore, se observasse scribit dictus autor *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 103. p. 171.* Et Josephus Lanzonus *l. a. An. 10. Obs. 89. p. 160.* alius uxoris Ferrariensis meminit, quæ, quotiescumque gravida erat, fontica passione afficiebatur bis in mense, transacto autem nono mense & partu finito, ab epilepsia liberabatur; ipsique pro signo infallibili novæ conceptionis spes erat epilepticus insultus &c. De femina sex liberorum matre, quæ quoties gravida erat, hoc sibi proprium habebat, ut circa

antipathia cum anguillis.

epilepsia.

quartum vel quintum gestationis mensem levi de causa, in planitie etiam prono lapsu in terram decidebat, alioquin nec epilepsiæ nec lipothymix obnoxia, v. Ehrenf. Hagendorn *Hist. med. phys. Cent. II. Hist. 91. p. m. 269.* Honoratissima semina, quoties utero gerebat, hactenus sex liberorum mater, hoc sibi proprium habebat, ut circa quartum & quintum gestationis mensem levi de causa, nihil tale cogitans, in planitie etiam, prono lapsu in terram decideret, alioquin nec epilepsiæ, nec lipothymix obnoxia; Quæ ipsa aliquando gravida in cubiculo sua munia exercens ex improvise in terram concidebat attonita quasi, unde brachio alterutro in repositorium, quo aquæ destillatæ asservabantur quædam, incidens, sua & mariti fortuna, vitrum aqua apoplectica plenum fregit, cujus odor fragrantia sua nares cum feriret, expergefacta quasi ad se rediit, ut assurgens domesticos vocare posset in adjutorium, referente Ehrenfrido Hagendorn *Hist. med. phys. Cent. II. Hist. 92. p. 269 seq.* Novit etiam Joannes Fernelius non paucas mulieres, quæ quoties uterum gestabant, crebro epilepsia corruiebant, expeditæ vero nunquam. v. Fernel, *Patholog. Lib. V. cap. 3. p. m. 72.* Sicuti plerisque feminis sanis mensium suppressio certissimum graviditatis signum esse solet, ita e contra aliæ quandoque observantur, quibus nunquam, nisi post conceptionem menses fluunt, uti jam supra ex *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 348. p. 555.* de molitoris uxore, quæ ex sola mensium apparitione imprægnationis certa erat, adduximus. Quemadmodum etiam noviter maritatæ plerumque post conceptionem de dentium dolore conqueri solent, ut etiam odontalgia a medicis inter signa conceptionis numeretur; ita e contra in uxore Johannis Ludovici Hannemanni, quæ dentium tortura, quando non gravida erat, plurimum laborabat, gravida facta, dolor hic evanescebat, neque prius redibat, quam quando pepererat. vid. Thom. Bartholin. *Act. Hafniens. Vol. III. Obs. 17. p. 30.* Refert etiam Dominicus Panarolus *Pentec. III. Obs. 9. p. 68.* se mulierem vidisse inter plurimas, quæ tantum consilio & mente

vale-

valebat, quantum in utero gerebat, tunc etenim cum prudentia & pudore maximo exemplar aliarum erat. Sed elapso puerperio non multo post illecebrosior & lascivior fomenta libidinum impudicissima mente quærebat, donec iterum utero gereret, quo facto mens & ratio ad suas sedes regrediebantur. Mulieris, quæ semper melancholia uterina laboravit; simul vero atque concepit, etiam ista melancholia cessavit, ex Amato Lusitano meminit Michael Ettmüllerus *Oper. Tom. II fol. 1073*. Mulierem quandam continuis cephalalgis vexatam ab iisdem extitisse immunem, ubi conceperit, ex Ballonio refert Michael Ernestus Ettmüllerus *Ephemerid. l. a. Schol p. 116*.

§. 27.

Cum proinde, secundum hætenus adducta, graviditatis signa adeo sint incerta atque fallacia, nihilominus tamen meretricio quæstu viventes mulieres sæpissime a medicis sub mensium suppressorum prætextu remedia sollicitent, quibus postea embryonem abigere tentant, cautus hac in tentatione fit medicus, atque in suspectis personis imprægnationis veritatem astutia quadam detegere studeat, qualem modum per uromantiam & venæsectionem Johannes Petrus Albrecht *M. N. C. Dec. II. An. 8. Obs. 165. p. 395 seq.* communicat. Quintus, inquiens, jam agitur annus, quo rusticus cum filia viro satis apta meas ædes intrabat, obnixè petens, ut hujus urina examinata, idoneis medicamentis ipsius morbo subvenirem. Relicta filia in museum intromittens solum patrem, cum ex fallacissimo lotio, uti fieri solet, nihil certi determinare possem, instabam, ut ad nonnullas quæstiones responderet, sed irritò valde conatu. Ipse namque me ex urina cuncta melius perspecturum esse, quam suis verbis proferre posset, regerebat. Nescio, quomodo factum, quod lotio satis naturali apparente forte fortuna de obstructione mensium facerem mentionem; quo facto ille statim, morbum me bene divinaſſe, aſſerebat: sed cum ulterius, anne cum servo familiariter filia hætenus vixiſſet? quærerem,

Imprægnatio astutia detecta.

rerem, ille me omnia ex lotio videre putans, summopere meam ex hoc divinandi peritiam admirabatur. Sed ego, heus amice! inquiebam, tua filia est gravida, neque alio morbo, quam quem ex concubitu cum servo contraxit, tenetur; utque scias, non gratis me de ea tale quid dicere, ipsius propriam confessionem tuis percipies auribus. Dato igitur campanula signo ipsam filiam adduci curabam, quam in præsentia patris ita alloquebat: quænam, amica, te causa movet celandi illud, quod medico data ipsi potestate inspiciendi urinam, ignotum amplius esse nequit? Ad quæ verba sæpius ingemiscentis facies rubore suffundebatur insigni, pulsusque, quem veritatis indagandæ cupidus studio attingebam, talis ferme erat, qualis in Antiocho, cum amore uxoris Seleuci captus esset. Sed quænam, pergebam, hæc tua est audacia, qua parentes, imo ipsum medicum eludere conaris? O stulta, si me tuam prægnantiam complexusque venereos, quibus servo patris tui juncta es, latere voluisses, cur tuæ mihi conspectum concessisti urinæ, quæ talia me ignorare amplius non finit? Hisce a me dictis, quanquam ita timidam obstupefaceret pudor, ut vix cogitata proloqui posset; nihilominus, se neque cum servo, neque cum alio unquam rem habuisse, constanter negabat. Mihi tum forte ad manus erat capsula quædam lusui infantum inserviens, in qua testudo artificialiter facta, ad quemvis levem impulsu caput pedesque tremulo motu concutiens, delitescibat. Arrepta hac occasione acriter negandi ejus pertinaciam detestabar addens, si spontaneam confessionem ulterius recusaret, hujus animalculi ope veritatem facile detectum iri: Quod cum attonito vultu suis oculis subjiceret, nescio quid mali inde sibi ominans victas dabat manus, defloratamque a servo virginitatem ultro & propriis verbis confitebatur &c. Sic memini ante aliquot annos ancillam quandam chirurgum venæsectionis administrandæ gratia adiisse: Ille secta mediana sanguinis quantitatem emittit. Tempore pomeridiano ancilla revertens ex chirurgo quærit, quid de sanguine emisso ipsi videat.

videatur? Hic nescio qua suspicione commotus audacter eam utero gerere asserit multisque ejus impudentiam increpat verbis, dicens, si antea ejus imprægnatio sibi fuisset nota, nunquam ad venæsectionem hoc in casu illicitam se manus adhibiturum fuisse: Quinimo ad majorem verbis fidem conciliandam petit, ut nulli hominum ancilla de venæsectione instituta quicquam aperiat, famæ alias se jacturam insignem pati posse, &c. Ad quæ verba illa statim effatur: Bone Deus! estne possibile, te tuique similes ex conspectu sanguinis imprægnationem mulieris detegere posse? Verum est, cepit usuram corporis mei amicus: Tuum erit, ut erga nullum de hocce meo statu verba facias, qui suo tempore sufficienter in apricum veniet &c. Addo & hoc, pergit Albrechtus, me ut plurimum, si ejusmodi suspectæ personæ sub prætextu obstructi mensium fluxus meum auxilium implorant, neque adeo certa prægnantiæ indicia sese offerunt, præscriptis initio aliquot confortantibus, talem vel similem loquendi formulam superaddere: En! amica, quanquam, quare tuis verbis fidem denegem, non habeam, necesse tamen judico, ut scias, ordinata medicamina, si ex vera præternaturali mensium suppressione labores, magno usui tibi futura esse; Si vero, de quo tamen dubitare me cogit pudicitia tuæ fama, cum viro accubasti, venereaque voluptate fruita es, te non ignorare velim, pharmaca alias saluberrima veneni induere naturam satisque & jam a me consignata virium habere, ut in lethality periculum te conjicere queant. Quibus verbis non raro id effeci, ut medicamentorum in pharmacopolio præparationem studio neglexerint, satis firmo indicio, eas non extra omnem læsæ virginitatis suspensionem positas esse.

CAPUT III.

De ſignis ſexus in utero.

§. I.

*An dentur
ſigna ſexus
in utero?*

NON autem ſolummodo graviditatem ſed ipſius quoque foetus, in gravidæ matris utero adhuc contenti, ſexum an ſcilicet mas vel femella fuerit, ex certis ſignis diſtinguere atque prædicere allaborant, ut plurimum autem ejusmodi ſigna pro maribus a gravidæ latere dextro, pro femellis a ſiniſtro, vel ex aliis ſignis deſumere ſolent, uti ex quibusdam autoribus videbimus: Inquit ſcilicet Ludovicus Bonaciolus *de Fæt. format. cap. 4. p. m. 252 ſeq.* an mas an femina fuerit partus, exquiſite explorandum eſt. Quamobrem neminem lateat, marem ferenti dextri oculi celeritudinem vividumque colorem ineſſe. Cui etiamnum mamma dextra impendio major, obdurior ejusque papilla ocyus, quam lævæ a colore evariat. Eidem lac præcox, quod ab ubere mulctum vitreo umboni injectum ſolique per horam expoſitum in orbiculum inſtar margaritæ fulgore micantis conglobatur: quod inſuper in ejusdem mulieris, a qua mulctra facta eſt, lotio fuſo partem imam recto viæ itinere petit, ſal illi adjectus neutiquam colliquatur. Quin & affidue, quæ marem gerunt, facilius exigunt, & coloratiores, dextra potiffimum mala, ſunt minusque pallent. Nec minus proſecto admiratione dignum eſt, mulierem itione perpetuo dextrum pedem præferre, ac exurgentem manui dextræ potius, quam lævæ inniti: Dexter pulſus eidem plenior. Contraria omnia in altero ſexu. Ariſtolochiæ pulviſculus ex melle confectus, lanaque obvolutus, per tempus vulvæ impoſitus, mari aut feminæ inchoatæ argumento eſſe poteſt. Nam ſi ſalivam edulcaverit, mas procul dubio conceptus eſt: ſi amarorem allectet, femella &c. Mulier prægnans ſi quidem marem geſtat bene colorata eſt; ſi vero feminam, male colorata, juxta Hippocr.

Secl. V. Aphor. 42. Quem Aphorismum Johannes Heurnius *pag. 374.* ita reddit & explicat: Mulier gravida si quidem marem concepit, colore est vivido: sin autem feminam, fœdo, hoc est, est coloratior cum mare, quam, cum femellam gestat, esse solet. Cum femina non tam bono est colore, ac cum marem gestat, & lentigine obsidetur facies. In mare ajunt fœtæ oculi dextri pupillam majorem ac nitidiorem esse, & dextras arterias turgidiores & commotiores, venas sub lingua dextras tumidiores, ut etiam mammam dextram uterique dextras partes. Secundum Roder. a Castr. *de Natur. Mulier. Lib. III. cap. 7. p. m. 123 seq.* in ætate florentes feminæ ut plurimum mares gestant, novellæ aut senescentes femellas, propter dejectum in his vegetiorem calorem in illis, quæ insuper masculum gestat, coloratior est, ac moderati vultus, læta, agilis, velox, & utero gerentium symptomatibus minus affligitur; quod adhuc minus certum est, quia sunt robustæ mulieres, quæ melius se habent, dum femellam gestant, quam aliæ delicatiores gestantes mares, quare potius de muliere ad seipsam collata, non ad aliam, hæc veniunt intelligenda, nigricantes enim ac tumescentes in dextro inguine venæ marem portendunt; in sinistro femellam. Ad hoc si mulier stans ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium est, item oculus ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus rotunda & in dextra parte magis elata, mamma dextra tumidior, & ejus papilla coloratior, gravedo, pondus ac sæpe motus sentitur in latere dextro; nam mares plerumque in dextris, feminæ in sinistris concipiuntur; qua etiam ratione e dextro teste avulsum semen masculinum magis, ex sinistro femineum est; pulsus item dexter major, manumque dextram porrigit primum. E converso autem quæ mulier feminam concepit, primus se ipsa colorata apparet, quoniam femina mare frigidior est &c.

§. 2.

De signis masculinitatis & femineitatis ita loquitur Avicenna *Alii auto-*

Lib. III. Fen. 21. Tract. 2. cap. 13. fol. m. 393. pręgnans habens masculinum, est melioris coloris, & pluris levitatis & agilitatis & mundioris faciei, & sanioris appetitus & quietiorum accidentium, & sentit gravedinem lateris dextri. Plurimum enim generatur masculus ex spermate expulso ad dextrum matricis: & non accidit illud, nisi aut propter desiderium illius lateris ad recipiendum, aut quoniam expulsio est ex testiculo dextro. Et quando movetur foetus masculus, movetur ex latere dextro. Plurimum enim cum incipit mamilla augmentari, & alteratur color, fit in ea quę habet masculum ex latere dextro, & proprie papilla dextra, & ad ipsam currit lac in primis, & provocatur in primis. Est & lac, quod mulgetur ex ubere ejus, grossum viscosum, non tenue aquosum, ita quod lac masculi distillatur super speculum, & consideratur ad ipsum in sole, & remanet, quasi ipsum sit frustrum argenti vivi, aut granum margaritę, non currens neque protensum. Et augmentatur papilla in habente masculum in rubedine, non in nigredine vehementi. Et fiunt venę papillarum ejus rubeę, ad nigredinem declives. Et fit pulsus ejus dexter vehementius plenus & frequens. Et dixerunt quidam, quod quando movetur a statione, movet prius pedem dextrum, & est expertum. Et cum erigitur, sustentatur super manum dextram. Et est oculus ejus dexter levioris & velocioris motus. Et masculus movetur post tres menses, & femina post quatuor menses &c. Uxorem novit Johannes Nicol. Binningerus juxta *Observ. medic. Cent. II. Obs. 38. p. 167.* quę primis graviditatis mensibus, prout masculum vel femellam utero gerebat, de insigni surę dolore conquerebatur, qui grandiore facto foetum evanescebat. Apud Thomam Bartholinum *Anatom. Lib. I. cap. 29. p. m. 278.* dividitur uterus in partem dextram & sinistram. In illa ut plurimum mascululi generantur, in hac femellę. Et raro aliter evenire compertum est, testibus Hippocrate & Galeno. Signum, an mas vel femina in utero geratur, hoc habent venatores, si percussę ferę in dextrum latus con-

concidant, marem conjiciunt, quia in dextro latere pondus gestatum latet, contra, si feminæ. Mulierculas ferunt marem gestantes semper dextrum pedem in ingressu magis elevare, quam sinistrum. Inquit, sunt etiam obstetrices, si mater sine labore gestet, & florida sit, leviter incedat, nullam gravitatem sentiat notabilem, hoc signum esse nascituri masculi; v. Theod. Craan *de Hom.* cap. 41. pag. 706. ubi quærit, quid hæc omnia recensita aliud denotent, quam potentem fermentationem, vires constantes, corpusque sanum? potentia hæc masculum foetum, debilitas vero femellam producit. Et David Græbnerus *Medicin. Vet. restit.* p. 643. in hunc Cranii locum annectit, quod, si papillæ sursum conversæ fuerint, masculum gestet, si deorsum, femellam. De diagnosi sexus in gravida sequentia scribit Rosinus Lentilius *Miscell. med. pract.* p. 3. Anno 1671. Dn. D. de Houft, Gallus, Practicus Heidelbergensis, nobis quibusdam medicinæ studiosis, ceu signum certissimum laudavit sequens: nempe considerentur ariolæ mammillarum in gravidis; hæ enim si pallescunt, feminam uteri incolam, si rubescunt, & fusci sunt quasi coloris, masculum indigitant. Quis autem medicorum arbitretur omnes gravidarum mulierum papillas? Licet igitur experimenti nervum non videam, celare tamen lectorem curiosum nolui, si forte se mammillarum arbitrum gravidis obtrudere velit.

§. 3.

Quod paulo ante ex Thoma Bartholino de venatorum iudicio adduximus, confirmat Philippus Salmuth *Observ. med. Cent. II. Obs. 25. p. 70.* sequenti observatione: Quærebat, inquit, aliquando ex me serenissimus Elector, cum in venatione hinnulum prægnantem, cornu in fronte gerentem, globo trajecisset: qui fieret, dum icitur fera gravida, si gerat foetum masculum, cadat in latus dextrum, si femellam, in sinistrum? id quod pro certo haberent venatores, ut etiam pretium deponerent, se nondum aperto cadavere asserturos, quidnam utero geratur. Respondebam, hanc

item.

mihi videri rationem, quod secundum Hippocratem mas in dextra, femella in sinistra plerumque sita sit, unde alimentum ad illam potissimum quasi feratur, sicque fortior ea reddatur, quemadmodum ex oculo dextro vividiore, & mamma dextra pleniore, si mas geratur, ex Hippocrate & aliis appareat. Sicuti etiam observatum sit, si marem gerat, dextrum pedem proponere mulierem solere; si feminam sinistram. Non itaque mirum, si fera icta parti fortiori innitatur, sicque in eam cadat. Adstabat vero nobilis quidam, qui hanc meam rationem sequenti narratione comprobabat: Iter una fecisse duos venatores per pratum, vel natura loci, vel ratione pluviae magis irriguum: cumque praecederet illos virgo (ut putabatur) rustici cujusdam filia, alterum cum altero deposuisse, gravidam illam esse & gerere masculum; Id & eventum comprobasse. Intra paucas enim septimanas illam puellum enixam esse, comperiunt venatores: quorum alter alteri postmodum concredidit, sed id ex dextri pedis, altius sinistro semper pressi, vestigiis animadvertisse. Masne an femina utero geratur, juxta J. Fernel. *Pathol. Lib. VI. c. 17. p. 206.* hinc conjiciendum: Mulier si marem gerit, probe colorata est & hilari vultu: si feminam, decolor ac tristis. Mares parte uteri dextra magis continentur, feminae magis sinistra. Et quum mas est, dextra mamma amplior est ac tumentior, ejusque papilla nigrescit firma & arrecta, citiusque lacte stillat. Praegnans e sede progressura dextrum pedem primum promovet. Omnes tum venae, tum arteriae dextrae magis quam sinistrae implentur, ac tument, praesertim sub lingua: estque pulsus in dextra quam sinistra manu plenior, major ac validior. Quum vero femina gestatur, sinistra omnia firmiora & magis conspicua sunt, flaccidioresque sunt mammarum papillae. Quin etiam lac emulctum si aquae instilletur, mox (quia tenue & dilutum est) divellitur: cohæret autem, ac diutius persistit in summo, si masculus est foetus. Juxta Petri Forest. *Observ. med. Lib. XXVIII Obs. 59. Schol. fol. m. 721.* in maris conceptu dextrae partis vasa, venae & arte-

arteriæ magis intumescunt, præsertim quæ sunt in lingua: sicut in conceptu feminæ oppositum conspicamur. Certissimum vero ac minime fallax masculi foetus indicium est, si prægnans dextræ manus pulsus validiorem, velociorem, majorem duriorumque habuerit: ac feminæ, si talis sinister fuerit. De femina marem gerente ita loquitur Joannes Varandæus *de Morb. mulier. Lib. II. cap. 2. Op. fol. m. 583.* exurgens dextræ manui potius incumbit, pedem dextrum deambulatura primum promovet, oculum habet dextrum limpidiorem & vegetiorem: lac crassius & magis compactum ex dextro ubere præcipue effluens &c. Alacrior est, citius motum embryonis in utero sentiscit, nec tot fatigatur symptomatis, ac si feminam gestet, quæ omnia ut plurimum vera, si non semper, reperiuntur. Mulierculæ nostræ, pergit idem, pro certo habent, marem esse, quando stillæ sanguinis vividi & bene rubentis frequenter ex nare potissimum dextra effluunt. Huc pertinent etiam versus Ægidii in Valesc. de Tarant. *Philon. pharmac. Lib. VI. cap. 16. App. p. 690.*

Conceptum maris insinuat splendor faciei,
 Membrorum levitas, spissi concretio lactis
 Atque tumor ventris in dextra parte rotundus,
 Feminæ sexum contraria signa demonstrant.

Eadem signa approbat etiam Nicolaus Venette *de la Generat. de l'homme Part. 3. cap. III. pag. m. 369.* inquiens: On ne se contente pas de decouvrir en general la grossesse d'une femme par des signes: on veut encore savoir, si elle est grosse d'un garçon ou d'une fille. Il est vray, que les garçons nous donnent souvent des marques, que les filles ne nous donnent pas: car celle qui est enceinte d'un garçon, se porte ordinairement beaucoup mieux, & le sent mesme plutôt, que si elle l'est d'une fille, qui dès les premières actions de sa vie commence à donner plus de peine à sa mere, que ne fait un garçon pendant toute sa vie. Si la mere sur la fin de sa
 gros-

grosseſſe tombe dans quelque fâcheuſe maladie ſans faire de fauſſes couches, c' eſt une forte conjecture, qu' elle porte en ſes flancs plûtoſt une fille, qu' un garçon, celui-cy a ſes attaches plus ſeches, que cellelà, il ne ſauroit reſiſter à des attaques ſi rudes. Mais encore un mâle rendra rôbuſtes toutes les parties droites de ſa mere, qui en voulant marcher, ſe ſervira plûtoſt du pied droit, & en voulant prendre quelque choſe, agira plûtoſt de la main droite que de la gauche. On remarquera encore dans ſon œil, dans ſa mammelle & dans ſon pous du coſté droit beaucoup plus d' eclat, & beaucoup plus de changement & de force, que du gauche, & ſi l' on tire de ſes mammelles une goutte de lait, lors qu' il y en aura de perfectionné, on verra qu' elle ſe conſervera ronde ſur l' ongle, ſi elle porte un garçon, au lieu que ſi c' eſt une fille, le lait eſtant fort fereux ne ſe ſoutiendra pas ſi bien. De his ſignis varia quoque adducit Fortunatus Fidelis *de Relation. Medic. Lib. III. Sect. 4. cap. 6.* de indiciis, quibus deprehendi poſſit, masne, an femina in utero geratur? *p. 424 ſeq.* vid. etiam David. Herlic. *de Curat. gravid. & puerperar. cap. 4.* de notis ſexus concepti *p. 27 ſeqq.* Bern. Gordon. *Lil. Medicin. Partic. 7. cap. 15. p. 799.* Hieron. Capivacc. *de Lact. Lib. IV. cap. 5. p. 829 ſeq.*

§. 4.

Alii negant.

Aliis tamen autoribus non immerito pleraque hætenus re-
cenſitorum ſexus ſignorum pro incertis atque fallacibus judican-
tur, unde Joannes Varandæus *l. a.* inquit: de hiſce ſignis pru-
denter reſpondere debemus, omnibus rite penſitatis, & ex colla-
tione cum aliis proprioque gravidæ temperamento, quia facile
eſt in hiſce decipi propter varias cauſas, a quibus iſtiusmodi effe-
ctus pendere poſſunt. Et Georgius Fridericus Laurentius *Exer-
cit. in Hippocr. Aphor. Exerc. 23. p. 271 ſeqq.* monſtrat, Hippocratis
Aphoriſmum 42. *Sect. 5.* (Mulier gravida, ſi marem gerit, bene co-
lorata eſt, ſi feminam decolor) absolute poſitum non eſſe absolute
verum; ideo contrariari obſervationi, limitatæ autoritati, au-
tori,

tori, conjecturæ artificiosæ & medicæ, quo loco non modo contra colorem, sed alia quoque sexus signa, varias rationes atque auctoritates affert, demumque Aphorismum absolute verum sic format: Mulier gravida, sive marem, sive feminam gerit, quandoque bene, quandoque male colorata est, pro ratione temperamentorum, causarum, signorum distinctivorum atque circumstantiarum variantium. Idem Laurentius etiam *Exercit. 25. p. 283.* Hippocratis Aphorismum 48. *Seç. 5.* (Foetus mares dextra uteri parte, feminæ sinistra magis gestantur) non absolute verum judicat, dum uteri in dextram & sinistram partem divisio falsa est, sed potius unica cavitas secundum foetus molem expansa deprehenditur; insuper etiam feminæ gravidæ tam mares quam femellas modo in dextro, modo in sinistro latere sentiunt. Minime itaque, juxta Mich. Ernesti Ettmülleri verba, *Ephem. Acad. N. C. Cent. I & II. Obs. 45. Sch. p. 115.* sexum embryonis prædicere quidam, ut gloriantur, poterunt, Hippocratis effato *Seç. V. Aphor. 48.* decepti, siquidem hoc ipsum Thomas Bartholinus *Cent. V. Hist. 88.* propriæ & Brassavoli uxoris exemplis refutat. Inquit autem Bartholinus *l. a. p. 168.* credunt plerique pro signo maris concepti perpetuo esse motum in dextris, cujus tamen signi fallaciam in uxore mea suavissima Elisa Christophoriana hætenus deprehendi. Uterum secundo gestabat 165. & in dextro plerumque tumorem motumque embryonis sentiebat, stupebatque crus dextrum, enixa tamen est filiam Margaretham, natu secundam. Quum reliquos filiolos Casparum, Christophorum & Thomam, & tertiam filiolum, Annam Margaretham subsequenter annis ordine suo gestaret, & in dextris & sinistris tumor motusque se prodidit, sed mamma dextra lacte prima turgebat. Brassavoli autem uxor perpetuo mares, secundam ipsius verba, in sinistra matrice, in dextra feminas concepit. Cognoscitur autem hoc, tum ex motu, qui in dextro fit latere, tum ex foetus globo, qui in eodem latere est. Imo gemellos parienti primo exhibat puella, quæ cum exiverat, latus dextrum

exinanitum esse videbatur, deinde exeunte mare finistrum latus exinanitum apparuit. vid. Laurent. *l. a. p. 288.* ubi addit, massam observasse in quadam prægnante, duos foetus masculos gestante, unum in dextra, alterum vero in sinistra uteri parte. Item, ipsi Laurentio quondam serio retulit illustris quædam Comitissa, fetam mares, quam femellas foetus in uteri dextro latere gestasse tantum. Andreas Libavius ad Sigismundum Schnitzerum sequentem observationem scribit: Fuit apud nos netrix quædam viginti quatuor annorum ætatis, quæ a quodam vitiata gemellos concepit, femellam, cujus situs in dextro latere, & masculum, cujus sub hypochondrio sinistro. vid. Joann. Hornung. *Cist. med. Epist. 76. p. 208.* Et Michael Ernestus Ettmüllerus. *l. a.* refert, se novisse feminam, quæ utriusque sexus liberos in lucem produxit, omnes tamen in dextra parte conceperat. Scribit etiam Fortunatus Fidelis *de Relat. medic. Lib. III. Sect. 4. cap. 6. p. 427 seq.* nescio, qui possit foetus aliquanto magis in una parte uteri, quam in alia consistere, nec quomodo ad dextram magis aut ad sinistram vergere: totum enim uteri spatium ipso æque completur. Omnia hæc signa meris conjecturis annumerat Scipio Mercurius *della Commare Lib. I. cap. 10. p. 74.* Il curioso, inquiring, in questo capitolo vorrà anco sapere, se vi è modo di conoscere, che la donna habbia concetto maschio o femina: il che essendo di niuna importanza à sapere, e mera curiosità, e però il ricercarlo mi pareva soverchio di trattarne: Pure volendo sodisfare anco ai spensierati, gli dirò quello, che da altri auttori è stato scritto; ma però in modo, che tutto sia segno congetturale effallacissimo: perche in molte pratiche hò veduto il contrario &c.

§. 5.

alia obser-
vationes.

Huc pertinet etiam observatio Francisci Mauricean *Obs. 458. p. 268.* d'un homme, qui croyoit, que sçachant le temps de la conception d'un enfant l'on pouvoit predire, si c'estoit un garçon ou une fille, durant qu'il estoit encore au ventre de la mere. Le 10. Jan-

Janvier 1687. j'ay accouché une femme d'un garçon, mais il y avoit pour lors en la chambre de cette femme un homme de ses amis, qui me dit un peu devant, qu'elle accouchast, qui sçavoit bien certainement, que l'enfant, dont elle alloit accouchoit, estoit un garçon; parce qu'elle estoit devenuë grosse durant le temps de la plene lune & qu'elle auroit infailliblement fait une fille, si elle eust conçu dans le temps du decours de la lune, m'assurant, qu'il avoit fait cette remarque par un tres grand nombre d'expériences, qu'il avoit toujourns trouvées vraies; & qu'il avoit appris ce secret d'un Prince deffunt, qui en avoit éprouvé luy-mesme la verité, dans tous les enfans, qu'il avoit eüs de sa femme. Si l'evenement de cette preconnoissance estoit toujourns vray, & que ce secret fust connu d'un chacun, il estoit certain, que l'on verroit dans peu de temps le monde diminuer beaucoup en nombre: car la pluspart des hommes desirans, que leurs femmes fassent plutôt des garçons, que des filles, il arriveroit, qu'y ayant un bien plus grand nombre des garçons que des filles, il n'y auroit pas à la fin un nombre de femmes assez suffisant pour perpetuer le genre humain, qui ne s'entretient que par le nombre de deux differens sexes à peu près egal. C'est pourquoy je crois, que Dieu n'a pas voulu expressement reveler à personne, le veritable secret d'engendre plutôt des garçons, que des filles, & d'avoir la preconnoissance du sexe de l'enfant, qui est dans le ventre de la mere: & ce qui me la confirme, est que j'ay souvent fait moy mesme des remarques toutes contraires à celles, que cet homme me dit, qu'il avoit faites, touchant la naissance des garçons & des filles, en plusieurs femmes, que j'ay accouchées de six sept, huit, & jusques à neuf enfans, qui estoient tous d'un mesme sexe, quoique la pluspart de ces enfans eussent esté conçus en differens temps de la lune; & en un grand nombre d'autres femmes, que j'ay accouchées d'enfans jumeaux, dont l'un estoit un garçon, & l'autre une fille, quoyqu'ils eussent esté conçus ensemble dans le mesme temps

de la lune, qui vraysemblablement ne contribuë en rien à déterminer le sexe des enfans; Car autrement tous les enfans jumeaux feroient toujours d'un mesme sexe, & nous ne verrions pas journellement des experiences du contraire &c. Et Marguerite du Tentre dans l'instruction pour les sage-femmes *p. 34 seq. ad quæstionem*: quels sont les signes que la femme est grosse d'un garçon? ita respondet: L'on dit, que la femme a meilleure couleur, quand elle est grosse d'un garçon, que d'une fille; que la mammelle droite est plus grosse, & la partie droite du ventre plus grosse, la prunelle de l'oeil droit plus vive. Mais tous ces signes sont équivoques, & l'on s'y peut tromper. vid. etiam Dionis *des Accouchemens Lib. II. cap. 2. p. 131 seq.*

§. 6.

*Certa signa
propria se-
xus.*

Sicuti autem paulo ante, circa graviditatis signa, aliquot exempla feminarum adduximus, quæ ex peculiaribus sibi que propriis indiciis prægnantiam suam præsciebant; ita etiam in quibusdam gravidis nonnulli autores certa aliisque prægnantibus non communia, embryonum, in utero adhuc latentium, sexum indicantia signa annotarunt. Solum hæmorrhoidum fluxum indicasse maris gestationem in nota sibi muliere, refert Thomas Bartholinus *Anatoni. Lib. I. cap. 29. pag. m. 278.* Novit etiam Johannes Nicolaus Binningerus, v. *Observ. med. Cent. II. Obs. 38. p. 167.* uxorem, quæ primis graviditatis mensibus, prout masculum vel femellam utero gerebat, de insigni furæ dolore conquerebatur pedumque stupore, dextri quidem, si masculus, sinistri, si femella fuerit embryo. Posse quandoque præscire mulieres quasdam, cujus sexus foetum gestent, inquit Michael Ernestus Ettmüllerus *l. a. p. 116.* edoctus hoc fui exemplo materteræ meæ, quæ octies jam peperit, prima vice filiam, secunda, tertia & quarta filios, quinta & sexta filias, septima filium, octava filiam; quoties igitur filias conceperat, nihil extraordinarii quoad uterum notaverat, ast semper, quoties filios gestabat, ultimis gestationis mensibus, infi-

insignem uteri prolapsus passa est. Quemadmodum & aliam novit feminam, quæ quoties filium enitebatur, toties lactando lacte abundare solebat, dum vero filiam peperit, parciolem longe lactis proventum experiebatur. De singulari gestationis femellarum in gravida signo sequentem observationem refert Petrus Rommelius *M. N. C. Dec. III. An. 2. Obs. 214. pag. 334.* Anna Maria Denglerin, Johannis Zelleri uxor, mulier mediocris staturæ & habitus, post cœlibatum, spatio octodecim annorum, quindecim liberos, decem nempe filios & quinque filias satis feliciter peperit. Hoc tamen singulare habuit, quod intra dictum tempus octodecim annorum, quinquies saltem catameniorum fluxum viderit debitumque lunare alias dictum naturæ, more aliarum feminarum persolverit, totiesque etiam post mensium fluxum conceperit, statoque tempore subinde puellam enixa fuerit. Cæterum mensibus prorsus non fluentibus, a partu priori ad puerperium sequens nempe, præter lochia, vix unum atque alterum diem, rarissime ad tertium usque fluentia, ne guttam quidem sanguinis, vel quod menstruorum vices supplere potuisset, per muliebria profudit: unde rebus ita se habentibus, certum & infallibile signum pathognomonicum sexus embryonis, sive foetus adhuc in utero latentis, subinde habuit, quod nunquam fefellit; ita ut semel menstruata, de gestatione femellæ, at vero nullis visis catameniis, de gestatione pueri, in utero certissima esse & pronunciare potuerit.

CAPUT IV.

De ingravidatione falsa.

§. I.

CUM supra *Cap. 2. §. 22.* de falso graviditatis signo, ex ventris intumescencia desumpto, falsæ quoque ingravidationis mentionem fecerim, merito aliquot ejusdem exempla hoc loco recensere mihi incumbit. A variis autem causis talis ingravidatio sive abdo-

a flatibus.

abdominis intumescencia fieri solet, v. g. a flatu, vel ab aqua, vel a mola &c. quanquam etiam inflatio uteri nonnullis mola ventosa vel flatuosa appelletur, falsamque non raro conceptionis spem præbeat; uti docet Hippocrates *de Natur. Puer. Op. Sect. III. fol. m. 27.* cum uteri a ventre flatum suppeditante spiritu distenduntur & intumescunt, tunc mulieres se concepisse existimant. Et si menses minime prodeuntes in uteris collecti fuerint, longioremque moram fecerint, subinde alii eo confluunt, interdum quidem flatibus, qui a ventre procedunt, permixti, interdum vero incalescentes. Tunc quoque sane, non prodeuntibus mensibus, & in tumorem sublatis uteris, mulieres utero sibi gestare videntur. Exemplum talismodi falsæ graviditatis, ex Valesco de Taranta recenset Daniel Sennertus *Præct. Lib. IV. Part. I. Sect. II. cap. 10. p. 59.* de quadam Judæa, quæ crediderit, se esse prægnantem, cui omnia præparata fuerunt, quæ ad partum sunt necessaria. Dum vero matrix ab obstetricibus tractaretur, magnam ventositatem sine ullo aliquo liquore exivisse a matrice. De falso gravida observationem refert Daniel Wincklerus *M. N. C. Dec. I. An. 6 & 7. Obs. 45. p. 79.* Femina, inquit, honesta juvenis post diuturnam menstruorum emanationem iterum eadem sentit, & quidem rubra; apparuerunt signa nonnulla, quæ primis mensibus in gravidis solent apparere. Putat se esse gravidam, quicquid dicatur contra de motu infantis. Ventre enim intumuerat & motum aliquem perceperat. Ita nonus mensis & dies expectabatur. Consulebantur obstetrices tam Bregenses, quam Wratislavienses; consenserunt omnes. Ego contrarium sentiens, expectavi tempus partus. At cum transiit nonus, transiit decimus mensis, venter iterum sua sponte subsedit, spesque cum prole nulla fuit. A flatibus itaque gravidam hanc feminam asserere non dubito.

§. 2.

alia exem-
pla.

Textoris cujusdam uxor biennio gestans uterum persuadebat sibi primum vivum mense utero foetum; at legitimam partum tem-

tempus prætergrediens sententiam mutavit. Variis consiliis usa, quid in utero latitaret, ex nullo tripode certum oraculum. Tandem biennio elapso, cum dolore parturientium simili, ter cum maximo conatu flatum ex utero per pudendum exclusit, juxta Philippi Hœchstetter. *Obs. med. Dec. VI. Cas. 4. p. m. 689.* Novit etiam Guilielmus Harveus matronam nobilem, quæ plus decies enixa fuerat, quamque menstruorum suppressio circa prægnationem nunquam fefellerat. Postea autem alteri denupta, præter alia signa solita, ex motu quoque (quem ipsa sororque ejus juxta cubans, sæpe noctu sentiebat) sese gravidam judicabat; neque ab ea opinione ullis argumentis dimoveri poterat, donec tandem spes omnis in flatum & pinguedinem facesseret. vid. Harveus *de Part. p. m. 505.* Similem casum annotavit Thomas Bartholinus *de insolit. Part. viis cap. 20. p. 197.* in juvencula, quam ipse sub cura sua habuit; hæc scilicet omnia ad partum, jamjam imminentem, ut putabat ipsa, pararat, omnis tamen ipsius spes in flatus evanuit. A quodam rustico sene audivit Thaddæus Dunus, uxorem ipsius, cum toto biennio uterum tanquam prægnans gestasset, tandem miro quodam sonitu vel potius tonitru in ventre & pudendis facto magnam flatuum copiam peperisse, uti ex Duno allegat Daniel Sennertus *l. a.* quo loco sequentem observationem annectit: Vivit in vicinia adhuc femina nobilis, quæ ante annos quatuor putabatur gravida, ut non solum omnia, quæ ad partum necessaria sunt, appararentur, sed & maritus jam feram caperet pro convivio, quod post baptismum cognatis & amicis exhiberi solet, instituendo. Sed præteriit non solum mensis decimus, sed & decimus octavus, neque tamen peperit; sed venter postea sensim subsedit, flatibus illis procul dubio sensim discussis: Figuli uxor juvencula Grunebergæ ingravidationis persuasionem laborabat, obstetrixque loci, uti sagax satis, cum omni feminarum choro idem affirmabat. Tempore partus legitimo adstat obstetrix, omnia apparantur, femina ad partum se accingit, exhibilant flatus per uterum

rum, fluitque materia rubraquosa cum frustis sanguinis crassioris & nigricantis, nullus autem foetus, teste Samuele Ledelio *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 138. p. 306.* Falsam ingravidationem & flatuum loco foetus exclusionem Islebiæ observavit Ambrosius Stegmanus, & quidem in paupercula quadam, quæ a primo ad ultimum usque gestationis diem temere credidit de ingravidatione. Accedit itaque nonus mensis, recedit & adhuc semel, ast de foetus exitu alium silentium, crevit tamen interim venter a die in diem, majorem in molem, ut ruptionem etiam exinde metueret misera. Post elapsos autem duos annos & tres menses muliercula hæc a cerevisiario quodam, nescio qua causa in terram projecta a mole & falso suo partu, ex improvviso liberabatur. Cum enim ex lapsu posterioribus suis nimium quantum conquateret terram, ex utero illius flatus quidam, bombardæ minoris ad instar sonitum edens, erupit, secutisque flatibus aliis venter paulatim detumuit. *v. M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 33. p. 56.* Sic Petiti D. de Montbrison uxor pro prægnante diu a marito & aliis omnibus habitavento cum impetu emissio curata fuit; hydrope enim ventoso matricis, qualis est in ventriculo tympanites, detinebatur, juxta Petr. Borell. *Histor. med. Cent. II. Obs. 26. p. 130 seq.*

§. 3.

item.

Porro Thomas Bartholinus *Act. Hafniens. Vol. II. Obs. 3. p. 4.* aliam imprægnationem falsam refert: Biennium inquiens volvitur, ex quo se uterum gerere credidit mulier Hafniensis studioso cuidam nupta. Sæpius quidem a marito compulsæ, qui gravidam esse sibi persuadere non potuit, ut medicorum opera uteretur ad expurgandum onus ventris inutile, semper repugnavit mariti voluntati, rata tumidum ventrem læto partu aliquando exonerandum. Neque etiam medici consulti consentire in vota mariti ausi sunt, cum ipsa serio fateretur, motum se nonnunquam prominentis ventris sentire, aliaque signa enumeraret, quæ imprægnationem solent indicare. Itaque temporì committendum nego-

negocium, cum de nullo alio malo conquereretur, quam pondere abdominis distenti, in quo sibi ipsi prolis cupida applaudebat. Sic vitam inter spem & mariti querelas seu jurgia hucusque transegit, neutiquam interim dubitantibus medicis, falsam esse imprægnationem a flatibus hypochondriacis excitatam, vel molam subesse. Illud eventus docuit & confirmavit. Cum marito enim ruri concedens cottidiano corporis exercitio in domesticis negotiis occupata, sensim discussis motu flatibus, ad pristinum statum abdomen detumescens vidit redactum. Ibidem etiam *Vol. III. Obs. 46. p. 80.* Olaus Borrichius sequentem observationem refert: Anna Castania post susceptam ex conjugio primo prolem numerosam, ab obitu mariti iterum uxor gravida redditur, læto conjugē, sed tandem, quod ultra gestationis suetæ terminos extendere-
tur partus futuri anxio. Mittit etiam ad medicos, ut remoram amoveant; qui vero ostendunt, videri tumorem mentiri potius infantem, quam afferre, temporique exitum commendant: Illa contra proprium infanti motum se jurat agnoscere, & cætera omnia pati, quæ futuræ puerperæ solent. Inter hæc labitur biennium, maritus uxorem monstrum visceribus alere vociferatur, quod fustibus se minatur exacturum, & promissi tenax, quoties vinum liberalius haustum invitabat, non parca manu verbera ingerit. Illa interim persistebat, gravidam se esse, calcitrantem experiri infantem, immo jam eousque excrevisse, ut in partu exspirandum sibi omnino sit. Tandem pondere inviso fatigata post finem anni tertii, eandem Borrichius circa tempus D. Johanni sacrum ad fontem Helenæ amandat, ubi haustis liberaliter aquis peperit non infantem quidem, sed infinitos borborygmos, quibus per naturalia exclusis, sana domum rediit. Observavit etiam Thomas Bartholinus *Histor. anat. Cent. III. Hist. 21 p. 51.* in quibusdam feminis sæpe ex flatibus commotum uterum imposuisse mulieribus, quæ falso sibi persuaserant, se & uterum gestare & embryonis motum percepisse. De mola ventosa sive de femina ter

ventum pariente sequentia annotavit Zacutus Lusitanus *de Prax. med. admir. Lib. II. Obs. 50. fol. m. 79.* nonimestris dolore partus vexata convocatis obstetricibus pariendi tempus expectat. At cum vehementi nixu cogitur expellere foetum, bombum & strepitum multum magna cum violentia per uterum elidit, ac si tonitruum exaudiretur. Aliquantisper subsidente ventre, immanis dolor iterum eam apprehendit, vacuatoque per uterum flatu lenius conquievit. Tertio lumborum dolore diro post tres dies afflicta, cohibita respiratione ad vacuandum flatus summa venititur, quos fotibus aliisque carminantibus adjuta expellit. Et *Obs. 51. fol. 80.* Baronis cujusdam uxor, cum utero gestare opinaretur, in octavo mense miro sonitu exaudito, flatum pro expectato infante excrevit. Acciti medici ad discutiendos flatus mira consulunt auxilia. His celebratis monent, ut habitet cum viro; hæc post mensem gravida putabatur, sed & procedente tempore crescente ventris tumore gravitationis increvit suspicio, sed octavo mense, loco foetus, sonorum flatum dimidii quadrantis spatio per uterum exclusit.

§. 4.

Ingravidatio falsa ab aqua.

Circa molam aquosam, sive uteri ab aqua expansionem notandum, interdum in cavitate uteri, occluso ejusdem orificio, tantam aquæ quantitatem colligi, ut ex ipsius intumescencia indeque inductis symptomatibus ingravidatio quasi indicetur; interdum etiam talem uteri & abdominis expansionem a multis in uteri cavitate inclusis hydatidibus oriri. Talem aquæ in utero collectionem vidit Rembertus Dodonæus *Obs. medic. cap. 49 p. m. 120.* in vidua quadam, quæ defuncto marito, cum se gravidam relictam existimaret, novem mensibus adimpletis, supervenientibus partus doloribus, non nisi aquosos humores enixa est; a quibus liberata, lacte ubera repleta haud aliter, quam si foetum peperisset. Femina quædam leprosa tumorem in ventre habebat, qui prægnationem ostendere videbatur, cui accedebat motus interior ven-

ventris talis, qualis in vera imprægnatione adesse solet, embryone in utero sese primo movente, unde judicatum fuit, gravidam esse hanc. Tandem vero, cum tempus partus præteriret, neque venter ab adhibitis remediis detumesceret, hæc femina diem suum obiit. In hujus demortuæ cadavere uterus aqua plenus vehementer intumuit : quo dissecto aqua citrina & putrida copiose effluxit, uti ex Jacobi Oethæi observationibus recenset Theophilus Bonetus *Sepulchret. Lib. III. Sect. 21. Obs. 55. fol. 1140.* De muliere, quæ, dum aqua inter cutem adeo laboraret, ut nulla de salute superesset spes, de eminente quodam loco ad terram devolvitur, & utero ad lapidem eliso dissecto, ita prorsus omnis effusus est humor, ut, quæ puerum octimestrem gestare videbatur, enixam crederes. vid. Anton. Beniven. *Obs. med. cap. 109. pag. 285.* Mulier Caunensis pro prægnante habita fuit, quod molem circa ventrem ejus adstantes motu quodam præditum perciperent; tamen aquis ad libras duas eductis tumor ille discessit. v. Petr. Borell. *Hist. med. Cent. II. Obs. 26. p. 130.* Femina quædam in Angliæ provincia Schroophshire, quæ per viginti annos gravida credita fuit, ventre dissecto, specie hydropis, quæ ascites dicitur, laborasse comperta est, uti ex Transactionibus Philos. Anglicanis refert Conradus Philipp. Hoffmannus *de Puerper. tempor. §. 18. p. 42.* Nobilissima quædam matrona quadraginta octo annorum concepisse sibi imaginata est, fere namque per integrum annum venter intumescere cœpit cum motu sensibili medio gestationis tempore percepto, & sexto mense aquæ copiosius utero exstillarunt. Absoluto stato pariendi tempore dolores partus insurgebant, quasi infans ad exitum promoveretur, signa omnia instantis partus aderant, mammæ turgebant, liquores iterum copiosi utero secreti sunt: Obstetrix cum adstantibus pusionem expectabant, at eventu lugubri, nihil enim præter aquas secretum fuit, juxta observationem Johannis de Muralto *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 95. Schol. pag. 235.* Virgo tenuioris fortunæ sine marito gravida credebatur,

quia ipsius regio hypogastrica quotidie magis magisque (absque tamen unico hydropis præsentis prodromo) intumescere videbatur, per cuius tamen genitalia post fortuitum in tumidum ventrem lapsum copiosa aqua, ad quintum usque a casu diem, effluebat, sicque dicta virgo cum omnium admiratione funditus sanari cœpit secundum relationem Johannis Georgii Josephi Schwalteri, v. *M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. Obs. 57. p. 114 seq.* Anno 1621. nobilis matrona duos & triginta annos nata, cui menses suppressi, rugitus ac flatus ventris persensit cum febre lenta & erratica. Quum post aliquot menses videretur partui vicina, excreto humore, copia ea, quam tres vel quatuor capiebant pelves, venter detumuit, juxta verba Joannis Rhodii *Obs. med. Cent. III. Obs. 55. p. 148.* Molæ aquosæ exemplum refert Zacutus Lusitanus *de Prax. med. admir. Lib. II. Obs. 152. fol. 80.* De femina quadam bene colorata, quæ tumorem uteri magnum passa est, cumque menstrua septem mensibus essent restricta, prægnantem se esse putabat, donec ad undecimum perveniens de conceptu desperaret. Sumpto autem quodam vegetabilium decocto copiosa aquæ citrinæ quantitas pondo librarum octo per uterum est vacuata. Subsidente aliquantulum ventre auxilium idem iterum in majori quantitate ebibit, dosi nempe quatuor unciarum. Sed quo eventu audi! nam viginti diebus per uterum, velut per perennem fontem, tanta aquæ, fero lactis simillimæ, copia emanavit, ut judicio suo quotidie quinque aut sex libræ profluerent sine dolore, sicque detumescente ventre reffectis viribus ad se rediit. Bina molæ aquosæ exempla annotavit etiam Guilielmus Fabricius, Hildanus, *Obs. chir. Cent. II. Obs. 53. fol. 127.* Anno nimirum 1604. honesta quædam matrona Bernensis, ad quinti mensis finem gravida & parturientium doloribus correpta ultra decem libras aquæ, tenacissima membrana inclusæ, non sine conatu & dolore maximo, una cum membrana enixa est, foetum autem ad maturitatem usque gestavit. Alterum exemplum molæ aquosæ observavit in pia matrona, quæ

quæ cum per menses aliquot se gravidam existimaret, factum est, ut dum noctu cum marito rem haberet, impetu quodam copiose ex utero prorupta sit aqua utcunque viscida. Venter mox subdidit, convaluitque Dei beneficio. Plura exempla reperies in Muliebribus.

§. 5.

Quoad hydatidum, a mulieribus vel virginibus, pro gravidis falso habitis, rejectarum exempla, meminit Johannes de Mur-^{ab hydati-}
^{dibus.} alto loco proxime alleg. p. 236 seq. feminæ, quæ antea adhuc virgo inordinatos & sæpe suppressos menses habuerat, posteaque maritata septies mater facta semel abortum tredecim septimanarum passa fuerat. Huic, cum se per septimanas tredecim jam gravidam putasset, menstrua fluere cœperunt & quidem adeo ut aliquot septimanas ne per horulam extra lectum perdurare potuerit. Tandem post varia symptomata decem sibi cohærentes vesiculas aqueas acinorum uvarum mediocrium magnitudine, brevique post ingentem numerum harum vesicularum, dense sibi conjunctarum cum hepate uterino exclusit. Mulier quædam, cui venter intumescebat & menses retinebantur, constantissime contendebat, se in utero gestare foetum vivum, quem moveri dicebat, at vero remediis adhibitis sexto mense ab utero excrevit supra septuaginta vesicas membranofas ac membranis hærentes, aqua pallida plenas, castaneæ quantitatis: Septem vero frustra membranis involuta, coloris carnis lienis, quorum quædam medietatem lienis humani æquabant, quædam paulo minora, aqua vero multa erumpebat & tota moles libras Romanas duodecim appendebat, referente Christophoro a Vega de Arte medend. Lib. III. Sect. 10. cap. 13. fol. m. 399. Talia exempla annotavit etiam Franciscus Valleriola Obs. med. Lib. I. Obs. 10 p. m. 103 & quidem in civis Arelatensis filia, viro nupta, florenti ætate & optimo corporis habitu prædita, quæ ob suppressos menses, nauseam, vomitum, anorexiam & alia graviditatis signa, uterum gestare se existimabat, post sex vero aut octo gesta-

tionis menses, magnis abortis doloribus, ingentem peperit membranaceum globum, totum aquosis bullis, instar ovorum piscium refartum. Erant autem bullæ rotundæ, pellucidæ, diluta sanie plenæ, atque per omnem membranam, qua integebantur, disseminatæ, tanta quidem copia atque numero, ut comprehendi posse nullo pacto viderentur; dissectis stylo bullis aquosa & diiuta sanies foetens emanabat, ad citrinum colorem inclinans. Idem etiam in obstetricis filia annotavit. Obstetricem inter partus monstrosos vidisse enixum quendam veluti globum membranosum flatuoso quodam spiritu turgentem & distinctum distentumque vesiculis quibusdam aqueo humore, puri non absimili scattentibus & plenis, & alias pellucentem; refert Carolus Piso *de Morb. a Colluv. serof. Sect. IV. cap. 5. p. 449 seq.* De femina, quæ secundo vel tertio ingravidationis mense vesiculam quandam aqua plenam per muliebria absque placenta excrevit, subsequente maximo lochiorum fluxu per sex septemve menses durante, cujus etiam venter, cessante lochiorum fluxu sensim magis magisque intumuit, v. Regner. de Graaf *de Mulier. Organ. cap. 8 | p. 250.* Uxor Philippi Borealis, afflicta aliquandiu menstruis inordinatis peperit tandem nescio quam pinguem massam, continentem in se innumeras vesiculas refertas partim aqua croceas, partim solo spiritu. Excernebatur autem non confertim, sed frustulatim. Sed partes hæc fuere tam frequentes, ut repleverint ferme integram ejuscemodi situlam, qua aquam hauriunt mulieres nostrates, inquit Nicolaus Tulpius *Observ. Lib. III. cap. 32 p. 247.* Et Cornelius Stalpartius van der Wiel *Obs. rar. Cent. prior. Obs. 70. p. 301 seq.* pseudopartum hydatidum recenset, scilicet cujusdam civis Hagienfis uxor sex & quadraginta circiter annos habens, postquam jam novem menses fuisset imprægnata, multo affici cœpit dolore, quare & obstetricem ad se arcessi jussit. Hæc autem cum ipsi inter eos labores jam totum triduum auxilium tulisset, nec quidquam appareret, vocata fuit Elisabeth Thomboy itidem obstetricis

cis fungens munere, quæ post exactiorem examinatione in nullum foetum, sed aliquod quid, quod præsentibus se illico ostensurum sperabat, adesse affirmavit. Postea puerperam aggreditur ejusque e corpore magnam hydatidum copiam eduxit, racemorum more sibi invicem adhærentium, membranis extrinsecus tenuioribus quam queis vestiuntur foetus, ambientibus, quales ibidem dictus autor depictas exhibet. Quanquam autem dicta mulier nullum ederet foetum, puerperarum tamen more lochiorum fluxum passa est.

§. 6.

Nobilis mulier Cesenatensis temperam enti calidi & sicci, habitus gracilis ac ab ineunte ætate fere semper sanitatis lubricæ, anno ætatis suæ trigesimo viro nupta puellam peperit, quæ paulo post obiit. Sequenti anno rursus sibi concepisse visa est: Suppressa enim erant menstrua, a vino abhorrebat, animi deliquia patiebatur, venter tumebat. A quinto conceptionis mense larga ab utero hæmorrhagia secuta est, quæ qualibet hebdomada modo major, modo minor patientem excruciat. Septimo mense post uberrimum sanguinis fluxum ac repetitos animi defectus, incredibilem vesicularum acervum peperit, suis filamentis ac canaliculis connexarum, quæ libras quatuor ponderabant. Ovario gallinarum per similes erant, aliæ granum ciceris æquantes, aliæ viciæ, fabæ aliæ, quarum aliæ rotundæ, majores vero ovalis erant figuræ, omnesque lymphæ quadam viscidula turgidæ. Coctis densabatur quidem liquor & aliquantulum albescebat, sed non indurabatur, ut ovorum albumen, qui liquor lente observatus reticulare plexum, cum microscopio vero ad radios solares expositus ramusculorum ad invicem implicatorum massulam fere argenteam aureis bracteolis intertextam repræsentabat. Interea uterino sanguine per quindecim dies adhuc fluente mulier ad pristinam sanitatem restituta est. Quam observationem ex literis Francisci Veretti communicat Antonius Vallisnerius *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. I X & X. Obs.*

Plura exempla.

73. p. 164 seq. Ibidem etiam *Obs.* 85. p. 191 seq. Johannes David Wogau alium stupendum hydatidum partum recenset: Christophori Ubleri, pellionis Memmingensis, conjux, unius & triginta annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, & quinque liberorum mater, vegeta tamen & sana, advertit subsistere menstruum fluxum & ex hinc mammas & abdomen sensim intumescere, ita ut se utero gestare existimaret. Tertio exacto mense siti vexabatur immodica, pedes circa talum intumescabant, cum hæmorrhagia uteri & lassitudine totius corporis, demumque de gravissimis ad partum doloribus vehementer conqueritur: atque obstetrix uteri constitutionem explorans, hiare uteri cervicem, & omnia ad partum disposita inveniri, serio affirmat, pauloque post miraculosus vesicularum fœtus in lucem excluditur: Proveniebat siquidem ex arvo muliebri in conspectum carneæ substantiæ, instar placentæ uterinæ, quædam portio, libram circiter pondere unam adæquans, cui adnata erat fibroso-musculosa, mucilaginis quadam illinita, membrana, in qua confuso satis ordine vesiculæ & pustulæ innumeræ, peculiari radice unaquæque prædictæ membranæ insertæ conspiciebantur, cum subsequente fluxu & gravi deliquio. Elapsa post semihora rursus ejusmodi carnosa substantia cum superstrata membrana, hydatidibus innumeris referta, protruditur, ita, ut spatio duarum horarum quinque hujusmodi partes, aliquot centenis hydatidibus scatentes, quinque quoque partitis vicibus, multo naturæ conamine, mulier hæc pepererit. Ex hisce vesiculis, cum acu aperirentur, effluebat putrida & citrini coloris aqua, quæ gustu erat gelatinosa, subdulci quidem & amariuscule principio prædita; dispares etiam erant magnitudine, nucem enim juglandem aliquæ, pleræque vero pisi formam referebant. Item Franciscus Mauriceau dans les *Observat. sur la Grossesse Obs.* 377. p. 221. exemplum adducit feminæ, qui croyant estre grosse de six mois, ne vuida de la matrice, qu'une espece de mole plus grosse que les deux poings, composée de plus que mille vesicules de differente

rente grosseur, pleines d'eau claire, les quelles tenoient toutes les unes aus autres par des petits filamens; de differente grosseur, les plu petites estant comme des grains de chenevy & des pois; d'autre estant de la grosseur d'une avellinae, & beaucoup d'autre de moyenne grosseur.

§. 7.

A mola non solum uxoribus, sed etiam viduis atque virgini- a mola.
bus abdomen adeo intumescit, ut falso graviditatis suspicionem incurrant, siquidem juxta Theodori Kerckring. *Spicil. anat. Obs. 81. p. m. 157.* si qua ventre non nihil intumescat virguncula, continuo in partem deteriore cadit suspicio; si qua vidua tantillum distendatur, vix pudori suo potest consulere apud homines. Habeo tamen, pergit allegatus autor, quo hasce defendam, historiolam; illæ sibi, quantum quidem hinc licet, capiant patrocinium. Vidua quædam nomen suum & famam, honeste vivendi egregie tuita hætenus, posthumum ediderat: post partum diu adversa valetudine usa, tandem visa tumidiore pondus aliquod circumferre ventre; hinc conversi in eam oculi, & auditæ voces: hem hæc illa est ægritudo, hic morbus viduæ: & vero tumor adeo increvit, ut etiam prudentibus & amicis ejus admirantibus nescio quid vel pudoris incuteret, vel doloris afferret; quæ augebantur omnia, cum ingruentibus quasi parturientis doloribus, obstetrix accersitur: illa, sibi optime conscia, puerum proditum negat, esse tamen quod se non secus ac puer, qui in lucem moliretur, iter premeret. Tandem post varia uteri luctamina prodit massa quædam informis, sive illa fuerit reliquum ex secundinis quippiam. Illa certe ejecto onere optime valuit, & quod nihil sequeretur eorum, quæ partum aut abortum solent comitari, famam apud suos integram retinuit. Civis cujusdam Arnstadiensis uxor annorum viginti quatuor, gravida visa stupendæ magnitudinis ventrem præ se ferebat, ultra menses novem; sed partus loco bursa se ostentabat hydropica, quæ tantam indies crescebat in molem, ut ruptu-

ram abdominis sæpe metueret ægrota. Sanitatis desiderium bonæ insidebat feminæ: cum vero nihil opis superesset, exsiccata tandem & arida illa superne exhalabat imo sub pondere vitam. In exenteratione, adacta novacula, ex abdomine trium ulnarum in ambitu, aquæ flavescentis mensuræ triginta sex in vas profilierunt, neglecta ea, quæ manavit in terram. Peritonæo papyraceo interne ad latus sinistrum adnatæ erant hydatides quatuor, gallinaceorum ovorum magnitudine, totidemque tubercula sebacea magnitudine gallarum. Intestina flatibus & excrementis aquosis scatebant. Uterus immensum extensus erat, & lateri dextro firmissime adhærebat mola carnosæ ovata, libras novem civilis ponderis pendens, cum aliis quinque minoribus uvarum magnitudine, & hydatyde vesicam æquans mediocrem fuillam &c. uti refert Jacobus Augustus Hünerwolffius *M. N. C. Dec. II. An. 7. Obs. 83. p. 146 seq.* Molam totos septendecim annos utero circumtulit uxor Guillelmi Rogerii, in cujus dissecto corpore uterum scirrhum maximeque durum reperit, atque in hujus media capacitæ carneam molem, manus ambas in pugnum contractas crassitie æquantem invenit. Ambrosius Paræus. Una vero omnium præsentium medicorum sententia fuit, ejusmodi molem initio molam fuisse, quæ temporis successu in scirrhum corpus una cum uteri propria substantia degenerasset. Quamdiu in molam illam circumtulit mulier, alvina regio mirum in modum dura, distenta & ampla erat, tanquam multiplici prole gravidæ &c. vid. Ambros. Paræi *Chir. Lib. XXIII. cap. 34. fol. 520 seqq.* Plura ejusmodi exempla paulo infra, ubi de molis sermo erit, adducentur, hoc vero loco aliæ de falsa graviditate adhuc recensitæ restant observationes.

§. 8.

Observationes aliæ. Hydropica quædam femina, cum in utero & circa uterum turgescencia quædam cum gravitatis sensu oriretur, decepta est, ut se concepisse putaret, & eo magis, quia venter ab umbilico infra
exten-

extendebatur, quod præ cæteris uti certæ gravidationis signum a multis statuitur. vid. Georg. Franc. *Annot. in Paul. Zacch. Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. 3. Qu. 1. f. 87.* Diomedes Cornarus *Histor. Admir. 3. p. m. 6sq.* hanc refert observationem: Georgius Rithamerus, magnæ eruditionis vir & quidem prolis acquirendæ cupidissimus accessit medicum ex Viennensium medicorum collegio primatem, cum urina, ut de sua uxore, quam gravidam suspicabatur, certior fieret: Medicus visa solum urina non modo gravidam ipsam, sed & masculum gestare certissimum affirmabat. Ibi Rithamerus alium medicum, Franciscum Emericum, statim odisse cœpit, qui prior eam, inspecta non solum urina, verum artificiosa signorum præcurrentium inquisitione, ex intellecta tota generantis in utero historia, habita, minime gravidam protulisset, ac statim obstetrices, nutrices aliaque ad partum & curam puerperæ pertinentia anxie & sedulo adornat. Paucis autem post diebus undique gravida, ac motum foetus subinde sentiens proclamatur, & propterea ob crebros affectus, quos sentiebat, ipsi a constitutis mulierculis fiunt balnea, a quibus facta comitalis subito interiit. De cujus obitu cum Emericus certior factus esset, a Rithamero statim petiit, ut ad inquirendam veritatem incidi corpus mortuum pateretur, quod ipse libenter fecit. Post incisionem matricem admodum exiguum vidit inque ea nihil contineri animadvertit: tamen ut veritas in oculos incurreret, eam incidens prorsus mundam & vacuum invenit. Dehinc progreditur secando versus ventriculum, ubi intra peritonæum & intestina aquam deprehendit, quæ nunc in hoc, nunc in aliud latus pro corporis motu procumbebat, hinc suspicio foetum moveri suborta fuit. Novi inquit Guilielmus Harveus, *de Part. p. m. 505.* juvenculam, filiam cujusdam medici, quæ gravida facta symptomata omnia prægnantes comitari solita experiebatur: ea sana & vegeta, post decimam quartam septimanam foetus in utero motum sensit, tempus partui debitum emensa est; indiciaque jam imminentis partus adesse ra-

ta, cubile, incunabula, cæteraque ad partum necessaria in procinctu habuit, sed frustra omnia, & Lucina votis abnuuit: motus enim soliti cessarunt, ac paulatim, ut increverat, detumuit venter, absque ulla ægritudine, sterilis autem marfit in posterum. Mulier Giniacensis annos nata circiter quinque & quadraginta Monspelsum venit de affectu suo consilium petitura, retulit nobis, se, cum nunquam viro nupisset & rem habuisset cum adolescente, in utero concepisse, unde sequuta est inappetentia, macies & pallor totius corporis, quorundam eduliorum desiderium, cum aliis graviditatis signis. Post quadagesimum a conceptione diem percepit palpitationem quandam versus hypochondrium dextrum, ab eoque tempore melius habuit & appetitus restitutus est. Venter indies augebatur, mammæ intumescebant, in quibus tandem lac colligi coepit, nempe quarto mense in mamma sinistra, idque subrufum, postea album in dextro. Quarto mense fluxus menstruorum apparuit copiosus, inde ventris tumor imminutus est. Motus in ventre sentiebatur illi consimilis, quem foetus in utero inclusus solet exercere. Nono mense dolores parturientium passa est, ut ita vocata obstetrice omnes adstantes partum expectarent. Illi tamen dolores post viginti quatuor horas quieverunt & nihil exclusum est &c. vid. Lazar. River. *Obs. Cent. II. Obs. 100. p. 179 seq.*

§. 9.

ad hoc plu-
res.

Recordatur etiam Casparus Theophilus Bierlingius *The-saur. theor. pract. Cas. 37. Schol. §. 5. p. 518.* se feminam in patria vidisse, quæ virgo adhuc ventrem gerebat mirum in modum intumescens, ut inde a plerisque in gravidationis, sed tantum non stupri turpissimi publice a vulgo rea accusaretur. Hæc Deum precata ederat suæ innocentiae testimonium, morbidumque corpus utriculæ instar summa cum molestia circumferens, petiit ab amicis, ut post mortem aperiretur venter. Placide igitur post annum spatium defuncta secabatur, aqualiculus, uterusque bulgæ ad instar prætumidus deprehendebatur, qui simul apertus nil nisi aquam

aquam reddidit copiosissime serosam, complures æquantem mensuras. Item apertum cujusdam mortuæ abdomen vidit Johannes Walæus, in qua uterus tanta magnitudine intumuerat, ut intestina omnia supra ad diaphragma detrusa erant, & uterus omnibus partibus adnatus. Continebat autem urnas tres cum dimidiâ humoris. Uxor Eliæ Tabellarii in vico regio prægnans ab obstetrice judicabatur ob ventris tumorem & duritiem. Remittebat tamen illa & interdum per vices augebatur. Menses ordinatis vicibus fluebant; tandem mense Junio ingentibus doloribus auctis vivere desiit. Ex aperto ipsius abdomine ingens copia serosi sanguinis effluxit, quæ cavitationem quoque thoracis occupabat, implebatque mensuras Hafnienses sex, referente Thoma Bartholino *Histor. anat. Cent. III. Hist. 6. p. 17.* Sequens falsæ gravidationis exemplum refert Ehrenfridus Hagendorn *Histor. medic. physic. Cent. II. Hist. 92. p. 271.* cessarunt apud feminam Gœrlicensem ante sedecim annos purgamenta uterina, seu menses, venter iusta mole intumescit, alia quoque in puerperium conspirant signa, unde nil, nisi verba de rebus ad puerperium necessariis, audivisses. Sub initium hebdomadis, ut putabat, vigesimæ conqueri cœpit putititia prægnans de nausea, abdominis dolore, quem excepit unus alterque sanguinis grumosi, foetidi, lobos pulmonum æmulantis & articulis undique circumdati. Venter autem paulo post detumescit, viresque analeptici restituantur.

§. 10.

Item illustris femina secundum verba Henr. ab Heer *Obs. 14. p. m. 141 seq.* sub annum ætatis trigesimum modo mensium fluxum *Alia exempla.* nimium, modo suppressum, ventre in exiguam se molem surrigente, gravidam se credidit, imprimis cum nec hilum ventris se tumor remisisset, imo auctus esset, mammæque non aliter turgerent, quam in legitime gravidis, dolorem nihilominus insignem & capitis, & scapularum & renum pateretur, appetituque omnino prostrato, & sæpe pica laborantibus affini, accedente cardialgia notabili,

tabili, excretis multis supra infraque aquis plurimum levabatur; maxime sumpto cibo, quoties vinum, ut est actu frigidum, bibe-
bat, manifestum in mammis frigus sentiebat; tumore interea
imam potissimum abdominis partem occupante, renibus tum
temporis, lumbisque insigniter dolentibus, ut creberrime partu-
rire se crederet: mammæ lac invitæ fundebant, & per sinum pu-
doris lactiformes serositates magna se effundebant copia, ita ut ob-
stetrix partum vicinum adfirmaret. Patiens motum pueri se sen-
tire adseverabat, seque uterum ferre non dubitabat. Demum
aquis Spadensibus & thermis Aquisgranensibus usa nil profecit, tu-
more non diminuto, nec ullo symptomatum se remittente, acce-
debat respirationis difficultas, dolor imi ventris, crurumque &
genuum, borborygmi infesti, venter in decumbente paulo quam
instante vel sedente depressior. Obstetrix in matrice dicebat
sentire se quid duri & ponderosi; nullus autem apparebat foetus,
sed dicta femina per medicamenta aperientia & confortantia ita
fuit percurata, ut marito paulo post cavione sublato secundas co-
gitaret nuptias. Refert etiam Georgius Fridericus Rallius *de Ge-
nerat. Animal. Sect. III. p. 103.* se novisse honestam feminam aliquot
liberorum jam tum matrem, quæ uterum se gerere partusque tem-
pus instare rata publicis precibus se & foetum suum Deo commen-
darat, sed falsam fuisse persuasionem, eventus docuit. Falsam
imprægnationem annotavit etiam Samuel Ledelius *M. N. C. Dec.
II. An. 2. Obs. 138. p. 306.* inquit: Nobilis a Fritschen, vidua quin-
quaginta quinque annorum, jam mea marita, patiebatur vomitu-
tum, nauseam, horrorem, uteri contractionem & quæ alia sueto
prægnantibus tempore: Venter intumescebat, motus aderat et-
iam satis fortis in ventre, mammæ pressæ fundebant liquorem
aquosum; dicebat se gravidam (utpote antea decem liberorum
mater hujusque rei sat gnara) ast ego repugnabam multas propter
rationes. Expectamus tempus partus, & justo tempore accede-
bat, cum alteratione insigni; aderat quippe cephalgia, cardial-
gia,

gia, extensio abdominis dolorifica, angustia pectoris cum metu suffocationis. Applicamus interna & externa, spirituosa & bezoardica, sudat per noctem copiosissime, mane alvum deponit aliquoties, respiratio fit melior, extensio abdominis evanescit, venterque sensim ac sensim indies detumescit adque pristinam figuram redit. Et sic spes pariendi cum prole aufugit. Item figuli uxor juvencula, Grunebergæ, eadem persuasione laborabat, obstetrixque loci, uti sagax fatis, cum omni feminarum choro idem affirmabat. Tempore partus legitimo adstat obstetrix, omnia apparantur, femina ad partum se accingit, exhibilant flatus per uterum, fluitque materia rubra quosa cum frustis sanguinis crassioris & nigricantis, nullus autem foetus. Eandem pariendi fortunam habebat femina primaria, pro qua etiam in suggestu preces instituebantur, ut divina clementia ipsam felici partu beare velit, ast post nonum mensem nil se movet, sequuntur adhuc tres menses, & nullum adest amplius signum foetus: De conceptu falso hanc historiam communicat Thomas Bartholinus *M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 1. p. 1.* Nobilissima matrona post multorum annorum sterilitatem se concepisse gavisâ ex omnibus signis apud alias consuetis ad partum omnia debito tempore præparat, advocataque obstetrice & aliis amicis advolantibus uteri dolores, quasi jam paritura experitur, nullo tamen foetu prodeunte. Postea sensim detumuit venter, sicut antea accreverat, & spe excidit optima femina.

§. II.

Ab ovarii muliebris statu præternaturali ortæ graviditatis *Exempla* falsæ aliquot exempla recenset Antonius Nuck *Adenograph. curios.* ^{ab ovario} *cap. 8. p. 84sq.* Virginis, inquiens, viginti quatuor annorum hypogastrium magis ac magis in tumorem abiit, quo non parum suspecta fuit habita, & quidem potissimum quod nullum cachexiæ adesset signum; brevi tamen diem obiit suum. Aperto cadavere, gravidam eam fuisse, prima fronte credebam, ob corpus uteriforme, pel-

pelvim occupans, nobis oblatum. Sed oculo propius admoto, illud versus sinistrum magis latus protensum & ab utero plane distinctum vidi. Ovarii quippe sinistri lymphaticum mirum in modum extensum, faccum formarat. adulti hominis caput æquantem, lymphæ admodum claræ & tenuis, pintas ad minimum duas continentem, ipsum ovarium destruente &c. Item mulier triginta sex annorum a congressu cum marito peracto, ingravitationis percepit indicia, & quæ ante aliquot jam pepererat liberos, eodem modo se affectam perſentit, hac saltem cum differentia, quod venter solito magis extenderetur & jam ad prodigiosam magnitudinem veniret. Elapsis autem novem mensibus partusque tempore instante, ex improviso dolores parturientem apprehendunt, & modica aquarum mole elapsa foetum sanissimum in lucem edit, foetumque unum aut alterum adsequuturum, nulla adstantium dubitabat, quod venter, in monstrosam fere magnitudinem elevatus, parum saltem ab ejus extensione remiserat &c. Et alia adhuc domicella triginta quinque annorum, jam octo liberorum mater, partus temporibus prodigiosam aquarum quantitatem excernere solita potissimum partu ultimo, qui fuit 27. Februar. 1678. quo die, elapsis aquis, filioque satis vegeto in lucem edito, geminum restare creditum fuit. Sed eo non prodeunte, doloribusque in modum novorum conatuum continuantibus vocatur Nuckius. Permagnum & inæqualem in sinistro inguine percipiens tumorem, judicavit testiculum sinistrum, tumore scirrhuso obsessum & consequenter malum esse incurabile. Brevi notabiliter adeo venter ejus inflatur, ut extensus magis, quam tempore graviditatis appareret. Et ab eo tempore ad oculum apparuit, tumorem in majorem assurrexisse molem, usque dum quarto Maji 1681. vitam cum morte commutaret. Ope paracnthesios, quadraginta ex abdomine extraxit Nuckius aquæ pintas; & separato testiculi sinistri tumore, testis insuper pendebat libras decem &c. Huc etiam pertinet observatio chirurgi gallici, Motte-

tei

tei apud Nicol. de Blegn. *Zodiac. med. Gall. An. 2. Februar. Obs. 12. p. 48.* Illustrissima scilicet Comes a Nieupert, cum per duos annos ab inito matrimonio sterilis fuisset, ventrem tamen in dies intumescere animadverteret, spem veræ graviditatis animo concepit ad decimum usque circiter mensem, quo tempore elapso non absque causa dubitatum est, lateretne mola vel falsum germen. At vero opinata illa graviditas diutius perstabat atque intumescencia amplius pergebat, irritis quibuscumque remediis. Interim duodecennio post graviditatis opinionem & decubitus catarrhi in ægræ pectus, tussis excitabatur imum ventrem concutiens, & post haustas aliquas portiones aperientes, ex utero insignis aquarum copia effusa est, quæ verisimiliter ex tuba uterina, in qua hydrops particularis excitatus fuerat, prodiens. Georgius Dethardingius anno 1681. die Januarii 29. vocabatur ad feminam, gravidam a consanguineis habitam, a festo Purificationis anni præteriti; ac illud quidem confirmare videbantur tumor abdominis sensim sensimque excrecens, motus sensibilis ac (hoc signum tantum non apodicticum mulierculis est) lac in mammis propullulans. Ast, quod tempus ingravidationis longe ordinarium superaverat, patiens hypochondriaco affecta morbo, abdomen circa præcordia magis ac quidem pubem tumidum, motus non nisi in latera sese volvente ægrota, menstruo fluxu, minori quamvis in quantitate, rhythmum servante, falsum de conceptu conceptum volatilibus diureticis maritatis, feliciter satis prostravit. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. Append. p. 147.* Novit etiam Rosinus Lentilius quandam illustrissimam comitem, quæ se gravidam rata, intumescente alvo, immo percepto post octodecim circiter hebdomadas, motu manifesto, fuis etiam publicitus ad Deum pro felici partu precibus, & instructo jam omni apparatu, alvum paullatim, sine tamen sonoris flatibus, delusa spe, subsidere sensit. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 10. Append. p. 45.* Varia quoque ejusmodi falsæ ingravidationis, modo cum, modo sine mensium fluxu, a variis causis ortæ, &

quidem nonnunquam post flatuum explosionem, interdum post aquæ ex utero effluxum, quandoque post tenuium membranarum vel sanguinis congrumati proventum, in quibusdam feminis post aliquot menses, in aliis post integrum, vel sesquiannum vel etiam longe tardius iterum disparentis exempla in praxi, ultra quadraginta annos exercita, observare mihi licuit.

§. 12.

alia exem-
pla.

Restant adhuc alia graviditatem mentientia exempla, interdum etiam ob impeditam defunctorum sectionem, quoad causas adhuc incognita; viduæ enim juveni N. Bourquin nunquam effœtæ venter ita sensim intumuit, ut parituram se sperarit. Ultra tempus gestationis in dies adauctus venter, nullis remediis cedens, mense tandem Aprili anni 1662. ægram de medio sustulit. Lucia Wechter, Jeremiæ Wernier, coriarii uxor juvenis, prægnans diu visa, insigni abdominis tumori anno 1664. etiam com-mortua est. Utrasque autem molis aquosis ob involucrorum densitatem non crepantibus laborasse potius, quam ascite, conjecturis allecutus est Johannes Nicolaus Binningerus *Obs. med. Cent. III. Obs. 19. p. 336 seq.* quod dissectione confirmari non licuit. Johannes Rudolphus Salzmannus in nosodochio, anno 1608. die 23. Martii corpus mulieris cujusdam aperuit, quæ gravidam sese esse dicebat, verum longe aliter se rem habere in ipsa apertione visum fuit, unica enim punctura cultello prope lumbos facta, prodire cœpit aqua purulenta, atque in tantum foetida, ut nemo adstantium foetorem perferre posset, quo pure aquoso evacuato & abdomine in formam crucis aperto, tota abdominis cavitas, omnia etiam inibi contenta copiosissimo pure tanquam membranis obducta atque investita fuere, ita ut alterum ab altero secernere & di-judicare vix licuerit. Intestina ita erant ad superiora contracta, ut vix mediam abdominis cavitatem adimplerent: Hepar erat omnino putridum, ventriculus, ut intestina, contractus ac angustatus: Uterus vero in loco suo naturali situs vix nucem juglandem

dem magnitudine æquabat &c. v. Salzmänn. *Observ. anatom.* p. 31 *seq.* Anno 1657. edidit intra primum ab urbe Lipsia lapidem, in pago *Marck-Kemberg*, mulier cujusdam rustici filium, & (uti postea ex eventu colligere licebat) in hoc ipso puerperio reddita fuit hydropica, forsân propter suppressas purgationes puerperii, nec ipsa, nec marito istud animadvertente. Quid fit? elapso trimestri abdomen hujus paganæ in fastigiatum attollitur tumorem, non secus atque solet fieri in ingravidatione; quo tumore conspecto obstetrix manu leviter abdomen comprimit, & ex obscuro aquarum hydropicarum motu decepta exclamabat, restitare adhuc foetum in utero superfoetatione conceptum, & statim medicum cum chirurgis accersi jubet; interim moritur hydropica mulier. Ne autem putatitius foetus vitæ periculum aliquod pateretur, os gravidæ (ceu putabatur) imposita clavi apertum tenuerunt. Simulac vero corpus hydropicæ dissectum, statim post primam incisionem tam foetida humorum colluvies profiliit, ut adstantes abire coacti fuerint, secundum observationem Pauli Ammanni *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 186. p. 284 seq.* Nobilissima matrona falsa ingravidatione laborabat tam exquisita, ut oculatissimus quisque eam gravidam pronunciasset, decimo vero mense se vidit deceptam, manente nihilominus obscuro quodam motu in utero, venterque interdum elevabatur, mox deprimebatur. Orta suspicio de inflatione uteri, adhibitis autem variis medicamentis dictæ feminæ sanitas restituta fuit. v. Christ. Franc. Paullin. *de Salvia Sect. II. Membr. 7. cap. 9. p. 330 seq.* Virginem gemino tumore steatomatoso distentum abdomen gerentem rudes ac inscitæ obstetrices, cum attribuerent vulvæ impudicitiae insontem accusarunt, confisæ gemellos ab ipsa gestari; sed calumniam hanc dissipavit anatome, post instituta, utpote quæ nec foetum nec gemellos in utero, sed in mesenterio duo duntaxat invenerit steatomata. vid. Nicol. Tulp. *Obs. Lib. II. cap. 33 p. 155.* Et *Obs. seq.* filia cujusdam pharmacopolæ meminit, quæ post obitum dissecta in mesenterio

fuo insignem ostendit tumorem libras viginti ponderantem; testum quidem extrinsecus membraneo involucro, sed intus repletum pluribus vesiculis, limpida aqua distentis. Increvit autem hæc moles tam lente, ut prægnationis suspicionem moverit. Honestæ quoque matrona anno 1665. ex diutina mensium suppressione, nausea, vomitu, appetitu insolito, pedum & abdominis tumore, motu, ast non sine aliquali fluctuatione &c. præmisso examine una cum obstetrice prænantem se esse credidit, & circa solitum tempus omnia ad instantem partum præparavit, ast frustra, teste Godofredo Schubart *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 260. p. 390.*

§. 13.

Item.

Anno 1648. Noribergæ mulieri rusticæ per plures menses venter inferior seu hypogastrium ita indies intumuerat, ut medici quidam, obstetrices atque mulieres eam, & quidem non unico, sed plurimo foetu gravidam judicarent. Menstruæ enim substiterunt, mammæ distendebantur; imo cum postremis mensibus lac interdum effluere viderent illæ, mammasque rursus flaccescere, abortum metuebant. Misera autem undecimo demum mense, ob virium lapsum, ac reliquo corpore tabe consumto, mortua est. Cadaver a chirurgo in hypogastrii regione fuit dissectum atque in abdomine putrescente præter viscera naturalia nihil, quam humor lentus, foetidus, ad libras duas tresve inventus est & exemptus, atque in vesicæ urinariæ, quæ insigniter intumuerat, parte antica superiore tunica exterior disrupta visa est, cum magno ibidem abscessu, pure multo ac foetido subtus scatente, quod intra ambas vesicæ tunicas amplum spacium ambiebat, illæsa penitus tunica interiore: Uterus vero in suo destinato loco, sine omni labe vacuus & contractus latuit. Tunc & maritus defunctæ referebat, se modo reminisci, quod uxor ante annum & ultra vaccam quandam emulserit, ac ab ista calcitrante circa pubem violenter percussa fuerit, dolorem ac locum læsum neglexerit

rit & exinde in hoc malum inciderit, uti ex propria observatione refert Johannes Helwigius *Obs.* 124. p. 337. Ejusmodi observationes falsæ in gravidationis annotavit Franciscus Mauricæus dans les *Observations sur la Grossesse Obs.* 255. p. 150. inquiens: Le 27. Fevrier 1680. j'ay veü une femme âgée de trente-huit ans, qui après avoir eü quelque petit retardement de ses menstres, avoit quelque soupçon de grossesse de son ventre. L'ayant touchée, je trouvay, que le soupçon de sa prétendue grossesse estoit tres-mal fondé, l'eminence de son ventre n'estant causée, que par la ratte, qui estoit extrêmement grosse, & que la perte de sang venoit d'un ulcere carcenomateux de la matrice &c. Item *Obs.* 275. p. 160 seq. Une dame, qui croyoit estre veritablement en travail d'un enfant, avoit à la verité le ventre presque aussi gros, que si elle eust esté effectivement grosse d'enfant & preste accoucher; & avoit senti depuis cinq mois entiers de mouvemens en son ventre; qu'elle croyoit semblables à ceux d'un enfant: mais elle s'étoit bien trompée; car ce n'estoit que certains treffaillemens, que sentent ordinairement les femmes, qui ont de ces sortes des fausses grossesses. vid. etiam *Obs.* 369. p. 216 seq. *Obs.* 566. p. 332. *Obs.* 579. p. 339. & *Obs.* 675. p. 390 seq. Idem autor etiam juxta observationem 383. p. 225. in femina quadam, quæ propter ventris intumescientiam pro gravida habebatur, post mortem dissecta sinistrum testiculum sive ovarium magnitudine capitis humani deprehendit. Plurima graviditatis falsæ exempla congescit etiam Theophilus Bonetus *Sepulchret. Lib. III. Sect.* 37. fol. 1358 seq. 1362. Mulierem Parisiis vidit Marquardus Stegelius ingenti totius abdominis tumore correptam, cum aliquo lumborum dolore, quam medici quidam gravidam existimantes ad partum accingi jubebant, parum proficientes. Hanc postea alius medicus, Honoræus, bono animo esse jubebat reique familiari operam dare, neque de onere illo die deponendo quidquam ultra cogitare; Nec enim prægnationem hanc esse, sed morbum Gallica lingua Champignon dictum.

Mirum in modum intumuisse mesenterii glandulas & συσπάρκωσιν quandam insensibilem accessisse. Tres jam eodem affectu laborantes feminas sibi observatas. Tumor hic totius abdominis capacitatem eam in magnitudinem elevabat, ut geminos utero ferre videretur. vid. Georg. Hier. Velsch. *Episagm. Obs. 48. pag. m. 29.* Magnifica domina, ætatis annorum triginta, habitus corporis delicatioris, menstruorum suppressione cum mesenterii & abdominis inflatione, febre lenta, dolore, vomitibus & anxietatibus dum per plures menses laborasset, utero vulgo gestare credebatur, elapso vero nono mense, cum futuri partus indicia nulla, humores foetidos per uterum propendulum excerneret, fluore muliebri perperam laborare judicata. Mense decimo sexto accersitus Nicolaus Guilielmus Beckers, legitimis gravidationis signis deficientibus, abscessu mesenterii ac procidentia uteri laborare eam comperit. vid. *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 32. p. p. 58.*

CAPUT V.

De graviditate occulta & dissimulata.

§. I.

Graviditas
occulta.

a variis
causis.

ob hydro-
pem falsum.

Contra vero quandoque non falsa, sed vera, occulta tamen, post tempus deprehenditur graviditas, quando mulieres eandem vel ignorant, vel se minime gravidas esse, sed alio morbo, e.g. hydrope, laborare credunt, vel quando in gravidationem celant seque ægrotas fingunt. Exemplum gravidæ pro hydropica habitæ annotavit Vitus Riedlinus *Linear. med. ann. 1700. Mens. Februar. Obs. 1. p. 121.* his verbis: Junxerat sibi matrimonio mercator quidam virginem, quam ob egregiam formam summe adamaverat. Cum ergo brevi post contractas nuptias non solum colorem faciei vividum amisisset, verum & difficiliter respirare, quin non solum abdomen, verum & pedes intumescere cœpissent, dubius unde hæc mala derivanda forent; medicum celebrem in

con-

consilium vocavit, qui hydropem præ foribus, & medicamentis convenientibus oppugnandum esse, statim edixit, eumque sedulo medicamentis aggressus est; & licet hæc femina aliquoties cum lacrymis testata fuerit, se non dubitare, quin sit gravida, & foetus motum percipere, hunc in finem etiam sororis manus abdomini admoverit, ut nempe ipsa quoque hunc motum exploraret, fidem tamen ipsi medicus obstinatus nullo modo adhibuit, sed sententiæ suæ pertinaciter institit & medicamenta antihydrica sedulo continuavit, donec tandem non tam aquam imaginariam, quam animam medicamentis suis expulit, & foetus motu vehementi, quem omnes adstantes non sine dolore viderunt, post mortuam matrem eum gravissimi erroris convicit. Sic femina quadraginta annorum appetitum patiebatur prostratum, lassitudinem, abdominis tumorem, faciei colorem pallidum, ejusque cum artubus tumorem. Pulsus habebat parvum, urinam reddebatur tenuem & aquosam. Accersitus ad eam Michael Ernestus Ettmüllerus sedulo sciscitabatur, num gravida esset? id quod constanter negabat, siquidem ex nullo signo imprægnationem hauriri valebat. Nihilominus tamen, post assumpta etiam multa & fortia purgantia debito tempore sanam atque vegetam enixa est filiam. vid. *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. I & II. Obs. 44. p. 112.* Ejusmodi observationes recenset Franciscus Mauriceau *dans les Observat. sur la grossesse* e. g. *Obs. 70. p. 42.* d' une femme, qui fut hydro-pique durant neuf ans, & qui non obstant cela fit en ce temps quatre enfans, dont elle accoucha heureusement. vel verum.

§. 2.

Hydropem in gravida annotarunt etiam alii autores, siquidem Felix Platerus *Observ. Lib. III. p. m. 637.* gravidæ juveniculæ meminit, cui non solum propter uterum, quem gestabat, venter distensus erat, sed propter ascitem mire intumuerat, pedesque admodum inflati erant, cum periculosa, ob ventrem adeo distentum, dyspnœa, quæ tamen puellam vivam sed imbecillam peperit,

rit, maximaque profusa aquæ copia ipsa detumuit. Ibidem dictus autor alia exempla annectit. De muliere hydropica & simul gravida feliciterque pariente observationem annotavit Eberhardus Gockelius *Gallicin. med. pract. Cent. II. Conf. 35. p. 462 seq.* in Michaelis Luickardi, textoris, conjuge, quæ nescia quod gravida esset, præ monstrosa tandem ventris intumescencia vix ambulare poterat, post copiosissimam vero aquæ serosæ excretionem vivam filiolum pariebat. De propria uxore hanc historiam recenset Guilhelmus Fabricius *Obs. chirurg. Cent. II. Obs. 56. fol. 128 seq.* Anno 1604. charissima conjunx mea, dum septimo utero gestaret, statim ab initio gestationis præter modum atque consuetudinem debilitata enervataque fuerat, dolores ventris & præcipue dextrilateris, maximi ac frequentes aderant. Circa regionem hepatis per intervalla, & quotiescumque foetus in utero sese movebat, frigus molestum ac dolorosum per sentiebat. Interim venter in monstrosam magnitudinem intumescerebat, adeo ut ipsam duos aut tres ad minimum enixuram foetus, cuncti arbitrarentur. Spatio hebdomadam sex ante partum, crura pedesque hydropicorum more intumuerant. Die 2. Martii 1605. dolores parturientium, quamvis leviores, continui tamen ipsam infestaverant, qui sensim accretiusque ad quartam diem ejus mensis, qua circa septimam vespertinam dolore vehementissimo correpta os uteri apertum, indeque ultra libras octodecim mercatorum, aquæ limpidissimæ, nulloque cruore admixto, maximo ac uno impetu effluxere, atque in isto motu foetus ad exitum sese paraverat. Et postquam per semihoram quievisset & aliquantum confectionis Alkermes, cum aqua cinamomi sine vino destillata, dissolutæ sumpisset, rursus dolore & conatu maximo correpta est; Tum primo aqua, quæ foetum comitari solet, ad libras novem effluxa, instante nona vespertina puellum simul peperit robustissimum &c. Nonnullis feminis una cum foetu copiosum aquosum humorem ex utero processisse, foetu debili ac non vitali meminit Rembertus Dodo-næus

næus. *Obs. 49. Schol. p. 121.* Et Hieronymus Mercurialis *de Morb. Mulier. Lib. I. cap. 2.* inquit: Anno elapso Venetiis fuere nobiles mulieres, quas medici putabant solum hydropicas esse, & tamen inventæ sunt una cum aqua conceptum habuisse v. Israel. Spacch. *Gynæc. fol. 212. v.* etiam Joh. Schenck. *Obs. med. l. IV. fol. 572.* In femina quadraginta annorum, undecim liberorum matre, & bis abortum passa, post varia symptomata ventris moles in tantum indies augebatur, ut nec stare nec ambulare valeret, nec nisi semi-erecta ob suffocationis periculum in lecto quiescere poterat. Septimo mense cum extra lectum tergo tenus inclinaret, ad sellam corpus, improvise incredibilis limpidæ aquæ copia, quantum æstimari poterat, ultra triginta menfuras, sive sexaginta libras civiles profluxit, maximam hypocaufti partem quasi inundans. Ex lectum petiit atque brevi post puellulam mortuam peperit, subsequente mox secundina; Et trihorio fere elapso, alteram enitebatur filiulam, vita quoque privatam, uti ex propria observatione refert Lucas Schroëckius *M. N. C. Dec. I. An. 9 & 10. Obs. 161. pag. 354 seq.*

§. 3.

Quandoque etiam tam gravidæ, quam obstetrices & ipsi medici exinde de graviditate incerti manent, quia nullum fere conceptionis signum apparet, præter intumescentiam abdominis, quæ tamen etiam non statim primis ab ingravidatione mensibus visui occurrit, atque sæpius etiam fallacissimum signum esse solet, pariter uti mensium suppressio eorumque fluxus, uti hætenus aliquot exempla adduximus. Quibus adhuc addendum stupendum ignoratæ gravidationis exemplum Zacuti Lusit. *de Prax. med. admir. Lib. II. Obs. 148. fol. 79.* Medicus scilicet propriæ uxoris menstruum suppressione, ut ipse dicebat, laborantis salutem consulens, & gravidam non esse ex lotiis certo sciens, multoties illi venam secare jubet, alterantia propinat, deobstruentia offert, & per triginta dierum spatium chalybem cum valido exercitio assumen-

dum jubet. Cerota & deobstruentia unguenta utero imponit. Demum omnia ministrat proprio consilio (licet uterus in majorem molem quotidie accresceret) venam in talo secandam imperat, postquam sectionem, cum gravida nonimestris esset, irritata natura foetum cum tanto impetu in vas, aqua & sanguine plenum, in ipso sectionis actu ejecit, ut exeunte e vena sanguine, & foetu aqua velut suffocato, infans & mater ob timorem & nimium sanguinis fluxum exanimes periclitarentur, sed constricto foramine, & foetu ab aqua extracto, ipsa vini potu refocillata ad se rediit. Lipsiæ honesta mulier, quæ per quatuor annos sterile egerat conjugium, præter alia symptomata abdominis molem sensim incrementum sensit, menses quidem erant suppressi, sed nullum præterea aderat imprægnationis signum, usque adeo ut medicus, ejus curam gerens, septuagenario major, paucis ante partum diebus dixerit, æque impossibile esse, ut ipse sit gravidus, ac ista femina. vid. *Ephemer. l. a. p. 113.* Franciscus Mauriceau *l. a. Obs. 224 pag. 128.* inquit: une femme avoit eû une fièvre lente & la jaunisse, durant tout le temps de sa grossesse, qui n'avoit pas même esté connue par un chirurgien, qui avoit assez de réputation pour les accouchemens, qu'elle avoit consulté étant grosse de près de quatre mois; le quel luy avoit dit, qu'elle pouvoit en toute seureté se faire traiter de sa maladie; l'assurant pour lors, qu'elle n'estoit pas grosse. Mais peu de jours ensuite, ayant elle senti remuer son enfant, elle connut bien, que ce chirurgien s'esté lourdement trompé. Idem autor etiam *Obs. 393. pag. 230.* de femina sedecim annorum agit, quæ quamvis numquam menses habuisset, nihilominus conceperat, quæ tamen neque ipsa neque ipsius maritus, ut hoc crederent, persuaderi poterant. Et *Obs. 286. p. 166.* inquit: j'ay vu une demoiselle grosse de huit mois, qui avoit esté traitée depuis six mois entiers, comme si elle eust eu un scirrhe de matrice; pour raison de quoy le medecin, qui ne connoissoit pas sa grossesse, l'avoit fait seigner quantité de fois de bras & des pieds,

&

& purger bien autant, s' estant lourdement laissé tromper par cette demoiselle, qui estant mariée secretement, avec un officier domestique du mesme logis, où elle demeuroit, luy avoit celé le soupçon de grossesse, qu' elle avoit lieu d' avoir, ne croyant pas toute fois elle mesme pouvoir estre effectivement grosse, à cause qu' elle n' avoit jamais souffert, a ce qu' elle me dit, l' introduction de la partie de son mary, qui me confirma la mesme chose. Mais après avoir examiné cette demoiselle en presence de son mary, je les assuray, tous deux, que la tumeur de son ventre estoit causée par une vraye grossesse d' enfant, & non point par un pretendu scirrhe de matrice. Cette demoiselle accoucha deus jours en suite d' un enfant vivant.

§. 4.

Ratione graviditatis interdum etiam a feminis vel uxoribus variæ committuntur fraudes, dum non nullæ graviditatem simulant, aliæ vero dissimulant, siquidem juxta Mich. Albert. *Jurisprud. med. cap. IV. §. 19. p. 95.* quarundam feminarum dolus & astutia multiplex est, quando se gravidas mentiuntur, ut aliquod lucrum & emolumentum inde acquirant; imprimis quando ob crimen aliquod incarceratæ & ad pœnam aut supplicium asservatæ imprægnationem simulant, quibus tam diu mora conceditur, donec imprægnatio magis manifesta evadit, vel rea peperit; Hinc illæ feminæ, quæ intumescentiam ventris simulant, ab obstetricibus bene explorandæ sunt, ne fraudulenter imprægnationem indicent: Ita etiam viduæ interdum post obitum mariti præviam imprægnationem simulare possunt, ut ad hæreditatem admittantur; Alia femina post divortium a pristino marito suo imprægnatam se esse denunciare potest; alia sterilitatis maculam hac prægnantia delere gestit; alia imprægnationem simulare potest, ex promisso agnati ægrotantis, quod ipsa ad hæreditatem admitti debeat, si in matrimonio suo imprægnabitur & infantem vivum pariet &c. Cum itaque casus multiplices sint, in quibus medici de

Graviditas simulata.

præsenti consideratione judicia sua proponere debent, ita etiam considerationes in illo capite propositæ prudenter observari merentur. v. etiam Herm. Fr. Teichmeyer. *Instit. medic. leg. cap. VI. p. 40.*

§. 5.

Gravidi-
tas dissimu-
lata.

Diffimulatam denique graviditatem sæpissime in iis experimur feminis, quæ furtivis indulgentes amoribus, per urinas vel alias fraudes a medicis pro certo scire desiderant, utrum revera gravidæ sint, nec ne? quo vel suam imprægnationem eo melius celent, vel honori suo modis illicitis consulendo embryonem mature abigant atque pro hoc scopo a medicis varia medicamenta, & quidem vel pro simulata alvi obstructione, fortiter purgantia, vel pro mensium refectione, emmenagoga efflagitent, medicosque hoc modo decipiant; quale exemplum refert Franciscus Mauriceau *l. a. Obs. 553. p. 325.* je vis, inquit, une femme grosse de cinq ou six mois, que son medecin avoit fait saigner du pied & baigner, & à la quelle il avoit aussi fait prendre des eaux minerales & beaucoup d' autres remedes, attribuant à une simplex suppression de ses menstrues toutes les incommoditez, qu' elle ressentoit, qui n' estoient causées, que par sa grossesse, qu' elle ne luy avoit pas déclarée, soit qu' elle ne la connust pas elle-mesme, ou qu' elle eu voulu pour quelque raison la luy celer, comme elle taschoit de me faire, lorsque je la visitay, en me disant, qu' elle estoit tres-certaine, qu' elle n' avoit pas couché avec son mari. Cependant non obstant cette raison je luy dis, que quoy qu' elle ne se souvint pas d' avoir couché avec son mari, je luy conseillois neantmoins de ne pas continuër à porter de la sorte, de crainte qu' elle ne donnast elle-mesme occasion de la soupçonner d' avoir derolé l' enfant, dont elle estoit certainement grosse; le quel après cela mourut en son ventre quelque temps avant qu' elle en accouchast. Ces fortes d' exemples & beaucoup d' autres semblables, doivent bien apprendre aux medecins, qu' en traitant les maladies des femmes, ils ne doivent pas se fier entierement à ce qu' elles leur disent, sans bien examiner le veritable état, où elles sont,

font, quand il y a le moindre soupçon de grossesse, car comme il se rencontre souvent des femmes, qui ne connoissent pas elles-mêmes, si elles sont grosses ou non; il y en a d'autres aussi, quoy qu'elles le sçachent bien, trompent leur medecin, en luy celant leur grossesse. Cum rustici cujusdam filia, parentibus insciis & ex illicito concubitu concepisset, adeo quidem hoc celavit, ut potius iisdem persuaferit, se minus bene se habere, & nisi remediis idoneis malo obviam eatur, brevi gravem contracturam morbum, quod & matrem permovit, ut Augustam venerit medicumque quendam propterea & quidem urina allata consuluerit, qui, ut solent eruditi juxta atque conscientiosi medici, certi quid non determinavit, ac medicamentum quoddam ad querelas parentis præscripsit; Cum vero hoc in usum ducto tumor abdominis, non tam imminutus, quam auctus fuisset, foetu nempe semper majus incrementum fumente, alia urina pater carnificem adiit, qui illa vix inspecta, filiam ejusdem hydropel laborare tam certo edixit, ut pater carnificem multis extulerit laudibus; sed haud diu ita post foetum omnibus numeris perfectum filia edidit, juxta Vit. Riedlin. *Linear. med. An. 1700. Mens. Aug. Obs. 23. p. 943 seqq.* Multæ etiam feminæ, quæ ex furtiva venere conceperunt, etiamsi foetus motum manifeste percipiant, secundum Mich. Ern. Ettmüller. *Ephem. l. a p. 113.* id tamen constanter negant, sicque studio impo-nentes medico hydropicas se fingunt. De virgine gravida hydropem fingente sequentem observationem communicat Franciscus Mauriceau *l. a. Obs. 161. p. 90.* J'ay accouché une vieille fille de trente cinq ans, qui estant grosse de deux enfans masles, avoit si bien celé sa grossesse, sans le pretexte d'une tres-grande devotion, dont elle avoit fait profession durant toute sa vie, que feignant toujours d'estre hydropique jusques au jour de son accouchement, elle avoit trompé plusieurs medecins, qui luy avoient fait prendre quantité de violens remedes, pretendans la guerir de cette hydropisie simulée; non obstant les quels elle ne laissa pas

de porter ces deux enfans jusques a terme. Item *Obs.* 352. p. 206. scribit dictus autor: Le 8. Fevrier 1684. un chirurgien de mes confreres desirant avoir mon avis, me fit voir une demoiselle agée de vingt ans ou environ, qui estoit sujette a des vapeurs epileptiques, dont elle estoit incommodée depuis six ou sept mois. Mais luy ayant mis la main sur le ventre, que je trouvay fort gros avec dureté inegale, & le nombril pousse en dehors, avec plusieurs autres conjectures, je ne doutay aucunement, qu'elle ne fust grosse, de huit mois ou environ, quoyque cette demoiselle niaist positivement le fait, simulant, que l'augmentation de sa maladie venoit d'une autre cause &c. Ejusmodi exempla dissimulatæ graviditatis quotidie occurrunt.

§. 6.

rarium exemplum.

Rarioribus exemplis annumerandum, quod refert Jean Palfyn dans la *descript. Anatom. des part. de la femm.* p. 77 seq. inquiens: Le chagrin, qu'une fille de douze ans prit de l'absence d'une personne, qu'elle aimoit eperdûment, lui causa la jaunisse & l'entre tint quelques années en langueur: elle trouva à la fin de quoy se consoler dans un amant, qui luy faisoit beaucoup de caresses. Elle vivoit neanmoins avec assez de retenue aux yeux des parens, lorsque le ventre commença à luy grossir. Tout le quartier s'en aperçut, & fut persuadé, qu'elle étoit enceintes, & en effet, son ventre s'etendoit de plus en plus en approchant du terme. Mais cette fille conçût tant d'horreur du crime, qu'on luy faisoit de sa grossesse, & ses passions avoient un si grand empire sur son corps, que le fœtus, suivant les intentions de la mere, par des liaisons, qui sont encore inconnuës, demeura inseparablement attaché à la matrice. Cette violence coûta la vie à l'enfant, & la santé à la mere. Car les eaux, qui devoient preparer les conduits pour la sortie de l'enfant au monde, gatées par leur sejours, corrompirent ce fruit, & la disposerent à l'hydropisie. Le temps de l'accouchement étant donc arrivé, elle resta au même état, & des mois s'ecou-

f'écoulerent sans aucun changement notable. Le peuple, qui ne se regle, que sur les apparences les plus sensibles, condamna son premier jugement, & la plaignoit autant, qu' il l' avoit blâmée. Mais elle passa fort tristement six ou sept années en suite, pendant les quelles le mal empiroit, & tout le bas ventre luy gonfloit peu à peu, malgré tous les remedes, qu' on y pouvoit apporter; de sorte qu' on fût obligé d' en venir à l' operation au mois de Juillet, que la malade étoit âgée d' environ 25. ans. Monsieur Prévôt, maître chirurgien à Paris, à qui l' on avoit confié le soin de l' hydropique, luy perça deux fois l' abdomen en differens endroits: & des peaux interieures bouchant les ouvertures qu' il faisoit, empêchoient, qu' aucune matiere passât, & que la malade fût soulagée. Quelque temps après il fit avec succès une troisieme ponction plus bas que les deux premieres: mais il fût bien surpris de voir sortir avec un eau purulente de la bourre, des cheveux, du suif, des os, de petites vessies. Il tira plusieurs jours de suite de semblables corps par la même ouverture, en presence de diverses personnes, qui crurent, que la fille étoit enforcellée. Elle mourut avant qu' on eût achevé la cure. Messieurs Devaux, Emmeret, & Duchesne, maîtres chirurgiens de S. Cosme, assisterent à l' ouverture, qui se fit de son corps, & observerent, que la matrice, qui s' étoit prodigieusement épaissie, & amplifiée, occupoit la plus grande capacité du bas ventre, & s' appliquant contre le peritoine, decouvroit la raison, pour la quelle on ne put tirer d' eau par le premieres ponctions: le reste de cette region étoit rempli d' une liqueur jaunatre: Mais quelque peine, qu' ils prirent pour chercher le foye & la ratte, ils ne pûrent appercevoir: La puanteur insupportable de toutes ces matieres jointe, à l' impatience des parens de la fille, ne donna pas le loisir de reconnoître ce qui devoit suppléer a ces visceres. On détacha la matrice, qui avoit été ouverte dans la derniere operation, qui contenoit beaucoup d' eau & de ces corps étrangers. On a examiné cette poche,

che, dont les parties confusement mêlées, avoient perdu leur forme & leur situation: elle étoit formée de plusieurs membranes denses, collées les unes aux autres en divers endroits & séparées ailleurs par de larges ouvertures: elle avoit quatre doigts d'épaisseur dans presque toute son étendue & elle étoit percée par des trous profonds d'un pouce de diamètre, & la plus part remplis d'une graisse très ferme. On rencontra de côté & d'autre des poils, & des os, qu'on ne pût ôter sans déchirer les peaux, aux quelles ils tenoient. Quand on ratiffoit un endroit, que l'on sentoît dur, on divisa une pellicule, par où l'on decouvroit une rangée de dents de la mâchoire supérieure d'un enfant, endurcie & augmentée en ce lieu, aussi bien que ces dents: l'on remarqua une grosse glande, qui avoit à peu près la figure d'un roignon, en l'ouvrant on y vit une cavité & des conduits, qui s'alloient rendre dans la substance de la matrice.

CAPUT VI.

De graviditate diuturna ob fœtum mortuum.

§. I.

*Graviditas
diuturna.*

Sicuti autem in hoc casu per dictæ feminae defunctæ sectionem fœtus in utero latitans detectus est, ita econtra sæpissime fieri solet, ut absque tali feminarum, pro gravidis habitatum, longe tamen post ordinarium graviditatis tempus absque partu morientium apertura nihil certi de ipsarum graviditate vel uteri intumescencia, an nimirum fœtus, vel mola, vel quicquam aliud, in utero detineatur? judicari liceat; siquidem tales conceptus interdum in utero materno defuncti post longum temporis spatium per corruptionem & putrefactionem consumpti tabido demum profluvio per vulvam, quandoque etiam per anum, frustillatim excernuntur, vel etiam, putrescente utero, circa umbilicum, vel alium abdominis locum disruptum progrediuntur, quandoque

etiam

etiam salvis matribus extrahuntur; vel in utero remanent, vel etiam extra uterum in abdomine reperiuntur, qualia exempla sine ordine annectere libet.

§. 2.

De foetu mortuo, quem mater totum annum mortuum utero gestarat, sensim per frustula excidente epistolam ad Carolum Goswinum scripsit Balduinus Ronsseus *Epist. med. I. pag. 9. seq. re-* *Fœtus post annum frustulatim excretus.*
voluto scilicet anno hæc femina una cum lotio primum digitorum articulos excrevit, ac sensim alia majora ossa, tibiam, radium, costas & id genus alia per posticum cum excrementis emisit; tandemque secundo a parturitione anno, maximos antepersa labores calvariam totam, cum cubito, costis & aliis aliquot ossibus, ejecit, quum interim illa totum illud biennium sanioso profluvio consumeretur, & putidissimis vaporibus discruciareretur; adeo ut & præsentis, si diutius adessent, odor offenderet. Liberata tamen a cadavere convaluit, atque ab omni accidente libera evasit. Fuit præter hanc alia Goudæ, quæ quum totum annum foetum in utero gestasset, consumpta tandem carne osseam illam compagem excrevit. Johannes Langius *Epistol. med. Lib. II. Epist. 39. p. 667 seqq.* feminæ meminit, quæ uterum duodecim menses gravida se gestasse arbitrabatur. Et *p. 670.* alius uxoris mentionem facit, quæ foetum viventem aliquot menses in utero gestaverat, & cum jam tempus enixus appeteret; ubera ejus prius turgida, lactis aquosi rore madebant, ac decrescebant; nec puer in utero subsiliit; quæ signa foetum mortuum testabantur. Tandem foetus in matrice computruit, cujus de cruribus & cerebello ossa denigrata & carie obsita, incredibile dictu, sed verum, quum mulier ob intestini exulcerationem alvi profluvio laboraret, tandem anno decimo, non pervulvæ ostiola, sed per anum ossa excrevit.

§. 3.

Historiam gestationis foetus mortui per annos plus quatuor, qui tandem opera & consilio medicorum ex utero per alvum ex- *Per aliquot annos & sectus menses.*
Syllepsilogia. P p p

fectus est & membratim exemptus, ut mater viva permanens, integra restitueretur sanitati, atque post biennium denuo conciperet, prolixè ex Matthia Cornace refert Franciscus Rossetus *de Part. Cæsar. p. m. 228 & 236.* & Diomedes Cornarus *Histor. admir. 6. p. m. 13 seq. 24 seq.* Varia ejusmodi exempla ab ipso Rosseto observata atque a Casparo Bauhino communicata ibidem reperiuntur *p. 72 seqq. & p. 162 seqq.* vide etiam Marcell. Donat. *de medic. Histor. mir. Lib. IV. cap. 22. p. 433.* Joh. Rud. Camerar. *Memorab. Cent. XX. p. 1625 seqq.* De muliere, quæ annos tredecim in utero gestavit, sceletum foetus mortui, quod tactu, cum ab ipsa matre, tum ab omnibus illi præsentibus percipiebatur, observationem ad Matthiam Cornacem perscripsit Ægidius Hertogius. vid. Rosset. *l. a. p. 240.* Cornar. *l. a. p. 29 seq.* Feminam quandam quatuordecim mensibus partum tulisse, refert Alexander Benedictus *de Re medic. Lib. XXV. cap. 23. fol. 475.* Mulieres per tredecim, quatuordecim, quindecim & sedecim, item viginti tres menses uterum gestasse, ex variis autoribus refert Johannes Schenckius *Obs. med. Lib. IV. fol. 581.* quo loco etiam feminarum, infantes biennium & triennium & quadriennium utero gestantium, exempla recenset. De meretricula sedecim menses gravida foetumque debilem pariente, vid. Thom. Barthol. *Histor. anat. Cent. III. Hist. 51. p. 101 seq.* Sic Lazarus Riverius *Observ. Cent. II. Obs. 100. p. 181.* meminit dominæ de Cardet, quæ se primum ad decimum quintum mensem, postea vero ad annum unum, duos & tres, foetum in utero gestasse afferebat; de cujus tamen veritate ibidem dubitat.

§. 4.

Viginti-
quinque
annorum.

Franciscus Bayle historiam anatomicam graviditatis viginti quinque annorum edidit, in qua recenset, pannorum tonsoris uxorem gravidam, etiamsi, post nonum gestationis mensem, partus doloribus fuerit correpta, foetum tamen eniti neutiquam potuisse, sed per dictum temporis spatium in alvo retinuisse, & ex febre continua tandem anno 1678. duos & sexaginta annos natam, obiisse.

obiisse. Aperto cadavere foetus materia quadam callosa, in quam amnios & chorion degeneraverant, obvolutum, extra uterum, in fundo ulcere foedum, epiploo scirrhuso duosque transversos digitos crasso adnatum, iustaque magnitudine & debita partium mollitie praeditum, fuisse repertum. vid. *Act. Erudit. an. 1703. Mens. Febr. p. 77.* Huc pertinent omnes foetus extra uterum in cavitate abdominis reperti, de quibus plura in Embryologia nostra reperies.

§. 5.

Fuit profecto, inquit Guilielmus Harveus *de Part. p. m. 503.* *Post multos menses.* non ita pridem apud nos mulier, quæ foetus in utero sedecim amplius mensibus gessit, eumque ultra decem menses (pluribus ejus rei consciis) huc illuc varie sese commoventem sensit: tandemque vivum peperit. In vita Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc si-ve Peireskii a Petro Gassendo descripta *Lib. I. pag. m. 86.* mentio fit cujusdam mulieris Belliquadrensis, quæ iterum nupta, cum ex prior-
e conjugio partus aliquot nonimestreis edidisset, ex posteriore tamen ediderat treis, unum mensium undecim, alterum quatuordecim, tertium vero octodecim, atque tunc quarto gestaret utero mensem jam vigesimum tertium. Addit etiam ibidem Gassendus ex ore Peireskii, dictam feminam non longe post peperisse infantem cum capillitio ac dentibus, obtinuisseque a conjuge, ne ulterius contingeretur. Anno 1640. prope Vesaliam femina per integrum triennium uterum gestabat, cujus foetus a multis vagire dicebatur, juxta Thom. Bartholin. *Cent. I. Histor. 1. p. 3.* Ex Alberto Kranzio refert Marcellus Donatus *Hist. med. cap. 13. pag. 373.* mulierem quandam Germanicam ex duce Baruch Vandalo uxorem concepisse & biennio prægnantem fuisse, & parturisse infantem gradientem & loquentem.

§. 6.

De infante mortuo in matris ventre annos sedecim & quod excurrit reperto hanc observationem refert Franciscus Bouchardus *Per sedecim annos & ultra.*

dus *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 12. p. 15.* Mulier temperamento sanguineo tribus lustris & amplius utero gessit, nono licet graviditatis mense, præviis omnibus signis; consuetos partus dolores, absque ullo tamen alio effectū fuerit perpeſſa, nisi quod ita fuerit emaciata, ut postea sceleton referret; indies etiam intumuit venter cum incredibili totius abdominis distensione; tandem annum ætatis quinquagesimum tertium prætergressa fato functa est. Apertis, in dissectione cadaveris, scalpello integumentis, cum impetu quasi ex dolio erupit serofus humor; colore subcroceus, minime foetens, quoad libras circiter sexdecim, quo educto, statim videndum se præbuit foetus nullis tectus involucris, imo nullum fere uteri vestigium apparebat, nisi qua parte utero foetus conjungebatur; is transversum hypogastrium scindebat, facie sursum spectans, vertice ilio dextro, pedibus vero circa regionem renis sinistri ita firmiter adhærebat, ut sine sectione & duorum chirurgorum ope non potuerit avelli. Avulsus tandem suis omnibus partibus absolutus deprehensus est, nec ultra eam excreverat magnitudinem, quam juxta consuetas naturæ leges novimestris foetus assequitur, caro musculosa paulo durior, nasus depressus, os clausum & induratae gingivæ observatae sunt. Interranea omnia erant integra, sed flaccida, absque sanguine. Integer foetus nunc nulla vel levi adhibita opera Dolæ asservatur & ostenditur: Hoc ostentum Dolanum etiam in tractatu sub nomine Collectaneorum de diuturna graviditate Amstelodami edito *p. m. 55.* iisdem verbis describitur. Continetur insuper in his Collectaneis historia embryonis in utero materno per annos viginti octo contenti, petrefacti & post matris mortem exsecti, de quo evolvatur etiam Thom. Bartholin. *Histor. anat. Cent. II. Obs. 100. p. 307 seqq.* vid. etiam Christ. Frid. Garmann. *de Mirac. Mort. p. 1134.* Dan. Sennert. *Pract. Lib. IV. Part. II. Sect. 4. cap. 8. p. 323.*

§. 7.

Historiam anatomicam foetus totis viginti quinque annis in
 utero

utero delitescantis, addito examine phænomenorum omnium per 25. annos.
concomitantium, conscripsit Nicolaus de Blegny *Zodiac. med. nos. Gallic. Ann. I. Januar. Obs. 9. p. 9.* vid. etiam *Febr. Obs. 8. p. 51.* Stephan. Blancard. *Collect. med. phys. Cent. I. Obs. 12. p. 17.* alii hanc observationem Francisco Bayle adscribunt. vid. *Journ. de Sçavans Tom. VI. p. 312. & Tom. VII. p. 24 seq. it. M. N. C. Dec. II. An. 8. Obs. 134. p. 293.* quo loco Johannes Dolæus ita scribit: fisto hic epistolam D. D. Bayle Tholosæ scriptam die 22. mensis Junii anno 1678. ad autorem Ephemeridum Eruditorum, in qua continetur compendiosa foetus viginti sex annorum historia. Margaretha Matthieu utero gerens circa finem noni mensis gestationis suæ eos perpeffa est dolores, iisque nisibus stipatos, a quibus vulgo vexantur parturientes. Lochia excrevit, sed foetus in lucem nequaquam prodiit; per viginti annorum spatium motus quosdam percepit variis cum incommodis, juxta quorum vehementiam chirurgum suum ordinarium efflagitabat, ut aperto ipsius utero illam ab importuno isto onere liberaret, per sex ultimorum annorum curriculum nihil amplius persensit; sed nuperis hisce diebus male se habens a chirurgo suo iterum exposulavit, ut statim ab ipsius obitu, foetum, quem gestabat, ab utero educeret. Dicta muliere die 18. mensis Junii 1678. fato defuncta, die proxime subsequente cadaver illius apertum fuit: & foetus mortuus in abdomine extra uterum repertus est, nullo cum utero vinculo conjunctus, capite inferiora versus deturbato, natibus ad sinistrum latus declivibus, altero brachio capiti imposito, & altera tibia versus exteriora implicata a sinistro fœmore ad dextrum tendente &c. Cadaverculum istud octo libras, quarum unaquæque sexdecim uncias valet, ponderabat. Cranium in plures partes erat diffractum, cerebrum consistentia & colore unguentum rosetum referebat. Carnes rubro gaudebant colore iis in locis, in quibus epiplois adhærescebant. Partes omnes internæ marcidæ conspiciebantur, colore nigro perfusæ absque ullo sanguinis vestigio, si cor exceperis,

quod aliquantulum ruborem conservaverat. Frons, aures, oculi, nasus, os, obducta invisebantur materia quadam cartilaginosa digitum transversum crassa, qua sublata, partes apparuere: Discifis gingivis dentes eadem pollentes magnitudine, quam in adultis possident, visi fuere. Exemplum feminæ Hassniensis foetum per quinquennium in abdomine gerentis communicat Bussiére, vid. Joh. Guil. Pauli *Annotat. in Johann van Horn. Opusc. anat. chirurg. p.m. 475.* Illustrissima etiam matrona trigesimum septimum ætatis annum agens ante septem jam annos, post sterile, octo annorum spatio, matrimonium conceperat, omnia signa habens felicitis imprægnationis, quippe ubera lacte copioso turgida, venter insuper indies magis increscens, motusque foetus strenue se moventis post decimam sextam septimanam haud dubia ingravidationis signa præbebant. At, cum transacto jam legitimo temporis spatio ad parturiendum nulla amplius mora expectaretur, accidit, ut ex inopinato motus foetus cessare, lac in mammis ac tandem penitus aboleri, nihilominus tamen ventris tumor in sinistro latere cum ponderis mole & duritie persistere, & omnis spes foetus evanescere, & econtra durus ille tumor ad contactum aliquantulum mobilis, molæ suspicionem injicere cœperit. Ab eo autem tempore, quo molæ suspicio cœperat, illustrissima patiens melius valere ac omnia peragere poterat, mensibus interim rite fluentibus; ac (quod mirabile) per spatium septem fere annorum in tali statu vixit, donec lenta tabe obierit. In defunctæ autem cadavere sub peritonæo dissecto informis massa comparuit, sex circiter librarum pondus pendens, in qua stupentibus omnibus, ibi præsentibus, caput infantis undique capillis contactum, ac foetus feminei sexus omnibus membris absolutus septemque fere annis ventre materno occlusus se in conspectum dedit. Deinde in alia massa, trium pugnorum magnitudine apparuit, qua aperta alter foetus, & quidem masculus, priori minor, membris tamen omnibus perfectus exemptus, partum gemellum, fratris scilicet &

& sororis exhibuit, annotante Francisco Mayr *M. N. C. Dec. III. An. 4. Obs. 277. p. 167 seqq.*

§. 8.

Huc pertinet etiam Cypriani epistola historiam de muliere ^{Cypriani observatio} unum & viginti menses gravida exhibens, cui foetus ex uteri tuba, ^{de foetu ex-} ipsa matre salva ac superstite a dicto Cypriano exscindebatur, ^{secto & alia exempla.} de qua jam supra egimus. Infeliciores erant mulier illa Mussipontana, quæ foetum humanum, demum lapidescentem, triginta annos in utero gestarat, quam observationem curiosam sub titulo historię foetus Mussipontani extra uterum in abdomine reperti & lapidescentis cum adjectis variorum excellentissimorum virorum commentis Laurentius Straussius, edidit 1669. vid. Joh. Bened. Sinsbald. *Geneanthrop.* Isbrandi de Diemerbroec de hac observatione judicium hoc est: non magnam fidem mereri videtur historia foetus Mussipontani, plane extra uterum in medio abdomine concepti & formati, ibique post mortem mulieris inventi, cujus historię a Laurentio Straussio edita est Darmstadii anno 1662. cum adjunctis plurium clarissimorum medicorum & professorum super ea judiciis: nisi dicamus hanc historiam veram esse posse, quatenus forte ovum seminis virilis irradiatione in ovario antea foecundatum, e testibus in tubas prolapsurum, casu ad tubarum fimbrias perveniens in abdominis cavitatem prolapsum fuit, ante ingressum in tubam, atque calore & fotu istius loci foetus in eo efformatus sit: quod tamen vix verosimile videtur; atque hinc tales historię, non omnino præter rationem, irridentur & exploduntur a doctissimis viris Guidone Patino, Bartholino aliisque pluribus. Quo loco etiam monendum, ejusmodi historias, uti hætenus ex variis autoribus recensuimus, Paulo Ammanno videri suspectæ fidei, quippe qui *Irerenic. pag. 75.* scribit: quod attinet observationes Marcelli Donati, Schenckii & aliorum, quibus attestantur, quod foetum in utero gestarint per annum, sesqui annum, biennium & ultra, historiis naturalibus nequaquam sunt annumerandæ, quia

quia superant omnem fidem physicam, cujus farinæ est etiam Ægidii de Hertoghe epistola ad Matthiam Cornarium (Cornacem) de gestatione foetus mortui per annos tredecim &c. cujus meminit Franciscus Swertius in Athenis Belgicis. Maxime etiam suspecta est observatio Alberti Kranzii de infante post biennium a matris ingravidatione in lucem edito, qui, uti paulo ante ex Marcello Donato adduximus, statim a partu ambulare ac loqui potuisse scribitur, quale exemplum infantis per biennium in utero gestati, qui loquebatur & ingrediebatur ex Joh. Wolffio refert Johannes Schenckius *fol. 581.* quia talis foetus in utero nec gressus formare, nec literas & sermones pronunciare discere potuit. Hinc etiam Gregorius Horstius inquit: in Marcello Donato nonnulla esse, quæ creditu sint difficilia, quæque fabulam sapiant, e. g. de quodam infante, qui in utero materno duos annos integros commoratus, editus vero in lucem postea, quasi compensaturus moram solus ambulasse & locutus esse dicitur &c. v. Frid. Nitzsch *Ephemerid. an. 1666. pag. 196 seq.* & Andr. Ottomar. Goëlicke *Medicin. forens. Specim. I. §. 31. p. 49.* Et Lazarus Riverius *Observ. med. Cent. II. Obs. 100. p. m. 181.* ait: Historiæ a Schenckio collectæ, ex eo falsitatis arguuntur, quod asserant infantes in lucem editos statim loqui coepisse; At nemo nescit, loquelam esse ex disciplina.

§. 9.

Rara observatio.

Rarior adhuc videtur mihi observatio, de muliere, quæ sceleton mortui foetus utero ferens denuo concepit, quam Marcellus Donatus *l. a. p. 436 seq.* his verbis recenset: Anno Domini 1540. in castro Pomponii erat mulier, cui nomen Ludovicia, vocabatur tamen communiter, eo quod vasti esset corporis, la cavalla. Hæc, cum antea utero de mortuum foetum gestasset, jamque per vulvam corporis molliores partes putrefactæ profluxissent, intro officulis corpusculi derelictis, cum recte tamen valeret, iterum concepit; at cum male admodum se haberet, jamque in vitæ discrimen manifestissimum traheretur, forte advenit chirurgus quidam, qui mulie-

mulieris casu audito, se mulierem sanitati restituere tentaturum, dummodo illam ut mortuam manibus ipsius subjicerent, nummosque decem aureos, si sanaret, persolverent. Pactum recipiunt cognati pauperes. Homo hic audax, deligata muliere, opus aggreditur, dissectisque per longum abdominis musculis, peritonæo utroque demum ipso sceleton mortui pueri extrahit, ablutoque utero vino calente, aromatibus quibusdam permixto futura vulneris labia conglutinat, candentique ferro partem inconsutam inurit. Mirandum dictu sanata mulier statim tempore alterum foetum peperit non solum vivum, sed nulla ex parte labefactatum, & postmodum non semel, sed quater concepit, utero gessit & feliciter enixa est &c. Alia gravida partui propinqua post casum, foetum vitalem amplius non sentiens ab eo tempore bis concepit, & feliciter enixa est, restitante nihilominus adhuc semper priore foetu cum ventris tumore, citra ullas ejusdem putrefactionis aut excretionis notas, uti ex Oswaldi Gabelchoveri observationibus refert Johannes Schenckius *Obs. med. Lib. IV. fol. 598.* In oppido scilicet Sindelfingen vixit femina, triginta circiter annorum, ea cum partui propinqua, sex nimirum vel septem septimanis ante expectatam partus horam, fallente glacie, supina dorsum muro illisisset, nihil amplius sensit vitale in foetu, quem gestabat utero, neque tunc neque deinceps. Ventris moles eadem, nisi quod aliquandiu post lapsum increvit, ac deinceps iterum decrevit, sed non extoto: sed neque mortuum edidit foetum, nec menses, vel qualia in puerperio expurgari solent, ex eo tempore vidit. Interim tamen bis vel ter concepit totiesque vitales edidit foetus: post partum tamen adhuc semper distentio ventris mansit, ita ut in ea fuerit omnino sententia, habere se adhuc in utero foetum illum mortuum. Quod quamvis contrarium ex toto sit, foetum in utero mortuum non putrescere: foetu in utero hærente mortuo, alterum concipi, ac tandem in utero foveri, donec justo tempore in lucem edi possit: quia tamen post lapsum

illum adusque primi infantis a lapfu partum, nihil ex utero neque humoris, neque solidæ substantiæ, vel ossæ, vel carneæ exclusum fit, credidit Gabelchoverus, non computruisse quidem, sed in scirrhosam quasi abiisse substantiam infantem illum & quasi contabuisse. Albucasis *Chirurg. Lib. II. cap. 76.* memorat, mulierem suo tempore foetum mortuum citra vitæ discrimen per longum temporis intervallum in utero circumportasse, demumque, priore non rejecto, iterum imprægnatam fuisse. Item Platerus observavit, aliquando vaccam, cum ob certas causas vitulum in lucem edere non valeret, nihilque inde gravius pateretur, paulo post iterum concepisse, & exacto certo tempore, alium vitulum vivum cum prioris sceletto simul peperisse, vid. Georg. Nymman. *Dissert. de Vit. Fœt. in uter. p. m. 22. it. Corn. Stalp. van der Wiel Obs. rar. Cent. post. Obs. 30. Sch. p. 322.*

§. 10.

recens ex-
emplum.

His autem observationibus ut aliam quoque eadem veritate, iisdemque, quibus mihi communicata est, verbis annectam, æquibonique benevolus lector consulat.

Extract eines Schreibens aus Stutgard vom 28. Martii 1720.

Nun willich auch etwas von hier berichten, welches iedweden so lange ungläublich scheinen muß, biß ers mit Augen gesehen. Es ist nemlich vor etwa 14. Tagen ein altes Weib von 92. Jahren gestorben; diese ist vor 46. Jahren schwanger worden, als aber die ordentliche Zeit zum gebären gekommen, hat sie vollkommene Geburts-Schmertzen und Wehen ausgestanden, gleichwohl ist kein partus, auch sonst nichts ediret worden, sondern die Schmerzen sind wieder nach und nach vergangen. Das Weib aber ist beständig darbey geblieben, daß sie das Kind noch im Leibe hatte, und fühlete sie nicht allein die ordentliche Bewegung, sondern hœrete das Kind auch zuweilen weinen. Sie ist endlich von allen Medicis, Hebammen &c. verlacht worden, und zwar um desto mehr, weil sie ex postfacto noch zweymahl schwanger worden, und iedes mahl einen Sohn zur Welt gebracht, welche noch zu dato leben, und wieder geheyrahet sind.

sind. Dessen ungeachtet ist das Weib constantissime darbey geblieben, das erste Kind hätte sie noch im Leibe; Dahero sie von ihrem Beicht-Vater und einigen andern gleichsam einen Eyd abgenommen, daß man sie dereinst nach ihrem Tode möchte æffnen lassen, denn sie wüßte gewiß, daß noch ein Kind in ihrem Leibe wäre, welches vielleicht so verschlossen, daß es nicht heraus kœnte. Nun hat, wie gedacht, das Weib biß in ihr 92. Jahr gelebet und ist vor 14. Tagen gestorben, und biß an ihr Ende bey ihrer Meynung geblieben. Als man sie nun nach ihrem Tode geæffnet, so hat sich auf derselben Seite, die das Weib beständig geklaget, in dem Horn der Gebæhr-Mutter, eine grosse harte langliche Kugel, so groß als ein Kürbis, gefunden, welche von der Schalen so dicke, als fast das Cranium eines Kalbes, gewesen. Diese Kugel ist von einander gehauen worden, da denn in solcher ein vollkommenes Kind, ein Knæblein, zwar todt, aber doch gantz frisch, und in der Figur, wie sonst Kinder in Mutter-Leibe zu sitzen pflegen, sich gefunden, welches solchem nach gantzer 46. Jahr in Mutter-Leibe gelegen. Nachdem Serenissimus und der gantze Hoff es gesehen, ist es auf Tübingen zur Medicinischen Facultæt geschickt worden, von dar es aber balsamirt zurück in hiesige Kunst-Cammer gebracht und daselbst asserviret werden wird. Item:

Nachricht von dem aus einer 94. jährigen Frauen geschnittenen 45. jährigen Kinde, aus Regenspurg überschrieben von dem 11. April 1720.

Das alte Weib von Leinzel, welches 45. Jahr schwanger gewesen, ist vor etlichen Tagen gestorben, so der Bader von Heubach geæffnet, bey welcher eine nicht gar runde Kugel, wie eine Kegel-Kugel, gefunden worden, deren Schale man mit einem Beil aufhauen müssen, und ist solche eines Fingers dicke gewesen, worinnen das Kind, wie in Mutter-Leibe lieget, und ist ein Sohn, so das eine Händlein auf dem Auge und das andere auf dem Knie, auch eine Nabelschnure, wie ein anderes Kind hat. Man kan aber nirgends finden, wo das einigen Zugang gehabt, welches doch noch muß gelebet haben, als die Frau gestorben, indeme es noch ganz frisch ist. Obgedachte Schale ist wie eine Hirnschale, so aber in des Wei-

bes Mutter angewachsen gewesen. Und ist noch das græste Wunder, daß dieses Weib noch zwey Kinder darneben getragen und gebohren, so noch am Leben. Auf der Seite, wo die Schale angewachsen gewesen, ist selbige weich, und wenn das Kind heraus kœmmt, dürffte es wenigstens drey Viertel-Ellen lang seyn. Da nun solche Kugel nacher Tübingen geschickt worden, so wird das Kind allda erst aus der Schale gethan werden.

§. II.

confirma-
tur.

Quantum autem his relationibus fidendum sit, confirmat idem casus in Ephemeridibus *Acad. N. C. Cent. X. Obs. 48. p. 337* a Johanne Burckardo Mœgling sequentibus verbis descriptus: Communico rariorem casum ossificationis chorii & foetus semiseclisenis, scilicet per quadraginta sex annos in utero materno absque corruptione detenti. Undecimo enim die Martii anni 1720. in pago Leinzell, ad nobiles de Lang spectante, prope Gmündam Suevorum demortua fuit vetula 94. annorum, Anna Müllerin, & post mortem a duobus chirurgis Heubacensibus, socero ac genero aperta, quod se jam a quadraginta sex annis foetum in utero gestare, quicquid contradixerint alii, constantissime asseruisset; jam olim debito tempore & motum infantis & conamina partus admodum dolorifica, quanquam irrita, per integras tres septimanas perpeffa. Peperit postmodum successive alios duos infantes, masculum ac femellam, ambos adhuc in vivis, illum quidem venatoriam artem Bischoffshemii exercentem, hanc ex occasione invasionis hostilis militi Gallo nuptam, nunc in Galliis degentem. Repertus autem fuit in utero hujus feminæ globus rotundus osseus, octo librarum civilium pondere, globum majorem conorum adæquans, *einer grossen Kegel-Kugel gleich*, fundo uteri, mediante quadam carnea tunica adnatus, & in illo vi adhibita aperto foetus humanus carne, cute, ossibus, funiculo umbilicali præditus, non putridus, sexus virilis & justæ fere magnitudinis. Veritatem hujus historiæ contestabuntur Johannes Christophorus von Lang, Centurio Suevicus, dominus loci, & Johannes Michael Weber, pastor

pastor ibidem. Adfuerunt quoque scabini, duo testes, Georgius Gelinck & Blasius Hartel. Die 20. Martii hic globus cum contento suo medicis Stuttgardiensibus primum, post pluribus aliis personis, præcipue serenissimo duci ad spectandum exhibitus, & ex hujus mandato ad Doctorem Zellerum, in Thermis ferinis commorantem, ut illum pro sua, qua pollet, peritia anatomica accuratius examinaret, Tubingamque deportatus fuit; ut de hystoriæ, quam ex originali, ut vocant, fidelissime extrahi, veritate dubitare minime liceat. Occurrunt quidem circa illam adhuc dubia quædam; primum ratione ætatis defunctæ, quæ non adeo certa est, scilicet nullo testimonio publico comprobata; nam quinquagenariam adhuc parere, rarius contingit; interim tamen decrepitam fuisse vetulam satis constat: alterum, an in cavo uteri hæserit hic tantæ molis tumor, procul dubio novam, & quidem binam conceptionem, quæ tamen facta est, impediturus, vel saltem partum eorundem secuturus? Annon potius in altera tuba Fallopiana (sinistra forsan, quia effato chirurgorum ad sinistrum latus deflectebat tumor ventris in demortua) fuerit detentus hic conceptus, sensim crescens, & postea propter molem exitu frustratus, demortuus & obrigescente pedetentim in osseam durtiem chorio a putredine defensus? Dolendum sane hanc sectionem non peregissem medicum doctum, chirurgis hisce anatomix plane expertibus facile pro utero per ætatem & propter viciniam grandioris tumoris tantum non obliterato imponere potuit turgida atque hoc foetu prægnans dicta tuba Fallopiana. (Stuttgardia Augustam Vindel. d. 6. April. an. 1720. missæ.)

CAPUT VII.

De gravidarum privilegiis.

§. I.

QUandoque etiam graviditatis signa juris consulti a medicis expetunt, si quando feminæ delicti cujusdam suspectæ vel *Gravidarum privilegia.*

etiam convictæ jurare & testimonium ferre, vel incarcerari, torqueri aut puniri debeant, in quibus & aliis casibus gravidæ multis gaudent privilegiis. Gravidæ enim, juxta Petr. Mülleri *Disput. de jure Prægnant. Cap. 4. §. 19. p. 39.* non coguntur jurare aut testimonium ferre invitæ in judicio *arg. l. 2. §. 4. ff. si quis caut. in jud. Bald. al. l. inviti. 8. ff. d. test.* ita ut teneantur comparere personaliter in judiciis, si sunt propinquæ partui, quia est timor, ne pereant in via Marfil. in *Præst. crim. §. nunc videndum. n. 49.* Sed mittere debet judex notarium ad earum domum, ut jurent atque dependant. *arg. l. ad personas. 15. ff. de jurej. Seb. Med. de Cas. fort. P. II. Qu. 6. p. 168.* Fallit tamen 1) quando mulier prægnans est rustica & valens, ut eo tempore portet onera. 2) in meretrice prægnante, quia vilitas vitæ non meretur legum laqueis innodari. Fallit 3) in gravidis paucarum dierum &c. Juxta §. 20. gravidis interdum juramentum remittitur, quod credantur magis memores esse æternæ salutis. Brun. *ad l. 18. de St. hom. n. ult.* Et Conradus Philippus Hoffmannus *de Insignior. Puerper. Tempor. cap. 1. §. 9.* ad quæstionem: An partui propinquis juramentum aut testimonii dictio remitti queat? respondet, quod non. Equidem Dd. in eam inclinant sententiam: prægnanti ob foetum non posse imponi juramentum, imprimis purgatorium, cum torturæ æquiparetur, & propterea tortura spiritualis dicatur, & quod mulier accedendo in judicium in discrimen aliquod incidere possit, juxta *l. 2. §. 4. D. Si qu. caut. in jud. sist. caus. non obtemp.* ita ut Brunnem. *ad l. 18. D. de st. H.* idem a commissariis observari fateatur. Fundamentis tamen hanc opinionem destitui recte asserunt Mevius *P. V. Dec. 81.* & Stryk ad tit. *D. si qu. caut. &c. §. 8.* cum hoc casu aut gravida, aut ejus foetus nullum subeat periculum, præsertim si de re ad se non pertinente, jurato testimonium ferre teneatur. Recte tamen cit. Mevius & Stryckius & cum iis alii monent, gravidæ scil. qualitatem attendendam esse, an domi examinanda sit, an vero examen differendum. Si prius, judex notarium ad ejus domum mittere tenetur,

ut juret atque deponat. Si posterius, examen exacto puerperio instituendum. Nullatenus tamen examen vel domi peragendum vel differendum, si gravida adhuc longe distet a statu enitendi, vel ea sit persona rustica & valens, ut eo tempore onera portare possit, vel sit ea meretrix, aut alia persona vilis. Idem statuendum esse credimus, de jure Prussico, ubi *P. I. L. I. T. 35. A. 4. §. 2.* Testes domi examinandi sunt, *so da kranck und unvermægend, oder sonst aus erheblichen Ursachen verbindet vverden.*

§. 2.

Ad quæstionem, an prægnans incarcerari, terreri, torqueri *circa tor-* & puniri debeat? respondet Paulus Zacchias *Quæst. med. leg. Lib. I. turam. Tit. 3. Qu. 1. n. 2 seq. fol. 86.* ubi torqueri mulierem oporteat, minus illud executioni demandari potest, ea gravida existente, *l. prægnantis. ff. de Pœnis. Clar. in §. fin. quæst. 64. n. 22. Menoch. de Arbitr. Jud. Lib. I. Quæst. 86. n. 10. Farinac. Var. quæst. & opin. crimin. quæst. 41. n. 78.* quod ampliat, ut neque verbis minitabundis terreri possit *num. 84.* sic & ubi damnari debeat ad ultimum supplicium, vel etiam ad corporalem aliquam pœnam, minus fieri potest, quamdiu utero gerit & differri executionem jubent *leg. Clar. ubi supra, quæst. 57. n. 5. Covarr. Var. resolut. Lib. III. cap. 4. Tom. 2.* Et Caspar Zieglerus in hunc locum addit: Non minus Romanæ gentis hanc fuisse legem, sed ab Ægyptiis primo latam, & ab iis a Græcis acceptam, tandemque ad Romanos dilapsam auctor est Plutarchus. Elegantia de consensu variarum gentium collegit Ægid. Menag. *Amœn. jur. civil. cap. 21.* Hinc adeo statuunt Dnd. non valere confessionem factam a muliere prægnante tortura. Joh. Bapt. Bajard. *ad Jul. Clar. quæst. 64. num. 77. Francisc. Cason. de Torment. cap. 10. n. 6.* Soletque ab Jctis nostris sententiæ criminali adjici, differri debere vel quæstionem vel pœnam corporis afflictivam, usque dum partum enixa fuerit mulier, & sex septimanæ deinceps exactæ. Et *Lib. VI. Tit. 2. Qu. 2. n. 4 & 5. fol. 524.* inquit idem Zacchias: Primus torturæ gradus est, cum judex mi-

natur

natur reo tormenta ipsumque terrere studet, ad veritatem ab illo eliciendam, & ab hoc primo torturæ gradu (licet abusive tortura dicatur) nemo excipitur, nisi mulier utero gerens, ut unanimiter sentiunt Dd. omnes, quia, si gravidam deterreas, foetum abjicere facile coges. Item *Quest. 4. n. 19. fol. 532.* docet, quod mulieres, si utero gerant, si puerperia habeant, aut si lac præbeant, a chordæ tormento excipiantur, & multo magis; Et hoc in quocunque prægnantiæ tempore procedere, non sit dubium. Sic Petrus Müllerus *Disp. de Jur. Prægnant. cap. 4. §. 6. p. 32.* inquit: Feminis gravidis quoad incarcerationem pro debitis parcendum Manz. *Patrocin. debit. depaup. Dec. I. Qu. 7. n. 74.* imo nec ob maleficia includi carcere debent, ubi frigore affliguntur carceratæ, manicæque ferreæ & ferrei compedes circumponuntur. Natt. *Conf. 319. n. 3.* etiamsi consuetudo esset in contrarium, quod etiam mulieres incarcerentur, vel mulier infamis aut impudicam vitam agens ad instar viri in carcerem vel aliam custodiam mitti possit. Prolixè etiam §. 8 seq. de gravidarum poenis agit idem Müllerus: Prægnans, inquiens, torqueri non potest, nisi post editum partum, etiamsi sit ancilla, & prægnans ab alio, quam a marito; semen enim hominis, ex qualicumque homine, Dei creatura est, ac propterea custodiendum, etiamsi in carcere concepisset fraudulenter & dolose, causa evitandæ torturæ. Bald. *ad l. 13. ff. de stat. hom. lat. 1. rel. 2.* Jodoc. Damhoud. *Prax. crim. c. 41. n. 6.* Ratio est, quia feminae prægnantes ut plurimum infirmæ & debilis sunt constitutionis, adeoque ab tormentorum dolores facillime damnum vitæ sentire possunt. §. 9. ampliatur, quod ne quidem post partum editum, nisi elapsis quadraginta diebus, quia propter corporis imbecillitatem infra id tempus posset mori, debet ergo expectari, donec sit fortis ad torturam.

§. 3.

ratione territionis. Juxta §. 11 seq. p. 36 seq. mulier prægnans, quæ cum dolore torqueri nequit, ne territione quidem reali, quæ fit, quando rea ad locum

locum torturæ per carnificem ducitur & funibus alligatur, absque elevatione tamen corporis, terreri potest. Nec potest vicina partui relegari seu confinari, sed differtur executio, si fuerit condemnata, donec pariat, ut ne ex hoc partus patiatur detrimentum scilicet si procul sint confinia, si iter asperum sit subeundum aut salvo ventre ex regione, ultra quam releganda, haud migrare queat. Facile enim posset partum deponere in itinere. Non potest puniri pœna corporis afflictiva, sed gaudet privilegio dilationis, nedum intra 40. dies, dum decumbit, sed etiam post, donec nutrix filio reperiatur &c. & relegationis.

§. 4.

Conradus Philippus Hoffmannus *de Puerper. Tempor. cap. 1.* ratione incarcerationis.
 §. 8. p. 9. ad quæstionem: Num gravida ob debitum vel delictum incarcerari possit? respondet de jure civili, quod non, cum illud mulieribus singulare de non carcerando indulserit privilegium. Justinus enim in *Nov. 134. c. 9.* unde desumpta est *Auth. sed hodie, C. de Off. div. Jud. & Auth. hodie. C. de Cust. reor.* expresse prohibuit, mulierem ob debita carceri includi, multo magis prægnantem, secus tamen se res habet in criminalibus, ubi publica vindicandi scelera necessitas quoad mulieres in genere suadet. Cum vero de jure civili ægroti carcerati relaxentur, si forte in carcerem conjecti ægrotare incipiant, certe multo magis prægnantibus id privilegium indulgendum erit, cum ægrorum privilegiis gaudeant. De jure Prussico tamen *P. III. L. VI. T. 1. A. 8. §. 1.* prægnantes incarceratæ non relaxantur, sed saltim ibidem usque ad tempus puerperii mitius tractantur, ibi: *Wenn die gefangene Person krank oder NB. schwanger, und die Zeit ihrer Niederkunft herannahet, soll der Richter Sorge tragen, daß das Gefängniß leidlicher gemacht, und dergleichen gefangene Person in einer Stube oder Cammer, bey dem Gefangen- Wärter, oder sonst an einem leidlichen Orte, vorzu die Obrigkeit Anstalt zu machen hat, verrühret, und die Zeit der Genesung oder Niederkunft allda abgewartet werde.* Ad quæstionem, num mul-

Syllepsilogia.

R r r

licris,

lieris, uterum gestantis, relegatio post editum partum differenda, distinguendo respondet §. 10. p. 11. scilicet si partui ex relegatione periculum imminet, v. g. quando confinia a loco habitationis longe distent, vel iter asperum sit subeundum, aut tempus pariendi instet, hoc casu relegatio post partum sit differenda. Si vero omne ejusmodi periculum cesset, relegatio non sit differenda. Item ad quæstionem: an mulier nondum edito partu, torqueri aut terreri possit, negative respondet, idque autoritate Pauli & Ulpiani corroborat, hujusque legis duplicem ex Carpzovio adfert rationem 1) ut partus salvus & illæsus fervetur, 2) ne ipsamet femina prægnans, quæ plerumque debili est corpore, ex tormentorum doloribus damnum vitæ sentiat. Imo post partum editum dies quadraginta expectandi, donec puerpera ad torturam pervenire queat. Cur vero puerpera neque intra quadraginta dies post puerperium torturæ subjiciatur, hæc est ratio: tum quod purgationes puerperii ordinarie per quadraginta dies durent, tum imprimis quia cessante etiam puerperio venæ adhuc hiant, & apertæ ad hoc usque tempus in plurimis remanent, ad expurgandas superfluitates in uteri substantia a partu relictas, ex quo periculosus excitari potest morbus. Neque hic tempus attenditur, an gravida proxima sit partui, an vero ante paucos saltem dies conceperit. Plura vide ibidem §. 14. p. 15 seq.

§. 5.

Ratione
torturæ.

Secundum Fortunat. Fidel. *de Relat. medicor. Lib. II. Sect. III. cap. 4. p. 233.* immunes ab equulei tormento mulieres sunt, quæ uterum gerunt, atque ultimis præfertim gestationis mensibus, facile enim a molestissima illa concussione suspensioneq; foetus, vincula disrumpuntur ac necessarius abortus sequitur. Secundum Pauli Ammanni *Prax. Vulner. lethal. Dec. II. Histor. 8. p. 192 seqq.* quæstio vel tortura de prægnanti haberi non debet, sed nec terreri prægnans potest. Et confessio ex prægnante extorta in tormento vel comminatione, nulla est. Item secundum Herm. Frid. Teich-

Teichmeyer. *Institut. med. leg. cap. 25. Qu. 3. p. 248.* gravidæ absolute a tortura, si non omnimode, tamen ad certum tempus liberantur. Hac enim de re expressa lex reperitur *leg. 3. ff. de Pœnis.* Ratio tam a fœtus, quam matris parte est petenda. Fœtui enim, qui adhuc in ventre est, non nocere debet calamitas matris. Maximum autem detrimentum ei imminere, si mater torqueatur, obscurum esse non potest illi, qui considerat, quod fœtus per vasa umbilicalia & placentæ cum utero matris cohæreat, & per ea nutrimentum suum capiat. Quod si igitur mater in scalp pendere cogere-
tur, aut funibus hinc illinc cum impetu traheretur, vincula illa facile lacerarentur, sicque embryo suo priyaretur nutrimento. Ergo ad abortum necessario fœtus promovetur. Talis tortura neque ultimis mensibus, neque primis diebus post conceptionem permittenda; ultimis mensibus fieri non potest ob molem fœtus, qui facile a levi & extraordinario motu matris læditur, teste experientia &c. Ad quæstionem, num inulier gravida, nondum edito partu, torqueri aut terreri possit? negando respondet Conradus Philippus Hoffmannus *de Puerper. tempor. cap. 1. §. 12. pag. m. 13 seq.*

§. 6.

Post territionem & torturam progredimur ad ipsam gravidarum pœnam, quam, imprimis si fuerit capitalis, usque post partum differre solent. Quod si enim ad mortem mulier sit condemnata, inquit Petrus Müllerus *l. a. §. 14. p. 37.* gaudet itidem prægnans dilatione supplicii Covarr. *l. 4. Var. Res. c. 4.* quia filius pro matre puniri non debet, cum pœnæ personam non egrediantur. Notandum tamen, si ad mortem mulier prægnans sit condemnata, executionem, secuto partu non differri, quia non expectandum, donec mulier fiat talis valetudinis, ut absque periculo illam pœnam pati possit. De muliere prægnante, quæ capitis damnata, Claudius Ælianus *Var. Histor. Lib. V. cap. 18. fol. m. 433.* ita scribit: Judices Areopagitæ, cum veneficam mulierem deprehendissent,

Circa pœnam.

& eam morti tradere vellent, non prius ipsam interemerunt, quam partu liberaretur. Postquam vero peperit, quod conceperat, solventes a damnatione innocentem infantem, eam, quæ commuerat supplicium, solam morte mulctarunt. Pluribus etiam de quæstione, an mulier prægnans ad mortem condemnata dilatione supplicii gaudeat? agit Conradus Philippus Hoffmannus *de insignior. Puerper. tempor. cap. 1. §. 14. p. 15 seq.*

§. 7.

De gravidarum pœna differenda.

De differenda gravidarum pœna inquit Andreas Ottomarus Goëlicke *Medicin. Forens. Specim. V. §. 2. p. 80.* Quæstio de exploranda puellæ imprægnatione præsentis tanto magis necessaria, quod certius iudicis interest, de eadem sufficienter convictum esse: quia leges ejusmodi personarum eam habuere rationem, ut damnatarum, nempe vel consumendarum, vel quacunque alia ratione capitaliter puniendarum, vel corporaliter saltem affligendarum, v. g. tormentis subjiciendarum, vel virgis cædendarum, pœna differatur, quoad pepererint. Idque a plerisque religiose observatum est, nisi quod imperator Claudius nullo commiserationis sensu erga miseras tales personas tactus esse videatur, qui ne quidem ab ultimis prægnantium mulierum suppliciis abstinuit, pessime ideo apud plerosque audiens. Recte interim jura sic disposuisse videntur; quia, cum innocens fœtus nihil peccaverit, eidem quoque pœnæ, cui peccaminosa mater merito subjacet, submitti jure nequit: Unde prudenti providentia hic opus est, ne vindicta divina in ejusmodi minus circumspectum judicem derivetur, si supplicio ultimo gravidam destinet, sicque innocentem fœtum una cum matre nocente perimat, qualem casum tragicum Lutetiis Parisiorum aliquando contigisse, allegavit Ammannus in *Irenico*.

§. 8.

Ratione fustigationis.

Inter pœnas corporis afflictivas satis nota est virgarum vel fustium ictus sive fustigatio, quam pariter in gravidis usque post

par-

partum differendam, vel in aliam poenam v. g. relegationem permutandam auctores statuunt. Scribit enim Petrus Müllerus *Disp. de Jure Prægnant. cap. 4. §. 13. pag. 36 seq.* Non potest puniri gravis poena corporis afflictiva, si pati debeat amputationem membri, aut ictus fustium. Quod si non reperiatur nutrix, propter defectum pecuniæ, debet solvi pecunia ex publico, adeoque non differri executio *Arg. l. 1. C. pro quibus caus. servi pro præm. lib. accip.* secus si propter defectum personæ. Moribus nostris si poena fustigationis mulieri per paucas septimanas prægnanti dictanda veniat, minime differenda executio, cum moderatione tamen fustiganda, ne is, qui in utero est, lædatur. *Richt. p. I. Dec. 7. n. 3. inf.* Sin ad medium pariendi tempus pervenerit, *vvenn sie über die Helffte ist*, tunc merito fustigatio differenda, ne abortio contingat. *Bechman. de privil. mul. th. 58.* & præterlapsis demum sex septimanis executioni mandanda. *Phil. lib. 1. Inst. Ecl. 36. circ. fin.* Sequentia docet Conradus Philippus Hoffmannus *de insign. Puerper. Temporib. cap. 1. §. 11. pag. 11 seq.* Ob favorem partus in utero existentis cum prægnans delinquens relegari ordinarie nequeat, quæritur: Num poena corporis afflictiva ea affici possit, veluti fustigatione, abscissione digitorum, amputatione manus, inustione stigmatis, & quæ sunt reliquæ poenæ corporis afflictivæ? & respondet Hoffmannus, quod non; cum terrore & cruciatu gravis facile eo adigi potest, ut abortum faciat; inde non solum intra 40. dies, dum decumbit, sed & ante & post puerperium ejusmodi poena affici nequit, donec infanti nutrix reperiatur. Distinguenda tamen & hinc veniunt tempora puerperii. Si enim gravidæ tempus pariendi longe distet, ex praxi, poena fustigationis ordinaria in extraordinariam, scilicet relegationem, commutari solet, ne ea longiori incarceratione sanitatis sentiat jacturam ipseque foetus de vita periclitetur. Inde hunc in modum tum sententiam concipi refert Wildvogel *in Disp. de Jure Embryon. cap. 4. th. 12.* *Es wolle denn die Obrigkeit in Ansehung, daß die Gefangene schwangern*

Leibes sich befindet, und annoch eine geraume Zeit zur Geburt vor sich hat, den Staupenschlag in die ewige Verweisung verwandeln, solches wäre sie zu thun wohl befugt, und würde so dann die Verweisung nach Erstattung der Unkosten und abgelegter Uhrfehde billig vollstreckt. Aut fustigari ea solet cum moderatione, ne is, qui in utero est, lædatur. Si autem ad medium pariendi tempus pervenerit, wenn die Geburt zur Helffe gekommen, & fustigatio decreta differenda, ne abortio contingat, & quidem post sex septimanas edito partu exequenda est, & tunc adhuc cum moderatione, ne per fustigationem alimenta infanti detrahantur. Inde in scabinatibus ita ordinarie ejusmodi in casu pronunciari refert citatus Wildvogel. l.a. Dievveil die Vettel schwangern Leibes ist, so wird die Execution solcher Leibes-Straffe, biß sie des Kindes genesen, und ihre Sechs-Wochen um seyn, billig eingestellet, und folgendes im Streichen eine solche Masse gehalten, daß dem Kinde, da sie es selbst nehren wird, an seiner Nahrung kein Abbruch geschehe. Tale moderatæ fustigationis exemplum recenset Paulus Ammannus *Irenic. pag. 107 seq.* Gravida inquam, nec torqueri, nec fustigari potest, dum nutrix filio non datur, hinc *Meyer-Mariegen 1679.* virgis non cædebatur, sed solum tangebatur iisdem, ob puerum lactentem; quod experta quoque est formosa Lipsiensium Phryne (cognomine *Blau-Peltzgen*) flagellatæ memoriæ, quæ 1653. hora quarta matutina, sine pompa, sine comitatu, sine campanæ sonitu, virgis solum titillabatur. O imperscrutabilem judicis affectum! o penetrantissimam intercessionem amasii! hic optinet axioma: Favores sunt ampliandi. Scortum quoddam, quod magistratus minime gravidum putabat, virgis cædebatur. Verum post paucas septimanas abortiebat gemellos, ictus virgarum in dorso referentes, uti ex avtopsia recenset Philippus Salmuth *Obs.med. Cent. II. Obs. 14. p. 65 seq.*

§. 9.

Quamvis autem duo hi casus favorabiles fuerint in delin-

quen-

quentes, fatis tamen tragicum ibidem, ex D. de Caux addit Ammannus *l. a. p. 108.* ubi gravida Parisiis suspendio extincta, & qui- <sup>Gravida
suspendi.</sup> dem ex incauta obstetricum & chirurgorum relatione. Hunc casum ita recenset Johannes Riolanus *Anthropograph. Lib. VI. cap. 2. fol. m. 366.* Anno Domini 1612. die 22. mensis Maji, gravida mulier dicta Genovefa Supplice, omen in nomine, Lutetiæ suspensa fuit. Illa cum esset obesa, pingui aqualiculo & opulentis mammis prædita, vacua nec foeta ab obstetricibus & chirurgis ad visitationem convocatis judicata fuit, ideoque ob insignia furta extremo supplicio affecta fuit; ipsa tamen muliere ad extremum usque vitæ spiritum pertinaciter asseverante, se gravidam esse & motum infantis persentire. Cadaver a iudice criminalium causarum ad usum anatomicum impetravi, & in scholis medicinæ, multis Doctoribus medicinæ præsentibus, & ferme trecentis tam Philiatris, quam literatis viris ad hoc rarum & mirabile spectaculum confluentibus dissecuri, atque per duos dies consequentes quatuor lectionibus anatomicam foetus humani historiam enarravi atque demonstravi. Mulier quinque menses erat gravida, ut ex foetus magnitudine & perfectione cognitum & decretum fuit. Ante dissectionem in partibus externis multa observavi notatione digna, ex mammis pressis lac stillabat, papillæ areola multum amplificata erat, umbilicus foras prominebat, orificii externi carunculæ subtumidæ erant, nec discretæ, sed membranosum veluti circumculum simul junctæ & unitæ effingebant. Aperto ventre inveni testes planos & albicantes, medii uteri lateribus accumbentes. Tuba uteri non erat amplior, quam in muliere vacua spermatica vasa deferentia minimi digiti crassitiem æquabant, dextrum majus erat sinistro. Vasis ejaculantis distributio manifesta erat, e medio testiculo productum, cum pervenit ad fundum uteri, in tres furculos dividebatur: unus tubam uteri petebat; alter fundum uteri penetrabat, tertius corpus uteri perreptabat usque ad orificium internum cervicis. Ejaculatorium sinistrum majus erat

erat dextro. Uteri substantia ubique digito crassa erat, instar spongiæ fistulosa & carnosæ. In fundo fistulæ & cavernulæ ampliores erant, quam alibi. Nulli per uteri substantiam venarum ramuli dispersi erant, sed evidenter conspiciebatur hypogastricarum venarum & arteriarum distributio, & ab infernis partibus ad superiores sanguinem efferri. Hypogastrica vena pollicari crassitie erat. Verum uteri collum durum erat ac veluti callosum, muco tanquam glutine obturatum. Pudoris sinus venosus & carnosus, sed ejus pars inferior recto intestino agglutinata carnosior ac venosior apparebat. Utero dissecto vidi placentam fundo uteri affixam fibrarum interventu, videturque toto suo corpore ab utero exfugere sanguinem absque mutua venarum osculatione sine anastomosi. Placenta vero digiti crassitiem æquabat. Incisis membranis tres aquæ libras eduxi urinæ simillimas. Foetus autem suis adhuc aquis innatans poterat in omnem partem moveri; nam digito pulsus huc & illuc celeriter instar globi revolutus circumferebatur. Inde cognovi situm foetus in utero, qualem auctores anatomici describunt fictum & commentitium esse. Duas tantum membranas observavi, chorion & amnion. Umbilicus sesquipede longus erat, circa pueri os nullo modo contortus. Foetus vero sua membra sic habebat composita, pedum calcanea nates tangebant, manus complicatæ erant, cubiti femoribus innixi, manibus supra genas positis caput sustinebat. De uxore gravida cum marito suspensa, quæ, cum per quatuor horas pependisset, gemellos vivos jam mortua peperit. vid. Guilh. Fabric. Hild. Oper. fol. m. 906.

§. 10.

*Judicis
cautela.*

Circa ejusmodi autem gravidarum feminarum torturam atque poenam ante omnia judex de suspectæ personæ imprægnationis certitudine, ab obstetricibus & chirurgis, vel potius a peritis medicis exploranda, sit sollicitus, siquidem si judex dolo malo prægnantem tormentavit, juxta Petr. Müller. *Disp. all.* §. 10. pag. 35. puni-

puniendus est arbitrarie juxta personæ qualitatem, Farinac. *de Indic. & tort. Qu. 41. n. 98.* quia est homicida. Bald. *ad l. 18. de stat. hom. lat. 1. rel. 1.* Non vero tenetur, si posuit eam in tortura, quæ ob id fecit abortum, quando medicus illam non prægnantem asseruit. Farinac. *ib. n. 85.* Sed fecit judex, quod sui fuit officii, cum dubitans, an mulier esset prægnans, consuluit obstetrices & medicos, qui de credulitate deposuerunt super mulieris prægnantia, quandoquidem feminæ se gravidam dicenti, ad effugiendam torturam, nullatenus creditur, nec mulier confessione sua eo tempore, in tortura, facta sibi præjudicat, *arg. l. 20. de Quæst. Balduin. in l. 18. de stat. hom. lat. 1. rel. 1.* Marfil. *in præf. §. nunc videndum. n. 48.* Utrum vero ejusmodi delinquentium feminarum inspectio atque imprægnationis indagatio solis obstetricibus a judice sit committenda, vid. Andr. Ottomar. Gœlick. *Medicin. Forens. Specim. V. §. 3. p. 81.* & alibi, ubi de obstetricum ignorantia egimus.

§. II.

Cum etiam quandoque feminæ ob delictum aliquod incarceratæ juxta Conr. Philipp. Hoffmann. *de insign. Puerper. tempor. cap. 1. §. 12. pag. 14.* pro evitanda tortura & vita prolonganda in ipso carcere fraudulenter atque dolose conceptionis seu imprægnationis occasionem quærant, vel etiam se ipsas pro gravidis venditent, quid mirum, quod nonnunquam post mortem vel executionem etiam ab aliis falso pro gravidis habitæ fuerint, juxta quæstionem magistratus Querfurtensis ad Facultatem medicam Lipsiensem: *An decollata fuerit gravida? Dieselben erinnern sich großgünstig, daß auf ergangenen Fürstl. gnädigsten Befehl ihnen neulicher Zeit, nemlich am 6. Maji, ein Cadaver zur Anatomie abgefolget worden. Wenn denn seithero allhier ein starcker Rumor unter dem gemeinen Pöbel entstanden, ob solte das decollirte Cadaver bey der Anatomie wieder schwanger seyn befunden worden, und man gleichvvohl an fleissiger Bevvach und Vervvahrung hiesiges Ortes nichts ermangeln lassen, dem Landknecht solche auch treulich anbefohlen worden, zu dem auch die*

Incarce-

ratarum
gravidatio
simulata.

allhier in Haſſt geuueſene Inquiſitin, vvenn ſie dergleichen an ihr verſpühret, es vwohl entweder denen Gerichten, oder dero Beicht-Vater würde entdeckt, und ihr Leben dadurch noch eine Zeitlang (wie ſie ohne dem Ausflüchte genung geſucht) geſtiftet haben würde. Als ergehet an meine Hochgeehrte Herren mein freundlich Bitten, Sie wollen groſſgünſtig geruhen, mit wenigen zu benachrichtigen, wie ſie das decollirte Cadaver bey der Anatomie befunden, und ob dem entſtandenen Rumor zu glauben oder nicht? Damit man ſo dann, wenn dem ſo geweſen, entweder inquiren, oder wiedrigenfalls denen Leuten das Maul geſtopffet werden möchte. Solches &c. Q. den 28. Octobr. 1671. Negative autem a Facultate medica fuit reſponſum, quoniam ex autopſia conſtitit, nullum adfuiffe in decollato cadavere foetum. vid. Paul. Amman. *Prax. Vuln. lethal.* Dec. II. Hiſt 8. p. m 120 ſeq. & Joh. Fr. Zittmann *Medicin. Forenſ. Caſ.* 83. Cent. I. p. 299 ſeq. ubi ſequentem cribrationem Ammannus annectit: Facinoroſæ non puniendæ nec capite plectendæ, niſi certo ſciat iudex, an ſint gravidæ, nec ne? nec fuſtigandæ gravidæ, ne foetui innocenti ſtigmata imprimantur. Exemplo ſit Urfula Porcarum anno 1667. Hæc propter iteratum perjurium, dum civitatem vel territorium nolebat vitare, capitis ſupplicio a iudice ſanguinolento erat damnata. Ego debebam ex inſtructione cum obſetricibus in noſocomio explorare, an ſit grvida, & meam categoricam dicere. Sed propter obſitatem perſonæ (nam ſimulabat ingravidationem) & incertitudinem rei, nil certi poteram determinare, & ſuspendebam meum iudicium. Phyiſicus autem D. Welfchius, mihi contrarius, poſt me miſſus a ſenatu ad idem individuum, categorice pronunciabat, illud non eſſe gravidum, quia venter non tumeat, quia mammæ non creſcant turgidæ. Ipſa miſera adjudicatur gladio, ſed confeſſionarii relatione, quod ipſa eſſet ſimplex, (*alber*) perpetuis carceribus fuit adjudicata. Poſt iterum vixit in libertate, nupta viro obiit epileptica in dyſtokia. De ejusmodi graviditate ſimulata ſcribit Dio-

Dionis *Trait. des Accouchem. Lib. I. cap. 8. p. 77.* Il arrive souvent, que des femmes condamnées à la mort, déclarent, qu'elles sont grosses; Ceux qui sont appelez par les juges pour les visiter & en décider, ne doivent point imiter cette sage femme, qui dans une pareille occasion dit aux juges, que la criminelle n'étoit point grosse, à laquelle ayant été exécutée, on trouva dans la matrice, en la dissequant publiquement, un enfant de trois mois & demi. Il est vray qu'il y a plusieurs de ces malheureuses, qui se disent grosses pour différer leur punition; mais il vaut encore mieux la retarder de quelques mois, jusqu'à ce que l'on ait des preuves certaines, qu'elles ne le sont pas, que de risquer de faire périr enfant avec sa mere.

§. 12.

Denique circa gravidarum mortem & sepulturam adhuc notandum, quod, sive in partu, sive ante eundem morbo quodam vel alio casu vitam finiant, non statim sepeliri, sed saltem per sectionem aperiri debeant, siquidem interdum matre jamjam defuncta foetus in utero adhuc detentus per aliquot dies supervivere, nonnunquam etiam excludi observantur, uti in tractatu de Foetu & Partu videbimus. Ne itaque foetus supervivens simul pereat, vel sepultura prægnantium per aliquot tempus differatur, vel gravidæ sine apertura sive sectione non sepeliantur, siquidem experientia constat & exemplis, foetus quam plurimos inciso utero feliciter extractos atque servatos fuisse, scribit Baldassar Timæus à *Güldenlee Respons 50. Oper. p. 1083.* quin & ipsa lex regia vetat, mulierem, quæ prægnans mortua est, humari, antequam foetus ex utero incidatur; secus qui fecerit, spem animantis cum grvida peremisse videtur. Inquit etiam Johannes Riolanus *Anthropograph. Lib. VI. cap. 8. fol. 389.* si contingat, mulierem nono mense gravidam morbi violentia perire, vel in ipso pariendi conatu convulsionibus enecari, si parentes, si amici, conjux prolem

Gravidarum
sepul-
tura.

desiderent, consuevimus statim atque extincta est mater, ex medicorum & chirurgorum adstantium certo judicio & accurato examine, baculo in os indito, matris mortuæ ventrem aperire, ut foetus extrahatur; sicque vidimus plures salvos & incolumes eductos fuisse; Hæcque pia & salutaris foetui, nequaquam mulieri mortuæ crudelis operatio, fieri deberet in qualibet prægnante mortua juxta edictum juris consulti. Sic Guilhelmus Fabricius, Hildanus *Respons. ad Mich. Dæring. Oper. fol. 905 seq.* ad quæstionem, an prægnans mortua cum foetu sit sepelienda? ita respondet: quorundam diffamatorum atque insidiosorum hominum impudentia simul atque inscitia notanda est. Illi enim, si medicus aut chirurgus abdomen prægnantis mortuæ inciderit foetumque extraxerit, rem crudelem simul & inhumanam esse exclamant, quod dicere profecto insulsum, parumque modestum est, quasi vero medicus fidelis crudelis cenferi debeat. Hoc sane genus hominum, si finem medici recte perpenderent, nihil crudelitatis nihilque inhumanitatis in hac operatione invenirent, quin potius illam non solum necessariam & licitam, sed ab ipsis quoque ethnicis approbatam & sancitam esse, Christianamque insuper charitatem eam a nobis requirere intelligerent, perciperentque. Duabus autem de causis abdomen prægnantis mortuæ inciditur. Primo ut situm foetus in utero medicus exacte annotare, secundo ut infans conservari possit. Sæpissime enim prægnans propter causam aliquam, aut morbum, veluti hæmorrhagiam, lipothymiam, apoplexiam aliosque morbos acutos, vita subito privatur, infans vero, etiam si ita debilis sit, ut interim, dum prægnans in agone versatur, in utero sese movere nequeat, potest ad tempus vivere. Hæc perpendens antiquitas, ne foetus, extincta matre, & ipse suffocaretur simulque periret, prudenter & optime constituit, ut extincta matre per apertionem abdominis extraheretur. Legem autem regiam non solum per excellentiam regiam appellant jurisconsulti, verum etiam, quia a Numa Pom-
pilio

pilio, secundo Romanorum rege, sancitam fuisse creditur. Quæ si a Christianis ubivis observaretur, multi procul dubio infantuli, qui nunc, extincta matre, in utero suffocantur, conservarentur, multique parentes quietiorem conscientiam conservarent. Plura alibi, de Partu cæsareo, reperies. Et Gregorius Nyminanus *Dissert. de Vit. Fœtus in uter. p. 3 seq.* ostendit, fœtum in utero propria vita vivere propriasque vitales actiones edere, & extincta genitrice ad temporis aliquod spatium non raro superstitem manere, vivumque ex matre demortua aliquando eximi posse; ideoque in bene constitutis rebus publicis non concedendum esse, ut vel ulla gravida, nisi prius per sectionem abdominis ex ejus alvo infans extractus fuerit, sepeliatur, ne forsan, quod sæpe accidit, vivens adhuc fœtus cum matre mortua eodem tumultu contegatur. Cum proinde talis casus non sit insolens, juxta Thom. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. II. Obs. 35. p. 92.* in more positum habent nonnullæ mulieres, quando gravidarum funera curant, in loculo ferali acus, forfices filumque addere, superstitione accedente, quasi manes istis instrumentis indigerent in refecando ligandoque umbilico prodituri fœtus ex cadavere matris; Cumque observatum, in loculis defunctorum prægnantium nonnunquam fœtus ex utero prodiisse, ne via præcludatur, divaricatis cruribus reponuntur matres mortuæ.

CAPUT VIII.

De gravidarum symptomatibus.

§. I.

GRavidæ autem vocantur, atque ab hætenus recensitis torturæ, fustigationis aliisque ejusmodi pœnis immunes sunt non solum illæ feminæ, in quibus post veram conceptionem, tam simplicem, quam duplicem, sive quando, mediante coitu fœcundo, unicum vel duo aut plura ovula in ovariis fœcundata secundum

Graviditas duplex.

ordinarium naturæ motum per tubas Fallopianas ad uteri cavita-
tem devolvuntur, ut ibidem ovulo inclusus embryo postmodum
a continuo alibilis succi affluxu indies melius formatus magis ma-
gisque crescat & augeatur, usque dum circa partus tempus perfe-
ctionem suam adeptus genitales matris suæ partes penetret; sed
aliis quoque feminis graviditatis nomen tribuitur, quarum ova
post imprægnationem non per dictas tubas ad uteri cavum protru-
duntur, sed vel in ipso ovario permanent & successive incremen-
tum sumunt ipseque embryo perfectionem suam ibidem acqui-
rit; vel quando tale ovulum fœcundatum equidem a tuba Fallo-
piana excipitur, eidem vero inhærens ab ulteriori in uteri cavita-
tem ingressu a quacunque causa impeditur; vel denique quando
dictum ovulum hanc tubam non ingreditur, sed statim in abdomi-
nis cavitatem prolabitur, ibidemque parti cuidam affixum manet,
donec talis fœtus vivus pereat & a putrefactione penitus corrup-
patur, vel ibidem exsiccatus per totam matris vitam permaneat:
vel etiam cum vel sine gravidæ matris morte ex ipsius abdomine
vividus adhuc excidatur; qualia exempla in superioribus adduxi-
mus. Quapropter non immerito etiam ejusmodi gravidæ fœ-
tum scilicet non in utero, sed alio extraordinario loco gerentes
reliquarum gravidarum beneficio ratione torturæ & aliarum pœ-
narum frui debent. Sicut enim in naturaliter gravidis durante
graviditatis tempore ob quotidianum fœtus augmentum uterus
adeo extenditur, ut, juxta Christ. Joh. Langii *Oper. Part. III. Disp. 41. cap. 1. § 11. fol. 544.* tan-
tum universum spatium abdominis
internum a viscere hoc occupetur, unde non solum tumescit hic
venter, imprimis sub umbilicali regione, sed sæpe etiam supra
eam, insuper etiam viscera circumposita ab incumbente hac mole
nunc irritantur ac stimulantur, nunc comprimuntur aliisque plu-
rimis molestiis afficiuntur, unde non his solum immediate affe-
ctis, sed aliis quoque non raro satis remotis symptomata inferun-
tur oppido egregia; ita etiam pari modo extra uterum fœtum ge-
rentes

rentes feminæ similibus & aliis vexantur symptomatibus, atque ob partus impossibilitatem longe majori periculo sunt obnoxia, ut ideo quoque ab ejusmodi poenis sint liberandæ.

§. 2.

Sunt autem symptomata gravidis feminis communia ut plurimum sequentia, quorum alia primis, alia mediis, & alia ultimis ^{Gravidarum symptomata.} gestationis mensibus supervenire solent, v. g. cephalalgia, vigilia, deliria, nausea, ciborum fastidium, vomitus, pica & malacia, dentium dolor sive odontalgia, cordis palpitatio & syncope, diarrhœa, ventris dolores, alvi & urinæ suppressio, stranguria, hæmorrhoidum tumor, hæmorrhagia, dolores coxendicis & lumborum, item mammarum dolor & intumescencia, tussis & respirandi difficultas, uteri procidentia, crurum tumor & inflatio, hydrops, pudendorum varices, spasmus, & abortus. De horum autem symptomatum causis & cura prolixiores esse nolumus, lectorem potius ad autores practicos remittendo; evolvi inter alios potest Michael Ettmüller. *Oper. Tom. I I. fol. m. 1090 seqq. item 1139.* Christian. Joh. Lang. *Disput. de Valetudinar. Gravid. Respond. Joh. Georg. Thamm. Lips. 1696. habit.* Item Lang. *Oper. med. Part. III. Disp. 41. fol. 542 seqq.* Theodor. de Mayern *Prax. med. Part. I. in Append. p. 1 seqq.* Joh. Michaelis *Oper. Prax. Clin. Gen. Part. I. Lib. V. cap. 36. p. m. 258 seqq.* Johann. a Muralt. *Hippocr. Helvet. p. 307 seqq.* Jul. Cæsar Claudin. *Respons. 31. p. 196 seqq.* Joh. Dolæi *Encyclop. med. Lib. V. cap. 6. p. m. 912 seqq.* Joann. Juncker. *Conspect. medicin. theor. pract. Tab. 112. p. 699 seqq.* Franc. Sylv. *Oper. medic. Prax. Lib. III. cap. 4. pag. edit. Amstelod. 528 seqq.* Theod. Zwinger. *Theatr. Prax. med. Part. prior. p. 436 seqq.* de terrore gravidis & foetui non raro exitiali v. *Ephemerid. Acad. N. C. Dec. IX & X. Obs. 33. p. 310 seqq.*

§. 3.

Prægnantes quoque variis alterationibus esse obnoxias, imprimis animi mœrori atque insultibus melancholicis, exemplo ^{alia.} probat Samuel Ledelius *M. N. C. Dec. III. An. 4. Obs. 28. p. 75.* & Nicolaus ^{Melancholia.}

colaus Venette *de la Generat. de l'homme Part. II. cap. 3. Art. 3. p. 123.* inquit : Lors qu'une femme a conçu, elle a exécuté les ordres de la nature. Mais je ne say par quel malheur ordinaire à l'amour, elle paroît plus abbatuë qu'auparavant. Tout luy deplaist, elle ne mange point : & si elle met quelque chose dans la bouche, ce sont des choses hors del'usage commun des hommes, encore les rejette t'elle, dès qu'elle les a prises. Les meilleurs alimens luy font mal au cœur ; elle n'en peut mesme souffrir la fumée ? Les nuits luy sont inquietes, son sommeil est interrompu, & quelque fois accompagné de la maladie, que l'on appelle incube, comme s'il ne suffisoit pas, que le corps pâtist, sans que l'ame eust encore les peines. La vapeur d'une chandelle éteinte est insupportable à cette mesme femme, qui souffre de temps en temps de legers tremblemens par tout le corps. Les graces ne sont plus sur son visage, ses yeux sont languissans & meurtris : & le feu, dont l'amour se servoît autrefois pour faire de conquestes, les a abandonnés pour quelque temps. Elle ne peut marcher, qu'elle ne boîte, & qu'elle ne ressent de extremes douleurs aux reins, aux cuisses & aux jambes. Enfin dans la langueur, où elle est, elle souffre sans cesse pour avoir trop aimé. Ces incommodités la font presque repentir de s'estre alliée à un homme, si elle n'esperoit au bout de neuf mois de récompenser ses souffrances par la joye d'un enfant, qui luy doit venir.

§. 4.

alia symptomata.

Ophthalmia

Paralyfis.

Insuper gravidæ nonnunquam alia adhuc experiuntur symptomata, teste enim Thoma Bartholino *Cent. VI. Hist. 31. pag. 254.* nobilissima femina, quoties uterum gerebat, quem singulis annis tumentem habebat, toties primis mensibus vel lienis obstructione & dolore, vel ophthalmia laborabat, cum sternutatione singulis diebus repetente. Idem Bartholinus *Cent. IV. Hist. 70. p. 375* *seq.* refert, quod nobilis matrona tertio mense gravida insomnes noctes diesque quinque & quadraginta transegerit, unde infania obor-

oborta & paralyſis pedum crurumque, quibus proſtrata vix partus operi ſuffecerit. Epilepſiam in gravida muliere, annorum *et epilepſia.* ſex & viginti, annotavit Joſephus Lanzonus *M. N. C. Dec. II. An. 10. Obſ. 89. p. 160.* ſcilicet civis cujuſdam Ferrarienſis temperiei bilioſæ, trium filiorum mater, quotieſcunque gravida erat, bis in menſe ſontica paſſione afficiebatur, tranſacto autem nono menſe & partu finito ab epilepſia liberabatur. Levi hæc femina cauſa in iram erumpebat, ex improviſo in terram cadebat, ſpuma ex ore exibat, violenta concuſſione totum corpus quatiebatur, membra modo inordinate retrahebantur, modo diſtendebantur, in ſe autem reverſa non recordabatur eorum, quæ ab adſtantibus fuerant peracta. Multa adhibebantur remedia, ſed omnia fruſtra; ſemperque rubore genarum ac capitis calore moleſtabatur. Infeſtum hoc ſymptoma ſanguini bilioſo, ſive particulis acribus & irritantibus prædito, qui tempore graviditatis per conſuetum menſtruum fluxum non depletur atque ita epilepticos inſultus, copia ſua infeſtus excitat, adſcribendum videtur Lucae Schroeckio *Schol. in eandem obſervationem.* De femina octavo geſtationis menſe ſub occaſum ſolis in epilepſiam incidente, & convulſionibus fere continuis concuſſa, circa medium noctis e vita decedente, vid. Bald. Tim. a *Güldenkl. Oper. med. Reſp. 49. p. 1081.* De epilepſia gravidam ejusque embryonem per viginti quinque hebdomadas infeſtante obſervationem annotavit Georgius Segerus *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obſ. 160. p. 291.* Friderici Waltheri biblioſtæ Thorunienſis uxor, temperamenti ſanguinei, annos triginta circiter nata, poſtquam anno 1665. die 9. Martii uterum jam ultra quartum menſem geſſerat, de dolore ſiniſtræ ſcapulæ mane conqueri cœpit, quem tamen ex caſu in cellam, ante paucos dies factò, ſe contraxiſſe ſuſpicabatur. A meridie nihil ſiniſtri cogitans convulſionibus epilepticis graviffime corripitur, quas *αφασία* biduana ſummaque debilitas & paroxyſmi alii epileptici exceperunt. Quo magis antiepilepticis utebatur, eo plures experta eſt paroxyſmos; aſſumpta

Syllepſilogia. T t t quo-

quoque juscula & alia edulia, subsequentes. Die 16. Mart. effluxit ei e pudendis albicans quidam atque lentus humor, cum horrore totius corporis; quem excepit teterrimus animæ foetor, anxietates ingentes, inguinum dolores gravissimi & summa virium prostratio, ita ut ad carpum motus arteriæ vix esset perceptibilis. Orta tunc est suspicio de embryo extincto, quam præter continuum eumque de die in diem ingravescentem anhelitus foetorem (quem ubi prægnans ex inferiori ventre ascendere sensit, simul quoque paroxysmum instare præsensit) auxit motus embryo ab initio morbi hucusque a matre non observatus, inferioris quoque ventris refrigeratio & aliqualis gravitas; unde mulierculæ foetum extinctum esse pro certo affirmabant. Die 19. Mart. hæc femina, post usum cochlearis aquæ cinamomi & liliorum convallium, insignes primum motus in abdomine experiebatur, quos gravis insequiebatur paroxysmus. Et ab hoc tempore motum foetus percepit ægra, qui licet alias fatis fuerit debilis, interdum tamen, & quidem eo semper tempore, quo ægræ imminebat paroxysmus, iusto vehementior ac inordinatior erat, ut foetum primum, post matrem convelli extra omne esset dubium. Assumptis antepilepticiis frequentiores numeravit convulsiones, cumque vel tantillum pulveris Marchionis aut balsami Embryonis hausisset, mox quoque paroxysmum instare e convulsivo foetus motu præsensit. Sic misera inter spem atque metum molestum trivit tempus, donec tandem die 31. Augusti affulgeret partus hora, qua adhuc bis graviter convulsa, in ipso paroxysmo posteriori inscia peperit filiolum egregium, atque ab eo tempore nec mater, nec filius similes sensere insultus. Femina quædam triginta annorum viro sociata tribus annis non prolifica fuit, semper valetudinaria atroci cephalæa corporisque macie laborans, quoad faciem tamen nunquam non florida. Acidulis & thermis crebrius usa, sine sanitatis ullo commodo. Quarto conjugii anno vegetæ & longæ sanitatis puellum peperit, ex omni parte doloribus curisque suis suble-

sublevata, referente Immanuele Weismanno *Ephemer. Acad. N. C. Cent. III & IV. Obs. 131. p. 297.* sicque dicta gravida per imprægnationem e cephalalgia, quæ aliis gravidis interdum solennis esse solet, liberata fuit.

§. 5.

Accidunt etiam gravidis quandoque fracturæ tibiæ, ^{Fractura tibiæ.} quæ, licet non ab imprægnatione, sed alio infortunio externo dependeant, in gravidis tamen ut plurimum difficilioris sunt curationis. Honestæ enim matronæ ætatis circiter triginta annorum, ex equo cadenti, & solea ferrea equi ictum in tibiæ sinistram recipienti, os tibiæ inter genu & talum in medio fractum fuit, cum insigni contusione & dilaceratione carnis. Ad hanc ægro tam vocatus Guilhelmus Fabricius cum chirurgo prædictum os in obliquum cum vulnere non exiguo fractum esse reppererunt, fracturam feliciter reposuerunt & tibiæ in capsulam collocarunt. Reposito osse dolor mox cessavit, atque nonnullis fragmentis ossis extractis, plenissime restituta fuit ægra. Circa hanc tamen curationem sequentia annotavit dictus autor: primo hæc gravida septimum mensem imprægnationis erat transgressa, nihilominus foetus ab hoc gravi casu non fuit commotus, sed mater ad constitutum tempus filiam sanam peperit. Secundo sine difficultate foetum enixa est. Tertio nulla apparebat macula in hac puella. Quarto circa generationem calli magnæ occurrebant difficultates & labores, adeo etiam, ut vigesima tertia septimana post contractam fracturam, movendo & circumagendo pedem, ossa confracta adhuc vacillarent. Tandem a vigesima tertia septimana morbi ad trigessimam callus generatus & fractura plane confirmata fuit. Causa tarditatis calli generationis absque dubio in foetu quærenda est, quamdiu enim in utero fuit, alimentum ad calli generationem destinatum ad sui nutritionem, per vasa umbilicalia, postea ex mammis cum lacte materno attraxit &c. v. Guil. Fabric. Hild. *Observ. Chirurg. Cent. V. Obs. 87. fol. m. 484.* Aliud

exemplum refert idem autor *Cent. VI. Obs. 68. fol. 582.* de gravida senatoris Bernensis uxore, quadraginta circiter annorum quæ pariter cum equum conscendere vellet, tibiam sinistram intra genu & talum fregit, dicto loco autor de calli generationis difficultate etiam inter alia addit, quod circa quadragesimum diem morbi, cum callum adhuc lubricum mollemque esse cognovisset, suaserit, ut infantem suum, quem in sextam septimanam post acceptam fracturam lactabat, ablactaret, idque cum fecisset, & infans, quem gestabat (qui hætenus propter defectum nutrimenti languidus fuerat, nec se movere poterat) vires acquisivisset, cognoscere cœperit, se gravidam esse. Incredibile quoque est, pergit Fabricius, quantam adhibuerit diligentiam atque industriam, ut callus generari posset, sed frustra, donec tandem enixa esset infantem. Tum demum spatio quadraginta dierum confirmatus est callus, feliciterque restituta fuit ægra sine ulla claudicatione. Tibias autem gravidarum verissime fractas, quamdiu ventrem ferunt, mediante callo, coalescere posse, impossibile est. Tota enim natura, cum circa formationem foetus occupata sit, materiam, ad formationem calli destinatam, ad uterum mittit, & ossa fracta negligit. Sequentem observationem in *M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 25. p. m. 91.* ad Phil. Jac. Sachsum scripsit Johannes Ferdinandus Herodius: Matrona quædam, agnata mea, in quinto gravidationis mense, alias sana, patitur luxationem cum fractura ossis tibiæ, accersitus chirurgus luxationem reposuit, naturam vero ad callum regenerandum in fracta tibia, etiam jam per tres menses, adhibitis, quæ calorem naturalem conservarent, symptomata supervenientia averterent, sollicitare nequivit. Diffidens de sanatione agnata me quoque in consilium vocat, quam bono animo esse admonui & callum fractæ tibiæ, dum enixa fuerit partum, certe futurum sponendi. Quid fit? parit agnata puerulum sanissimum, & uno mense post callum in osse fracto regeneratum experitur. Simile quid etiam observatum antehac in gravida a singulari amico, dum

in

in Italia degeret, se intellexisse, annectit Hertodius. Fracturam costæ & cruris in gravida annotavit Georgius Francus *M. N. C. Cent. II. An. 3. Obs. 203. p. 404.* nimirum anno 1681. die 29. Decemb. honesta matrona in glacie cecidit adeo periculose, ut in dextro latere frangeret costam, in sinistro utrumque focile cruris paullo supra malleolum; nihilominus, (utut jam a semestri esset gravida) rite curabatur utraque fractura intra tres menses; donec tandem feliciter enixa esset foetum. Anno 1691. futoris Dresdensis uxor, *Observatio.* evsarca atque robusta, gravida partus tempore propemodum appropinquante, octavo scilicet gestationis mense, super glacie ambulans in terram prosternebatur ipsique in pede sinistro utrumque os, tibiæ scilicet ac fibulæ, simul diffringebatur, adeo ut per vulnus circa talum os tibiæ ultra digiti longitudinem extra cutem prominere. Hæc fractura non tantum ægrotanti maximum dolorem, sed chirurgo quoque insignem laborem causabatur, siquidem ingens totius suræ tumor ad genu usque rubicundus accedebat, ex quo postea aperto non modo magna puris copia, sed festucæ quoque & fragmenta ossium, & inter hæc quoddam ad ulnæ fere quadrantem, prodibant & extrahebantur. Quibus remotis omnia ad meliorem statum perveniebant, nisi quod circa malleolum foramen immedicabile remaneret apertum, ex quo per longum temporis spatium, tanta lactis copia profluebat, ut infantem, quem intra hoc tempus enixa erat, amplius lactare non sufficeret, sed ipsum ablactare atque nutrici tradere cogeretur. Interim tamen adhuc post ablactationem talis lactis ad partem læsam affluxus fracturæ plenariam consolidationem ultra mensem retardabat atque impediabat, tandem tamen mater post varias lactis evacuationes optime convalescebat.

§. 6.

Morbillis laborans gravida infantem per totum corpus morbillis contaminatum peperit, uti observavit Guilielmus Fabricius, *Hild. Obs. Chir. Cent. IV. Obs. 56. fol. m. 328.* & quidem in rei-

Morbilli.

publicæ Bernensis senatoris uxore, quæ cum dimidiâ partem, noni mensis imprægnationis fere attigisset, febre acuta & quidem maligna correpta fuit: morbilli quin etiam mox per totum corpus eruperunt. Quarta die morbi prægnantium doloribus correpta puellum per totum corpus morbillis contaminatum peperit. Porro etsi cum mater, tum etiam ipse infans, per dies aliquot gravissime laborarent, ambo tamen convaluerunt. De morbillis in

Variolæ. gravida v. *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 347. p. 554 seq.* De variolis in muliere prægnante refert observationem Petr. Forestus *L. VI. Obs. 50. fol. 202.* qui tamen nullam foetus, an nimirum post partum etiam maculas habuerit variolosas, nec ne? mentionem facit; nihilominus idem autor *l. a. Obs. 44. Schol. f. 196.* ait, sæpe deprehensum, prægnantes maturos partus, hac lue perfosos, edidisse, quarum aliæ nihil omnino foris, aliæ non nisi multis post diebus incommoda senserint. Anno 1656. variolæ epidemicæ Hafniæ non puerorum tantum corpuscula deturparunt, sed adultiores utriusque sexus, etiam qui antea immunitatem sibi polliciti fuerant, & gravidas, & puerperas & foetus in utero infecerunt, cum febre maligna & petechiis, quibus infiniti vel primo invasionis die, vel quarto, vel in declinatione variolarum in libitinæ censum adscripti sunt, teste Thoma Bartholino *Cent. IV. Hist. 50. p. 339 seq.* Variolosos foetus ex utero provenientes hinc inde annotatos legimus: Generosi enim viri cujusdam uxor, cum ante variolis laborasset, filiam peperit vestigiis variolarum conspicuam, undeliquet, ipsam adhuc in utero materno simul cum matre variolis affectam fuisse, annotante Valentino Andrea Moellenbroccio *M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 53. p. 150.* A magna matrona variolis editum infantem, quibus & mater fuerat afflicta & maculata, vidit Johannes Dolæus *Encyclopæd. med. Lib. IV. cap. 6. p. 777.* Honesta quædam matrona in oppido Fontenoy in Lotharingia, Barne Chardini uxor, cum primo utero gestaret, & constitutum tempus pariendo fere attigisset, una cum marito suo, uno eodemque tempore

variolis correpta fuit, & quidem tam graviter, ut maritus mortem obiret. Matrona in ipso vigore morbi, cum corpore & mente simul, & gravissime laboraret, infantem peperit, vivum quidem, sed variolis ita infectum & contaminatum, ut ipsa facies quoque undique pustulis scateret, v. Guilh. Fabric. Hild. *Cent. IV. Obs. 55. fol. 328.* Mulier triginta octo annorum paupercula, cum uterum gereret & in alvo materna foetus adhuc instrueretur ad exeundi patientiam, de gravitate totius corporis conqueritur, premitur pandiculatione, cordis palpitatione, pruritu narium &c. erumpunt varioli in corpore undique. Mox cum instaret partus hora, infantem edit variolis per tenerrimum corpus æque tam multis contaminatum, qui post sacri baptismatis acceptum Sacramentum placide obibat; mater autem tertia die post exhibat mortalitatis sensus, uti Johannes Fridericus Treubler perscripsit ad Thomam Bartholinum *Epist. med. Cent. II. Epist. 85. p. 682.* Inquit etiam Horatius Augenius *de Febr. Lib. IX. cap. 2. fol. m. 359.* variolæ conspiciuntur non solum in superficie externa, ut in cuticula ipsa, sed etiam intrinsecus fiunt in pulmonibus, faucibus, intestinis, ventriculo, in utero etiam ipso, imo vero in foetu, quem natum cum variolis hætenus frequenter observavi. Foetus non sine variolarum labe editos se conspexisse ait Cornelius Stalpart van der Wiel *Obs. rar. Cent. post. Obs. 42. Schol. p. 426.* Veronæ pellionis uxor inquinata lue filium peperit defœdatum variolis. v. Joh. Rhod. *Obs. med. Cent. III. Obs. 83. p. 164.* hoc tamen exemplum potius de variolis venereis intelligi debet. Anno 1669. uxor quædam gravida variolis laborans Halis Saxonum filiam vestigiis variolarum conspicuam peperit, juxta Casp. Theoph. Bierling. *Thes. theor. pract. Obs. 49. Sch. p. 651.* Vivit adhuc Secretarii *Observatio.* cujusdam V. uxor, sedecim ad minimum jam liberorum mater, quæ ante viginti aliquot annos, grassantibus tunc temporis hinc inde febribus ardentibus, prima vice & quidem ultra quatuor menses gravida, subito de horrore cum subsequente calore, maxi-
mo

mo dorsi dolore gravativo, præcordiorum anxietate, & ventris torminibus, instar dolorum ad partum, conquerebatur, hinc ad eam vocatus statim, ob metum abortus venam secandam curavi, quo facto paulo post aliquantum melius se gessit; quinto vero die præter opinionem hinc inde maculæ rubicundæ, variolarum erumpentium instar, apparebant; unde ex ipsa, an unquam variolis laboraverit, quæsi, id quod non solum ipsa affirmabat, sed etiam foveolæ variolosæ in manibus & facie adhuc conspicuæ confirmabant; Nihilominus tamen subsequenter diebus succrescebant dictæ maculæ tantaque variolarum per totum corpus proveniebat copia, ut nil nisi variolæ, distinctæ tamen, conspicerentur. His vero variolis exarescere incipientibus, denuo horror cum ingenti calore summaque debilitate redibat; quibus symptomatibus per totum corpus purpura alba superveniebat; a quibus tamen omnibus per Dei gratiam liberata post quatuor menses filiolum vestigiis sive maculis variolarum rubicundis per totam cutem signatum, optime tamen sanum, enitebatur. Quandoque etiam foetus cum variolis in lucem eduntur, licet matres toto graviditatis hoc morbo non laboraverint; Gorlicii enim matrona quædam utero gerens, felici alias nisu peperit filiolum, variolis undique refertam, nescia quid sibi hoc velit phænomenon, cum ne ipsa tempore gestationis, nec instante parturitionis tempore, iisdem fuisset afflicta. vid. Ehrenfr. Hagendorn. *Histor. med. phys. Cent. II. Hist. 58. p. 233.*

§. 7.

morsus canis rabidi.

Gravida quædam a cane rabido demorsa, morientibus paulo post omnibus reliquis demorsis, sola quinquaginta dies nihil sensit; post hoc tempus salva peperit filiam; post duos vero a partu dies in ea omnia symptomata incidit, quæ cæteri demorfi pati soliti fuerant & tertia die obiit, uti ex Johanne Fabro Lynceo refert Henricus Vollgnad *Schol. in Obs. 52. M. N. C. Dec. I. An. 1. p. 149 seq.*

§. 8.

Pluribus insuper gravidæ tam ante partum, quam in partu, *alia incommoda.* vel post partum, vexantur incommodis, quorum aliqua hoc loco allegasse sufficiat. Ante partum communia sunt, quorum supra inter signa graviditatis & alibi mentionem fecimus & alia, v. g. nausea, pica, vomitus, mammarum dolor, difficultas & incontinentia urinæ, tumor pedum, hæmorrhoides, menstrua, albus & sanguineus fluor, hydrops, alvi fluxus, tussis & respirandi difficultas dorsi, lumborum & coxendicum dolor, uteri procidentia, febres & alii morbi atque imprimis abortus. In ipso partu jam narratis malis accedunt matricis passiones atque tormenta, pariendi conatus præposteri, situs infantis vitiatus, lipothymia, convulsiones, molæ, monstra, secundinarum retentio, infantis mors, genitalium angustia, ossis sacri & coccygis obstinata & inflexibilis durities, denique naturam obsidens tumor, inflammatio & cancer. A partu gravidas vel puerperas urget hæmorrhagia, inflammatio & ulceratio matricis & perinæi, hujusque interdum ruptura & sexcenta alia, de quibus alibi, vid. *M. N. C. Dec. II. An. 1. Obs. 110. p. 471 seq. Jodoc. Lomm. Observ. medic. Lib. II. p. 279 seq.*

§. 9.

Flatus etiam non solum a variis causis in non gravidis ex utero prorumpere, sed in eodem etiam interdum tamdiu includi, ut ejusmodi flatulentia laborantes feminæ, ob inde exortam abdominis intumescuntiam, prægnantiæ suspicionem incurrant, variis exemplis alibi probavimus; tales quoque flatus interdum simul cum foetu in gravidarum utero incarceratos & ante vel in ipso partu absque foetus detrimento, cum sonitu quodam prodeuntes annotarunt autores, siquidem secundum Christ. Gottl. Reusnerum *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. VI. Obs. 32. p. 259.* cursoris cujusdam uxor, annorum viginti, legitimo tempore ad partum se accingit, qui ad viginti quatuor procrastinatur; paulo post conatus uteri augentur, & clinicæ audiunt fragorem ex utero ingentem, sonitui

Flatue.

bombardæ minoris, *eines Puffers*, similem, mox embryonem mascululum excludit sanum & vegetum. Et Franciscus Mauriceau *Observ. sur la Grossess. Obs. 100. p. 64.* hanc refert observationem: Le 8. May. 1674. j'ay accouché une femme âgée de vingt cinq ans, de temperament pituiteux de son second enfant, qui estoit une fille, qui vint au terme de huit mois & vingt jours. Cet enfant se portoit assez bien, quoyque la mere eust rendu par plusieurs fois des vents par la matrice, avec aussi grand bruit, que si c'eust esté de l'anus, lors qu'elle estoit au quatrieme mois de cette grossesse &c. Et *Obs. 105. p. 62.* inquit idem: j'ay encore vû quelques femmes grosses, sujettes au même accident, dont elles ne suffroient aucune autre incommodité, que l'indecence de ce bruit, qu'elles rendoient toujours involontairement en quelque compagnie, qu'elles fussent. Musici cujusdam conjux gravidationem sentit cum enormi alvi inferioris inflatione, accedente partus tempore neque obstetrices, neque agnati gravidæ ipsis suis manibus vel digitis uteri orificium internum penetrare, multo minus foetum promoveri possunt, ob uteri fortissimam constrictionem, unde misera misere extincta periit. Inter corporis sectionem statim minima facta uteri incisione, flatus inibi collecti tanto cum fragore fuere explosi, ut horrore adstantes concuterentur omnes; erat enim tantus, quantus ex instrumento sclopezante minori, pulvere pyrio accenso fieri potest, foetus male situatus extractus mortuus lividi erat coloris, annotante Samuele Steurlino *Ephem. Acad. N. C. Cent. VIII. Obs. 20. pag. 47.* In Thuringia etiam ex utero mulieris cujusdam difficili partu laborantis, tam ingentem cum fragore flammam exiliisse, ut videretur bellicum tormentum excussum, atque adeo & pueri nates & obstetricis manus ambussisse, ex Lycoftene & Cornelio Gemma recenset Johannes Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. Lib. IV. Tr. II. cap. 3. p. 457.*

§. 10.

Utrum vero mariti, graviditatis uxorum suarum tempore, ea
sym-

symptomata, quæ alias mulieribus post imprægnationem familiaria esse solent, quandoque ipsarum vice perferant, ita ut hæ ab istis liberæ permaneant, vel ad minimum paria cum ipsis incommoda perferant, affirmare nolo, licet ejusmodi relationes extent; meminit enim Salomon Reifelsius *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 216. pag. 316.* mariti pro uxore gravis pica laborantis, & quidem his verbis: Singularem casum virorum judicio an opprobrio exponendum adducam; sed risum teneatis amici! Cum Buxovillæ in Alsatia adhuc degerem, sæpe audiivi de fabro jam sene, quod uxoris suæ, quando gravis facta fuerit, personam egerit, dum maritus pro uxore vomeret & pica laboraret. Quod de illo Vixbohn nominato vix bona fide credidissem, nisi ipsius quoque filius, maritus jam factus, cum præsens adhuc eram, talia, qualia pater, seu paterentur seu ageret. Rarum etiam in hoc sexum masculinum degenerare, quem tamen ad generandum natura primum fecit: & mirum, quod non & hic pater suum non degenerem filium aut filius nepotem, quem generavit, pepererit. Causam in marito possem quidem conjicere in effluvia sympathica, si & ipsa vomuisset; Cur vero ille sine illa vomuerit, obscurior est ratio. Videtur fidem huic historiæ facere majorem similis fere affectus, quem fortuitum quidem plerumque & non sine joco dictum judicant plurimi, ego vero in aliquibus viris, etiam ex propria ipsorum observatione, perpetuum & constans vidi, quod quoties uxor esset gravis, toties dentium dolore laboraret maritus. Hanc tamen sententiam erroribus vulgi annumerat maritumque loco uxoris gravidæ non ægrotare defendit Jacobus Primerosius *de Vulg. Error. in medicin. Lib. II. cap. 13. p. m. 147 seq.* inter errores, inquit, quam plurimos maxime ridendus hic esse videtur, quod vir credatur ægrotare iisque affici symptomatis, quibus ipsa mulier prægnans solet; illudque experientia confirmatum plurimi esse volunt. Habebam ægrum febre laborantem cum urina valde accensa & turbida, qui ægritationis suæ nullam causam agnosce-

Maritus
pro uxore
laborans.

Uuu 2

bat,

bat, quam uxoris suæ graviditatem. Nullibi terrarum, quam in Anglia id observatum memini me audivisse, aut legisse unquam. Deinde dictus Primerosius equidem concedit, gravidas mulieres, quæ corpore sunt impuro, primis mensibus ex retentione menstruorum variis symptomatibus affici posse, quas tamen causas vir in se non habeat; & licet maritus eo tempore, quo uxor gravida est, ægrotet, non tamen ex infectione, sed peculiari corporis vitio id patiatur; cum res nova non sit, viros & mulieres etiam simul ægrotare. At mirum est hætenusque ignotum, graviditatem affectum esse contagiosum, & non alias mulieres, sed viros infici. Accidit sæpe, ut, cum mulier bene valet, ægrotet maritus etiam absens per aliquot milliaria. At si ex graviditate uxoris id patitur, cur ipsa eo tempore incolumis permanet? causæ enim naturales prius agunt in proximum, quam in remotum. Cumque noxios ejusmodi humores mulier secum ferat, prius ipsa & gravius ægrotabit. Nec admittit Primerosius sympathiam, antipathiam, contagium aliasque nugas, tandemque concludit: male cum viris ageretur, si, quoties uxoribus supprimuntur menses, toties non ipsæ, sed viri laborarent. Hæc tamen Primerosii argumenta Johanni Paulo Wurff bainio non sufficiunt, qui *M. N. C. Dec. II. An. 10. Obs. 205. p. 410.* ubi de maritorum vomitu dentiumque dolore loco conjugum utero gerentium agens ita scribit: Ut ut Primerosius, viros gravidarum suarum conjugum loco nonnunquam ægrotare, inter errores maxime ridendos numeret, & nullibi terrarum, quam in Anglia hoc observatum se audivisse aut legisse scribat, rei tamen hujus veritas quotidiana etiam in Germania nostra confirmatur experientia; quod duplici hac vice exemplo mihi notissimo demonstrare sufficiat. Medicus quidam Norimbergensis, quoties ex amplexu conjugali conjux ejus conceperat, toties, prout ipse hoc publice non una vice in Dnn. collegarum præsentia non modo enarravit, sed & sancte affirmavit, primis in gravidationis mensibus, singulis mane diebus, molestis-

simo

fimo ac vehementissimo conatu, limpidissimam evomebat lympham, dilectissima sua conjuge nequicquam de familiaribus ut plurimum alias gravidarum symptomatibus sentiente. Eandem fere fortem Theologus ejusdem loci, eruditione, doctrina vitæque pietate haud leviter se commendans, expertus est, qui aliquot liberorum pater, usque dum conjux ejus primos foetus fenserat motus, dentium dolore semper fuit vexatus, reliquo tempore a dolorifico hoc symptomate vel plane liber, vel rarius, nec tamen continua temporis serie afflictus.

§. II.

Cum proinde tam variis hucusque commemoratis & aliis *Gravidarum diæta.* symptomatibus vexentur gravidæ mulieres, non immerito, partim prægnantis matris, partim in utero existentis foetus gratia summa cura bonaque diæta est observanda; unde, juxta Francisc. Bayle *Dissert. physie. p. m. 114.* notandum, quanta debeat esse mulierum prægnantium temperantia, quam moderata victus ratio, quanta animi tranquillitas, ut liberos gignant & mente & corpore sanos, in quibus rebus cum passim mulieres delinquant, imo nonnullæ sui vix compotes omne genus intemperantiæ sectentur, & pathematis continuo, quibusdam veluti furiis, agitentur, nec pudori, nec foetui, quem in utero gerunt, consulentes, subit mirari, cur in humano partu monstra non sunt frequentiora. Johannes Bickerus *Hermet. rediviv. sive de conserv. constant. Sanitat. Sect. I. cap. 14. p. m. 99 seq.* de prægnantium diæta admonet: Prægnans omnem motum vehementem fugiat, nec mammas constringat, nec nimis arcte cingatur, & quidem hoc toto gestationis tempore. A principio conceptionis abstineat a venere, decem dierum spacio. Per integram septimanam utatur victus ratione tenui, deinde usque ad diem trigesimum, moderato victu ex pane, carnibus palumbæ, & marinis illis, quæ alvum sistunt, assis potius, quam elixis, deambulet in loco plano ac levi, desideat super mollia, nec caput madefaciat. Mense octavo tranquilla sit, cibos solito pau-

alvi obstru-
ctio.

Intestinum
rectum gan-
grænosum.

ciores accipiat, & si cum pondere pendet, ventrem fasciis diligenter suspendat constrictum, ceroto etiam ex oleo myrtino, aut alio constringente cutem ventris oblinat, ut solidior evadat, ne in partus conatibus rumpatur: Mense nono inferiores partes latius obvolvatur, superiores perstringat: Loci item unguentis & mucilagibus laxandi, & balneo frequenti emolliendi &c. Quamvis autem hoc loco Bickerus omnem motum vehementem prohibeat; minime tamen sedentaria vita suadenda; siquidem Johannes Schenckius *Observat. med. Lib. IV. fol. 568.* gravidæ cujusdam meminit, quæ assidue sedendo & nendo mira alvi astrictione correpta est; ex qua tandem in sævissimos incidit dolores colicos, qui eidem foetum, immaturum quidem, sed vivum extorserunt; a partu ingenti ventris tumore adeo non subsidente, ut magis exactus fuisse videretur, unde paulo post vitam finiit. Aperto ejusdem corpore colum intestinum sua sede pulsum & gangrænosum, una cum vicinis musculis abdominis denigratum, & ad eanthari amplitudinem facibus infarctum, deprehensum fuit, reliquis intestinis undique flatibus admodum prodigiose distentis. vid. etiam Marc. Gerbez *Intric. extric. medic. Part. II. cap. 15. edit. in 4. pag. 140 seq. & cap. 20. p. 192 seq.*

§. 12.

Pica gra-
vidarum.

De appetitu gravidarum nimio & extraordinario sive de pica in *Chylologia nostra cap. 2.* pluribus egimus. Huic tamen gravidarum appetentiæ pravæ aliquando a medico indulgendum esse admonet Johannes Bohnius *de Offic. medic. duplic. Part. I. cap. 4. pag. 79.* singularem, inquit, conniventiam medici feminæ postulant imprægnatæ, si malaciam aut picam experiantur, non raro abortus productricem: ubi prudenter agit, qui aliquando minus rigidus, licet aliquatenus aliena & inepta appetant, iis talia indulgent; modo detrimentum non adeo magnum ab iis fuerit metuendum & excessus omnis vitetur: Talem enim excessum seu nimium aceti & acidorum usum foetui noxium annotavit Chri-

stia-

ftianus Fridericus Garmannus in nobili quadam femina, quæ uterum gerens toto gestationis tempore nullum cibum nisi acidum, prout ipsa retulit, expetiit, potus vero loco continuo acetum avidis hausit faucibus. Exclufit poſtea foetum absque epidermide, cætera perfectum & valentem quidem, qui tamen paulo poſt ob dolores a defectu cuticulæ cauſatos fatis cedere coactus eſt. Idem de Ludovico Hungariæ rege apud Curæum *Part. I. Annal. Sileſ.* legitur, cujus mater an eodem in acida flagrarit appetitu, incertum eſt. vid. *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obſ. 149. pag. 233.*

§. 13.

Quamvis menſium fluxus poſt conceptionem ordinarie ceſſet, atque poſt partum vel etiam foetus ablactationem demum red- Menſium
fluxus. eat, in quibusdam tamen gravidis quandoque eundem in prioribus, in aliis in poſterioribus graviditatis menſibus, vel etiam erratice apparere, paulo ante in hoc capite ut & in *Emmenolog. cap. 2. p. 203. 204.* multis exemplis monſtravimus, quibus adhuc alia annecti poſſunt; quale exemplum refert Franciſcus Mauriceau *dans les Obſervat. ſur la Groſſeſſe Obſ. 168. p. 93 ſeq.* de l' accouchement d' une femme, qui avoit eû durant les trois premiers mois de ſa groſſeſſe ſes menſtruës fort abondamment, on plûtoſt des pertes de ſang, qui luy arrivoient deux ou trois fois par mois. *Et Obſ. 388. p. 228.* d' une femme, qui avoit vuidé par deux differentes fois quelque peu de ſang par la matrice; l' une à deux mois & demy, & l' autre fois vers le ſeptieme mois de ſa groſſeſſe. Item *Obſ. 606. p. 352.* de l' accouchement d' une femme au terme de neuf mois, dont l' enfant ſe portoit bien, quoyqu' elle euſt eû une perte de ſang durant quinze jours, vers le commencement du ſecond mois de ſa groſſeſſe. Fluxum menſium cum gravibus ſymptomatibus in gravida obſervavit Johannes de Muralto in Eliſabetha A. e pago Tallwyl oriunda; & hæc annum ætatis quadrageſimum ſuperans, parvæ ſtaturæ femina anno 1681. cum jam ſeptem menſes gravida eſſet,

esset, fluxum sanguineum passa est, per quinque hebdomadas cum virium debilitate, tussi, respirandi difficultate, dorsi, lumborum & coxendicum dolore: ad præcavendum abortum quædam sumpsit medicamenta, quibus usurpatis convaluit, & legitimo tempore peperit. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 1. Obs. 110. p. 271.* De fluxu sanguinis uterino in gravida observationem communicat medicus Burdegalensis, Contens in Nicol. Blegny *Zodiac. med. Gall. An. 2. Jul. Obs. 1. p. 141.* Mulier, inquiens, secundo graviditatis mense exeunte ab injuria externa passa est hæmorrhagiam uterinam insignem, ad tempus usque partus productam, qui tamen ne una die statutum tempus prætergressum est: Neque quies, neque remedia adstringentia sanguinis illam effusionem ullo modo cohibere potuerunt. Istud vero admiratione dignum, quod in quatuor subsequenter imprægnationibus, sanguinis effluvium secundo mense semper passa sit &c. Et Wolfgangus Gabelchoverus *Curat. medicin. Cent. IV. Curat. 94. p. m. 208.* talem fluxum sanguinis per uterum annotavit. Judith scilicet, conjunx M. Wilhelmi Gmælini, Diaconi Calwensis, gravida conquesta fuit, se jam per tres septimanas semper septima vel octava die percipere fluxum sanguinis puri per uterum, & inde aliquatenus habuisse melius. Quorundam tamen remediorum beneficio abortum periculosum vitavit & postea infantem vivum peperit. vid. etiam *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. X. Obs. 40. p. 327.* Thom. Bartholin. *Epist. med. Cent. IV. Ep. 13. p. 47 seq.* Reiner. Solenand. *Consil. med. Sect. V. Cons. 15. f. 492. §. 138 & 39.* Paul. Spindler. *Obs. 67. p. 125.* Corn. Stalp. van der Wiel *Cent. I. Obs. 76. p. 332 seq.*

§. 14.

per quas
vias?

Per quas autem vias in gravidis talis sanguis menstruus, absque foetus periculo, effluat, ut explicemus, ex Emmenologia nostra repetendum erit, quosdam autores ordinarium mensium fluxum per uteri cavitatem, alios per uteri vaginam, & alios per utrumque locum derivare; quo loco etiam variæ de gravidarum san-

sanguine menſtruo & hæmorrhagia uterina opiniones autorum recensentur, quarum pleræque eo collimant, quod, cum in gravidis uteri orificium ad præcavendum abortum, per totum geſtationis tempus penitus occluſum ſit, talis hæmorrhagia potius per vaginæ, quam cavitatis uteri canales evacuentur; alii quoque talem ſanguinis effluxum in vasis circa exteriorem interni orificii partem quærent, vid. Franc. Mauriceau *l. a. Obſ. 168. p. 93.* De hac autem menſium gravidarum emanatione paucis adhuc eſt repetendum, quod menſes æque in gravidis, quam virginibus aliisque feminis non prægnantibus, per utrumque locum, cavitatem ſcilicet uteri ejusque vaginam emanare poſſint, quamvis differente effectu, ſcilicet ſi in prægnantibus menſes ex uteri cavitate fluunt, tunc per ſanguinis in uterum infuſi fluctuationem placenta facile divelli abortusque oriri poteſt. Quod ſi vero menſes vel alius ſanguis ſuperfluus per vaginæ uterinæ vaſa expurgantur, abortus non æque metuendus erit. Quamvis enim Hippocrates *ſect. V. Aphor. 60.* ſcribat: ſi mulieri in utero gerenti purgationes menſtræ prodeant, foetum ſanum eſſe, impoſſibile, quod etiam quotidiana teſtatur praxis medica, id tamen, mea ſententia, de iis tantum intelligi debet, quibus ex uteri cavitate menſes profluunt, ſiquidem, contra hunc Aphoriſmum, aliæ quoque mulieres non ſolum primis graviditatis menſibus, ſed quandoque etiam per totum geſtationis tempus, abſque ullo abortus periculo tributum lunare ſolvunt, qualia exempla hæcenus recenſuimus.

§. 15.

Non autem ſolummodo ex utero ejusque vagina gravidarum menſes ſive ſanguinem ſuperfluum excerni videmus, ſed ^{per alias} _{vias.} per alias quoque vias: Mulier enim Schwarzburgica, ætatis triginta annorum, habitus corpulenti & conſtitutionis plethoricæ, a primo conceptionis menſe uſque ad ultimum ſingulis diebus vomuit ſanguinem, nonnunquam floridum, nonnunquam aliquatenus coagulatum in ſatis magna & unciarum octo quantitate,

sine tamen noxa vel graviori læsione; integra cæteroquin valetudine usa, uti annotavit Benjamin Scharffius *M. N. C. Dec. I. An. 9 & 10. Obs. 6. p. 43.* Sutoris cujusdam uxor gravida statim temporibus menstrua vomitu ejecit, annotante Vito Riedlino *Obs. med. 98. p. 228.* Vomitus sanguinis in prægnante observavit Philippus Salmuth *Obs. med. Cent. II. Obs. 54. p. 82.* femina scilicet præcipuæ conditionis, incipientibus singulis imprægnationibus, crebris conflictabatur vomitionibus, quæ sequentibus & partui propioribus mensibus quotidie exasperabantur, adeo quidem, ut nonnunquam diei noctisque spatio ad quindecim vel viginti vices plus minus vomitionibus affligeretur. Sputum cruentum in femina quadam, quoties ad quintum mensem gravida, singulis alias catameniorum imminentiis, & ultima vice usque ad partus ultimum terminum, observavit Johannes Bohnius, vid. ejusdem *Tract. de Offic. medic. duplic. Part. I. cap. 20. p. 416.* Hæmoptysin & hæmorrhagiam narium menstruam in gravida innoxiam annotavit Michael Alberti, *Ephem. Acad. Nat. Cur. Centur. IX & X. Obs. 38. p. 325 seq.* Feminam ejusmodi in hæmorrhagiam narium satis largam post venæsectionem incidisse, qua mediante natura solers sanguinem quantitate & mole nimia peccantem motu spontaneo evacuavit, se observasse, annectit Benjamin Scharffius *l. a.* Hæmorrhoides quoque fluentes loco mensium, in duabus mulieribus nobilissimis, jam quatuor menses in utero habentibus, in quibus partus tempestivus consecutus est & saluberrime adolevit, observavit Scholiographus Hollerii *ad cap. 55. de morb. intern. v. Joh. Schenck. Obs. Lib. III. fol. 358.* Hæmorrhoidalem mensium fluxum fere continuum hic loci patiebatur femina quædam prima vice gravida, quæ filium legitimo termino equidem pariebat, summe tamen debilis quinta post partum die salvo filio remanente, animam Deo reddebat. Hæmorrhagiam menstruam in gravida per talum communicat Alhardus Hermannus Cummius *M. N. C. Dec. I. A. 1. Obs. 96. p. 224.* nimirum femina agrestis, opulenta, ætatis suæ anno trigesimo

fimo quarto, anno 1667. tertium gravida, post primam statim mensium retentionem pati incipit sanguinis profluvium ex poplite sinistro periodicum &c. Interdum etiam gravidis uteri hæmorrhagia accidit lethalis, uti recenset Johannes Helwigius *Obs.* 141. pag. 383. anno 1673. Ratisbonæ matrona quædam nobilis & ingenua, foetu gravida, quinto conceptionis mense hæmorrhagia uteri improvise adfligebatur tam vehementi ac immodica, cum virium debilitate, ut sæpius in animi deliquium incideret, & pro agonizante haberetur, foetu tamen semper se in utero naturaliter movente; cui malo quidem venæsectione atque variis medicinis obviam itum fuit, sed omnia penitus incassum, ac fluor iste per iteratas vices usque fere ad ultimum gestationis mensem continuavit, quo foetus demum debilitatus in utero subito moriens matri quoque mortem attulerat.

§. 16.

Quamvis in hac observatione venæsectio frustra fuerit adhibita, in aliis tamen gravidis, plethoricis imprimis, eadem non modo innoxia, sed etiam maxime proficua est variaque sympto- *Venæsectio
proficua.*mata impedit. Laborabat enim quædam gravida sat plethorica, ob protractam diutius venæsectionem, vomitibus ferme continuis, cum calore præternaturali, & siti sat molesta, qua de causa ex consilio medici sanguinem ea, qua conveniebat, quantitate detrahi curavit, hincque a dictis symptomatibus liberabatur, teste Vito Riedlino, filio *Obs.* 98. p. 229. Post parcam sanguinis subtractionem in gravida femina sanguinis vomitum in narium hæmorrhagiam fuisse mutatam ex *M. N. C. Dec. I. An. 9 & 10. Obs.* 6. p. 43. modo adduximus. De matrona epileptica in septimo mense uterum gerente ter secta vena in talo tuto curata. vid. Zacut Lusit. *Prax. med. admir. Lib. I. Obs.* 27. *Oper. Tom. III. f. m. 7. v. etiam Lib. II. Obs.* 144 seqq. fol. 77. Venæsectionem in plethorica ad partum difficilem ordinavit Johannes de Muralto *M. N. C. Dec. II. An. 1. Obs.* 103. p. 244. Mulier, inquiens, viginti annorum, sanguinea & primum gravi-

gravida toto gestationis tempore venæsectionem neglexit. Cum vero partus instaret, conatus impendere nequit. Suasi venæsectionem in brachio dextro sufficientem, qua celebrata parturiens puerum vegetum feliciter enixa est. In scholio ejusdem observationis annectit Muraltus: in Helvetia feminas si conceperint, & sanæ & plethoricæ fuerint, toto gestationis tempore bis terve sanguinem utiliter mittere, ita enim primis mensibus præcaveretur abortus, proles a constitutione humida defenderetur, tandemque partus fieret facilior &c. ubi varia adhuc de gravidarum venæsectione admonet. De venæsectionis commodo in gravidis agens Johannes Schmidius *M. N. C. Dec. I. An. 9 & 10. Obs. 48. pag. 113 seq.* refert, se in praxi sua sine noxa, tempore ingravidationis omni, urgente necessitate febrili, sanguinem tuto detraxisse, non raro iteratis vicibus, non raro in bona satis quantitate, neque unquam aliquam inde percepisse noxam, cum sæpius gravidæ majorem sanguinis quantitatem evacuent, quam per venæsectionem ordinarie emittitur, sine foetus debilitate. Deinde etiam uxoris juveniculæ meminit, quæ aliquoties jam abortierat, ita ut abortuum numerus pene septenarium vel octonarium excederet, post repetitam autem venæsectionem partum legitimum enixa est neque

Observatio. amplius abortiit. Id quod etiam mihi in femina honesta, aliquot jamjam liberorum matre, ante triginta annos in pharmacopæi nostratis uxore, observare contigit, quippe quæ undecies in una serie abortum passa erat; postquam autem iterum, octava a nova conceptione septimana, tormina abdominis, tanquam abortus prodromos sentiret, statim ipsi in brachio venam secari curabam; qua incisa omnia symptomata remittebant, usque ad undecimam hebdomadem; hac enim finita dolores denuo redeuntes secunda venæsectione iterum cessabant, quæ etiam ob eandem causam metumque abortus, tertia vice septimana decima quarta tali cum fructu repetebatur, ut ab ultimo hoc termino nihil amplius incommodi sentiret, sed justo tempore filium optime vegetum, po-

stea-

steaque etiam filiolum ad hunc usque diem adhuc viventes eniteretur. Utero gerentes primis mensibus, ne copia sanguinis foetum obruat, dummodo sint sanguineæ, phlebotomia ab abortu esse præservandos, admonet etiam Dominicus Panarolus *Iatrológism. Pentecost. II. Obs. 23. p. 46.* vid. etiam Gregor. Horst. *Obs. Lib. V. Obs. 34. Oper. Tom. II. fol. m. 292.* Paul. Zacch. *Quæst. med. leg. Lib. VI. Tit. 1. Quæst. 7. n. 17. fol. 503.* Matth. Moron. *Direct. medic. p. 217.* De abortu bis venæsectione impedito vid. *M. N. C. Dec. I. A. 6 & 7. Obs. 204. p. 301.* item Henr. ab Heer *Obs. 14. p. 131 seq.* Plura vide de Abortu. item Theoph. Bonet. *Mercur. compitalit. Lib. XIV. fol. 577.* ubi de venæsectionis loco & tempore agit, variaque de gravidarum purgationibus & clysteribus annectit.

§. 17.

De gravidarum salacitate ac coitu non solum in Muliebribus, *Gravida* sed etiam Spermatol. *Cap. 5. §. 72 seq. p. 311 seq.* pluribus egimus. *Cur cur coeant? non brutæ.* vero ratione coitus femina a reliquis animalibus adeo differat, ut, cum hæc post conceptionem venerem detrectent coitumque recusent, femina econtra & equa, juxta Aristotel. *Hist. Animal. Lib. VII. cap. 4. fol. 435.* non modo marem admittant, sed quandoque etiam cohabitationem multo fervidius, quam non gravidæ appetant; hujus appetitus venerei causas sequentibus verbis reddit L. Coelius Lactantius Firmianus *Lib. VI. de ver. cult. cap. 23. p. m. 431 seq.* Venio nunc ad eam, quæ percipitur ex tactu, voluptatem, qui sensus est quidem totius corporis; sed ego non de ornamentis, aut vestibus, sed de sola libidine dicendum mihi puto, quæ maxime coercenda est, quia maxime nocet. Cum excogitasset Deus duorum sexuum rationem, attribuit iis, ut se invicem appeterent & conjunctione gauderent. Itaque ardentissimam cupiditatem cunctorum animantium corporibus admiscuit, ut in hos affectus avidissime ruerent, eaque ratione propagari & multiplicari genera possent. Quæ cupiditas & appetentia in homine ve-

hementior & acrior invenitur; vel quia hominum multitudinem voluit esse majorem, vel quoniam virtutem soli homini dedit, ut esset laus & gloria in coercendis voluptatibus & abſtinentia ſui &c. Et *p. 434 ſeq.* inquit: divina lex ita duos in matrimonium, quod eſt in corpus unum, pari jure conjungit, ut adulter habeatur, quicquid compagem corporis in diverſa diſtraxerit. Nec ob aliam cauſam Deus, cum cæteras animantes ſuſcepto fœtu, maribus repugnare voluiſſet, ſolam omnium mulierem patientem viri fecit; ſcilicet ne feminis repugnantibus libido cogeret viros aliud appetere; eoque factò, caſtitatis gloriam non tenerent. Sed neque mulier virtutem pudicitie caperet, ſi peccare non poſſet. Nam quis mutum animal pudicum eſſe dixerit, quod ſuſcepto fœtu mari repugnat? &c. Quas rationes morales Johannes Benedictus Sinibaldus *Geneanthrop. Lib. VII. Tr. I. cap. 4. pag. 637.* ita reddit: prima ratio eſt, quod Deus immortalis ideo dedit, ut feminæ ſine noxa gravidæ ſuſtinerent virum, ne ſcilicet homines (viri) alienas mulieres cogerentur calcare: Secunda eſt, ut mulier gravis renuens virum pudicitie nomen acquirere valeret; nam bruta pudica dici non poſſunt, cum naturaliter tantum agant, & impulſu duntaxat naturæ. Juxta Chriſt. Warliz. *de Morb. biblic. cap. 12. p. 374.* præpoſtera venus, & injuſto tempore blandiens gravidis nocet, multorum malorum ſcilicet ferax, ob perturbationem circuitus humorum, qui ad fœtum alendum tendunt, unde loco benigni & laudabilis humoris nutritivi, vitioſus, ſpiritibus orbatus, in qualitatibus mutatus & adulteratus communicatur. Alii autem autores varias rationes phyſicas inquireunt, vid. Ariſt. *de Generat. Animal. Lib. IV. cap. 5. fol. 583.* De quæſtione, an mulier, quo tempore uterum gerit, cum viro conſuetudinem habere debeat? v. Hieron. Mercurial. *de Morb. Mulier. Lib. I. cap. 4.* in Iſrael. Spacch. *Gynæc. f. 223.* Joh. Bicker. *Herm. rediviv. cap. 16. p. 99. 101.* Joh. Bened. Sinibald. *l. a.* Roder. a Caſtr. *de Natur. Mulier. Lib. III. cap. 2. pag. 104 ſeq.* Spermatol. noſt. *l. a.* Paul. Zacch. *Quæſt. med.*

medic. leg. Lib. VII. Tit. 3. Quæst. 3. n. 11 seq. fol. 639. n. 18. fol. 641.

§. 18.

Ob varias autem causas, superfœtationem scilicet, vel etiam Cur absti-
 abortum vel alia symptomata, quæ tum matri quam foetui primis nere de-
 & ultimis gestationis mensibus accidere possunt, uxores gravidæ beant, &
 potius a coitu abstinere, quam coitum aversum, vel illum mo- quando?
 dum, quem Marcus Gerbezius *Intricat. extricat. Part. II. cap. 20.*
p. 447. commendat, (scilicet ut vir brachiis suis fortiter innixus
 coeat, ne prægnantis ventrem comprimat) admittere deberent.
 Juxta eundem Gerbezius certum est, frequentiore coitum sal-
 tem primis gestationis mensibus esse infecurum, eo quod, teste
 Francisco de le Boy Sylvio, fere præcise propter istam causam me-
 retrices rarissime concipiunt, aut si concipiunt, plerumque ante
 tempus abortiunt. Concubitum autem ante partum suadet Ari-
 stoteles *Hist. Animal. Lib. VII. cap. 4. fol. 435.* inquiens: quæ pau-
 lo ante partum concumbunt, facilius pariunt. Vix tamen hoc in
 passu semper feminis lex certa præscribi poterit, cum ob humo-
 rum circa partes genitales stagnationem nonnullæ mulieres a con-
 ceptione longe evadant salaciores eoque sæpius conjugalem am-
 plexum desiderent. Unde inquit etiam Nicolaus Venette *de la*
Generation de l'homme Part. II. cap. 3. Art. 3. p. 124 seq. l' experience
 nous apprend, qu'une femme grosse est plus amoureuse au com-
 mencement de sa grossesse, qu'auparavant. Beaucoup plus de
 sang & d'esprits occupent ses parties naturelles, et si on la baise en
 ce temps-la, c'est de l'eau, que l'on jette sur le feu d'une forge,
 qui plus il est arrosé; plus il est ardent. Les François ne sont pas
 si retenus à caresser les femmes grosses que quelques autres na-
 tions. Il y a même des medecins qui sont d'avis, qu'on les doit
 baiser avec plus d'ardeur, pour obeir aux loix de la nature, qui les
 rend alors plus amourenses. Mais à dire le vrai, si nous suivons
 le sentiment d'Hippocrate, elles sont de plus vehementes cou-
 ches, quand elles ne sont point caressées pendant leur grossesse,
 &

& nous voyons souvent arriver des accidens funestes aux femmes, qui se divertissent avec un homme, quand elles sont grosses; car si elles ne font pas de fausses couches, au moins deviennent elles grosses une seconde fois. Les femmes du Bresil sont bien plus retenues, que nos Françoises, puisque dès qu'elles se sentent grosses, elles se separent de leurs maris. Elles n'apprehendent pas, que les fortes secousses, de l'amour ebranlent un enfant, qui est fort delicat, dans ses premiers mois, & que les regles, qui sont souvent provoquées par la chaleur, que les baisers reiterez excitent dans les parties naturelles d'une femme, l'etouffent & le souffoquent. Il ne peut mesme s'en garantir sur la fin de sa prison, lorsqu'il est plus robuste. Les liens, qui le tiennent saisi, se relachent par sa pesanteur, aux moindres efforts amoureux de la mere: & il est ainsi contraint de perdre la vie en naissant, luy qui ne l'a presque pas encore receüe. Et *Art. 5. p. 141 seq.* inquit idem Venette: Il y a beaucoup de difficulté à savoir, si une femme grosse peut manquer à ce qu'elle doit à son mary. Les sentimens sont partagez ladessus. Quelques-uns veulent, que l'on puisse baiser aussi vigouresement une femme, lors qu'elle est grosse, que lorsqu'elle est vuide. J'en prends à témoin Julie, fille de l'Empereur Auguste, qui estant grosse voulut persuader aux gens, que l'on ne faisoit point tort à son mary de faire passer d'autres hommes dans sa barque, lorsqu'elle estoit chargée de marchandises humaines, pour me servir de la pensée de cette femme. Les autres ont tant de scrupule dans cette occasion, qu'ils s'imaginent, que l'on commettoit un grand crime, si l'on caressoit une femme grosse, & que l'on contribueroit à la perte de son enfant. Pour decider cette question, on n'a qu'à observer ce qui se passe dans la nature parmy les bestes, & on y verra que les cerfs, les taureaux, les beliers & quelques autres animaux ne touchent plus leurs femelles, quand elles sont une fois pleines. Les accidens facheux, que nous avons remarqué cy dessus pouvoir arriver à une femme
gros-

grosse, qui reçoit les caresses de son mary, sont de causes legitimes, pour empêcher un homme de caresser sa femme. De fausses couches peuvent arriver par un flux de sang, que les agitations amoureuses excitent: une superfétation peut survenir; un faux germe ou un fardeau peut suffoquer l'enfant, comme Riolan nous témoigne l'avoir vû. En un mot ces accidens peuvent ôter la vie à la mere & à l'enfant. Au contraire les accouchemens seront plus libres, si l'on ne touche point une femme pendant sa grossesse. Et les enfans, selon la pensée d'Hippocrate ne naîtront pas avant la terme: Ce furent sans doute ces raisons, qui empêchèrent le sage Empereur de Constantinople, Isaac Comnene, de toucher sa femme, après qu'elle eut conçu; & quoyque ses medecins le luy conseillassent pour la conservation de sa santé; il n'en voulut pourtant rien faire, preferant ainsi la santé de deux personnes à la sienne propre. C'estoit mesmes une loy parmy quelques peuples payens, de ne connoître jamais une femme grosse. Ob supra adductas rationes, abortum scilicet ac superfœtationem gravidis quoque coitum dissuadet Petrus Müllerus *Disput. de Jure Prægnant. Respond. Sigismundo Alupeck. Jen. 1686. habit. cap. 2. Th. 7. p. II.* his verbis: Suadent physici, ut caveat mater, ne longiusculo tempore post primum fœtum coeat, fit enim tunc, quippe utero magna ex parte ad partum usque se comprimente, ut maturato dolore primus partus intereat & posterior conceptus perfici non possit, adeoque abigatur, similis iis, quos abortus vocamus. Sin a primo conceptu secundus proxime molitus sit paululumque temporis inter eos intercesserit, quod superfœtarit mater, nasci absolvi que potest, non secus ac si gemini nascerentur. Ipse Hippocrates *de Superfœtat. Oper. Sect. I II. fol. m. 43.* inquit: Mulierem prænantem, si venerem non exerceat, partu facilius liberari. Apud Judæos certa erat secta, Essenorum dicta, quorum nemo cum uxore prænante concumbibat, ut ostenderent, quod nuptias, non voluptatis, sed liberorum causa inierint, referente

Flavio Josepho *de Bell. Judaic. Lib. II. cap. 7. pag. m. 642.*

§. 19.

Coitus ante partum.

Ad quæstionem: An maritus ab uxore tempore partui vicino debitum conjugale exigere possit? Conradus Philippus Hoffmannus *de insigniorib. Puerper. Temporib. cap. 1. §. 18. p. m. 20.* ita respondet: Canonistæ unanimiter fere in eam abeunt sententiam, conjuges mortaliter peccare, si tempore prægnantiæ venere utantur, quando verosimilis adest timor abortus; tum quod foetus periculo exponatur, tum quod ipsa prægnans periculum incurrat suæ ipsius valetudinis. Si vero nullus abortus sperandus sit, concedunt concubitus cum gravida, Alii distinguunt tempora, ita ut primo ipsius prægnantiæ tempore & postremo debitum conjugale neque exigere neque reddi debeat; in intermediis autem conjuges debitum & exigere & reddere queant; idque ex ea ratione, quod primis & postremis prægnantiæ temporibus gravida facile abortiat, non item tempore intermedio. Item ad quæstionem: se la donna gravida può congiungersi col marito senza pericolo della creatura? ita respondetur nella Commare di Scipione Mercurio *Lib. I. cap. 21. p. 127.* essendo si detto, ch'è pericolosissima cosa non contentare le donne nei loro ardenti desiderii, potremo affermare, che, se la donna gravida appetirà grandemente il congiungimento, si debbono computare i mesi della gravidanza, cioè, i primi, i mezzani, e gli ultimi; proibendo le nei primi quattro mesi la congiunzione dell'huomo: perche è di gran pericolo, e può causare morte alla creatura: Negli ultimi ancora il danno è più certo, e più grande: perche, come dice Aristotele *nel libro 7. dell' historia degli animali, al capitolo 4.* congiungendosi la donna in questi mesi, partorisce la creatura piena di mochi per difetto de' quali è facil cosa, che nasca nel ottavo mese farucciando dal ventre fatto lubrico per detti mochi. Restano dunque solo i mesi mezzani, ne' quali possa la donna accompagnarsi sicuramente con l'huomo senza pregiudicio del feto. Sed
respon-

respondet ad ea Paulus Zacchias, mulieres non omnes eadem natura quoad abortum præditas esse, quod aliæ facilius primis post conceptionem temporibus, aliæ facilius intermediis, aliæ temporibus partui vicinis, abortum faciant, ita ut simpliciter loquendo prægnantia, nisi aliunde timor adsit rationabilis, neque exactiorem, neque redditionem debiti impediatur, modo major, quoad usus veneris, cautela adhibeatur in prægnantia, quam extra eam, in primis cum a medicis mulieribus prægnantibus concubitus in extremis mensibus concedatur, ob id, quod partum faciliorem reddere existiment. Aliud quoque periculum imminere volunt quidam ex coitu cum gravida, superfoetandi nimirum & molam gerendi. Sed cum tum superfoetatio, tum molæ generatio res rara sit, inde nec ob hæc pericula concubitus cum prægnantibus dissuadendus. vid. etiam Mich. Albert. *Jurisprud. med. cap. 4. §. 6. p. 82.* item Spermatolog. nostr. *cap. 5. §. 73. p. 313 seq.* & Dionis *des Accouchem. Lib. II. cap. 4. p. 144 seq.* Conrad. Phil. Hoffmann. *de Puerp. tempor. cap. 1. §. 18. p. 20.*

§. 20.

De quæstione, an gravidarum uterus tempore gestationis incrassetur, vel propter dilatationem attenuetur, vel an simul dilatur & incrassetur, in Muliebrib. nostr. *Seçt. III. cap. 2. p. 234 seqq.* pluribus egimus. vid. etiam *Traité general des Accouchemens de M. Dionis Lib. I. chapitr. 2. p. 37 seq.*

CAPUT IX.

De gravidarum animi pathematis & imaginatione.

§. 1.

Quamvis quantum damni atque periculi gravidis inferant animi pathemata, testantur non modo observationes medicæ, sed aliæ ^{a terrore} ~~abortus.~~ quoque historiæ. Julia enim, Cæsaris filia, cum ædilitiis comitiis Pompeji Magni, conjugis sui, vestem cruore respersam e campo

domum relata vidisset, territa metu, ne qua ei vis esset allata, exanimis concidit, partumque, quem utero conceptum habebat, subita animi consternatione & gravi dolore corporis ejicere coacta est; atque ita exspiravit, magno quidem cum totius terrarum orbis detrimento. vid. Valer. Maxim. *Lib. IV. cap. 6. §. 4. p. m. 324.* Quod Plutarchus in vita Pompeji sic tradit: Comitibus ædilibus cum manus quidam conseruissent, & circa Pompejum multi cecidissent, cruore cæforum perfusus vestes mutavit, & cum multus fervorum tumultus ad ædes ejus fieret, inter ferendum vestes puella prægnans visa cruenta toga concidit, nec multo post abortivum enixa, periit. De Marci Varronis uxore sequentia narrat Marcus Aurelius *nell' Horologio de' Prencipi Lib. II. cap. 15. p. m. 23. b. seq.* dove narra i casi sfortunati, che avvennero a donne gravide: nella seconda guerra Africana erano capitani Paolo Emilio & Marco Varrone due consoli; di questi Paolo Emilio fù ammazzato, Marco Varrone vinto, & Annibale rimase nel campo vittorioso. Publio Varrone poco avanti, che andasse alla guerra, s'hauea accasato con una Romana bella & giouane, nomata Sofia, laqual rimase gravida di sette mesi, & quando udi, che Paolo Emilio era morto & suo marito superato, subito cade morta rimanendole la creatura viva nel corpo &c. Ejusmodi exempla alibi in capite de Abortu plura reperies. Gravidis insuper obesse solet repentinus terror, qualis quandoque ex inexpectato exortis incendiis, fulgure, tonitru, rixis, tristi nuncio, monstrosis hominum bestiarumve aspectibus, & similibus inopinatis, concipitur.

§. 2.

*pictura vi-
sanda.*

A picturarum quoque, tam elegantium, quam turpium, aspectu gravidarum phantasiæ facillime diversæ imprimi possunt figuræ, a quibus etiam ipsi foetus, materno utero adhuc inclusi, secundum Marc. Gerbez. *Intricat. extric. Part. II. cap. 20. p. 449.* facile simili forma figurantur. Quid autem hoc in passu moliatur mulieris imaginatio, monstrat Levinus Lemnius *de occult. Natur.*

Mirac.

Mirac. Lib. I. cap. 4. p. m. 14 seq. Si quid, inquiens, illa animo concipiat, aut in obvia quæque inconniventes defigat oculos, menti-que imprimat, ea plerumque infans in extrema parte repræsentat. Sic inter amplexus & suavia si mulier oculos ac cogitationem in viri vultum dirigat, aut quem alium præsentem imaginatur, huius effigies in foetu solet elucere. Ea enim est imaginariæ facultatis vis & potentia, ubi mulier fixius quid intuetur, ut simile quiddam conspectis emoliat, adeo ut infanti varias rerum formas induci contingat, ac nævos, lentigines, lituras verrucasque imprimi, quæ non facile elui possunt, aut emaculari. Sic nostrates matronæ ex leporis obtutu infantes edunt labello supremo bifido & bifurcatim dissecto. Simili ratione nonnulli simis existunt repandisque naribus, ore distorto, labris indecore prominentibus, totoque corporis habitu deformi, quod mulier conceptus ac gestationis tempore, oculis totaque mente ac cogitatione in monstrosas quasdam species fuerit defixa. Tale quiddam etiam in reliquis animantibus elaborare solent naturæ artifices, objectis sub ipso conceptus momento variarum rerum coloribus. Quo strategemate astuque usus Jacobus *Genes. cap. 30. v. 37 seq.* passim stratis objectisque virgultis, quibus cortices ademerat, maximam gregis partem, cum se inirent, maculoso tegmine varioque ac verficolori vellere præstitit, de quo vide Remig. *Dæmonolatr. Lib. I. cap. 6. p. 68 seq.* Sic picturatas alites, sic canes equosque scatulatos ac guttatos perficimus. Et *pag. 21.* inquit allegatus Lemnius: vehemens fixaque cogitatio dum rerum species vehementes movet atque identidem versat, formam figuramque, quam assidua imaginatione revolvit, foetui imprimit atque illi rei cogitatæ figuram inducit. Spiritus enim interni atque humorum affluentia rei excogitatæ pingit formatque imaginem. Nec vero temere aut ex nulla causa est, quod nonnulli enormi sint corpore, aspectu torvo atque inamœno, protuberantibus inflatisque buccis, ore distorto rictuque indecenti, cum hæc eo eveniant, quod gra-

gravidæ hujusmodi spectra ac simulacra cogitatione menteque conceperint, aut oculis intentius in illa fuerint defixæ: Sic nihil mihi æque improbari solet apud lasciviores mulierculas, quam quod catellis simiisque sese impensius oblectant, quodque illos sinu gestant, foveant, demulcent, basiant, blandeque contrectant. Horum enim consuetudine & aspectu natura feminarum imperfecta, nescio quid alienæ formæ animo menteque concipiat, ac fœtui inamabilem minusque speciosum vultum affingat &c. Quade causa etiam inhumanus ille quarundam muliercularum mos, quo catellos caniculosve tota quasi die in manibus gestant, exosculantur, & aliquid quasi lascivæ familiaritatis cum ipsis habent, Marco Gerbezio *Intric. extric. med. Part. II. cap. 20. p. 450.* reformatus videtur.

§. 3.

*Phantasia
operatio.*

De tali prægnantium phantasia ita sentit Hieronymus Fracastorius *de Sympath. & Antipath. cap. 23. Oper. Part. prior. cap. 23. p. 92.* sicuti in veneris appetitu facto intenditur virga, suggerente anima plurimum spiritus, & dolente membro calor & sanguis concurrat: ad quæ si recte respiciamus, impossibile non existimabimus, quod de prægnantibus dicitur, remanere scilicet in fœtu signa quorundam, quæ ipsæ avidissime appetivere: siquidem facta ingenti quadam phantasia & appetitu quorundam, anima ex iis, quæ in corpore sunt, proportionate aliquid movet præcipue in sanguine, ex quo cum nutriatur fœtus, nihil prohibet, signa quædam ejus alimenti ita affecti in eo remanere, præsertim coloris, propter quod ea signa rubentia fere omnia sunt, & exustionem aliquam in sanguine factam ostendentia: fortasse autem & figura cupitæ rei ostenditur, quod in eo proportionali anima etiam figuram mentiat.

§. 4.

*a gravidarum
phantasia navi.*

Posse autem gravidæ mulieris imaginationem fœtui adhuc in utero detento per pathemata non modo varios nævos & appetitus

titus infigere, sed stupendos quoque effectus producere, imo fœtum in alienam plane speciem mutare, sequentia ab autoribus annotata quandoque fere incredibilia testantur exempla, absque ordine a nobis recensenda. A denegatis scilicet picantium & gravidarum mulierum appetitui cibis & aliis ejusmodi desideratis rebus, nævos sic dictos maternos, stigmata & varias fructuum excrecentias infantibus utero adhuc inclusis per matris impressionem imprimis, in Chylolog. nostr. *cap. 11. de Pic. & Malac.* multis exemplis probavimus, dantur tamen adhuc plurima ejusmodi macularum vel præternaturalium conformationum exempla, ab aliis causis, v.g. a terrore, vel alia gravidarum phantasia dependentia.

§. 5.

Nævos fragiformes in capite habuit Johannes Helwigius, de quibus sequentia refert *Obs. 35. p. 125.* Ego ab infantia hucusque in capillitii parte sinistra nævos seu notas gero trium fragorum, quæ quotannis mense Martio, quando fragaria florescere solet, rubescere quoque incipiunt; postmodum paulatim sese attollunt, usque ad Junium, fragorum fructus repræsentantes cum leni pruritu; denique in granula parva alba generantia sponte decidunt, cutis spatium glabro & sine pilis manente. Et cum adolescens scabie fœda corriperer cutis capitis insigniter intumescebat, cætera cutis divellebatur, cum effluxu humoris ferofi fœtidi, usque dum tumor sponte subsederit; unde nævum hunc a natura per cutem & capillitium ossi bregmati alte infixum esse conjicio. Ortum autem suum habere, e matre ipsamet sæpius audieram, ex imaginatione, cum ipsi gravidæ fraga in foro avide spectanti illorum comestio negaretur. Johannes Valentinus Willius condiscipulum Mompelgardi habuit, cui tuberculum fragiforme in humero enatum erat, Junio mense semper tumidius ac alias, quod matris desiderio ipse acceptum ferebat. vid. Thom. Bartholin. *Act. Hafniens. Vol. III. cas. 83. p. 152.* Viennæ mulier quædam gravis pridiæ ante partum summo fraga comedendi desiderio flagrans,

Fragum.

grans, fuit tandem compos facta voti die subsequenti felicissime foetum enixa est, cujus dorsum fragis integris & recentibus conspersum visum est, cum maxima circumstantium admiratione, secundum relationem Tobiaë Czaſchelii *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 268 p. 483.*

§. 6.

Ceraſum.

Honeſta quædam matrona Bernenſis puellum peperit, qui in medio naſi maculam aut potius tuberculum rubicundum, ſed parvum ad inſtar lentis habebat, & quidem ex imaginatione matris, quæ dum utero geſtaret, ceraſa aſpice, ſed fruſtra appetierat. Non diu poſt, creſcente puero macula illa in tuberculum (quod molle & flaccidum erat) quoque excrevit, & ceraſum per medium diſciſſum & naſo appoſitum præ ſe ferebat, teſte Guilhelmo Fabricio Hildano *Obs. Chirurg. Cent. V. Obs. 46. Oper. fol. m. 432. vid. etiam Cent. VI. Obs. 66. f. 580.* Ceraſum in viro ceraſorum tempore rubeſcens obſervavit Petrus Borellus *Hiſtor. med. phyſ. Cent. III Obs. 49. p. 236.* Nævus fragis vel ceraſis ſimiles, tempore verno, cum ejusmodi fructus matureſcunt, quotannis etiam rubicundiores fieri & matureſcere, ſæpius ſe obſervaffe dicit Carolus Joſephus Myllerus *M. N. C. Dec. II. An. 7. Obs. 225. p. 429.* Mater foetui ceraſi notam impreſſerat, qui virideſcebat, flaveſcebat, rubeſcebat quotannis, iisdem ſtationibus, quibus ceraſa arborum; & compertum eſt, aliquem has viciffitudines colorum in Belgio paſſum, in Majo & Junio; in Hiſpania vero eaſdem in Martio & Aprili; rurſumque in patriam redientem Majo & Junio; juxta verba Aloyſi Temmik *Philoph. ver. Anim. Mund. p. m. 638.*

§. 7.

Morum.

Pueri cujuſdam coxæ dextræ rubi Idæi ſatis grande & protuberans morum implantaverat matris phantaſia, ob denegatam ſcilicet mororum illorum aſpice concupitorum ſufficientem eſum, eo quod vermiculum in ſpiram, inſtar ſerpentis contortum, inter illa reperiens, anguis eſſe pullum putans deterrita ſimulque

mulque indignata coxam suam dextra percusserat, juxta observationem Gustavi Casimiri Gahrlied *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 46. p. 90.* Mulierem quandam cum sub moro versaretur, & mora plura in ipsam deciderent, filiam genuisse, quæ in iis corporis partibus, in quas in matre mora deciderant, verrucas instar mororum habuit, refert Daniel Sennertus *de Consens. Chym. & Aristol. cap. 14. p. 236.* Novit etiam Jacobus Gaffarellus aliquem, cujus fronti, ex impedito & denegato matris appetitu, impressum erat morum. Is, quoties edebat mora, suram convulsione insolita lædi animadvertibat. Item nota Parisiis mulier in labro inferiori morum similiter habebat, quod cætera quidem anni parte carni æquale erat, at mororum tempore ingruente, paullatim attollebatur & rubescebat, donec eandem cum naturalibus magnitudinem & colorem adipisceretur. vid. Jacob. Gaffarell. *Curiosit. in audit. Part. II. cap. 5. p. m. 101.* Petrus Borellus morum nigrum in fœmore, ut mater ipsius in brachio, habebat, quod etiam mororum tempore augebatur, uti ipse *Obs. med. Cent. III. Obs. 49. p. m. 236.* meminit. Ex imaginatione matris gravidæ puella Massiliensis, sedecim annorum, in fronte maculam gestavit. Morum, quod veris initio, dum ejus speciei arbores germinarunt, intumuit, virescens primum, post rubescens & nigrescens maturo fructu. v. Phil. Jacob. Sachs. *Gammærolog. p. 214.* Sequentem observationem in Kenelmi Dygbi tractatu Germanico, de Sympath. p. m. 75 seq. his verbis legimus: *Eine hohe Weibes-Person hat auf ihrem Halse die Figur einer Maulbeeren so eigentlich, als sie ein Mahler oder Bildhauer lebhafter nicht könnte ausbilden. Denn sie hat nicht allein die Farbe, sondern auch die Græsse, gehet auch über das Fleisch heraus, als wenn sie ausgehauen wäre. Dieser Weibes-Person Frau Mutter, als sie hohes Leibes, bekam Lust zu Maulbeeren, und indem ihre Einbildung damit so hefftig erfüllet, daß, als erstenmahls sie deren ansichtig wurde, ihr ungefehr eine auf den Hals fiel; Man eilete mit Fleiß den Maulbeersafft abzuwischen, sie spürete dazumahl im geringsten nichts; aber das*

Kind, so baldes zur Welt gebohren, brachte eine Figur einer Maulbeeren auf seinem Halse, eben an diesem Orte, dahin die Maulbeere auf ihrer Frau Mutter Hals gefallen war; Und alle Fahrzeit, wenn die Maulbeere zeitig, geschwillet sie, und diese Eindrückung oder vielmehr Auswachsung vergræßert sich, machet Fücken und entzündet sich. Mori fructum in amici æstumatissimi gena dextra, tempore mororum satis magnum, postea vero iterum decrefcentem quotannis observare licebat.

§. 8.

Prunum.

Mulier quædam gravida a pruno, in horto ex arbore super axillam actutum decidente, perterrefacta filiolam pruni effigie prope axillam dextram signatam peperit, teste Ehrenfrido Hagendornio *Hist. med. phys. Cent. III. Hist. 54. p. m. 353.* In fratris sui brachio sinistro nævum, figura, magnitudine & colore prunum Damascenum simulantem observavit Johannes Helwigius *Obs. 35. Schol. p. 126.* Et Guilhelmus Fabricius Hild. *Obs. chirurg. Cent. V. Obs. 46. p. m. 306.* in puella octo circiter annorum ætatis excrescentiam ad instar pruni in utero matris contractam in medio fronte excidit.

§. 9.

varia.

Filiola cujusdam fabri cultrarii ob denegatam matri prægnanti baccarum illarum, *Preusselbeere* nostratibus dictarum, esum, in nasi apice caractere talismodi baccæ sigillata videbatur, juxta Ehrenfrid. Hagendorn. *l. a.* Recens ribesium auri in utero impactum communicat Christianus Franciscus Paullini *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 185. p. 351.* inquires: Cum adhuc sub corde suo me gestaret dilectissima mater (scribit in Observationibus suis, Israel Schmid, Prussus) pridie ante partum, circa crepusculum, in horto ambulans, ribesia ambabus ingessit manibus, quorum unum integrum adhuc sinistræ auri meæ firmiter impactum in lucem protulit. Lentescens rustica quædam gravida vesperi maximo appetitu comederat, die sequenti horis matutinis foetum lentes in ore haben-

habentem pariens, secundum observationem Christiani Francisci Paullini *Philosoph. Feyerabend cap. 66. p. 649.* Refert etiam Petrus Borellus *l.c.* se in gena viri uvæ figuram, soleæ marinæ etiam cum squamis suis figuram in tempore sinistro; Tulipam in fœmore vidisse: Habuit etiam Borellus amicum, qui florum fertum cum vitta in cute puellæ vidit; in alia caryophyllum florem cum majorana. Et ipsius Borelli soror lentes circa cordis regionem habuit. Ex sequiori sexu multas in pectore, aut collo aut brachiis, ceraforum, pisorum, fragorum, ribesiorum, foliorum, avellanarum & vulnerum quoque hiantium effigiem habentes, se novisse, inquit Georgius Hieronymus Velschius *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 38. p. 61.* quo loco etiam de cicere in facie Marci Tullii Ciceronis, a quo nomen accipit, pluribus agit, curque in statuis nummisque antiquis plerisque hoc cicer non cernatur, quid causæ sit, indagat. De hoc cicere inquit Cornelius Stalpart van der Wiel *Obs. rar. Cent. post. Obs. 36. Sch. p. 380.* E. Tulliis qui fuerunt Arpini potissimum Cicerones sunt appellati, quod auctor illorum nescio quid in naso, quod ciceris formam referret, habuisse dicatur, ut Plutarchus scribit, quamquam Plinius ita dictos putat, quod genus hoc leguminis optime fererent.

§. 10.

Tumorem rapiformem fœtui in vulva enatum, ob rapam prægnanti matri improvide denegatam annotavit Nicolaus Tulpus *Obs. med. Lib. III. cap. 30. p. m. 243.* scilicet dictæ repulsæ ergo lumbos suos ubi percussit mulier animi impotens, læsit tantopere tenellum fœtus sui corpusculum, ut inde in lumbis enata sit ipsi insignis rapa; quam angustiori pediculo innixam, quo auferret chirurgus, constrinxit eam arctissimo filo, deinde satagens emortuam scalpello excidere. Verum antequam res eo devenit, emoriebatur infans. vid. etiam infra de Tumoribus.

Rapa.

§. 11.

Filiolæ medici cujusdam Hagienſis corpus prominentibus

Ficus.

latisque maculis colore ficuum maturarum, cum prodiret, hic illic obsessum vidit Cornelius Stalpart van der Wiel, vid. *l. a. p. 379.* quas maculas, quia continue accrescebant, ipse per lixiviosa alcalia auferre statuit, molesta tamen admodum fuit hæc curatio. Duas filiolas, quarum altera in genu dextro ficum, altera in dextra mammilla hepatis parenchyma habuit (quod utrumque ab appetitu imaginario dependebat) Manhemii vidit Johannes Daniel Geyerus. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 235. p. 459.*

§. 12.

Pomum.

Sequentem observationem de cognata sua retulit Marcus Marci: Mater focus meæ, inquiens, gravida una cum marito arborem præteribat, pomis agrestibus onustam, quæ specie illius fructus jam maturi & suaviter rubentis illecta avellere nitebatur, irritato conatu fronde effugiente præsentem manum. Et cum a marito impediretur, ne noxam inferret, mœrori se dedit, totoque itinere pomum cupitum animo volutavit: nec minuebatur appetitus, licet alia poma maritus afferret, agrestia saltem illa desiderabat. Soluta partu prolem in lucem edidit cum notis manifestis illius pomi, quod ex mala infantuli suo petiolo dependebat, cum eoque crescente pariter sumebat incrementum figura & colore prorsus pomo assimilatum. Et licet adhibitis ligaturis ex arte petiolo inarescente postea deciderit, vestigium tamen & cicatrix, quo loco carni adhæserat, semper remansit. vid. Philipp. Jacob. Sachs. *Schol. in M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 61. p. 119.* vid. etiam Laurent. Strauß. *de Fæt. Mussipont. p. 6.*

§. 13.

*Malum Pun-
icum.*

Mulier satis formosa maculam mali Punici in clune dextera ob matris malaciam habebat, quæ, dum florent balauſtia, rubeſcebat: dum fructus ad maturitatem pervenerint, flavescebat, cum quibusdam granis miræ rubedinis, ita ut imaginem aperti mali Punici præ se ferret: hyberno tempore evanescebat, ita ut nullum ipsius vestigium appareret, donec redeunte vere florentibus

bus balauftiis denuo quoquo anno rubesceret, juxta Dominic. Panarol. *Observ. medicin. Pentec. I. Obs. 12. p. 7 seq.*

§. 14.

Alia mulier pridie ante partum laborabat desiderio oleris, quod postquam comedisset, postero die peperit prolem, cujus vertex erat tectus frustulis concisi oleris, uti ex Arnolando Senguerdo recenset Tobias Czascheli *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 268 p. 483.*

Oleris.

§. 15.

Instanti partu mulier quædam farinæ triticeæ appetitu cruciabatur; quam cum ingessisset, post semihoram prodit infans, clausis pugnis referens farinam siccam, similem illi, quam mater antea ingesserat, vid. *ibid. p. 484.*

Farina.

§. 16.

Timandra Britomandis regis Galliæ conjux cum secundo ventrem ferret, & pedes in agros spatiaretur, subito timore perterrita ad turbinis sonum, qui ingentis campi messem cedentibus spicis percurrerat, filiolum edidit Astioristen, paulo infra cervicis exitum & in crure dextro maculam, tanquam spicæ figuram ardenti purpura expressam habentem, uti ex Barclajo refert Petrus Müllerus *Disput. de Jure Prægnant. §. 13. p. 15 seq.*

Spica.

§. 17.

Uvæ figuram in gena viri vidit Petrus Borellus, & soleæ marinæ cum squamis suis figuram in tempore sinistro, item tulipam in foemore. Alius florum sertum cum vitta in cute puellæ vidit, in alia caryophyllum florem cum majorana. v. Petr. Borell. *Cent. III. Obs. 49. p. 236.*

Uva.

§. 18.

De puero rosato sequentem observationem refert Zacutus Lusitanus *de Prax. med. admir. Lib. II. Obs. 242. Oper. Tom. III. fol. m. 76.* Gravida septimestris rosarum virentium esum duobus diebus omni conatu affectat, tempore quo rosæ non germinabant. Multo labore illarum ramus in privato hortulo inventus. Illa

Rosa.

avidebinarum non explicatarum adhuc folia mandit, alia in sinu reservat. Nono mense peperit feliciter infantem candidissimum, cui in costis tria stigmata rosarum valde purpurea apparebant, in fronte & facie utraque rosarum trium imago puniceo colore infecta erat depicta, quare a vulgaribus puer rosatus vocabatur. Rosam in mamma annotavit Christianus Franciscus Paullini in honesta & formosa femina, tunc octodecim annorum & primum gravida. Hæc in pergula circa vesperam æstate sola sedens forte obdormiverat, cumque e symposio veniens maritus dormientem videret dilectam suam, furtim & suspenso gradu accedens joci ergo rosam rubram inter mammas, more sequioris sexus, pendentem lenta manu protraxit. Ipsa vero expergefacta & territa cœpit vociferari. Quam ut demulceret, nudis protractis mammis eam rosam, amplexus & oscula inter, crebrius affricat, tandem in locum suum reponit. Tertio abhinc mense parit puellam, in cujus læva mammilla manifesta elegantis rosæ delineamenta, sed pallidiora, quæ vero circa annos pubertatis saturatius rubuere, nunquam tamen magis & floridius, quam Majo, si cæteræ in hortis florerent rosæ, & tunc ab ebulliente ac acriore sanguine molestum aliquando sensit pruritum. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 6. Append. p. 42.* Ancilla quædam gravida rosarum plures in sinu gestare gaudebat, & illarum odore maxime delectabatur; post menses tres filium peperit in maxilla insignem rosam habentem, quæ singulis annis mense Majo conspicue magis repullulabat, attollebatur, rubore suffundebatur ac dolebat; quod per plures annos observasse se scribit Casparus a Reies *Elys. jucund. Quæst. Camp. Quæst. 50. §. 36. p. 640.*

Passula.

Cum baronis cujusdam uxor pridiana vespera jusculum avenaceum passulis minoribus maximo cum appetitu avide comedisset, postridie foetum peperit illis ipsissimis passulis toto corpore oblitum; quarum adspectu cum obstetrix primo intuitu

maxi-

maxime territa, variolosum ex ipso utero materno infantem suscepisse autumans, & quid de iis agendum subdubitans, tandem eas ungue tentasset, illas ipsas esse passulas priores assumptas, jussulo adhuc suo aliquatenus imbutas deprehendit easque postmodum omnes lavacro sustulit, notante Gustavo Casimiro Garliep. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 88.*

§. 20.

Idem autor *l. a.* de lactuca sequentem refert observationem: *Lactuca.* Batavi cujusdam uxor partui jamjam vicina appetitu urgebatur lactucæ comedendæ valde intempestivo, adulta jam bruma, cum ejus nullibi fere daretur copia. Commode tandem vir in memoriam revocavit hortum aliquem splendidum ejusque hortulanum valde curiosum, leuca integra a suo domicilio diffitum: Ut igitur uxoris suæ desiderio satisfaceret, (uti sunt hac in parte Batavi valde religiosi, nec facile appetitui prægnantium quicquam denegant) pedestri se itinere illuc ocyus contulit, & utut difficulter admodum ab hortulano tantum lactucæ obtinuit, ut patinam mediocrem implere posset; domum itaque festinans pro lubitu sibi parandam illam obtulit uxori, quæ quantocyus præparatam cupide devoravit omnem, vixque elapso bihorio infantem peperit, ipsissima illa lactuca undiquaque stipatum. Risu cum a nonnullis exciperetur relatio, sanctissime contestatus est relator, rem revera ita contigisse.

§. 21.

Femina quædam gravida cum sociabus aliquot in calidum descenderat balneum, arte a se paratum. In quo cum consideret, alia junior & petulantior cæteris suspenso gradu a tergo furtim accedit, nilque minus talia cogitanti recentem fungum subflavum, ad arborem in horto decerptum nudæ lævæque mammæ fortiter & crebrius affricat ac apprimit. Ipsa perterrita & excandescens jocum egregia compensat alapa. Tandem partus tempore prodit

diit puella, e cujus læva mammilla elegans fungi figura enata. vid. Chr. Franc. Paullin. *de Talp. Sect. I. cap. 3. pag. m. 97 seq.*

§. 22.

*Brassica &
caput vitu-
linum.*

Puella quædam in hypochondriis ostendens binos nævos maternos, quorum dexter caput vitulinum, sinister vero brassicam capitatam una cum foliorum venulis exacte referebat, nec brassicam capitatam integram coctam, nec caput vitulinum coctum conspiciere valebat, ita quidem, ut si ad id cogeretur, in animi deliquium ac syncopen incideret, observante Georgio Sebastiano Jungio *M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 135. p. 299.*

§. 23.

Umbra.

Primogenitus Gustavi Casimiri Garliep filius e secundo matrimonio, nævum, umbræ similem, in alvo prope umbilicum gestavit fuscum, digitum fere longum, acsi penicillo, umbræ colore diluto, tincta esset cutis, eumque occasione aranei, qui uxoris, sub crepusculo cum marito in horto spatiantis, ante vultum sese celeriter demiserat, quem illa, ignara, quid rei fuerit, manu abactura forte fortuna ventrem a foetu turgentem leviter tetigerat, indicio manifesto, fugacem illum sub crepusculo aranei transitum celerem & improvisum, confusam hanc umbræ tantum ideam menti maternæ circa foetus formationem occupatæ imposuisse, juxta ipsius Garliep verba *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 90.*

§. 24.

Imago crucifixi.

De imagine crucifixi pectori impressa sequentem observationem annotavit Alexander de Insul. Monachor. Anno 1188. devotissima mulier, ubi stabat, ibat, sedebat vel cubabat, ibi imaginem crucifixi habebat appictam, seu adfixam aut positam. Diu noctuque inter ubera ejus pendebat, ceu fasciculus myrrhæ, ut canticum ait, ut nunquam non piis suspiriis Jesu crucifixi meminisset. Nunquam præteriit aut adspexit talem imagunculam, nisi

ut

ut ad os & pectus premeret. Pariebat demum filium primogenitum, ipsi Deo in utero sacratum, qui elegantissimam Jesu crucifixi imaginem pectori habebat impressam, sanguineis lineolis, vel potius arteriolis artificiosissime distinctam. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 4. App. p. 209 seq.*

§. 25.

Feminæ cuidam utero gerenti, cum alterius feminæ sanguinem in venæsectione instituta exsurgentem pelvi excipere vellet, *Macula sanguinea.* guttulæ aliquot sanguinis in brachium inciderunt. Hinc perterrita digitos sub nasum posuit. Puella nata nævum instar guttulæ sanguinis isto in loco postea habebat. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Adversar. curios. Obs. 9. p. 24.* Uxor Lusitani cujusdam cum videret fratrem ictu fauciatum & cruore perfusum, manum utero gerens faciei adhibuit & enixa est filium maculam sanguinis in facie gerentem, uti ex Petri a Castro *Observat. med. MSS.* refert Philippus Jacobus Sachs *M. N. C. Dec. I. An. 1. Obs. 135. pag. 301.* quo loco addit, hanc maculam fuisse curatam, quod puer posthumus in infantem per triduum tempore matutino anhelitum tacense efflasset. Feminam vestigia quinque digitorum manu expansæ colore sanguinea in vultu repræsentasse, quod mater gravisda feli, cauda præcisa sanguinolentæ, improvise occurrerat, atque perterrita vultum manu expansa obtexerat. vid. Joh. Helwig. *Obs. med. 35. Schol. p. 126.* In fœtu quodam recens nato, cujus mater *Observatio.* quinto graviditatis mense variolis laborarat, per totum corpus apparebant maculæ rubræ, quales alias a variolis remanere solent, tempore tamen disparentes, uti mihi observare licuit. Femina quædam prægnans militem a commilitone verberibus male multatum, cruenta facie sibi occurrentem, ut illatam injuriam ad vice-chiliarchum deferret, ex improvise cernens, territa spectaculo illo horrido, ne ulterius illud oculis usurparet, manu dextra totam cum utroque oculo frontem tegit. Quid sit? Paulo post partu filium excludit, cujus frons tota una cum oculorum palpe-

Observatio.

bris, quousque faciem manus tetigerat, nævo sanguinei coloris foedata erat, qui tamen successu temporis, illo adolescente, paulatim disparuit. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 90.* Maculas duas rubras, instar sanguinis guttularum, alteram in superiori palpebra dextra, alteram prope ejusdem oculi canthum externum, in bibliopolæ Dresdensis filiolo unius & dimidii anni hodie mihi cernere licuit, postquam ipsius mater gravida Tœplizii filioli Judaici circumcisioni interfuerat, inque tali actu aliquot sanguinis guttas ex parte discissa in operatoris faciem exsilierant, unde ipsa territa eundem palpebræ & oculi locum signatum duobis digitis attigerat.

§. 26.

Flammæus color.

Conjux Simonis Schulzii circa initium noni mensis prægnans, sana & vegeta, inter coenam inopinato metu percellitur, audito signo campanæ incendium in urbe indicantis; a quo temporis momento male habere cœpit, motumque infantis per triduum nullum sensit, sequentibus vero diebus admodum debilem; tandem filiolum perfectum, sed post baptismum tantum bihorium viventem in lucem edidit, cujus totum sinistrum latus a capite usque ad calcem colore flammeo conspiciendum erat; uti de propria uxore refert dictus Schulzius *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 83. pag. 158.* Pastorem vidit Johannes Nicolaus Pechlinus, cujus toto pectore & vultu sparsæ rubræ striatæque maculæ, ignis flamman-
tis instar miram conciliabant foeditatem, territa ad conspectum furentis incendii gravida matre, quod aliæ feminæ notaverant, pectus visumque manibus demulcente, translata adeoque in certam & solidam partem imagine optica. Hujus ipsius viri conspectus alii gravidæ horrorem incusserat, qui idem etiam in infantem, sed debilioribus notis minusque distinctis, transiverat. v. Joh. Nicol. Pechlin. *Obs. med. phys. Lib. III. cap. 15. p. 430.* Anno 1672. nupta est Thorunii Scoto cuidam in vicinia habitanti virgo e Scotticis quoque parentibus orta, cujus sinistræ manus dorsum fere totum

totum rutilus occupavit color, a matre gravida, incandium subito ortum advertente, atque ex terrore sinistram suam contrectante, ei impressus; referente Georgio Segero *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 197. p. 371 seq.* Bibliopolæ cujusdam Gorlicensis filia mentum rubicundo tinctum colore ad mortem usque circumferebat, teste Ehrenfrido Hagendornio *Histor. med. phys. Cent. III. Hist. 54. p. 353.* Coriarii Hafniensis uxor post obsidionem urbis stigmate notatum infantem peperit, quod imputabat injuriis obsidionis. Crebris enim tormentorum bombis auditis visisque globulis ignitis per urbem obsessam volitantibus territam se similes globulos infanti suo impressisse querebatur. Item alium filium peperit, qui a primo nativitatis die in ossis sacri regione tuberculum gestabat, quod postea excrescebat, ut capitis magnitudinem æquaret atque incessum, ob nimium pondus, difficilem redderet; Figura hujus tumoris erat globosa. v. Th. Bartholin. *Epist. med. Cent. III. Epist. 40. p. 152.* Gießæ matrona gravida propter incendium perterrefacta post triduum infantem, sed undique maculis igneis contaminatum edidit; uti ex communicatione Gregorii Horstii refert Guilielmus Fabricius Hild. *Respons. ad Mich. Dæring. Oper. fol. m. 900.* Eodem folio meminit etiam feminæ, quæ gravida cum casu ictum bombardæ in coxam dextram, non globo, sed charta madefacta & dentibus masticata reciperet, protinus doloribus partus correpta fuit, & aqua, quæ foetum comitari solet, paulo post effluxit. Sequenti die foetum non tantum mortuum, verum etiam nigrum, quasi pulvere tormentario infectus fuisset, edidit.

§. 27.

Sequentes casus recenset Johannes Nicolaus Pechlinus *Obs. Signum di- med. phys. Lib. III. Obs. 15. p. 429 seq.* nota, inquiens, mihi est femi- gitorum. na Gallica culta ac morata, quæ, cum gravida esset, diris excruciabatur dentium doloribus, quibus domandis cum nulla sufficerent pharmaca, manum requirit chirurgi, quæ dentem evellat. Ille ergo, dum maxillam in omnes tentat partes, tandem imposi-

to, quod putabat, in ægrum dentem forcipe, alium & vicinum corripit, tenet, lancinat, & male obnoxium vi quanta maxima effringit, nihil moratus feminæ lamenta; effractum dentem protinus ei objicit in materiam gaudii: verum illa, ob sani dentis jacturam doloremque immensum, continuo manum maxillæ admovet resque imprimis digitos ad leniendum dolorem fortius impingit, donec sedato nonnihil dolore & ipsa manum remitteret. Expectat interim post quatuor menses partum, quem & justo & favente Lucina enititur sanum quidem, sed nota ideaque trium digitorum impressorum in eadem illa mala, qua dolor fuerat, signatum, corrupta non leviter oris gratia. Dictinævi etiam cum Junæ deliquiis & incrementis mirifice mutabantur; nunc majores, nunc minores, nunc levius, nunc saturatius tincti.

§. 28.

Verberum. Piscatoris cujusdam uxor semper, maxime graviditatis tempore, male a viro nequam multata infantes peperit ad unum omnes, signis illis stigmatibusque in ipsis locis foedatos, quibus verbera acceperat gravida, nunc levius, nunc altius impressa. Et vero unus infantum nascendo perierat, quod, qui matris collum fugillaverat fustis, embryonis medium plane divisisset, manifesto documento, verbera, quæ mater cervicis superficie immediate acceperat toleraveratque, tenello embryonis corpori, quamvis per refractionem, fortius tamen & periculosius impacta fuisse.

§. 29.

Virgarum ictus. Scortum quoddam publicum, quod magistratus minime gravidum (quemadmodum jactaverat) putabat virgis cædebatur. Verum post paucas septimanas abortiebat gemellos, ictus virgarum in dorso referentes, uti ex autopsia refert Philippus Salmuth *Observ. medic. Cent. II. Obs. 14. p. 65 seq.*

§. 30.

Lardum. In gena virginis cujusdam dextra nævum, frustum lardi simulantem, se observasse scribit Johannes Helwigius *Obs. 35 Schol. p. 126.*

§. 31. In

§. 31.

In puellæ cujusdam recens natæ mamma sinistra nævus appa- Figura
equi.
rebat subruber, pilosus, equum tam accurate repræsentans, ut
caput, pedes caudaque discerni potuerint. Causam inquirenti
Carolo Josepho Myllero facta est mater hanc, se cum Lucernam
profectura sub crepusculum iter fecisset, in equum in via jacen-
tem incidisse, qui derepente surgens eam (cum illum ob ingruen-
tes noctis tenebras dignoscere non potuerit) tanto terrore per-
culsit, ut dextra pectori admota attonita quasi staret, donec equo
agnito semet recolligeret. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 7. Observ. 225.*
pag. 428.

§. 32.

Femina quædam nobilis in Anglia, Kenelmo Digby sanguine Musca nigræ.
conjuncta, solebat, uti tunc inter æquales & coætaneas suas moris
erat, nigras illas maculas, quas vulgo muscas, Gallice mouches
vocant, in facie gestare, quam consuetudinem Digby conatus illi
adimere, joco sæpe dixit, infantem, quo proxime tumeret ute-
rus, dum istarum macularum phantasiæ perpetuo obversantium
solicitudine teneretur, cum istiusmodi nota impressa fronti na-
sciturum. Quæ cogitatio, quo tempore foetus concipiebatur,
tam alte insedit animo, ut filia, quam proxime pepererat, ita pror-
sus, ut Digby prædixerat, & illa imaginabatur, in lucem prodi-
ret. v. Kenelm. Digb. *Demonstrat. Immortalit. Anim. Tr. I. cap. 38. p.*
425. vid. etiam ejusdem Discurs. de Sympath. p. m. 91 seq.

§. 33.

Nobilissima quædam femina, cum prima vice puellam utero Aranea.
gereret, & ad mensam in conversatione aliorum sederet, ex im-
provviso aranea, a quibus multum abhorruit, per mensam repsit;
qua visa mensam statim reliquit, manum ad aliquam corporis par-
tem absconditam admovens, in qua puella nata araneam expresse
depictam gessit. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Advers. cur. Obs. 9. p.*
m. 25.

§. 34.

Gammari.

Gammari figuram in mamma observavit Christianus Franciscus Paullini: Primaria scilicet femina audiens, a marito honestum quendam virum ad prandium esse invitatum, varia in foro coemit, quæ inter & gammaros. Supervenit autem famulus nuncians: herum suum hac vice abs alio detineri, velle tamen cœnæ interesse. Sic femina gammaros in ollam coniectos & urtica recenti coniectos, interim aliud actura, in proximum cubiculum defert ibique sub lecto suo reponit. Prandio finito & marito ad publica negotia redeunte, ipsa more sueto quieti se tradit obque liberiores respirationem & intensum caniculæ æstus, tunc ἐν γαστρὶ ἔχουσα, a pectoris regione omnia vestimenta submovet, mammis partim nudis prominentibus. Interea aliquis gammarus chelis suis librum, orificio ollæ super impositum, protrudit, lectum conscendit & usque ad dextram feminae mammam lentius progreditur, cui firmiter adhæsit. Expergefacta illa & valde attonita insanum vociferatur. Advolat famula & tollit gammarum. Ipsa tandem peperit puellam, veram & accuratam gammari figuram in eadem mamma perpetuo gestantem omnesque cancos, vivos pariter & coctos, angve pejus & cane devitantem. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 5. App. p. 17 seq.*

§. 35.

Muranula.

Gravida quædam Ratisbonæ aliquando muranulas appenulas appetens, maritum, qui mercator erat, & tunc temporis ipse illas vendebat, rogavit, ut saltem unicam edendam daret, ob insignem appetitum, ne embryoni noxa accideret. Ast ille, ut non solum avarus erat, sed præterea Cappadocum portentum, indignabundus murænulam denegat, respondendo, stolidam hanc esse imaginationem, hoc tempore eas esse raras & plurimo vendi posse. Gravida in lacrymas soluta murænulas se ubique odorari testatur. Ancilla nunciat hæc hero suo, qui abortum veritus parvu-

parvulum feligit, eamque in cauda tenendo hypocauftum intrat & uxori ostendit, ejusque imaginationem & lacrymas deridet. Verum ista, ira frendens profilit a sede sua abreptamque e manu mariti murænulam in terram projicit, & pede conterit his verbis: en avare! nec ego edam, nec tu vendes. Metuunt quidem in domo omnes uxoris abortum, ob hanc excandescentiam; non tamen nocuit gravidæ; filia autem, quam legitimo tempore peperit, effigiem murænulæ habuit in planta pedis, & etiamnum habet, licet jam mater sit aliquot liberorum, annotante Johanne Adamo Gœritzio *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. X. Obs. 13. pag. 268 seq.*

§. 36,

Infantem flava cute natum annotavit Isibordus ab Amelun- *Cutis flava*
xen. Anno scilicet 1062. uxor Viti Bretstheles, Walpurgis, anno ætatis suæ vigesimo quinto tertium gravida, nescio quo inordinato appetitu ferebatur in crocum, adeo ut omnes fastidiret cibos, si non croco essent conditi. Peperit tandem lepidum puellum cujus tota cutis crocei coloris erat. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 4. App. p. 196 seq.* ubi Christianus Franciscus Paullini, simile fere exemplum ex Amato Lusitano allegat. Utrum vero hæc cutis flavedo a gravidæ matris imaginatione, an vero ab ipso croco humores & cutem tingente dependeat, dubium adhuc est.

§. 37.

Interim tamen etiam cutis ab imaginatione gravidarum co- *Color ni-*
loratur, sic, secundum Joh. de Muralt. *Clav. medic. Exercit. 6. p. 243. 8^{er}.*
Regina Galliæ aspiciens pictum Æthiopem tempore coitus, filium nigro colore præditum enixa est, quo pertinet effatum Avicennæ *Lib. I. fen. 1. doctr. 2. cap. 14.* Corpus patitur propter affectiones & imaginationes animales, ipsæ enim imprimunt res naturales, quemadmodum accidit, ut puer ei similetur, cujus forma imaginata fuit in hora coitus, & ut sit ejus color propinquus colori ejus, quem viderunt parentes, cum fiebat casus spermatis. Humores etiam in corpore existentes colorem in cute immutant: sic
fangui-

sanguinei floridam habent cutem, biliosi flavam; melancholici fuscam, & pituitosi albicantem &c. De foetu nigro a matre pulvere pyrio adusta excluso observationem hanc refert Johannes Petrus Albrecht physicus Hildesheimensis *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 13. p. 39 seq.* Ante aliquot annos hic loci sequenti modo agebatur. Deposuerat ille, qui pulveris tormentarii conficiendi apud nos munere fungitur, ejus ad ulteriorem exsiccationem obtinendam duodecim libras prope fornacem, in sellam: Vix ædibus, aliorum negotiorum causa, egressus erat, cum scintillula ex fissura fornacis profiliante dictumque pulverem incendente domus funditus & cum intenso fragore everteretur. Duobus filiis cum matre partui vicina in superiori cubiculo placido fruentibus somno hic casus exstitit funestus: Dispersis enim illorum corporibus in præterlabentem fluvium, vi fluminis suffocati necabantur; mater vero trabibus aliisque ædium partibus oppressa, misere adusta, semimortua instarque carbonis nigra extrahebatur. Admota igitur solita contra ambustionem curatione; relictisque ita viribus, ut foetus motum satis fortem subinde persentisceret, insequenti mense filiulus nigerrimus, Æthiopem credidisses, lucem aspiciebat, qui tamen vix baptismate tinctus somno consopiebatur sempiterno, ipsa matre paulo post simile fatum subeunte. Quem foetus colorem a matris imaginatione ortum fuisse, non dubito. Anno 1656. die 9. Novembris, justo pariendi tempore mulier quædam, quod Æthiopem forte occurrentem adspexisset, filium exclusit, cujus facies & brachium dextrum cum manu coloris erant nigricantis &c. vid. Job. a Meckren *Obs. med. chir. posthum. cap. 1. p. 350 seq.* Plumbini dux cum de se prægnantem concubinam crederet invitassetque ad baptismi sacra quam plurimos primarios viros, ea Æthiopem peperit coquo suo simillimum. Quapropter ridiculo habitus quæstione deprehendit veritatem. vid. Mart. Weinrich. *de Monstr. ort. cap. 17. p. 160.*

§. 38.

Penem nigrum in puello ex Æthiope genito annotavit Thomas Bartholinus *Hist. anat. Cent. IV. Hist. 5. p. 120.* Æthiops cerdo ergastulo Hafniensi detentus amore puellæ servæ accensus clanculum illam compressit. Gravida inde legitimo partus tempore enixa est prolem virilis sexus, quæ matrem universo corpore cutis candore referebat, solus vero penis paternum genus nigrore prodebat, quod oculati testes plures & viderunt & mirati sunt. Imaginationi matris id universum assignat Bartholinus, quæ partem vehementius desideratam animo fixo comprehendens ejusdem colorem foetui impressit. Et Gabriel Clauderus *M. N. C. D. II. An. 5. Obs. 190. p. 301.* sequens communicat exemplum: Æthiops, aulæ cujusdam alumnus, lasciva utitur venere cum meretrice Germana alba. Hæc tempore legitimo parit filium omnia membra album, excepto solo illo, quo virum se præstitit taurus ille in venerem ruens, nigro & patrissante. Patescit inde lascivam istam in coitu phantasiæ suæ impressisse non auream arenam, quam Ganges & Tagus transmittunt, alias ubivis gratissimam, neque delicatas culinæ & cellæ dapes, nec vestium pulchritudinem, nec Floræ delicias nec Cereris divitias, sed præ aliis omnibus impudici istius amasii sibi desideratissimum Dic cur hic. Proditum ab Heliodoro legimus, Persinam Æthiopix reginam ex Hiduste marito, pariter Æthiope, filiam suscepisse albo colore insignem, quod, cum in viri amplexibus, ex quibus gravida evasit, esset, fixis oculis intentoque animo in oppositam pulchræ Andromedæ imaginem se convertisset. Econtra narrant, Hippocratem hac causarum explicatione principem quandam mulierem, quæ alba, ex marito pariter albo, prolem Æthiopis instar nigram ob id susceperat, quod concumbens oculis obversantem Æthiopis imaginem fortiter & assidue animo comprehendisset, adulteri suspicione explicuisse. vid. Ambr. Paræi *Oper. Lib. 24. cap. 7. fol. 554.* Persinæ Æthiopix reginæ maritum Casparus Bauhinus *de Herma-*
Syllepsilogia. *Bbb b* *phrod.*

phrod. Lib. I. cap. II. p. II9. Hydaspem nominat addens, quod, cum Persina filiolum albam peperisset, inusitatum Æthiopibus colorem referentem, metuens, ne color hic ipsi adulterii crimen conciliaret, maritum infantis nati conspectum celaverit, continuo mortuam apud maritum fingens clanculum exposuerit. Cum femina Ultrajectina subito Æthiopis feminae conspectu exterrita embryoni suo male metueret coloremque transiisse plane crederet, remedium quæsit in lotionem, & hoc uno corpus ab inauspicata nigredine vindicari posse plane sibi persuasit. Dum ergo totam se manibus, qua patent, perlueret, hinc inde intervallorum, quæ in pedum manuumque digitis sunt, oblita filium peperit integrum quidem & album, sed tamen illis partibus, quas aqua non attigerat, nigredinis vestigiis pulchre imbutum. vid. Joh. Nicol. Pechlin. *Obs. med. Lib. III. Obs. 15. p. 432.* vid. etiam Joh. Swammerdam. *de Uter. fabric. in Biblioth. anatom. Part. I. f. 499.*

§. 39.

Penis albus in nigro.

In alio puello, ex Æthiope & venusta matre nato, absque dubio nigro virilitatem plane albam & alia mirabilia annotata legimus *M. N. C. Dec. II. An. 4. App. p. 208.* scilicet Alexander de Insul. Monach. inquit: An. 1183. cum Erfurto tenderem Coloniam in Ubiis, vidi in oppidulo quodam lepidum puellum ex Æthiope & venusta matre natum, in quo quatuor singularia notavi, 1) narium fere cœruleum, 2) lunæ imaginem pectori manifeste impressam, 3) in vertice pilos albos, cum cæteri essent atrii & crispuli, 4) addebant alii virilitatem ejus plane albam. Scilicet gravida mater linteamina lota amylo cœruleo (intelligit *blaue Stærcke oder Stüßels*) magis magisque cum expurgaret & nitidiora redderet, frater ejus forte superveniens clanculum, immisso in patellam amyli plenam digito, oblinuit eo narium ejus. Ex quo terrore narium istum asperferat infanti. Somnians aliquando, ac si luna magno cum fragore cœlo super pectus ejus delapsa, valde perterrita, somniumque istud semper ruminans

minans & referens, & alteram inuſſerat notam. Ob terrorem igitur, ex hoc aliisque turbulentis ſomniis ſæpe conceptum, capillos ſubinde fricabat, interdum candore eorum quaſi delectata, coram ſpeculo crebrius intuebatur, donec tertium infanti imprimetur ſignum. De quarto iudicent alii, non ego. Quibus Alexandri verbis annectit Chriſtianus Franciſcus Paullini: quam mirabilis phantaſiæ viſ, quam omnes, quotquot ſumus & erimus, curioſi nunquam digne vel commendabimus vel explicabimus.

§. 40.

Ruſtici cujuſdam filius crines varios a primis incunabulis in capite aiebat, una parte nigros, albos altera capitis parte. Matris id culpa eveniſſe confeſſione ejusdem credebatur. Fatebatur quippe illa, cum uterum gereret, ſacculum carbonum una capitis parte excepiſſe ſe, & exinde frequenti hujus rei imaginatione vexatam, teſte Thoma Bartholino *Act. Haſn. Vol. II. Obſ. 1. p. 1 ſeq.* Guſtavus Caſimirus Gahrlied filiam habuit ruſſo crine natam idque occasione viſi a matre ruſſæ e carpento inopinato proſpectantis puellæ capillitio, cum ædem ſacram quatruiduo forte ante partum adiret. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obſ. 56. p. 90.* De capillis nigris & criſpis ita ſcribit Levinus Lemnius *de Complexion. Lib. I. cap. 7. p. m. 46.* inter Belgas maritimos plurimi ſunt nigro criſpantique capillo ac cute fuſca, præſertim qui æſtivalibus ſolis ardorem perferunt, ac laboribus ſubeundis ſunt aſſueti; quanquam hæc corporum varietas in multas cauſas referri poſſit, nempe vel regionis naturam, vel alimentorum vires ac facultatem, vel denique in mulieris latentes tacitasque imaginationes, quarum viſ tanta eſt, tamque efficax, ut quæ ſub ipſo conceptus momento animo mentique obverſantur, in foetum elaborentur. Quum enim is ſexus laſcivus ſit ac ludibundus, atque oculos in obvia quæque continenter deſigat, ſit ut naturalis facultas, quæ operi formando perficiendoque inſiſtit, eo cogitationes mentisque conceptus dirigat atque aſcitiſſimam formam infanti inducat,

a parentum natura ac conditione prorsus alienam. Sic observatum est nostra & avorum memoria, quum imperator Carolus ejus nominis Quintus, ex Hispaniis in Belgium instructissima classe esset delatus, ac numerosa clientela, amploque procerum ac stipatorum apparatu has oras implevisset, mulieres, quæ passim gestabant uterum, ex crebro Hispanorum contuitu, exactis novem mensibus decursoque anni dodrante, infantes edidisse superciliis capillisque nigris ac crispis, tum colore illi nationi undique affimili; non quidem triobolares ac meritorias, quas genti fervidæ ac salaci se subjecisse credi par est, sed spectatæ probitatis atque incorruptæ pudicitiae matronas hujusmodi affectus in se suosque concepisse. Simili ratione, quum Belgis imperaret Maximilianus Cæsar ex Pannoniis, hoc est, Austriaca gente oriundus, feminæ ob Germanorum consuetudinem ac conspectum, flavis rutilisque crinibus infantes ediderunt, ac Germanis prorsus affines.

Observatio. Civis cujusdam Dresdensis machæropœi sive ensium confectoris mater paupercula, at tineæ capitis mundificatione panem quærens, tempore quodam circa talem curationem occupata simulque gravida, ob campanæ ad templum convocantis auditum sonitum nimis festinat manusque pinguedine ursina, qua pro hoc scopo uti solebat, adhuc madidas capitis sui capillis componendis atque ornandis ex improvviso admovet, hincque non solum sibi, sed filio quoque tunc temporis adhuc in utero latenti, canitiem contrahit. Imo duo quoque filii, postero tempore ab ipsa nati, pariter primis statim annis canos alere incipiebant, quorum alter, scilicet supra nominatus, hæc mihi de se suisque fratribus referebat.

S. 41.

Cornua. Anno 1573. in India orientali, in pago S. Laurenzii, infans duo magna cornua in capite gerens, natus est, uti refert Eberhardus Gockelius *Gallicin. med. pract. Consil. Cent. I. Cons. 39. p. 150.* Alias feminas legimus filios cornutos peperisse, quod Actæonis fabulam

lam in congressibus veneris essent coutemplatæ, secundum Casp. Bauhin. *de Hermaphrodit. Natur. Lib. I. cap. II. p. 120.*

§. 42.

Rerum absurdarum monstrosarumque aspectum gravidis cavendum docet Marcus Gerbezius *M. N. C. Dec. III. An. 1. Obs. 75. p. 113.* sequenti observatione: Anno 1692. Labaci mercatoris cujusdam uxor, eo quod utero gerens bacchanalium tempore larvatos forte nimis curiose contemplata fuerit, imo ipsa cum eis conversata sit, post aliquot tandem menses peperit filiolum, univ- Facies ru-
bicunda. versa, præterquam modico frontis & menti spaciolo, facie adeo rubicundam, ut minio tinctam crederes. Quamvis id alii alterius cujuspiam feminæ media facie taliter coloratæ atque a dicta matre gestationis tempore aliquoties in platea cum terrore singulari casu conspectæ fixiori aspectui adscribendum potius esse existiment.

§. 43.

De barba ex fetis porcinis observationem sequentibus ver- Barba. bis recenset Christianus Franciscus Paullini *Zeitverk. Lust p. 42 seq. Mein lieber Freund Eusebius Hieronymus Fellmann hat im Bischoffthum Trident einen Bauer gesehen, dessen Bart lauter Schweins-Borsten waren, drum er ihn sehr offte abnehmen ließ. In der Woche, wie seine Mutter mit ihm nieder kam, glitt sie ohngefehr im Hoff aus und fiel taumelnd gerade auf eine vorbey lauffende Sau, die sie mit der lincken Hand beym Schwantze, mit der rechten aber oben am Rücken ergriff, und so lange sich an den Borsten anhielt, bis man sie wieder aufrichtete. Wie sie nun in dieser Arbeit von der aus dem Koth kommenden Saue besudelt worden, hat sie ohne Zweifel diesen Macul dem Sohn angeklecket.*

§. 44.

In conterminis Pisæ mulierem puellam edidisse pilis camel- puella pi-
losa. lorum similibus refertam, quia imago B. Johannis ante oculos ei perpetuo obversabatur, recenset Andreas Laurentius *Histor. anatom. Lib. VIII. Qu. 14. fol. m. 302.* Et juxta verba Ambrosii Paræi *Op.*

Lib. XXIV. cap. 7. fol. 554. testatur Damascenus, visam sibi puellam urfi instar villosam, quæ non aliunde eam deformitatem contraxisset, quam ex eo, quod mater in ipso excepti & concepti seminis articulo, in D. Johannis camelina, ut solet, pelle tecti imaginem, ex lecti oppositis fulcris pendentem, intuita esset.

§. 45.

*Tumor
frontis :*

Puella semestris erat in fronte deformata tumore valde rubente ac doloris experte, quem in utero adhuc delitescens contraxerat. Mater ægrotulæ, dum utero gerebat, vulnus in fronte accepit, ex quo multum sanguinis profluebat & quod dolorem fatis magnum inferebat; quare mater infortunii sui certior fieri volens adiit speculum & sic non parum perterrebatur, vid. Joh. Muys *Prax. med. Chir. ration. Dec. III. Obs. 1. p. m. 103.*

§. 46.

in lumbis.

Paupercula quædam septimo mense prægnans cecidit supina in lumbos, sed sine evidenti cutis noxa. At infans in lucem editus habuit insignem tumorem in lumbis, quo ad aperto effluxit ipsi quidem frequens aqua, sed non minus ipsa vita &c. v. Nicol. Tulp. *Obs. med. Lib. III. cap. 29. p. 240 seq.* Uxor mercatoris Dantiscani Danielis Stuve ab octo mensibus gravida plorantem cum esella tolleret puerulum, animadvertit circa anum protuberantiam ad ovi gallinacei magnitudinem; perterrita mater ad rei novæ spectaculum, an periculum? medicum Johannem Schmidt illico vocari jubet, prout interea tenens infantem super genua; accedit ipse, & procidentiam intestini recti esse affectum plurimis familiarem puerulis, etiam asseverat, qui fotibus & ordinariis remediis integre tolli possit, prout etiam brevi intestinum reponebatur. Justo partus tempore puerulum enititur omnia sanum, nisi quod in lumborum vertebriis ad capitis pene magnitudinem sacculum haberet, cruore refertum, excrescentiam nimirum carneam cute obductam, in cujus apice ad imperialis magnitudinem livor apparebat, putredinis quasi alicujus incipientis initium, quo in

in loco rupta cutis sponte sua cruorem reddebat ad integram pene libram, vid. *M. N. C. Dec. I. An. 4. Obs. 22. p. 24.* v. etiam Joh. Muys *Prax. Chir. Dec. IX. Obs. 9. p. 390.* Civi Augustano filiola nata fuit, quæ præterquam quod incurvis & male conformatis pedibus prædita fuerat, etiam tumorem supra os sacrum in utero materno contraxerat, quo cauterii ope per chirurgum sexta hebdomade aperto, plurimum aquæ, & plus, quam tumor continere potuerat, effluerat, tumore hinc una cum viribus decrescente; illudque ferum non minima ex parte per spinalem medullam a cerebro descendisse creditum fuit, eo quod caput antea tumidiusculum, & calvaria post mortem, octava a partu septimana insecutam, passim mollis comparuerit. Ipsum vero tumorem os sacrum, mole magnum & prominens constituebat; quod fortior imaginatio materna in eam monstrosam magnitudinem adauxerat, excitata a viso sæpe puero mendicante, qui claudus & corpore incurvo præditus per plateas urbis, pro eleemosyna colligenda circumgestabatur, referente Luca Schroëckio *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 115. Schol. p. 275.*

§. 47.

Matrona quædam honesta Bernensis Helvetica die decimo septimo anni 1689. formosum alias enixa est pusionem, cum tempore inter ambos oculos ad nasi radicem connato, livido, mobili ac molli radice plana, magnitudinemque juglandis, ni superante, æquante tamen. Hujus pusionis mater cum esset gravida, in octavo mense ex improvviso & cum terrore aliquo obviasse hominem quendam vidit, struma colli pensili maxima oneratum: quo viso mater illam nasi partem fricuit, teste Christophoro Horchio *M. N. C. Dec. III. An. 3. Obs. 96. p. 185.* ubi curam tumoris dicti reperies. *inter oculos a visio struma.*

§. 48.

De tumoribus circa collum strumosis in Casp. Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. pract. Cas. 14. p. m. 175.* sequens observatio legitur *in collo.*

tur: Matrona quædam honesta undecim liberorum mater singulari amore pullos gallinaceos complexa est, adeo ut etiam ova gallinarum pullos jamjam exclusura sinu foveret, pipitu delectata sit, & subsultatiunculis, ingluviemque eorum sæpius tetigerit, imprimis gestationis tempore. Quid sit? sex liberi ætatem vegetam consecuti, reliquis fato præmature functis, strumas in gutture singulares instar gallinarum majorem ætatis progressu molem acquirentes cum summa respirandi difficultate aluerunt. *Sie haben gepipt und gepfiffen, wie die jungen Hünnergen.* Generosa quædam domina tempore gestationis multoties cum averfatione adspexit servam scrofulis in collo satis deformem. Edidit tandem filiolum, qui in dextra colli parte, maxime vero in sinistra scrofulas in lucem una protulit, harum quæ in sinistra, ubi clamaret infans, aut collum nimis moveret, nimium intumescebant, immo videbantur, & suctionem & pultis deglutitionem impedire, teste Georgio Francisco *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 223. p. 451.*

§. 49.

*circa car-
pum.*

Nobilissima quædam femina tumorem sublividum, magnitudine nucem juglandem æquiparantem, inter cubitum & carpum dextri brachii monstrabat, cujus color exacte sanguinem repræsentabat extravasatum. Causa istius hæc erat: Mater prædicta adhuc gravida cum rheda veheretur, ob viæ asperitatem ab illa contusa fuit, unde dolorem percepit; antedictum locum fricavit hinc factum, ut filiam natam tuberculo sublivido in brachio signaverit. vid. Casp. Th. Bierling. *l. a. p. 25.*

§. 50.

in nate.

De infante, nævo seu tumore in nate a matris phantasia deformato, ibidem *p. 175.* sequens extat casus: Infantis mater paupercula inusitatam intestini recti in bove cum horrore conspicata procidentiam, post semestrem gemellos peperit, quorum alter in sinistra nate (alter gemellorum omnium membrorum integritatem & incolumitatem habebat) ad ipsum usque podicem tumorem gere-

gerebat œdematosum & spongiosum, rotundum, atro-rubrum, pugni magnitudine, indolentem, nisi quando novilunium instabat; quem dum chirurgus quidam emollire conaretur, aut discutere, abruptus est infans.

§. 51.

Imo in viro tumorem in dorso saccum frumento plenum referentem imaginationis vi attribuit Theodorus Kerckringius *Spicileg. anat. Obs. 3. p. 6.* scilicet quæstor quidam, Franciscus Huyer, coactus rusticum ad ea onera solvenda, quæ subditis erant imposita; quibus vel par non erat, vel non esse simulabat, iussit frumentum e granario ejus efferri; cui executioni dum ille adest & præest, anicula quædam dorsum ejus terque quaterque feriens, Francisce, inquit, Francisce; quid agis? o quid agis, Francisce? Ille percussione, verbisque nonnihil commotus sensit eodem die, quo loco anicula eum tetigerat, tuberculum quoddam surgere, nucis avellanæ magnitudine, quod intra triduum ad magnitudinem ovi gallinacei excrescebat; neque hic finis incrementi: tribus id annis gesserat, cum informis tumor eum in modum auctus erat, ut saccum frumento impletum, quem dorso portaret, referre videretur.

§. 52.

Vitrum elatius vino rubello semiplenum in fronte cujusdam viri, quoties incalescebat, visebatur. Quod matris vitio adscribitur, visum forte ejusmodi poculum avidissime desiderantis, juxta Johannis Valentini Willii relationem in Th. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. III. Obs. 83. p. 152.*

§. 53.

Gravida quædam cum in tenebris domum circumiret, frontem posticam sic allisit, ut ipsa quidem præter dolorem & leve tuberculum nihil persentisceret, infans autem paulo post in lucem erumpens diffusa & hiulca, ad pollicis latitudinem, fronte, qua sagittalis in nares descendit, non levem parentibus sollicitudinem incuteret, a qua non ante liberati sunt, quam biennio post, cum

hiatus ille lente coalescere frontique formam redonare coepit, annotante Johanne Nicolao Pechlino *Obs. med. phys. Lib. III. Obs. 15. p. 429 seq.*

§. 54.

Labia coalita.

Anno 1672. in nosodochio Basiliensi femina quædam infantulum peperit, cui labium utrumque firmiter coaluerat, & superius adeo excreverat, ut bilinguem primo intuitu crederent, juxta in utroque existentibus figuris leporinis. Mater rogata culpam terrificæ imaginationi, ex contemplatione hominis pari fissura laborantis & labio superiore prætumido, attribuit, vid. Joh. Jacob. Harder. *Apiar. Obs. 91. p. 340.*

§. 55.

Labia leporina.

Rusticus quidam per inflictam a patre matri gravidæ alapam rostro leporino admodum præ aliis erat deformis, siquidem palati seu cæli extremitas aliqua, cum ipsius maxillæ parte (quasi excisa) versus nares sursum flexa iisque adnata erat cum mystace & dentibus aliquot. Hunc intuita ex improvviso & exhorrescens gravida quædam post tres septimanas puellam peperit, cætera perfectam, nisi quod simile penitus rostrum ostentaret &c. referente Daniele Ludovici *M. N. C. Dec. I. An. 4 & 5. Obs. 208. p. 294.* Plura exempla labiorum leporinorum ab imaginatione matrum, quæ vel lepores, vel etiam homines hac deformatione laborantes, intente aspexerunt, ortorum hoc loco adducere superfedemus, cum quotidie annotentur, & juxta Levin. Lemn. *de occult. Natur. miracul. Lib. I. cap. 4. p. 16.* nostrates matronæ ex leporis obtutu sæpe infantes edant labello supremo bifido ac bifurcatim dissecto: alias rationes vid. Chr. Fr. Paullin. *Lagograph. Sect. I. cap. 3. p. 113.*

§. 56.

Labium leporinum cum uvula divisa.

Puelli cujusdam, qui labio leporino ita deformatus erat, ut simul palatum ad imas usque fauces fissum, & columella duplex, imo potius divisa conspiceretur, meminit Henricus Vollgnadus vid. *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 39. Schol. p. 342.* Quale exemplum in

in filiolo statuarii Dresdensis observare mihi licuit; cujus tamen *Observatio.* deformatio non æque labio leporino æquabat, hinc etiam ab adstantibus ictus seu os lupinum vocabatur, quia labium infantis superius cum maxilla, toto palato seu cœlo uvulaque ictu fissum quasi videbatur. Dentes ictui proximi in utroque latere intra quatuor dies incredibiliter & ad perfectam magnitudinem procredebant, ut papillas maternas iisdem apprehendere atque hoc modo lac sugere posset, quod primis diebus impossibile erat. Post tertiam autem septimanam hic infans moriebatur. Hoc malum a me interrogata mater ex alterius pueri quadrimuli, sibi primo gestationis tempore ex improvise obvenientis aspectu se contraxisse fatebatur. Item anno 1682. amici mei uxor gemellos, & quidem alterum perfectum, alterum vero eodem modo deformatum pariebat, cujus erroris causam mater nullam aliam reddere poterat, nisi quod aliquot porcorum fumo exponendorum mactationi sive occisioni & dissectioni attente adstitisset. Scribit etiam Johannes Sperlingius *de Format. Homie. in uter. cap. 5. p. m 105.* se novisse feminam, quæ, cum a lanio caput suillum securi dividi vidisset, filium genuit, cui tota superior palati pars cum maxilla superiore & labio superiore ad nares usque divisa erat.

alia.

§. 57.

Femina quædam Heidelbergensis gravida, non ita remoto pariendi tempore, ibat obsonatum ad macellum, cumque temporis jam plus satis, ut ipsi videbatur, apud lanium, dum carnes pro *Labium superius abstersum.* ea penderentur, expectando transmisisset, moræ tandem impatiens, frustum quoddam arripit, ac perdi jubet: ideique ex manibus ille, pro sua ferocia, magno conatu denuo rapit, & appendens alii adstanti feminæ vendit: eam rem iniquo illa ferens animo intra se ita exæstuat, ut e naribus cruorem emitteret; quem dum a supero labro abstergit, simul, quem masculum in utero gerebat, abstergit superius labrum, velut eventus postmodum, non ita multis dierum interjectis hebdomadibus, ostendit. Vixit turpi

*Eoco nasi
proboscis
suilla.*

hac nota signatus puer integrum annum, quo elapso peste correptus interiit. vid. Joh. Schenck. *Obs. medic. Lib. IV. fol. m. 567.* quo loco etiam aliam observationem, similem fere, refert: Civis Haguenensis, opificio pellicis, uxor prægnans porcina appetebat: quare ad macellum se contulit sibi que carnes elegit. Intervenit lanii cognata, cui has carnes lanio tradit. Mulier commota macello abiens forte nasum perfricat. Unde factum, ut infantulus suis proboscidem nasi loco retulerit: carnis etiam porcinae frustum ore continuerit. In Westphalia non ita pridem ex phantasiæ errore lepores cum rostro suillo natos fuisse, refert Christianus Franciscus Paullini *Lagograph. Sect. I. cap. 3. p. 114.*

§. 58.

Piscis.

Jacobi Gaffarelli sororis cruri sinistro ex matris appetitu impressus fuit piscis, mira arte efformatus, vid. Jac. Gaffarell. *Curiosit. inaud. Part. II. cap. 5. p. m. 101.* Nævum piscis, quem nonnulli *Rætel* vocant, similem & punctulis suis subrubris exactissime representantem Carolo Josepho Myllero in puero videre contigit. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 7. Obs. 225. p. 428.* Et Petrus Borellus novit virum, circa regionem cordis figuram piscis maximi, & alium cancri fluviatilis figuram corpori insculptam gerentem; vid. Borell. *Histor. med. phys. Cent. IV. Obs. 74. p. 336.*

§. 59.

Serpens.

Femina quædam ex imaginatione matris prægnantis & occursum serpentis exhorrescentis in brachio adeo accurate cum omnibus coloribus depictam serpentem gestavit, ut vel naturaliter ibi latitantem arbitrareris, teste Johanne Daniele Geyero *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 235. p. 459.*

§. 60.

ostrea &c.

Lucas Tozzi exemplum pueri cujusdam Neapolitani refert, annum agentis decimum, cujus brachium sinistrum multis avidtium maternarum notis signatum erat, quæ ostreis, spondylisque & dactylis valde erant similia, cujusque metacarpium corpus can-

cri

cri marini digitique chelas referebant; quod piscium genus mater sexto gestationis mense venale viderat, cujusque cupidine correpta sinistrum brachium manumque sæpius, ut ipsa retulit, tetigerat. Idem etiam, quo anni tempore pisces illi pinguescebant, manum brachiumque puellæ intumuisse febremque inde ortam fuisse tradit. vid. Cornel. Stalpart van der Wiel *Obs. rar. Cent. poster. Obs. 35. Schol. p. 377.*

§. 6r.

Vidit Philippus Jacobus Sachsius puellam aliquot mensium hortulani filiam, corpore alias sano & vultu non invenuto præditam: in singulis autem manibus aberant pollices; indices cum medio digito arcte connexi, annulares rursus cum minimis, ut viderentur quasi duæ furcæ. In dextræ manus interstitio istius furcæ protuberantia quædam globosa, qualis non raro cancerum forcipibus ad nasci solet. Pedes omnibus carebant digitis, loco illorum pes in plantæ medio in duas divaricatus furcas, primum latiores, post in acutas cuspides desinentes exactissime referebant forcipes cancrinos. Mater fatebatur, se tempore gestationis in rivo insignem magnitudinem cancrorum avido aspexisse vultu, quin & altero die eundem eo in loco rursus reperisse, & ejusdem potiundi desiderio flagrasse, capere tamen non potuisse. vid. Phil. Jac. Sachs. *Gammalog. Lib. II. Sect. I. cap. 4. §. 14. p. 597.* Idem etiam *Lib. I. cap. II. p. 234.* pari ratione ex imaginatione matris, quæ forte cancri forcipe perterrefacta, embryoni digitorum loco chelas succrevisse refert. Similem historiam annotavit etiam Ehrenfridus Hagendorn *Histor. med. phys. Cent. III. Hist. 32. p. 322 seq.* scilicet virgo quædam in oppidulo quodam degens, annos octodecim nata, justæ staturæ neque inelegantis formæ. Hæc simulac in lucem edebatur, manus pedesque exhibuit, cancrinas chelas (*Krebschæren*) æmulantes, sine pollicibus tum manuum, tum pedum, nisi quod pollicum loco massa quædam carnea videretur; & ipsa mobilis. Alias manus pedesque a nativitate pariter:

informes minoresque pro ætatis ratione erant, ex quorum extremitatibus duæ massæ carnosæ, ossiculis tamen suis constantes, protuberabant, chelas cancriformes præsentantes, antrorsum acuminatæ, retrorsum vero versus manus & pedes crassiores. Pedes hinc difficiles faciebant gressus, manus vero ad negotia peragenda expeditiores erant, quandoquidem fila e colo ducere aliaque domestica munia, non ita laboriosa, auxilio earundem sic factis commode obire poterat. Quæsitâ, unde hoc contraxisset infortunium, hancque impetrasset monstruosam manuum pedumque figuram? respondebat, ex imaginatione matris, utero gerentis, quæ, facta olim in oppidulo aquarum inundatione, cum aquis domum irrepsisse canculos majusculos, quibus a se visis, perterrita nimis inde facta fuit ob inopinam eorundem præsentiam. Utriusque tam puellæ quam virginis icones *l. a.* reperies.

§. 62.

Digiti racemosi.

Mulier gravida decerptura ex palmite racemum, ægre tulit, quam patiebatur repulsam, discessitque tantum non mœsta, ac animi se angens, sed quasi desperanti proxima; unde factum, ut conformatrix uteri vis irritata effinxerit embryonis digitos præter naturæ ordinem, non tam ex articulis, quam ex acinis uvisque a tereti pediculo pendentibus, plane ad instar illius racemi, quem ipsi denegaverat hortulanus, juxta Nicol. Tulp. *Observat. medic. Lib. IV. cap. 64. p. 389.*

§. 63.

Digiti conaliti.

Nobilissimi domini a Ketschau, serenissimi ducis Holsatiæ præfecti aulici, uxor anno 1674. mense Januario filiam peperit, cui in ambabus manibus digiti, minimus nimirum, auricularis & medius adnati erant. Amasiæ manus per jocum fortiter premere ipsi moris fuit: Gravitationis igitur tempore aliquam tam fortiter illius manus compressit, ut præ dolore clamorem edere coacta fuerit. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Thesaur. theor. pract. Obs. 14. Schol. §. 5. p. 181.*

§. 64.

Feminæ cuidam gravidæ, quæ peste cum bubonibus utriusque inguinis laborabat, a chirurgo ad extrahendum virus pro more ranæ imponebantur, postmodum autem dicta femina puellam, cujus minor digitus dextræ ranam repræsentabat, enitebatur, uti refert Philipp. Salmuth. *Obs. med. Cent. I. Obs. 95. p. 57.*

Digiti raniformes.

§. 65.

Femina quædam aliquot annos conjugii fructum & effectum percipiens, de convivio quodam splendidissimo, binis miliaribus distante, ac reliquis ferculis laudabilissimis in abundantium rerum, & limaces apponendas fore, certior facta eo pruritu & appetitu vix non explicabili esum limacum phantasiæ impressit, ut hunc unicum cibum constanter tum temporis desideraret. At cum hoc ipsum desiderium occultaverat, & alibi locorum hujusmodi cibus non ad manus erat, filium debito tempore peperit, cujus membri glandem formosissima limacis figura quoad omnia condecoravit: & hæc ob loci ac figuræ raritatem, juxta observationem Johannis Adami Lospichleri *Ephemer. Academ. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 150. p. 313 seq.*

Limax.

§. 66.

Filiola quædam in humero dextro, axillam versus, carunculam rubicundam, cristatam a nativitate gestabat, ob visum ex improviso a matre prægnante gallum Indicum, quem dono acceperat. vid. Ehrenfr. Hagend. *Histor. med. phys. Cent. III. Hist. 54. p. 353.* Casparus Theophilus Bierlingius feminam quandam cognovit, quæ cum pavore & tremore gallinas jugulabat. Hæc cum aliquando, dum gravida, ob ancillæ absentiam, gallum, quem cristam tenebat, interficere cogeretur, averfis oculis ipsi gulam truncavit, & rejecto gallo abiit; digitis vero auriculam sinistram tetigit; postmodum vero enixa est filiolum, qui loco auriculæ cristam galli cum apicibus & interstitiis habuit. vid. Casp. Th. Bierling. *l. a.*

Crista galli.

pag. 24 seq. Afferebatur etiam Johanni Valentino Willio anno 1649. infans, supra cujus utrumque oculum perque totam frontem infinitæ extuberantiæ molles, rubræ, cœruleæ, albæ, fuscæ, variis denique variegatæ coloribus, non secus ac si galli Africani collum & caput fronti accrevisset, extendebatur, procedente super utrumque oculum crista rostrata galli Africani longissima; similis excrescentia, sed aliquanto depressior, genas deformaverat. Causa tantæ deformitatis erat similis facies aurigæ, quam forte gravida viderat mater. vid. Thom Bartholin. *Act. Hafn. Vol. III. Obs. 83. p. 153.* Basileæ vidit Casparus Bauhinus puellam paucis diebus vitalem, ob productionem in dorso carnosam, collo gallipavonis Indici similem, pertusam, sanguine manantem, ob terrorem propter improvissum supra ipsius gravidæ dorsum gallopavonis factum. vid. Casp. Bauhin. *de Hermaphrod. Lib. I. cap. 12. pag. 129.* Et Matthæus Gothofredus Purmannus, *im Chirurgisch. Lorbeer-Krantz Part. I. cap. 30. p. m. 168.* hanc de galli Africani capite refert observationem: *Eine vornehme Frauens-Person zur Fraustadt in Polen gieng im Junio anno 1664. im fünfften Monat mit einem Knäblein schwanger; Des Morgens früh, als sie in die Kirche gehen und nun zu der Stuben-Thüre heraus treten wolte, hauet die Magd in der Küchen, so nicht weit darvon, einem Puter-oder Catecutischen Hahne den Kopff dergestalt geschwind ab, daß gemeldter Kopff der Frauen vor die Füße gesprungen. Die Frau über diesen unverhofften Vorfall entsetzet und verändert sich, und greiff in derselben Zeit an die Stirne über das lincke Auge, gehet, nachdem sie sich erhohlet, ohne Furcht in die Kirche. Weil sie aber in denen noch übrigen Monaten oft und vielfältig daran gedacht, als hat sie auch zu rechter Geburts-Zeit ein sonst wohlgebildetes Sæhnlein mit einem Stücklein angehengten Fleische über der Stirne, gleich dem abgehauenen Kopffe zur Welt gebracht; Welches ob es schon nicht gar zu groß, dennoch so natürlich anzusehen war, daß es kein Mahler und Bildhauer besser formiren und abbilden können. Was aber das verwunderlichste war, so nahm dieses Stücklein Fleisch im Frühling allezeit zu,*
gleich-

gleichete denen Farben derer Türckischen Hünen-Köpffe, und setzte sich endlich gegen den Herbst wiederum &c.

§. 67.

Femina quædam Pragensis puellum genuit præputio fere in- Præputium
incisum.
ciso & inverso, propter cogitationem vehementiorem, qua ho-
spitem quendam peregrinum, tribus tantum a partu septimanis,
observaverat recitantem & exacte describentem Judaicam cir-
cuncisionem, cui, tanquam rei singulari, matutinis horis inter-
fuerat, testante Marcello Donato *de Medic. Histor. mirab. Lib. VII.
cap. 3. p. 667.* vid. etiam Gregor. Horst. *Oper. Tom. 1 I. Lib. II. Obs. 3.
fol. 523.*

§. 68.

Cum artificis cujusdam uxor filium dilectum admodum hy- Scrotum
vacuum.
drocele laborantem herniotomo subjecisset, de hac re valde solli-
cita & contristata, tumque insuper gravida filiolum deinde enixa
fuit, qui scrotum testiculis omnino vacuum habebat. An autem
illi in corpore latuerint, quod facile fieri potuisset, anatomia qui-
dem in puerulo, paulo post mortuo, docere potuisset, ast paren-
tibus ab eadem abhorrentibus, sicque testiculis nullo modo dete-
ctis, hunc defectum cum ipsa matre fatente imaginationi fortiori
adscripsit Vitus Riedlinus, fil. *Obs. med. Obs. 78. p. 182.*

§. 69.

Ridiculum est, quod prope Lipsiam non ita diu contigisse re- Erinaceus.
fert Petrus Müllerus *Disput. de Jure Prægnant. Cap. 2. §. 13. p. 16.* Ru-
sticus scilicet quidam juvenculam suæ conditionis duxerat, quæ
in primo coitu, ob nimiam τῆς γυναικὸς in modum erinacei acu-
leati asperitatem, novellum maritum ad sanguinem usque læserat,
quod hic indigne ferens dissolutionem matrimonii in consistorio
petiit. Illam autem notam mater impresserat; cum per campum
ambulanti inopinato erinaceus offerretur, ad, cujus insolitum
aspectum manum cunno admoverat.

§. 70.

Mus.

Feminam quandam in hypogastrio nævum vel maculam muri domestico affimilem gessisse, ex fide dignorum relatione reminiscitur Johannes Helwigius *Obs. 35. Schol. p. 126.* Et Johannes Valentinus Willius amicum novit in Francia orientali, cujus in cubito perfectus mus cum pedibus & cauda exprimitur, plurimis pilis nigricantibus brevissimis horridus, quod vitium a terrore matris derivat. vid. Thom. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. III. Obs. 83. p. 152.* Novit etiam Georgius Hieronymus Velschius quendam, cui in gena muris pilosi effigies faciem foedabat, qui cum lautissima semper fortuna usus esset, hanc turpitudinem jam olim magno redimisset. vid. *Miscellan. Natur. Curiosor. Dec. I. An. 3. Obs. 38. p. 61.* Thorunii vixit vir quidam consultissimus, cui uteri materni claustris adhuc incluso imaginatio materna ad dextra tempora impresserat pellis murini signum pilosum, quia mater gravida, cum ei forte fortuna obviis factus esset musculus, ex terrore manum dextram dextris imposuerat temporibus, teste Georgio Segero *l. c. Obs. 197. p. 371 seq.* Turpitudine istius notæ commotus dictus vir aqua regia locum affectum subtilissime inunxit, unde primum pili, mox & cuticula secessit; tandem vero chirurgus tempora erosa mundavit atque obduxit, apparentibus hinc inde quibusdam cicatricibus. Huc pertinet etiam tumor in medio occipitis juglandem magnitudine æquans, tactu mollis, colore fusco, & multis pilis obsitus, similibus murium pilis, quem mater terrore contraxerat, teste Johanne Ledelio *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 158. p. 363. 366.* Nævus, qui ortus erat ex matris terrore, conspecto mure, murem referebat colore & forma; imo, quod erat valde notabile, odorem spirabat, ac mures solent, juxta observationem Christiani Michaelis Adolphi *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. V & VI. Obs. 15. p. 29.* Talibus stigmatibus etiam duos foetus, duplici partu editos, feminam quandam improvise murium conspectu, cum esset gravida, per terrefactam signasse refert Lucas Schröckius

ckius *Additament. ad Joh. Helwig. Obs 35. p. 127.* Sequentem observationem recenset Matthæus Gottofredus Purmannus *im Chirurg. Lorbeer-Krantz. Part. I. cap. 30. p. m. 169.* his verbis: Anno 1667. im Monat Augusto gieng zu grossen Glogau eine vornehme Frau im vierten Monat mit einem Tœchterlein schwanger, dieselbe, als sie an einem Morgen früh nach der Kirchen gehen will, bleibt an unserm Hause, woselbst ich damahls noch in der Lehre war, bey einer Frauen stehen, mit ihr etwas zu reden; In wehrender Zeit ist der andere Junge oben, wo wir schliefen, und hat eine Maus gefangen, diese schüttelt er aus der Falle, auf die Strassen. Die Maus, weil gedachte Frauen gleich darunter stunden, fällt der schwangern das Gesicht vorbey auf die Schaub, von der sie aber auf die Erde fällt und wieder darvon läuft. Die Frau, weil sie sich ohne dem vor denen Mäusen sehr gefürchtet, entsetzet sich dergestalt darüber, daß man sie in das nächste Haus bringen muß. Weil sie aber in demselbigen Moment an den rechten Backen gegriffen, und nach der Zeit sich diese Sache gar zu sehr eingebildet und zu Sinne gezogen, als hat sie auch bey der herannahenden Geburt ein sonst wohlgestaltetes Tœchterlein, mit einem Stücklein Fleisch, gleich einer Maus an dem rechten Backen, auf die Welt gebracht; Und war dasselbe dergestalt einer Maus æhnlich, daß auch, ob es damahls schon noch klein war, nichts (auch die Haare nicht) daran vergessen worden.

S. 71.

Infanti cuidam, cujus mater sexto in gravidationis mense, ob glirem pectori infilientem, subitaneo terrore concussa fuerat, ab ortu tumor œdematosus lumborum vertebra occuparat, qui sub-
tus velut cauda donabatur linea pilosa, digiti longitudine, aspectu horrida ad nates usque pertingente. vid. Joh. Jacob. Harder. *Apiar. Observ. 91. p. 340 seq.* Murem majorem seu glirem in femore infantis recens nati, a matris terrore observare mihi contigit. Mercatoris scilicet Dresdensis, nomine Kemrichii, uxor ultimis gestationis mensibus gravida, a mure majori, in sinistro pede ad

Glie.

Observatio.

D d d d 2

femur

femur usque sub vestimentis celerrime ascendente ibidemque super femore nudo, per mariti, in auxilium a clamante uxore vocati, manus compressionem enecato, tantum incurrebat terrorem, ut paulo post foetum equidem vivum, eo tamen in loco mure ejusmodi piloso signatum ederet. Cutis scilicet non modo erat mutata & pilosa, sed etiam elevata, ita ut in altera parte cauda longa, in altera caput propenderet; ac si mus quidam conquassatus ac mortuus sub cute jaceret. Imo post paucos a partu dies tota illa gliris circumferentia, instar carnis putridæ cum incipiente foetore cadaveroso separationem minabatur, quæ etiam paulo post, absque ullo chirurgi adminiculo, sequebatur, totumque illud carnis frustum, muris majoris figuram referens, decidebat, ingenti foramine, ad os femoris penetrante, in infante relicto; qui etiam foetus admodum debilis post duas hebdomadas etiam vivere desinebat. Imo Isenaci formosa & pudica matrona enixa est glirem, quod eo accidit; quia ex vicinis aliquis gliri nolam suspenderat, ad cujus sonitum reliqui fugarentur; is mulieri gravidæ occurrit, quæ ignara rei aspectu & accursu gliris ita territa est, ut foetus in utero degeneraret in formam bestiolæ, uti ex Luthe-ro refert Martinus Weinrichius *de Ort. Monstr. cap. 17. p. m. 160.*

§. 72.

Oculus vitulinus.

Vixit Halæ Saxonum anno 1659. puella duorum annorum, cujus oculus dexter aliorum hominum oculis similis erat, sinister vero oculum vitulinum repræsentabat, neque audiebat, neque videbat, manu dextra gulam sæpius prehendebat. Mater vitulum mactandum se nimium aspexisse dicebat. Hanc puellam se vidisse refert Casparus Theophilus Bierlingius *Adversar. Obs. 19. p. 140.* Oculos vitulinis simillimos, errore matris intempestive vitulinos, cum prægnans esset, considerantis, in filia concionatoris observavit Christianus Helwigius *M. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. Obs. 70. p. 136 seq.*

§. 73.

Christiano Francisco Paullini bona fide dixit Henricus *Himmel*, ecclesiastes Mihlanus, se puerum nosse auribus asininis natum, & molitoris filium, quod vitium prægnans mater contraxerat. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 4. Append. p. 209.* De infante aures leporinas habente, vid. J. G. Schenck. *Monstr. Histor. p. 13.*

Aures asininae

leporinae.

§. 74.

Vixit Norimbergæ vir quidam, cujus mater, dum in utero ipsum gestaret, cum marito aviarium augustissimi imperatoris Viennæ ingressa, lascivis oculis, uti sequior iste sexus solet, curata perlustrans, ex improvise aquilam præmagnis ungulis præditam consternata vidit, & ita perterrita foetui huic impressit labem, ut statim a nativitatis hora in utroque pedum pollice ungulæ tales, ast minores, apparuerint, atque adeo crescente ætate cum annis creverint, uti Gregorius Hillingius *M. N. C. Dec. II. An. 1. Obs. 160. p. 385.* delineat. Hoc singulare considerandum venit, quod vernali tempore dextri pedis ungula, autumnali vero sinistri ungula sponte sua deciderint, denuoque de novo singulis repullularint annis. Ungulæ duræ erant, cineritii coloris, ad fundum, ubi adhærent pollici, concavæ. Exinde autem & puer & vir nihil incommodi vel doloris, etsi pedes iter egerit, persensit, sed semper bono constitutus habitu, nisi quod ad melancholiam inclinarit, ad vitæ finem optime valuerit, & amplioribus calceamentis opus habuerit. Patavii rusticæ puellæ in indice digito unguis aversa parte accreverat. vid. Thom. Bartholin. *Histor. Anat. Cent. II. Hist. 44. p. 209.*

Ungues aquilini.

§. 75.

De puero singulis annis cutem una & ungues, a matris impressione, exuente rarissimam observationem annotavit Johannes Nicolaus Pechlinus *Observ. Phys. med. Lib. II. Obs. 42. p. 316.* Puero scilicet Italo, Bernardino, cuticula crassa admodum &

Cutis & ungues decedentes.

squamosa a collo ad manus & pedes usque descendebat, variegata admodum & notis violaceo-nigris inusta; interiora autem manuum pedumque, volæ nimirum & planta, in cætera cutis novitate petrosarum exphysium copia, uti rayæ clavatæ corium inferni solet, armata erant, non parum ab hoc offenso manuum pedumque usu; namque nec firmiter manu comprehendere, nec pedibus incedere poterat. Hanc cutim circa singulos autumnos eo tempore, quo natus erat, crustulatim & lamellarum reticulatarum instar decidere, novamque cum omni apparatu subnasci, & ipse, & qui aderant, testes affirmabant. Color autem cutis vel colubri aquatici aut testudinis inversæ illum exprimere videbatur; & sane ita erat. Matrem enim conspectu testudinis, dum in littore maris aberrat, territam non coloris tantum, sed & ingenii aliqua vestigia concepisse, inque puerum, tum embryonem, transmisisse, constans erat opinio. Addebat in fidem rei puer, magno se teneri aquarum desiderio, & si occasio suppeteret, protinus ad aquas advolare, imo ultra horæ dimidium sub iis morari posse, & in universum frigoris se tolerantiores esse, quam caloris, ne longe eum a pisculenta natura abfuisse credas. Nataverat & hoc, ungues sive ungulas, promissa namque longitudo & ex longitudine nata curvitas bestiarum istis hæc affiniores reddiderat, una cum cute decessisse, succedentibus semper novis. Mirandum autem erat, illam cum matris imaginatione visusque terriculamento immissam notam, tam pertinaciter hæsisse, ut cum annis crescentibus, imo vel primo isto, obliterari non potuerit, sed usque regenerata originis suæ contumaciam prodiderit.

§. 76.

Nictatio.

Fabri cujusdam cultrarii uxor cum gravida hominem perpetuo oculis nictantem attentius per aliquot temporis spatium aspexisset, filium peperit, qui a partus tempore quintum annum agens tantam oculorum nictationem perpetuo patiebatur, ut & visio non parum inde impediretur. Et licet hac de causa parentes

tes varia remedia adhibuerint, nil quicquam tamen iisdem effectum fuit. vid. Vit. Riedlin. fil. *Obs. med. Obs. 78. p. 181 seq.*

§. 77.

Femina quædam Amstelodamensis gravidationis tempore *Menses.* ira percita ita commovebatur, ut menstrua ei fluere inciperent, & deinde mensibus singulis redirent, ita ut illa, num vere gravida sit, addubitaret; præcipue cum sub finem gravidationis fluxus hic quindecim continuis diebus perseveraret: eo nondum cessante, parit puellam, cui menses fluere incipiebant ipso nativitatis die, itaque fluxerunt quindecim omnino diebus: deinde suppressi redierunt post mensem exactum denuo, & post alterum iterum, post tertium autem puella epilepsia correpta interiit. vid. Theod. Kerckring. *Spicileg. anatom. Obs. 87. p. 168.*

§. 78.

Gangrænam ex terrore materno embryoni impressam in *Gangræna.* duobus infantibus observavit Georgius Segerus *M. N. C. Dec. I. An. 4 & 5. Obs. 147. p. 153 seq.* videlicet cum anno 1667. die 18. Julii Thorunii regii commissarii, ita volente serenissimo, templum S. Jacobi, quod in novo oppido est, monialibus traderent, uxor gravida cujusdam viri literati, ibi habitantis, durante occupatione, insigni anxietate & terroreangebatur. Hæc quinto post die enixa est filiulam, cujus dextri pedis digitos omnes ipsamque pedis plantam, & sinistri digitos binos gangræna ita corripuerat, ut vix aliquam scarificationem sentiret. Item, cum anno 1673. die quarto Novembris domus quædam flammam concepisset, & hæc, antequam restingueretur, superiores illius contignationes confestim absumfisset, fabri cujusdam bombardarii uxor gravida, scintillas cum fumo ascendentes pavente animo oculisque suspensis observans, die decimo quarto Decembris puellam peperit, cujus utrumque crus gangræna occupaverat &c.

§. 79.

Anno 1665. mense Martio Argentinæ femina quædam femel- *Mamma.*
lam

lam parturivit monstrosam cum duabus mammillis admodum candidis ex ore pendentibus linguæ adnatis. Venis atque papillis præditæ erant, quarum altera intus versus os vergebat, ac si infans fugere vellet. Magnitudine pugnum æquabant. vid. Casp. Theoph. Bierling. *Advers. Obs.* 19. p. 40. Feminæ etiam meminit Johannes de Muralto, quæ ex improvise uber vaccinum in horreo quodam suspensum videns, ita valide perculsa fuit, ut foetus in utero simulachrum ejus rei acceperit, ac puellam in lucem ediderit, ubere vaccino cum tribus papillis ad inguen dextrum præditam. Uber hoc cum infante indies incrementa sumpsit, ac maxime ab eo tempore, quo ipsi catameniorum purgationes fluere coeperunt. Tandem hoc uber post obitum amputatum septuaginta tres libras civiles pependit. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs.* 88. p. 208 seq.

§. 80.

*Pedes cur-
vi.*

*manus cur-
væ.*

Anno 1682. civi Augustano filiola nata fuit, quæ præterquam quod incurvis & male conformatis pedibus prædita fuerat, etiam tumorem supra os sacrum in utero materno contraxerat, teste Luca Schroëckio *Schol. in Obs.* 115. *M. N. C. Dec. II. p. 275.* Et femina quædam Leidensis gravida anno 1649. partu jam instante per plateam domum petens, in via defessa præ foribus civis cujusdam, cui manus utraque curva erat, in subsellio confedit: interim civis ille januam inferiore parte clausam & superiore apertam accedens, manus curvas exseruit, quas posteaquam gravida ex improvise conspexisset, valde consternata est, ut fere in lipothymiam incideret. Vir ille mulierem adeo consternatam videns eam consolabatur, vitrumque vino Gallico plenum propinabat. Mulier domum regressa casum hunc infelicem marito suo narravit, male se interim habens, dein paucis diebus elapsis, filiolum curvis manibus & pedibus enixa est, secundum observationem Simonis Scholzii *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs.* 61. p. 118 seq. ubi addit, quod cum anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo primo ex Anglia per Belgi-

Belgium in patriam iter fecerit, puerum istum bene valere compertus sit, sed manibus & pedibus in eodem statu permanentibus. Filius Gustavi Casimiri Gahrlied primogenitus dextra natus est luxata & incurva, eo quod octiduum ante uxor carpento vecta mendicum in transitu luxatam ejusmodi dextram ostendantem, vix oculi ictu spectasset, ab amica sibi affidente mature monita, ut oculos averteret: Quod tamen vitium spleniorum ope postea correctum manusque in integrum restituta fuit. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 89 seq.*

§. 81.

Uxor Angli cujusdam, septimo ingravidationis mense circa *Fistula ani.* rem culinariam occupata, bombardam explodi cum fragore insigni audit, perterrita exinde globum clunes ferire existimans manum derrepente, averfura quasi globum, circa intestinum rectum protrudit. Nihil mali ex eo tempore sentiens justo mense puerulum parit, foramen circa anum rotundum habentem, quod circa intestinum rectum ad digiti longitudinem intra corpus, ut stylo immisso judicare licebat, extendebatur. Cum nullam initio exinde infans pateretur molestiam, opem parentes non petebant; post trium autem mensium decursum saniosa per foramen effluebat materia, eaque & copiosa satis & acris, quam fletus & inquietudo continua monstrabat, erodens tandem sanies illa intestinum ipsum, quæ per anum naturæ ordine exire consuevit materia, per foramen hocce fistulam referens, reddebatur, ita ut scybala per utrumque foramen sese monstrarent, sicque misere vitam trahens sex mensibus supervixit, donec tandem accedente inflammatione obiret, referente Johanne Schmidio *M. N. C. Dec. I. An. 4. Obs. 21. p. 24.*

§. 82.

Prænobilis quædam femina temperamenti phlegmatico biliosi ac corporis obesi, aliquarum jam prolium mater, noviter *Foramen ani par-* imprægnata, eodem, quo semper utero gerens correpta fuit capi- *vum.*

tis dolore gravissimo, repetitum affligitur, nullo tum temporis medicamento remedibili, quam ob rem, præmissis præmittendis, usus fonticulorum proponitur, admittitur unus, & doloris requies sequitur ex hac parte; applicatur & alter, sicque totum caput liberatur; interim tempore debito hora partus instat, & quidem felicissima; parturit etenim feliciter, at infantem feminei sexus, cujus nates invicem tam firmiter cohærebant, & connectebantur, ut debita partium divisio nulla, loco ani consueti vero in plano non nisi foramen parvulum ad instar fonticuli signatum observaretur; puella autem recens nata paucas post horas vitam cum morte commutavit, secundum relationem Johannis Adami Lospichleri, *Ephem. Acad. N. C. Cent. I & II. Obs. 150. p. 313.*

§. 83.

Intestino-
rum prola-
psus seu
hernia.

Quandoque etiam ex gravidæ matris phantasia intestina & alia viscera situm naturalem mutant & extra abdomen propendent; talem prolapsum ex matris repentina impressione ex Johannis Georgii Gockelii communicatione refert Johannes Scultetus *Armament. Chirurg. Part. II. Obs. 60. p. 87.* Villica quædam primis gestationis mensibus, messis tempore suburbanis rusticisque operationibus incumbens, & frumenti per agrum hinc inde sparsos manipulos colligens, sub eorundem uno reptantium viperarum acervum subito animadvertit, harumque & figuram & motum umbilicali regioni superimposita manu, ita strenue sibi imaginata est, ut toto quidem, quo utero gerebat tempore, utcunque bene habuerit, circa crepusculum vespertinum filiam quoad reliqua vividam quidem peperit, sed ex radicata illa imaginatione non bene formatam, adeo ut omnia natæ hujus intestina, alias, secundum naturam, in inferiore ventre occultanda, hic præter naturam per relaxatum umbilicum, extra corpus tanquam magno in culeo recondita, solo peritonæo investita, conspicienda se præbuerint &c. Mulier quædam infantem peperit, cujus intestina

extra

extra ventrem sita erant, quia gestationis tempore visum & cogitationes in maſtatum conjecerat suem, extra cujus ventrem intestina profluxerant. vid. Cornel. Stalpart van der Wiel *Obs. rar. Part. post. Obs. 33. Schol. p. 367.* ubi etiam ex Stephano Blancardo infantis meminit, qui intestinis extra abdomen propendentibus natus erat. Fortasse etiam ex matris phantasia fuit omphalocoele, cujus Felix Platerus *Obs. med. Lib. III. p. 759.* de puella tumorem immensum, in quo intestina tenuia deprehendebantur, ex umbilico propendentem secum in lucem afferente, meminit. Excreſcentiam carneam intestina referentem annotavit Johannes Fredericus Weismannus *Ephemer. Acad. N. G. Cent. VIII. Obs. 18. p. 279.* Fernina scilicet cujusdam venatoris, mater quatuor liberorum, per quatuor & ultra menses jam gravida, videns maritum aprum juniorem globulo plumbeo transossu exenterantem, subito expavescit, quem terrorem firmitus memoriæ impressit, cum videret intestina ex abdomine exempta in labrum reposita, & per aliquot dies in culina conservata, & ita quidem, ut post quartum mensem, nonum vero imprægnationis, infantem, excreſcentiam magnam ultra duas libras ponderantem in abdomine habentem ederet, quæ exactissime ratione coloris & figuræ intestina apri referebat. Uxor viectoris paulo postquam porcum maſtare vidisset, infantulum enixa est, cujus infimi ventris partes extra abdomen propendebant, teste Ludovico Hornicæo. vid. Guilh. Fabric. Hild. *Obs. Chirurg. Cent. VI. Obs. 66. fol. 580.* Pragæ anno 1610. puer incerti parentis nascebatur, cui jecur, intestina, ventriculus, lien cum mesenterii maxima parte extra umbilicum nuda propendebant, teste Marcello Donato *de medic. Histor. mirab. Lib. VII. cap. 3. p. 664 & p. 666.* addit idem, matrem dicti infantis ad quæſtionem, num forte partui tali quandam occasionem præbuisſet? cum lacrymis respondiſſe, quod tribus mensibus ante partum vitulum maſtandum detinere ab agmine militum coacta, eo-que protinus aperto, procidentibus illico visceribus abdominis,

quodammodo commota fuerit. vid. etiam Dan. Sennert. *Pract. med. Lib. IV. Part. II. Sect. IV. cap. 7. p. m. 316.* It. Gregor. Horst. *Oper. Tom. II. Lib. XI. Obs. 3. fol. 523.* Meminit etiam Christophorus Horchius, se vidisse infantem recens natum, & per semihoram viventem, integumentis abdominis ab osse ensiformi ad umbilicum usque apertis, illisque callosis, ita ut ventriculus cum mesenterio, intestinis & hepate, quasi evulsa prolapsa erant extra cavum abdominis, colore sanguinolento & inflammationem præcessam indicante; Mater nimirum in tertio graviditatis mense bovem mactare conspexerat. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 3. Obs. 97. p. 189.* Abdominis hiatus viscerumque & intestinorum propendentiam in puella recens nata observavit Godofredus Benjaminus Preussius, vid. *Ephemer. Acad. N. C. Cent. VII & VIII. App. p. 117 & 121 seqq.* ubi addit, puellæ hujus matrem fassam esse, se primis gestationis mensibus forte fortuna lanioni capellam mactanti & exenteranti proxime adstitisse, ac viscerum intestinorumque tractum propendentem ex abdomine sæpius adspexisse, seque capellæ hujus innocentis cædi intime indoluisse; posteaque sæpius, re familiari sic exigente, lanionum tabernas visitantem vitulos porcosque exenterare, horumque viscera, ut fieri solet, convoluta & ex abdomine propendula vidisse ac præter spem intentionemque ideam de capella pristinam phantasie suæ sive imaginationi suæ altius impressam probe observasse. In pago Carnovies, Cracovia, Poloniæ metropoli, duabus milliaribus distito, mendicus quidam obtulit se pagi dominæ, a quatuor mensibus & semis gravidæ, quam in sui commiserationem excitaturus, detexit herniam umbilicalem sibi molestant; Domina ad mali magnitudinis conspectum pavore adeo insigni perculsa fuit, ut vix ad se redierit; objecti idea tota nocte subsequente imaginationi obversante, imo sæpius toto graviditatis tempore. At vero subsecutus est maxime lugendus effectus: foetus enim, quem legitimo tempore peperit, umbilico gestabat tumorem pugni magnitudine, coloris
ad

ad plumbeum vergentis &c. vid. Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. 3. mens. Febr. p. 28 seq.* Anno 1644. in Saxonia inferiori ab ancilla editus est puer, cujus ventriculus & intestina extra abdominis, cute externa saltem tecti & clausi, cavitatem propendebant, item cor cum visceribus aliis extra cavitatem thoracis prominebant. Causa miseræ istius conformationis credebatur, quod ancilla ista maectatum vitulum, tempore graviditatis, attente exenterari conspexit. vid. *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 103. p. 166.* Aurifabri Augustani uxor gravida, aliquot jam antea liberorum mater facta, postquam vituli exenterationem in macello non sine horrore contemplata fuisset, filiolum mortuam partu admodum difficili postmodum exclusit, cujus pars dextra abdominis, non procul ab umbilico ad spithamæ longitudinem fere dehiscebat, lateribus divulsionis signum non præbentibus, sed callo quasi obductis, e quo hiatu intestinula propendebant, teste Luca Schroeckio *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 232. p. 342.* Plura ejusmodi exempla ex variis autoribus in *Chylolog. nostr. cap. 8. §. 12. p. 544 seqq.* adduximus. vid. in super *Ephemerid. Acad. N. C. Cent. VII & VIII. App. p. 118. 121. 124. 128. M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 126. p. 263.*

§. 84.

Squameum ac veluti phocæ pelle contectum puerum annotavit Cornelius Stalpart van der Wiel *Observ. rar. Cent. post. Obs. squamens. 35. p. 374 seq.* Anno scilicet 1683. mense Majo Hagæ puer quidam decem circiter annorum conspiciendus exhibebatur, nomine Bernardus, Bisegliæ, quod est regni Neapolitani ad Hadriæ littora oppidum, natus, cujus patri Petro Antonio Consiglio nomen erat, mater Elizabetha Nastasia vocabatur. Pueri illius manus pedesque toti quanti squamei erant, brachia autem & crura, atque adeo totum corpus, excepto solo capite, veluti phocæ pelle obducta, contactu dura erant, & scabra. Narrabat matertera, cujus curæ ipse creditus erat, ortam fuisse istam cutis deformitatem, quod mater, cum lintheaminum purgandorum causa littus peteret, in

Puer

Squamens.

flumine vicino varios squamatos & testaceos vidisset pisces, quorum imaginem tam firmiter cerebro impressisset, ut non ita diu post a marito imprægnata, pisciumque perpetuo memor fœtum pepererit, instar piscis squamosum, facie tamen colloque decorum, reliquo autem corpore prorsus nigricantem, & obscuro quodam, scabroque obductum musco, quapropter idem nudus non tantopere frigore, quam quidem alii, infestabatur. Puer ille ingenio, quantum ætas ferebat, subtili & acri, ac, quod mirere, piscium avidus admodum erat, adeo ut post crebriorem carnis esum male se haberet. Ipse etiam Stalpartius cum aliis medicis ex ejus corpore prodeuntem animadvertit, qualem pisces diffundunt, odorem, quem quivis admoto propius naso percipere poterat. Delapsis veteribus novæ succedebant illico squamæ, quibus avulsis, mox effluebat sanguis. Ibidem loci etiam Stalpartius ipsius pueri delineationem adjecit.

§. 85.

*Dentes
ovini.*

Cum uxor concionatoris singulari utero gerentium desiderio, nimis avide minusque caute dilectæ ovis os & insitorum dentium structuram rimaretur, fecit ut infantis embryonis dentes similem in modum formarentur, & infanti excluso dentes ovini postea prodirent, quod puero & loquelæ ac masticationis difficultatem, tum quoque insignem faciei deformitatem non potuit non afferre, uti ex Conringio allegat Christianus Helwichius *M. N. C.*

Observatio. Dec. III. An. 5 & 6. Obs. 70. p. 136. Similes dentes similemque deformitatem, & absque dubio pariter a matris impressione, ante quadraginta aliquot annos in mercatore quodam Lipsiensi, ob talem naturæ errorem vulgo Schaafmaul dicto, observare licebat.

§. 86.

Imago Christi.

Anno 1542. Pilsenæ Bohemiæ oppido puer natus imagine Christi, salvatoris nostri crucifixi, quem beata virgo mater de cruce depositum sinu sustinet, pede altero supra alterum inflexo, & qui, si amoveretur, mox & quidem sponte reductus reponebatur;

tur; Cui & collum erat reflexum, quare cibus in os difficulter inferi potuit: aliquandiu Viennæ Austriæ vixit, uti ex Fincelio refert Casparus Bauhinus *de Hermaphrod. Lib. I. cap. II p. 119 seq.*

§. 87.

Spinam bifidam a matris imaginatione annotavit Johannes Muys *Prax. med. Chir. ration. Dec. IX. Obs. 9. p. 390.* Puellam, in-
*Spina dor-
si bifida.*
 quiens, trium dierum invisi, quæ connatum in lumbis gestabat tumorem, pugni magnitudinem adæquantem, in medio carnosum, alias pellucidum instar vesicæ aquam limpidam continentis. Tumor hic indies accrescebat ac carnosus evadebat etiam illic loci, ubi antea pellucebat. Postquam per trimestre spatium miseram vitam traxisset, hæc ægrotula, motibus epilepticis correpta, tandem naturæ debitum persolvit. Tumor post apertionem totus carnosus erat, spina autem dorsi subjecta in medio adeo divisa apparebat, ut fissuræ ovum columbinum potuisset imponi. Causam hujus spinæ bifidæ ac tumoris lumbaris hanc reddit dictus autor, matrem prægnantem super dorsum in terram prolapsam esse ac postea sæpius inter ambulandum manum dorso læso imposuisse, ut ita dolorem aliquatenus demulceat, atque hoc pacto forsan spiritus animales impetuose in spinam dorsalem infantis provolarunt illamque molliusculam ac teneram adhuc diffiderunt. Simile tumoris rapiformis & spinæ bifidæ exemplum refert Nicolaus Tulpius *Obs. med. Lib. III. cap. 30. p. 242.* & quidem ob rapam prægnanti matri improvide denegatam. Cujus repulsæ ergo lumbos suos ubi percussit mulier animi impotens, læsit tantopere tenellum foetus sui corpusculum, ut inde in lumbis enata sit ipsi insignis rapa. Sub quo tumore in defuncto cadavere spinæ medulla plane lacera apparebat. Et *cap. 29. p. 240.* idem autor meminit pauperculæ, septimo mense prægnantis, quæ supina in lumbos cecidit, sed sine evidenti cutis noxa. At infans in lucem editus habuit insignem tumorem in lumbis, quo ad aperto effluxit ipsi quidem frequens aqua, sed non minus ipsa vita. Qua sublata, dictus

ctus Tulpius vidit spinæ vertebrae, ut laceras, sic late a se invicem disparatas, & nervos spinalis medullæ tam perplexo errore per tumores dispersos, ut vix ullibi posuisses scalpellum, sine manifesto vitæ periculo. Ibidem etiam Tulpius admonet chirurgos, ne tales tumores improvide aperiant, hominesque occidant.

§. 88.

Hydrocephalus.

Hydrocephalum ex matris imaginatione ortum annotavit Guilelmus Fabricius Hildanus *Obs. chir. Cent. V. Obs. 3. Oper. fol. 386.* Mater scilicet illius infantis, cum adhuc puella undecim aut duodecim circiter annorum ætatis esset, ob intempestivam curiositatem continuo circa infantulum hydrocephalicum versabatur ejusque caput tractabat, post annos aliquot viro cum nupsisset, infantem hydrocephalo laborantem enixa, sæpissime & quidem toto gestationis tempore, monstrosum illud caput continuo fere, sibi ante oculos obversatum fuisse Fabricio fatebatur. vid. etiam Greg. Horst. *Oper. Tom. II. Lib. I V. Obs. 53. fol. 251.*

§. 89.

ab ira tremior.

Bernæ anno 1617. vivebat matrona quædam honesta, quæ ante annos decem, cum utero gestaret, ac quodam die cum alia quadam muliere in arenam descendisset, strenueque inter se linguis concertassent, ac prægnans ita supra modum commota esset, puellam postea peperit, quæ etiam dicto anno adhuc vivebat. Hæc animum quidem habebat heroicum, sed pedes manusq; contractæ erant, totumque corpus veluti in continuo motu, ita ut quasi saltando totoque corpore tremendo ut solent irati, incederet & domestica negotia perficeret, teste eodem Fabricio, Hild. *Epistol. Cent. I. Epist. 44. Oper. fol. 991.*

§. 90.

Pili.

Vinitoris Stutgardiensis uxori gravidæ, statura justæ prædictæ, carnosæ & robustæ cæteraque sanissimæ tribus septimanis ante statum partus terminum vicinus quidam ex petulantia felem mafcu-

sculum circa collum imposuit, qui aliquandiu partibus vicinis adhæsit. Anno 1682. d. 22. Maji enixa est puellum vividum & satis robustum, habentem tumorem in nucha similem scroto humano, in apice bifidum, basi lata partim nuchæ, partim extremo occipiti adnatum, pilis fuscis tectum, ejusdem scilicet coloris, quo felis mas impositus cervici fuit, &c. juxta Salomon. Reifelium *M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 115. p. 272 seq.* quo loco etiam allegatus autor aliud exemplum periculosæ imaginationis & terroris in gravidis addit: Relatum scilicet est Antwerpia de die 17. Septembr. 1682. in novellis, mulierem nobilis familiæ gravidam ex felis circa collum applicatione territam peperisse foetum monstrosum, cujus caput & humeri, quoad cutem, pilos & barbam felinis similes fuerint, reliquæ partes humanæ similem tumorem in medio occipitis magnitudine juglandis, tactu mollem, colore fuscum, multisque pilis, murium similibus, obsitum in infante masculo annotavit Johannes Lechelius, *l. a. Obs. 58. p. 363. 366.* Carolo IV. imperante *infantes villosi.* mulier Johannis Baptistæ effigiem sæpius contemplata hirsutum peperit filium, referente Johanne Jonstono *Tavmatograph. Class. X. cap. 7. Art. 2. p. 488.* In conterminis Pisæ mulierem puellam edidisse pilis camelorum similibus refertam, quia imago B. Johannis ante oculos ei perpetuo obversabatur, uti recenset Andreas Laurentius *Histor. anatom. Lib. VIII. Qu. 14. fol. m. 302.* vel juxta verba Ambrosii Paræi *Oper. Lib. XXIV. cap. 7. fol. 554.* testatur Damascenus, visam sibi puellam ursi instar villosam, quæ non aliunde eam deformitatem contraxisset, quam ex eo quod mater in ipso excepti & concepti feminis articulo, in D. Johannis camelina, ut solet, pelle tecti imaginem ex lecti oppositis fulcris pendentem, intuita esset, vid. etiam Simon. Majol. *Dier. Canicular. Colloq. III. fol. m. 42.* Depilis ursinis in puero a matris phantasia sequentem observationem refert Thomas Bartholinus *Cent. V. Hist. 24. p. 41.* Bergis Norwegorum, inquiens, apud Petrum Hiermind 1657. famulabatur puer, cujus pili prorsus ursinos pilos referebant &

colore & figuræ similitudine monstrosos pilos a matre contraxit, quæ gravida, quum sacræ synaxi interesset, attentis nimium oculis novam ursi pellem contemplantur, quæ nuper pro more loci ad aram strata fuerat. Adolevit jam ad justam hominis magnitudinem, sed barba caret, quæ qualis sit futura, tempus docebit. Et Martini IV. pontificis necessaria puerum instar ursi villosum Romæ peperit, quod eo tempore, quo conceperat & gesserat uterum, frequenter urforum imagines, quæ Ursinorum insignia sunt, oculis ac mente volvisset, uti ex Casparo Schotto refert Georgius Fridericus Rallius *de Generat. Animal. Sect. V. §. 22. p. 226.* Philippus Camerarius hanc historiam *Horar. subciv. Cent. I. cap. 54. p. 239.* ita recenset: Monstrum crinibus & unguibus urso simile, Nicolao III. Pontifici Romano, concubinam suam peperisse tradit Johannes Balæus, in ipsius actis, & citat Johannem Noviomagum in illustrationibus Bedæ: Hanc concubinam Martinum IV. primo sui pontificatus anno ad se recepisse & ne similis illi casus accideret, cum prole urfos omnes in palatio per Ursinæ factionis pontifices olim depictos, præcepisse auferri & deleri, (non ignorabat enim, quod formæ in ipsa venere, a feminis conceptæ, in productis infantibus expressæ non raro mancant) tradit idem autor ex historicis. Anno 1655 filiola publicis nundinis se spectandam exhibuit, quæ toto corpore, mento imprimis, hirci instar pilosa. Referebat is, qui eam circumducebat, matrem ejus gravidam impetus varios sustinuisse ab hirco quodam illatos, quocumque modo remove hostem hunc laborabat, nihil efficere valuerat, juxta Job. a Meekren *Obs. med. Chir. posthum. cap. 1. p. 353.*

§. 91.

Ronebus
aminus.

Notatu quoque digna est observatio Johannis Georgii Sommeri *M. N. E. Dec. II. An. 1. Obs. 40. p. m. 113 seq.* communicata, nimirum nobilissima quædam matrona prægnans filiolum cum canicula in mensam locaverat, mater mensæ affidens videt filiolum durius vellicare aures caniculæ lusus gratia secum jacentis: ecce cani-

canicula cum inimico faucium strepitu in filiolæ faciem involat
 ejusque nasum dentibus petit. Hoc nobilissima mater perterrita
 paulo post, justo quidem tempore, sed laboriose enitebatur filium,
 qui simulac in lucem editus esset, ex faucibus ronchum sonorum
 per triginta sex horas edebat, qui roncho canis in hostem invola-
 turi non erat absimilis. Cumque hic ronchus usu medicamento-
 rum aut parum levaretur, aut paulo post rediret, mulieres dictæ
 caniculæ aures & caudam per os recens nati infantis stringebant,
 quo facto ronchus quidem disparuit, sed epilepsia pertinax subse-
 cuta, quæ per Dei gratiam medicis auxiliis sublata est. Item mo- *Grunnitas*
 litoris cujusdam uxor tempore gestationis uteri horrendo suis *suillus.*
 grunnitu perterrita statò quidem tempore peperit filium, strepi-
 tum huic grunnitui similem gutture edentem. Plebejæ mulieres
 insolito hoc in casu, quid agendum, anxie quæritant, tandem
 a vicinis edoctæ in fimeto corruptas quasdam setarum suillarum
 reliquias ab illa sue (carne ejus nulla amplius superstite) infanti
 per os strinxerunt, quo facto strepitus ille crassius desiit & infans
 postea in robustum juvenem adolevit. v. *ibid.* p. 114. Grunnitum *Observatio.*
 suillum in infante sex mensium, cujus mater gravida saginandis
 porcis operam dederat, ante paucum temporis spatium observare
 mihi contigit.

§. 92.

Rarissimæ observationis est, quod ex communicatione Jo- *Coaxatus*
 hannis Franci refert Rosinus Lentilius *Miscell. med. pract. Part. I ranarum.*
 & *I L p. 370.* sequentibus verbis: Vidi puerum octo circiter an-
 norum, feminæ mendicæ filium, ex cujus ventriculo, tempore
 præsertim pluvioso, vox ranarum audiebatur, ac si multæ ranæ co-
 axarent. Inquirenti mihi, unde hoc veniret? mater responsum
 dedit: desideravi tempore graviditatis & opipare vixissem, mo-
 do talismodi animalcula habere potuissem, audiivi quidem coxa-
 tiones eorum, sed carnis non particeps esse potui; hinc deside-
 rium adhuc est in ventriculo filii mei.

§. 93.

Uvula du-
plex.

Interdum columella seu uvula duplex deprehenditur. Puer enim octennis ad Johannem Muys veniens conquerebatur, quod ultimas verborum syllabas difficulter pronunciaret. Inspicit hic linguam & penitus loquelæ depravatæ originem investigans invenit duas uvulas ex faucibus dependentes, quæ, dum puer os aperiebat, a se invicem separabantur, alias satis conjunctæ; unde mox conjecit aerem ex pulmone propulsum ac per angustias utriusque uvulæ intermediæ progredientem loquelæ vitium afferre, sed immedicabile. vid. Joh. Muys *Prax. med. chir. rational. Decad. 8. Obs. 9. p. m. 326.* Quæ columellæ duplicitas seu abundantia absque dubio a matris impressione dependet, uti ex sequentibus exemplis patet. Duplicem enim uvulam a matris imaginatione observavit Johannes Bohnius, in honesta quadam femina Lipsiensi, quæ cum gravida speculum ore aperto aliquando adiisset, ut uvulam sibi luxatam conspiceret, puellam postmodum edebat duplici uvula præditam: uti dictus Bohnius in collegio Pathologico referebat. Absque dubio etiam alia duplicis uvulæ exempla a matrum phantasia dependent; Andegavi enim hominem triginta annorum, qui duplicem habuit uvulam, legitimo in loco pendentem, se vidisse scribit Jacob. Rolandus *Aglossotomograph. cap. 2. in M. N. C. Dec. I. An. 3. p. 568.* Bis quoque Lucæ Schroëckio uvulam geminam observare licuit, uti ipse testatur *M. N. C. An. 6 & 7. Obs. 228. p. 337.* & quidem prima vice dum juvenis viginti quatuor annorum ipsius curæ subjectus singularem in columella naturæ lusum exhibendo, duplicem eam concessisse ostenderet, non quidem immediate palato adnatam, sed ex carnosâ aliqua rotunda excrefcentia, palato juncta, tanquam e basi quadam propendentem, cæterum naturali plane situ locatam, ac figura & magnitudine justâ præditam. Alterum exemplum ancilla viginti duorum annorum præbuit, cujus palatum duæ pariter uvulæ unitæ occupabant, quoad figuram nihil insoliti ostendentes magnitudine saltem naturalem illam haud æquan-

æquantes. Duplicem etiam columellam se in puello vidisse, scribit Henricus Vollgnadus *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 239. Schol. p. 342.* quæ tamen potius fuit divisa. In orphanotrophio Dresdensi ante *Observatio.* viginti annos puer alebatur quindecim annorum, nomine *Færster*, qui etiam a matris impressione in loco consueto binas monstrabat uvulas, quæ circa radicem unitæ videbantur.

§. 94.

Econtra vero alii columellæ absentiæ seu defectum a nativitate annotarunt, e. g. in puella quadam Gorlicensi, quæ nihil incommodi inde passa est, uti de patruelis sui Johannis Hagendor-*Uvulæ defectus.* nii observatione recenset Ehrenfried Hagendorn *M. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 239. p. 341 seq.* item *Histor. phys. medic. Cent. I. Obs. 68. p. 102.* De filio, qui columella & tonsillis destituebatur, unde & lac, quod fugebat, per nares statim reddebat, ideoque vigesimum primum saltem ætatis diem attingebat, vid. Phil. Salmuth. *Obs. med. Cent. III. Obs. 6. p. 115.* Bina exempla infantem post nativitatem uvulæ defectu laborantium, observavit Georgius Wolffgangus Wedelius *M. N. C. Dec. II. An. 5. Obs. 5. p. 12.* Idem Wedelius etiam *Tr. de Morb. Infant. cap. 4. p. 12.* uvulæ defectum vidisse ait, quod mater pisciculis vivis deglutiendis addicta ore aliquando piscis aperto inspectoque dedisset ad ideam talem repræsentandam occasionem. Unde id advertebatur a partu, quod papillam fugenti lac per nares extrorsum regurgitaret. Cui remedium suasit profundior in os infantis impressionem, ut breviori via lac melius deglutiri posset, ingerendo papillam longius. In progressu vero ætatis non poterant certæ literæ sermone exprimi, vid. etiam Act. Erudit. Lips. *An. 1717. mens. Sept. p. 404.*

§. 95.

Scribit Antonius Deusingius *de Fær. Mussipont. Section. VII. Oculi præ-* senovisse exemplum, quo per terrefacta uxor pastoris ecclesiæ, *vatio.* quod videret oculum filioli baculo forte punctum læsum, triduo post enixa est filium oculo orbatum, cum interim filiola ipsa læsa

convalesceret, ac ne visum quidem amitteret. vid. Laurent. Strauff. *Histor. Mussipont.* p. 112. Huc pertinet etiam cautela, quam Christianus Johannes Langius *Oper. Part. III. Disp. VII. §. 43. fol. 89.* chirurgis exhibet, ne in gravidis dentis evulsionem temerarie administrent, si quidem Salmuth referat, aliquando gravidam quandam ocularem dentem sibi extrahi passam paulo post foetum fuisse enixam sinistro destitutum oculo. vid. etiam ipse Philip. Salmuth *Obs. med. Cent. I. Obs. 86. p. 53.*

§. 96.

*Penis &
testes.*

Refert etiam Johannes Nicolaus Pechlinus *Observ. medic. Lib. III. Obs. 15. p. 431.* talem Archei Fescennini vim in fronte nati cujusdam impudicissimis testium colisque notis sese exseruisse, quod Onolsbaci apud egregium medicum, Lælium, vidisse meminit. Imo, pergit idem Pechlinus, dum hæc scribo, objicit monstrum fortuna, quod & ipsum impudici aliquid in visu alere videtur, excitatum, si matri tanquam testi credendum, ab improvviso conspectu prodigiose turrity aut pileati militis ex illis, quos *Dragons* hodie vocant; hujusque foetus monstrosi figuram loco allegato dictus autor communicavit.

§. 97.

Vulnera.

Femina quædam quatuor ultra menses gravida templum conscendit, tumulum, cui ossa matronæ nobilis inferenda erant, cum mulierculis curiosis aliis visitatura. Adstans incidit in statuam Salvatoris crucifixi, humi jacentem vulnusque insculptum lateri & cum sanguine emanante affabre depictum defixis oculis contrectat, ut a feminis, quas comites habebat, abstrahenda esset. Puerperium destinato tempore instat, filium enititur vulnere sub pectore quasi studio inflicto conspicuum, quod sanguinem lymphatico humore mixtum (*als ein Fleischwasser*) stillabat, elapsis aliquot demum hebdomadibus consolidato, juxta relationem Christ. Ludovic. Gœckelii *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 151. p. 312 seq.* Quandam gravidam, cum jam partus instaret tempus, maritum

stri-

stricto gladio insequutum frontique ejus plagas & vulnera minutatum esse ipsamque post prolem peperisse ingens in fronte gerentem vulnus, equo sanguis profluxerit tam abunde, ut fisti nequiverit prolesque obierit, ex Cornelio Gemma refert Johannes Sperling. *de Format. fœtus in uter. cap. 5. p. 105.* Cum matrona quædam herniosa, ex nobilissima familia Bernensi oriunda, secta & feliciter curata fuisset, & post menses sex a curatione puellum progenuisset, vulnus non exiguum in inguine infantis repertum fuit; cujus cicatrix etiam post trigesimum ætatis annum, adhuc apparebat. vid. Guilh. Fabric. Hild. *Observ. Chir. Cent. V. Obs. 3. f. 385.* Quo loco etiam sequentem observationem addit de gravida monomachiam duorum observante, quæ cum alterum ab altero transfodi videret, admodum perterrita digito oculorum palpebram petiit & paulo post puerum mortuum, cui caput transfossum erat, genuit. Et in epistola ad Mich. Doering. *fol. 900.* his verbis eandem observationem ex communicatione Danielis medicæ Dusbergensis, refert: Matrona gravida, cum duos inter se confligentes videret, & ex iis unus gladio perfoderetur, nec non mortuus in terram corrueret, supra modum perterrefacta & perturbata (exclamando & nomen Domini, pro eo, qui cecidit, invocando) manu dextra oculos obvelavit. Eadem die doloribus partus correpta fœtum mortuum, cui caput ab oculo ipso, ad occipitium usque perfossum erat, edidit. Novit etiam Daniel Senertus feminam, quæ cum vidisset, a lanio caput suillum securi dividi, filium genuit, cui tota superior palati pars cum maxilla superiore & labia superiore ad nares usque divisa erat. v. *ejusd. Consens. & dissens. Chymic. & Aristot. cap. 14. p. 236 seq.*

Caput
transfos-
sum.

§. 98.

De sternutationis idea fœtui a matre per totam graviditatem sternutante impressa observationem recenset Caspar Bezoldus *M. tio. N. C. Dec. III. An. 5 & 6. Obs. 183. p. 425 seq.* Sutoris scilicet uxor virago & primipara, quæ dum virago esset, præviis per unum vel alte-

Sternutatio

alterum diem sternutationibus instantis tributi lunaris admonebatur, ab ipso fœcundati uteri momento, ad tempus usque puerperii, nullum diem intermisit, quo non crebro, aliquando ultra quinquagesimam vicem (potissimum a coepta ad mediam usque gestationem) sternutaret, affectu isto eatenus fœtui indemni, quod ipsum non præmaturius utero ejecerit, hac tamen ratione nocivo, quod in eodem sigillatus ab hora partus ad præsens usque tempus (quo vitæ ejus primus annus ad finem tendit) illum explosione narium sonora quotidie crebrius turbare non desinat, matre interim a puerperio molesta ista sternutatione plene defuncta.

§. 99.

*motus la-
scivus.*

Singularem gravidæ imaginationem communicat Daniel Ludovici *M. N. C. Dec. I. An. 4 & 5. Obs. 208. p. 293.* Honesta, inquiens, femina, sub gestationis fere finem, negotii expediendi causa, ad vicinam ostio minus obserato invisens, tandem illam per cameræ rimam meridiari cum amico videt, non sine risu & joculari apprehensione. Post tres præterpropter septimanas enititur puellam, cum vigilaret, varie semet (sed modo, quem apud Martialem facilius quis legerit, quam ego descripsero) moventem; ut cum annicula jam in sella federet, etiam facies inde cum rubore nonnunquam intumesceret. Primo torminibus parentes adscripserant, sed, cum postmodum minus verecundum viderent, ad me detulere annum tunc cum dimidio natam, uxori meæ rem aperuit mater, nec per extantiora adhuc exempla absonum id ratus sum; curam vero pro talium more aut nullam aut perdifficilem futuram. Nihilominus experiundi gratia per quatuordecim dies vesperi quidem quotidie granum unum cinnabaris nativæ, mane guttas tres vel quatuor spiritus cephalici Hartmanni dedi, sicque incompta illa motitatio evanuit. Sexennem autem Quartillam hanc Petronianam dysenteria sustulisse dicitur.

§. 100.

Anno 1676. sartoris cujusdam pagani uxor in nundinis Sittavienfibus circumforanei histrionem cum saltatrice sua in utriusque manus annulari crotalum gestante, in publico loco choreas agentem mirasque gesticationes, deformes oris distractiones corporisque tortuosas flexiones perficientem, ore, quod dicitur, & oculis intentoque animo adspicit. Paulo post eadem ex difficili partu enititur puellulam viventem, depressis naribus & labiis ad utramque maxillam duplici modo scissis. De minimo utriusque manus digito itidem loco cymbali exigua eaque rotunda carnis portiuncula dependebat. Corpusculum vero anterius, posterius, dextrorsum sinistrorsum, quocunque lubebat, modo, projici poterat, ac si lumbares vertebræ vel nullam ossis consistentiam haberent, vel plane deficerent. Mirandum ergo, qua ratione imaginatio matris magnam suam virtutem in foetum integerrium & partui fere vicinum exercuerit, teste Christophoro Seligero *M. N. C. Dec. I. An. 8. Obs. 55. p. 92.*

mira flexibilitas.

§. 101.

Femina civis cujusdam Zittaviensis, custodis ad D. Johannis uxor, gravida sub concione, virgunculæ a dextris assidenti & cum pyxide sua balsamica ludenti cum oculis mentem aliquoties communicans, tempore debito pariebat puerum, alioquin formosum, cui in utroque annulari pars carnosæ dura, rotunda, adnata erat. Hanc obstetrix statim a primo intuitu cultro tonsorio abscidit, puerque postmodum adhuc vivens, exiguum, carnosæ pyxididis suæ balsamicæ, vestigium, cuilibet monstrabat, uti idem Seligerus, loco allegato recenset. Ante quindecim circiter annos generosissimi domini comitis a D. conjux non prima vice puerpera filiolum bene formatam pariebat, nisi quod a matris, circa graviditatis initium, intentis oculis cor vitulinum considerantis impressione in manu dextra, circa digiti auricularis radicem, excre-

Carnis portiuncula.

Observatio.

diculo quasi membranaceo extra manum propenderet, quæ tamen pars carnea, impedito per successivam fili ferici constrictionem ipsius nutrimenti affluxu, exsiccata post aliquot dies decidebat.

§. 102.

a vini pica
ca. fetus
mortuus.

Matrona quædam ad pariendum vicina prævia confessione apud mensam Domini se sistebat. Vini autem sacri parte porrecta atque ab hac assumpta abire recusat gradumque sustinet. Quæritanti sacerdoti, an forsan vini nihil accepisset? respondet, se quidem ejus portionem degustasse, sed secunda vice idem expetere. Annuit sacerdos atque iterum delibandum id matronæ præbet. Quo facto tertia vice calicem desiderat, quo recusato tristis domum petiit, quartoque insequenti die tres filios enixa est, quorum duo priores sani ac vivi erant, tertio mortuo mundum ingrediente. Si ultima vice in sacra synaxi vinum ipsi non fuisset denegatum, firmiter, se omnes filios vivos peperisse, sibi habuit persuasum: quod non adeo absurdum imaginationis efficaciam in ejusmodi mulieribus ponderanti videri potest, juxta Joh. Petr. Albrecht. *Observat. 14. M. N. C. Dec. II. An. 6. p. 40.* Quam gravidarum phantasiæ efficaciam confirmare etiam videntur feminae, pica erga virorum furas vel carnem laborantes, atque ob tertium denegatum morsum duos tantum vivos infantes, tertium autem mortuum enixæ sunt, quarum exempla in Chylolog. nostr. cap. 2. circa finem adduximus.

§. 103.

obesitas stupenda.

De stupenda pueri recens nati obesitate ex matris gravidæ impressione sequentem observationem communicat Fridericus Wilhelmus Clauderus *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 190. p. 380.* Cum aliquot ante annos copiæ electorales Saxonicae Cygneam, ad deletum militum instituendum, hinc inde passim moverentur, contigit, ut præfectus quidam excubiarum, vir rara pulchritudine ac corpore athletico præditus, in pago *Corbussen*, non procul ab oppido

pido Ronneburgo distante, apud rusticum pernoctaret, ibi ex itinere (Sirius enim tunc ardebat) fatigatus, habitu militari & chlamide exutus pectus denudabat. Rustici uxor per aliquot menses gravida ob raram a se conceptam hancce pulchritudinem in admirationem ducta, militem pectore nudato ad mensam sedentem, fixis continue intuens oculis tanta afficiebatur delectatione, ut nihil magis in votis haberet, quam quod semper eundem aspicere ac manibus contrectare illi licitum esset. Imo sibi adeo impressit illius imaginem, ut per totam demum noctem ipsi oberraret ante oculos. Quid sit? tempore partus accedente, peperit filiolum quoad omnia corporis membra perfectum ac sanum, attamen valde succiplenum ac obesum, qui statim a tempore puerperii insolita pinguedine ac nimia corpulentia indies aucta in tantam accrevit corporis molem, ut mater eum in fasciis solitis ulterius continere non posset; his tamen non obstantibus per annum temporis spatium lacte proprio nutrit. Ablactatus puellus optima semper utebatur valetudine &c.

§. 104.

Anno 1686. paupercula femina Alzææ gemellos peperit, quorum alter habebat vesicam sanguine repletam, totum os occupan- *Vesica sanguine plena.* tem, etiamque extra illud propendentem; qua levi punctura aperta, statim profiliit sanguis, non secus ac solet fieri arteria vulnerata; continuavit aliquandiu, donec vitam cum morte commutaret. Causam hujus vesicæ Johannes Richier, dicti loci physicus, infantis matri adscribit, quippe quæ pharmacopæo pleuritico, qui ob impeditam venæsectionem largam sanguinis copiam per os excernebat, linteis sanguinem ex ore prodeuntem abstergebat, & quia jam gravida erat, procul dubio inde hoc vitium contraxit foetus. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 199. p. 396 seq.*

§. 105.

Guilhelmus Fabricius, Hildanus puerum octennem vidit, qui cataractam sinistri oculi in ipso utero matris contraxerat. *Cataracta.* Ma-

ter enim dum gravida esset, ob intempestivam lacrymationem cataracta affecta fuerat, ex quo videmus, quam fortis & valida apud prægnantes sit imaginationis vis atque efficacia, v. Gu. Fabric. *Obs.*

Observatio. chir. Cent. V. Obs. 3. fol. 386. Nota quoque mihi est femina, Michaelis Schroeteri uxor, aliquot liberorum mater, quæ secunda vice gravida certam personam, in sinistro oculo cataracta laborantem, sæpius intentis oculis animique commotione intuebatur, præterlapso autem ordinario prægnantiæ termino, etiam filium pariter in sinistro oculo cataractam habentem peperit, qui hoc tempore, quo hæc scribo, octennis adhuc vivit.

§. 106.

*abdomen
pertusum.*

De ictu bombardæ & gladii proli per impressionem matris impacto sequentia refert Rosinus Lentilius *M. N. C. Dec. III. An. 2. Obs. 117. p. 176.* Anno 1644. juvenis quidam Geislingensis, ad oppidi mœnia habitans, bombardam in oppidi fossam explosit. E regione diversata pistoris uxor mensem octavum gravida, perterrefacta, se plumbo trajectam credidit, manu sua dorsum illico contrectans, inde male habens, triduo post infelici partu foetum est mortuum enixa sine ullis profusi vel tantilli cruoris vestigiis. Ad ossa coxendicis ecce foramen totum abdomen pertundit, quod exitum sibi prope umbilicum ita parabat, ut ab uno limbo ad alterum, ceu per syringam visui transitus pateret. Deinde vidit Simonius chirurgus Tubingensis monomachia Brisaci coeuntes cum balistario triarium, quorum iste balistarius (quos vocant, qui tormentis bellicis explodendis destinantur) gladio totum corpus terebrante confossus occubuit. Istius itaque balistarii de mariti salute sollicita uxor gravida, cum ex improvviso digladiantibus occursaret, intra paucas horas, mariti clade perterrefacta, foetum enititur iisdem, quibus parens, locis perforatum. Quæ binæ historiæ, tametsi persimiles existant, in hoc tamen differunt, quod Geislingensis foetus pertusus fuerit eo in loco, quem sua manu

*foetus per-
foratus.*

manu gravida mater contrectarat, Brisacensis vero eo, quo pater, vulneratus interierat. vid. etiam §. 134.

§. 107.

Nobilis femina in Finmarchia ex superiori hypocauſto in culinam descendens ſub ſcala forte reperit canes venaticos a coitu cohærentes. Quo fœdo ſpectaculo perterrita non deſtitit quidem, clauſis foribus, utrumque baculo tamdiu delumbare, donec ſejungerentur. Peperit vero poſtea gemellos diverſi ſexus mortuos, at pudendis canum inſtar monſtroſe cohærentes. Qui ocyus & clanculum tumultati rumore effugere publicum, uti ex communicatione Ambroſii Rhodii refert Chriſtianus Franciſcus Paullini *M. N. C. Dec. II. An. 5. App. p. 53.* Imo matrona Venetiis una portione gemellos edidit, quorum corpora cancellatis cruribus ita juncta invicem erant, ut ægre ſexus diſcerni poſſet: quod aſpexerat propudioſam quandam imaginem, qua complexus ſponſorum exprimebatur, uti ex P. Schott. adducit Petrus Müller. *Diſp. de Jur. Prægnant. cap. 2.*

Cohaſio gemellorum.

§. 108.

Idem Ambroſius Rhodius, dicto Paullini ingenuè faſſus eſt, ſe in Laplandia viſiſſe puellam lepidam ac venuſtam, cujus vulva vero intus erat piloſa. Cauſam conjecit in phantaſiam matris, quæ forte crebrius contrectarat membrum mariti, pilis valde luxurians, & dormiens digitum in genitalia ſua intruſerat. vid. *l. a.*

Vulva intus hirsuta.

§. 109.

Horridum imaginationis in gravida effectum anno 1697. in futuro annorum ſex ultra quinquaginta obſervavit Roſinus Lenti-
lius *Miſcell. med. pract. p. 360.* Caput enim erat vaſtum, facies tumida, oculi quaſi ſugillati, labia cærulea; vultus integer cæruleus magis colore, quam fuſcus, immo color talis, qualem referre ſolent apex abones, transparente per cutim teneram obſcuro cruore. Nunquam talem viſi, ſiquidem nativi coloris in facie tota ne parva lineola. De cauſa nævi decumani quæſitus reſpondit,

horrida facies.

superiori tricennali bello, quum Harburgo, prope Donaverdam, incolæ sibi fuga consuluissent, matrem collectis pretiosioribus reculis in arcem editam Harburgensem se contulisse, ut alicubi sua conderet. Ibi cum latebras huic negotio aptas quæ sivillet, obvenisse ad templi parietem valvas binas, intra quas erat structus mons oliveti, cum historia Dominicæ passionis statuis e saxo excisis. Gravida mater distractis valvis intuitu subitaneo fertur in S. Johannem crucis dominicæ adstitis, pigmentis ejusmodi incrustatum, qui librum insuper sub axilla rubrum gestaret; perterrita mulier valvas illico clausit quidem, aspectus tamen caractere in phantasia relicto, natus hinc puer, non ea tantum, quam descripsi facie, verum & libri colorem in dextro latere ostendens. Goudæ in Hollandia mulierem quandam videntem greges gallinarum Indicarum, consternatam fuisse, ut postea pepererit foetum habentem faciem multis excrescentiis carnosis multiformis coloris galli Indici instar defœdatam, ex Sebastiano Münstero refert Daniel Sennert. *de Chymic. & Aristot. Consens. cap. 14. p. 236.* vid. etiam Joh. Schenck. *Obs. med. Lib. IV. f. 566.*

§. 110.

facies pallida.

Retulit Zacuto Lusitano Doctor Valle, medicus eximius & expertus, se vidisse feminam, quæ plures infantes pepererat pallore vultus ita infectos, ut cadaveris imaginem referrent, quod illa inter coeundum, infantem mortuum in lecto ante oculos depictum intueretur, quo remoto alios deinceps peperit vividos, formosos & rubicundos. vid. Zacut. Lusit. *de Medic. princip. Hist. Lib. III. Hist. 12. fol. m. 487.* Witenbergæ civem cadaverosa facie fuisse natum, eo quod mater uterum ferens obvio cadavere subito fuerit pavefacta, refert Joh. Bened. Sinibaldus *Geneanthrop. Lib. VIII. Tr. I. cap. 1. p. 680.* v. Martin. Weinrich. *de Ort. monstr. P. I. cap. 17. p. 160. b.* Mulierem quandam mortuum infantem peperisse ad similitudinem puelli, quem singulari artificio ex marmore in cubiculo habuerat, ex Joh. Baptistæ Portæ *Mag. natur.*

Lib.

Lib. II. cap. 23. refert Philippus Camerarius *Cent. I. cap. 54. pag. 240.* Ipsius autem Portæ verba *cap. 20. p. m. 92 seq.* sic sonant: Quædam mulier pulchros filios parere percipiens candidum marmoreumque puerum beneque formatum ante oculos sibi proposuit, talis enim formæ puerum exoptabat coeundo & uterum gerendo, quam sæpissime animo volutabat, enatumque postea foetum ostendit mater obesulum, nec a marmoreo simulacro diffitum, sed ita pallentem, ut verum imitaretur marmor, & veritatis experientia patuit. Experimento quotidie deprehenditur, gravidam de morte parentum, amici aut mariti, tristem audiens nuncium eniti infantem cadaverosa facie præditum, uti ex Chr. Warlitz. allegat Petrus Müllerus *de Jure Prægnant. cap. 2. §. 13. p. 15.*

§. III.

Mulier prægrandi utero tumens | cum partus tempora non ^{trium re-} procul ab Epiphaniæ festo seu trium regum, vulgari calculo con- ^{gum æthi-} jecisset, aliis alludentibus, ac si reges tres utero ferret, quod felix ^{ops.} faustumque sit illa respondit. Neque fefellit eventus rei: nam regum profesto enixa est proles, masculas tres, quarum una colore bituminis regem æthiopem præ se ferebat, etsi eadem non vixerit diu, uti ex Gemma refert Johannes Schenckius *Obs. med. Lib. IV. fol. 565.* Regem quendam, qui paulo antea de æthiope habuerat sermonem, uxori commistum eadem mente revolvisse imaginaria quadam repræsentatione tametsi tum ipse tum uxor albo colore essent, æthiopem genuisse ex Galeno refert Simon Majolus *Diercanicul. Colloqu. 3. fol. m. 42.*

§. II2.

In oppido Essen, in Marchia, matrona quædam gravis cum ^{Fœtus mor-} casu ictum bombardæ in coxam dextram, non quidem globo, sed ^{tus & ni-} charta madefacta, & dentibus masticata reciperet, protinus dolo- ^{ger.} ribus partus correpta fuit, & aqua, quæ foetum comitari solet, paulo post effluxit. Sequenti die foetum non tantum mortuum, verum etiam nigrum, quasi pulvere tormentario infectus fuisset, edidit,

edidit, juxta Guilhelm. Fabric. Hild. *Epist. ad Mich. Dæring. Oper. fol. 900.* Gravida tonitru perculsa foetum mortuum membris convulsis rigidisque edidit. vid. *Act. phys. med. Acad. Nat. curios. Obs. 3. p. 5.*

§. 113.

Capita co-
alita.

Tempore Sebastiani Münsteri prope Moguntiam accidit, cum duæ mulieres in platea confabularentur, alteram ex improvise venientem a tergo frontes utriusque collisisse, & postea alteram earum, quæ prægnans erat, inde filias duas peperisse frontibus ad nasum usque cohærentes, quæ sic decem annis continuis conjunctæ vixerint. vid. Dan. Sennert. *de Chymic. cum Arist. consens. & dissens. cap. 14. p. 236.* vid. etiam Hieron. Cardan. *de Subtilitat. Lib. XII. fol. m. 379.*

§. 114.

Offis occi-
pitis absen-
tia.

Filia præter propter tres annos nata, cujus mater jam septem menses & dimidium gestabat uterum, imprudens per valvas superne prolabitur in caput: advocatur chirurgus, qui post artis suæ tentamina os occipitis confractum esse pronunciat; hoc, quasi fulmine icta, mater ita percellitur, ut post octo dies infantem ederet in lucem vita & toto occipitis osse carentem. Loco offis visebantur quædam pelliculæ dilaceratæ & divulsæ ab invicem, vid. Theod. Kerckring. *Spicileg. Anatom. Obs. 64. p. m. 129.*

§. 115.

Cranii de-
fectus.

Rivetus chirurgus Parisiensis accersitus, ut obstetriciam exerceret in uxore cujusdam pannificis, peracta extractione foetus rite conformati, alterum itidem eduxit cranio orbatum cum pauxillo cerebro, etsi satis adhuc vitalis fuerit, ut ad sacras usque ædes deferri valuërit ibique sacro fonte ablui. Hoc vero præsertim admiratione dignum, quod, antequam a matre conspectus fuerit ille foetus, prædixerit, capite illum orbem futurum; eo quod singulari animi attentione conceptionis tempore conspexisset imaginem B. Virginis, sic depictam, ut caput illius a ma-

nu, cooperiretur. v. Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. 3. mens. August. Obs. 9. p. 106.* Pueri recens nati, sed antea mortui cranium in fragmenta multiplicia vixque numerabilia comminutum vidit Antonius Everhardi. Causam hujus mali professa est puerpera, quod ante quatuordecim dies ex scamno, prono capite primum in mensam, mox capite supino in terram turbata valde concidisset, nulla continui solutione, excepta in fronte excoriatione levi se manifestante. vid. Georg. Frider. Rallius *de Generat. animal. Sect. V. p. 231 seq.* De muliere nobili egregium, sed mortuum & calvaria carentem foetum pariente vid. Francisc. Rosset. *de Part. Caesar. Append. Casp. Paulin. p. 223.*

§. 116.

Uxor civis Hafniensis anno 1673. mense Augusto enixa est filium tam acceptum, quia primogenitus, quam ingratum, quia ^{Manus de-} ^{fectus.} primam lugendi materiam parentibus præbuit: una enim manu mancus prodiit & altero pede curvus. Forte enim obvians prægnans mater mendicantem, manu truncatum & pede flaccidum viderat, cujus speciem nec die nec nocte potuit oblivisci, referente Thoma Bartholino *Act. Hafniens. Vol. II. Obs. 1. p. 2.* quo loco dictus autor sequentem admonitionem maxime necessariam annectit: magno periculo prænantium occurrunt in plateis locisque publicis mendicantes, vel morbo sacro concidentes, vel membris mutili. Utinam his provideretur in rebus publicis, ne publice oberrando inficerent mortale genus. Absque dubio autem adductum exemplum idem est, quod in juvencula Gerhardiana annotavit Olaus Borrichius *l. a. Obs. 82. p. 201.* Hæc scilicet quarto gestationis mense aream palatii regii incauta perambulans conspicatur ad pedem Byrsæ egenum mendicato viventem, qui, ut miseria sua misericordiam transeuntium evocaret, truncam manum suam & pedem mutilum late ostentabat. Viso hoc infelici ostento illa cohorrui, ut domum revertens marito tristitiam inde conceptam significaret, & de frigore dorsi circa os sacrum con-

quereretur. Ille frigidulam auram viæque longioris molestias causari & alia atque alia lætitiæ argumenta conquirere, ut erat sagax & non inscius futuri, si imaginatio constantius uxori adhæreret. Quid multis? perit tandem facti memoria & animus gravidæ a sollicitudine revocatur ad quietem. Interea ex horaria speculatione turbata feminæ imaginatio eas jam in embryo duxerat lineas, eos signaverat characteres, qui totis sex mensibus nescirent obliterari. Prodit enim justo tempore misellus infans & easdem infelicitatis notas manu pedeque, quas in mendico spectaverat mater, in auras vitales secum exportat. Vidit etiam Paulus Spindlerus Heroem Ducali familia oriundum, ex obsidione Budensi anno 1686. vulneratum, Pofonium delatum, & post Viennæ extinctum, qui altera manu carebat, eo quod ipsius mater cum ipso gravida in Poloniæ tumultibus, a milite in consensione arcis, ubi cum Duce, marito suo residebat, captivata & gladio in manu sine tamen ulla læsione percussa, amputatam sibi eandem consternata crediderit. vid. Spindler. *Obs 96. Schol. p. 171.* Et Gustavus Casimirus Gahrlied. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 88.* exemplum recenset, quod ex illustrissimæ cujusdam principis ore habet. Cum scilicet illius arx, in qua ab omni hostilitate, vi pactæ neutralitatis ac prolixissimarum pollicitationum, omnino secura residebat, inopinato ex insidiis occuparetur, ipsaque serenissima oborti circa crepusculum vespertinum, in tranquilla alias aula insoliti tumultus causam sciscitatura per fenestram in atrium prospiceret, ac cuidam paucorum, quos alebat, præsidiariorum officiali dextram, qua ictum gladii capiti ex improviso intentatum amoliri tentabat, amputari cerneret, inopino ac tristi spectaculo validissime commota, summa insuper & inexcusabili perfidia in captivitatem abducta, una cum principe suo & liberis, omnique opulentissima supellectili spoliata, quatrIduo post partu difficili enixa est principem, omnibus alias numeris ab-

solu-

solutissimum, ac tam corporis, quam animi dotibus, quod adolescens ejus ætas docuit, excellentissimum, sed manu dextra quæ nusquam apparuit, mutilum. Amstelodami Maria de Vogeler Henrici Hoochcameri conjux sinistra manu caruit ex terrore, quo mater gravida fuerat perculsa a mendico, qui neganti stipem subito tanquam minabundus ostentavit nudum manu truncatum brachium suum, uti ex Lindano refert Antonius Deusingius *de Fœt. Mussipont. p. 23.* De puero, qui sinistra manu prorsus destituebatur, ejus vero loco pedem felis anteriorem obtinebat, vid. Philipp. Salmuth. *Obs. med. Cent. II. Obs. 15. p. 66.* Fœtui manum periisse, quod manus matris a scropha grandiore periculum immineret, vid. Anton. Deusing. *de Fœtu Mussipont. Sect. VII. p. 112.* Sartoris uxor Mechliniæ præ foribus vidit militem in conflictu manum amittere: statim perculsa horrore peperit filiam una manu, altero autem cruentoque extinctam, quod manus ejus non reperiretur, & hæmorrhagia infantem interimeret, juxta relationem Johannis Baptistæ van Helmont *de Inject. material. §. 9. fol. m. 367.* In vicino pago Grisheim Johannis Ochlen, pistoris, uxori gravidæ, paulo ante partum, sues saginanti, a grandiori scropha dextra manus ore prehenditur, unde factum est, ut terrefacta mulier pareret filiam, sine manu dextra, cætera sanam. Cæterum nuspiam dextra manus reperiri potuit, neque vel ossa, vel ulla in lochiis apparuit putrilago, in quam manus computruisset, uti ex Laurentio Straußio recenset Georgius Fridericus Rallius *de Generat. Animal. Sect. V. §. 22. p. 232.* Ante aliquot anno ancilla quædam Palæodresdensis ex furtivo amore gravida infantem enitebatur, non modo sinistra manu, sed dimidio quoque ejusdem lateris brachio mancum, siquidem totum brachium antè, ulna scilicet radius & manus, decrat, circa extremitatem autem ossis humeri duo prominebant digiti. Cum postea dicta mater de causa monstrosi hujus fœtus a me examinaretur, respondebat ipsa: tempore ipsius graviditatis, sæpissime mendicum quendam, eo-

Observatio.

dem modo mutilatum, in suam culinam venisse, hocque mon-
strato brachio vitioso eleemosynam aut victum ab ea petiisse.

§. 117.

*Digitorum
defectus.*

Interdum digiti aliquot ob gravidæ matris imaginationem
desunt. Suinfurti enim accidit, ut uxor cujusdam lanionis circa
dimidium gravidationis tempus in mola occupata ex improvise
spectaret manum ministri molitoris digitis quatuor mutilatam,
hinc perterrefacta adstantibus mulieribus factum narrat, a quibus
animatur, & ut manum ministri paulo accuratius contempletur,
informatur; illa dictis paret, ast postmodum enixa est filiulam cæ-
tera vegetam, cujus manus dextra pollice quidem donata, ast qua-
tuor reliquis digitis naturæ conformibus erat orbata, quorum lo-
co particulæ carneæ breviores, parum mobiles, absque ullis arti-
culis, cartilagineis protuberantiis aut unguibus extabant, teste
Johanne Laurentio Fehrio *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 30. pag. 84.*
Pollicis defectum in filiola circa finem octavi mensis nata observa-
vit Franciscus Mauriceau *Observ. 640. p. 372.*

§. 118.

*Brachio-
rum defe-
ctus.*

Brachiorum quoque a matrum imaginatione deficientium
exempla annotata leguntur, siquidem secundum Joh. Baptistæ
Helmont. *l. a.* uxor Marci de Vogeler, mercatoris Antverpiensis,
anno millesimo sexcentesimo secundo videns militem mendican-
tem, cui pila ferrea in obsidione Ostendana dextrum brachium
abstulerat, illudque adhuc cruentum circumferebat: mox abin-
de filiam peperit orbam brachio, & quidem dextero, cujus cruen-
tus adhuc humerus per chirurgum solidari debuit. Nupsit Mer-
catori Amstelodami, cui nomen Hoochcamer, illa anno 1638. ad-
huc fuit superstes. Neque etiam uspiam reperibile fuit brachi-
um hoc dextrum nec ossa, &c. Mulierem ex oppido S. Maxentii,
cum prohiberi non posset, quo minus miserum infantem feminæ
alicujus peregrinæ, qui sine brachiis natus fuerat, visum iret, ex-
pleto ad pariendum tempore, simile monstrum peperisse, in quo

ne

ne quidem minima excrescentia prominebat, quæ locum brachiis prodeundis destinatum ostenderet; ex Digby refert Georgius Fridericus Rallius *l. a. p. 230.* Ab occurſu ejusmodi mutili ſimilem partum annotavit Roſinus Lentilius *Miſcell. med. pract. Part. I. p. m. 3.* inſuens: Anno 1676. cognata mea duorum antea liberorum mater, tertio partu enixa eſt filiolum ambobus brachiis adeo uſque truncatum, ut neque eorum ullum extiterit veſtigium. Contemplata autem curatius erat mendicum his artubus mutilum, & ſtipem in regia via prope Lipſiam petentem. Hardevici circumforaneum hominem ſine brachiis natum & ad ſcribendum pedibus natum ſe vidiffe, ſcribit A. Deuſing. *de Fæt. Muſſip. p. 18.* quo loco etiam conſimilis feminæ, pedibus ad nendum & ſuendum, loco manuum utentis, ex Mercato meminit. Idem infortunium expertus quoque eſt Thomas Schweickerus Saxo-Hallenſis, qui ſine brachiis fuit & ad decrepitam ætatem ſupervixit, omniaque munia quæ alii ingenioſiſſima opera ſuis manibus eadem, hic pedibus incredibili fere ſolertia perfecit. Cum enim in editiore loco, qui æquaret altitudinem tabulæ, in qua eſculenta appoſita erant, conſediſſet, apprehenſo pedibus cultro ſcindebat panem & alios cibos, pedes ea poſtea nec non etiam potum, veluti manu, orî porrigebant. Pedibus etiam tam elegantes pingebat latinæ & germanicæ literas elegantiffimas, cultello quoque parabat calamos ad ſcribendum aptiſſimos. Ipſius autem pedum digiti ita erant oblongi & ad reſtenendas apti, ut procul aſpicientibus manus (pallio enim ſuo verecunde admodum crura tegebat) viderentur; uti refert Philip-
pus Camerarius *Horar. ſubciſiv. Centur. I. cap. 37. pag. 169 ſeq. & Cent. II. cap. 8. p. 27 ſeq.* quibus locis Johannis Poſthii epigrammata in dictum Schweickerum reperiens. Hujus Schweickeri iconem communicat Johannes Georgius Schenckius *Hiſtor. Monſtr. pag. 31 & 35.* qui etiam *p. 30.* meminit, eundem quoque admirabili induſtria eadem, quæ arcularii dedolando, ſculpando, ſcindendo, forando, ferrando ingenioſiſſima efficere ſolent opera, velut co-

lumnas, peristylia ejusque generis alia, pedibus felici imitatione præstitisse. Hunc autem brachiorum defectum propter terrorem fortemque imaginationem matris, cum forte fortuna pauperem brachiis orbatum videret, accidisse, ex Matthia Quando probat Guilhelms Fabricius, Hildanus *Obs. Chir. Cent. VI. Obs. 66. p. 580.* vid. etiam Gregor. Hørst. *Oper. Tom. I. fol. 463.* Lutetiis quoque olim visus est vir quadragenarius quadrato corpore, qui etsi brachiis careret, omnia tamen, quæ manibus perfici solent, munia, haud infeliciter obibat. Humeri enim trunco & capite colloque vibrato securim in palum oppositum, tam certo & valido ictu, quam manu quivis alius vir, ejaculabatur, aurigæ flagellum tanta vi distringebat, ut aere validius percussio resonaret. Cæterum pedibus edebat, bibebat, chartis lusoriis & talis colludebat. Tandem latro & sicarius deprehensus, ex cruce strangulatus rotæ affixus est. vid. Ambros. Paræi *Lib. XXIV. cap. 6. fol. 554.* Plura sine brachiis natorum exempla commemorat Johannes Georgius Schenckius *l. a. p. 28 seqq.* Philippus Camerarius *Hor. subciv. Cent. I. cap. 37. p. 170.* Fort. Licet. *de Monstr. p. 8. 56. 60.*

§. 119.

Pedum defectus.

Femina viginti sex annorum quinto gestationis mense amendici in platea eleemosynam petentis atque, pro visceribus magis commovendis, prætereuntibus os denudatum, ab amputatione pedis relictum ostendentis, intuitu ita terrore perculsa atque commota est, ut aliquandiu eum oculis quasi infixum tenuerit memoriaque absentis, quanquam oculis inerraverit; Exactis aliquot diebus nihil amplius curavit, bene sese habuit, iustoque tempore partus, ad novi mensis finem, infantem mortuum in lucem protulit, partibus superioribus a vertice ad umbilicum rite ac egregie dispositis, pulcherrima mascula facie ornatum; deformitatem & monstrositatem in inferioribus, ab umbilico nimirum ad extremum corpusculi præ se ferebat; quod loco pedum sensim

acu-

cuminatam caudæ vervecinæ instar superius tres digitos transversos latam ac crassam, inferius vero in apicem terminantem, dimidii pedis longitudine ad umbilicum reflexam excrescentiam carnosam ossibus imprægnatam gerebat &c. referente Johanne Henrico Hottingero *M. N. C. Dec. III. An. 9 & 10. Obs. 233. p. 413.* vid. etiam Joh. Georg. Schenck *l. a. p. 28. 51 seqq.*

§. 120.

De pede infantis anserino ex matris terrore notabilem historiam recenset Christianus Franciscus Paullini *M. N. C. Dec. II. An. 6. App. p. 70.* Dederat nimirum ancilla nobilis & maxime strenui Dn. ab Ufslau, equitum magistri, anseribus faginandis suetum pabulum, cui nequam puer semen hyoscyami & cicutæ clanculum & petulanter immiscuit. Cœperunt illi titubare, stupere, stertere, denique magno clamore infanum proeliari & se invicem mordere. Advolat opilionis conjux tunc gravida, ut stabulo expelleret tumultuantes. Sed ecce! unus isque masculus, dextro pede elevato, magno strepitu, clamore & impetu in mulierem involat, quem illa repagulo ligneo, quod forte dextra tenebat, abactura percutit, ut claudicaret. Hinc perterrita maxime cruciabatur, rens, se pœnas hujus facti luituram. Terrore igitur & errore hoc menti obversante perpetuo, id tandem effecit mulier, ut filium pepererit, cujus pes dexter inferius vere esset anserinus.

Pes anserinus.

§. 121.

Anno 1655. vidit Jobus a Meckren puerum octo vel novem septimanarum, pedibus brachiisque privatum, cujus mater triginta octo annorum liberos plurimos sanissimos antea pepererat. Monstri vero hujus causa erat, quod filium tredecim annorum in prælio navali Anglico brachiis pedibusque orbatum certo sibi persuasisset; vixit hic puer ad menses quinque v. Job. a Meckren *Obs. med. chir. posthum. cap. 1. pag. m. 351 seqq.*

Infans sine pedibus & brachiis.

§. 122.

Ipsius capitis defectum annotavit Johannes Baptista van Helmont

Capitis de-
fectus.

mont de *Injeçt. material.* §. 9. fol. m. 367. Uxor, inquiens, mercatoris cognita nobis, ut audivit quod uno mane decapitarentur tredecim (tempore Ducis Albani contigit Antverpiæ) statuit spectare det truncationes. Adscendit ergo cubiculum familiaris sibi viduæ, in foro morantis; visoque spectaculo statim illam adorsus est dolor parturientis peperitque maturum infantem cruento collo, cujus caput nusquam apparuit. Et *Tract. Nexus sensitive & mentis* §. 14. fol. 220. meminit mulieris, quæ cernens Bruxellæ in foro aliquem capite plecti, pariebat foetum decollatum, cujus caput juxta truncum reperiebatur. Item Franciscus Mercurius ab *Helmont Observat. circa homin.* §. 94. p. 108. meminit gravidæ, quæ cum decollari quendam vidisset, paulo post foetum enixa est, cui non tantum deerat caput, sed plane disparuit. Mirabilis item est relatio de infante nato, cujus mater seorsim partu excluserat caput, & seorsim truncum; prægnans enim cum stupore in foro malefici cujusdam caput detruncare conspexerat, uti ex Dygbæo recenset Petrus Müllerus *Disput. de Jure Prægnant. cap. 2. §. 13. p. 15.* vid. etiam G. W. Wedel. *Patholog. dogm. Sect. II. cap. 9. p. 319.* Zittaviæ ante aliquot annos factum, ut faber quidam ferrarius securis manubrio uxorem, per quatuor menses prænantem percutiendo, collum quoque ejus contingeret, unde hæc abortivum enitebatur foetum, cujus caput plane detruncatum seu a trunco separatum comparuit, secundum relationem Johannis Bohnii in *Colleg. Patholog. de monstro acephalo.* vid. *M. N. C. Dec. II. An. 9. Obs. 148. p. 258.*

§. 123.

Cerebri de-
fectus.

De puella sine cerebro nata historiam narrat Johannes Jacobus Wepfferus *M. N. C. Dec. I. An. 3. Obs. 129. p. 205 seq.* Jacobi Ernii uxor decies feliciter peperit, undecima vice utero gerens, circiter medium gestationis tempus incidit in rusticorum, strictis gladiis dimicantium, turbam, viditque unum in capite, undique manante sanguine, vulneratum, ac ambabus manibus, hoc spectaculo valde

valde territa caput perfricuit. Postmodum peperit legitimo tempore puellam, non gravioribus nixibus, quam quibus cæteros foetus edere consueverat. Puella e claustro materno liberata, & communis auræ particeps facta aliquoties vagiit & manus pedesque movit. Obstetrici cæterisque mulierculis vittam carneam in capite gestare videbatur; Eodem die sacro fonte tincta circa duodecimam noctis horam visus usuram amittebat. In sectione occurrebat moles convexa, rubicunda, anfractuosa, similis fere cerebro jam denudato, adeo ut cerebrum cute capillata & maxima cranii parte spoliatum explorationi se sisteret. In dextro latere, separata membrana tenui, loco cerebri deprehendebatur moles ex plurimis vesiculis, & ne minimum quidem cerebri apparebat: quod etiam in sinistro latere evenit.

§. 124.

Quandoque etiam a matris impressione penis defectus annotatur; cum enim Basileæ barbitonforis cujusdam ædes incendi- Penis defectus. um paterentur, ejusque uxor gravida expergefacta præ terrore indusium induere oblita, nuda prorumperet, a famulo nuditatis admonita, illico manum pudendo præposuit: postmodum puel- lum, membro genitali, non vero testibus carentem enixa est, qui paucos annos supervixit. vid. Caspar. Bauhin. *de Hermaphrodit. Lib. I. cap. 4. pag. 40.* Plura de penis a nativitate defectu exempla in *Spermatolog. nostr. cap. 3. §. 20. p. 117.* reperiuntur.

§. 125.

Parisiis in nosocomio stultus ad annum usque vigesimum Ossa diffracta. vixisse perhibetur, cui ossa brachiorum, crurum aliarumque partium a nativitate fuerant disrupta, non aliam ob causam, quam quia mater ipsius prægnans non sine terrore conspexerat malefico cuidam ossa a carnifice publice confringi. vid. Joh. Muys *Prax. med. chirurg. rational. Dec. III. Obs. 1. p. m. 103.* Femina quædam gravida, cum quadam die vicini sui infantulum ex alto quodam muro in terram corruere videret, supra modum perterrefacta at-

que commota fuit, nihil aliud sibi persuadens, quam infantulum istum omnia sua confregisse membra: & aut in ipso casu, aut paulo post vitæ suæ finem facturum: cum tamen ne minimam læsionem ex casu isto receperit. Mansit gravida in istis angustiis & animi perturbationibus per aliquot septimanas. Tandem vero non absque difficultate foetum edidit, sed mortuum, habentem omnia sua membra veluti confracta & mirum in modum contorta. Sed, quod summopere admirandum, indutus fuerat infantulus prænominatus, cum ex alto delaberetur, veste quadam alba, undique fimbriis rubris adornata, quæ rubræ etiam fimbriæ in foetu isto mortuo evidentissime apparebant, juxta Guilh. Fabric. Hild. *Respons. ad Mich. Dæring. Oper. fol. m. 900.* Item cum nobilis quædam matrona primo utero gestaret & sub initio secundi mensis imprægnationis ante crucifixum transiret, nec non latronis ad sinistram pendentis crura confracta distortaque attente & nimis curiose inspiceret, puellam ex dextro crure mirum in modum deformem postea procreavit, secundum eundem Fabricium *Cent. III. Obs. 56. fol. m. 240 seq.* qui in consilium vocatus rotulam nullam invenit, crus, quod valde extenuatum & cum altero crure proportionem nullam habuit, coxam versus retractum fuit, neque extendi potuit &c. Ibidem etiam meminit illustris cujusdam gravidæ, quæ cum quadam die crepidis incederet & forte fortuna vacillaret, aliquo modo commota atque perturbata fuit. Puellum postea progenuit, cui pes dexter ita distortus fuit, ut digiti versus talum interiorem, totusque vero pes suram versus reflecteretur. Itaque cum incederet, non planta pedis, sed potius malleolo exteriori solum calcabat. Exemplum feminae, quæ, cum assisteret supplicio, quod rota in hominem flagitiosum statuebatur, adeo a singulis ictibus facile consternata fuit, ut filium peperit a prima nativitate fatuum, cujus singula ossa distracta erant pariter, ac illius, qui ob flagitia commissa dictam poenam sustinuit, ex autore Scrutinii Veritatis refert Johannes Jacobus Harderus

M. N. C. Dec. II. An. 2. Obs. 185. p. 402. Aliud exemplum de viribus imaginationis in prægnante annotavit Nicolaus Blegny *Zodiac. med. Gallic. An. 1. mens. Mart. Obs. 6. p. 62.* scilicet puellam, sub regimine matris constitutam, effrænata licentia eo perduxit, ut viri cujusdam irretita amoribus, in ejus amplexus ruerit, nec semel, sed iterato. Ex condicto loco, quarto aut quinto a primo concubitu die, redeunti occurrit carnificina facinorosi post strangulationem confractis artubus rotæ impositi. Non eo momento solum terror inductus ab horriferi spectaculi aspectu, sed & metum incussit proprium crimen admissum, ac poenæ a matre expectandæ, a natura digitis in manibus & pedibus destituta: Ad hæc animi pathemata, non abortus, ab ejusmodi causis induci solitus, sed effectus multo magis prodigiosus consequutus est. Puella enim illa cum legitimo tempore enixa esset, conspectus est infans pedibus & manibus aviæ suæ persimilis; ossibus, qua parte confracta fuerant in nocente dicto, matre præsentē, divisis; cute iisdem locis lacera. Collo autem, extremis brachiis & tibiis vibicum funis quadam specie circumdatis, adeoque constrictis, ut quibusdam in locis contusionis notæ adessent, in aliis cutis ipsas ambientis disruptio, non absimili fere modo, quo a funibus illis exilibus, quibus furciferorum colla constringuntur. Gravidæ, ex familia magna, ad fores stanti occurrebat mendica brachium truncatum, quo eleemosynam extorqueret, ostendens, illa subito consternata filiam mox peperat, cujus brachii ossa ad tactum omnino mobilia, vi imaginationis de statu sano deturbata, maxime ea, quæ manus digitorumque adeo ut non nisi truncatum brachium exhiberent. v. Job. a Meckren *Observ. posthum. I. p. 347 seq.*

§. 126.

Alio quoque modo foetus jam formati in utero vulnerantur, *Plaga dorſi.* v. g. Francofurti matrona quædam honesta explosa bombarda perterrefacta, cum prægnans esset, infantulum peperit, plagam in dorso habentem, non aliter formatam, ac si a glande tormenta-

ria inflicta fuisset, juxta Ludovici Hornicæi epistolam ad Guilhel-
 mum Fabricium, Hildanum perscriptam. vid. *hujus Obs. chirurg.*
Cent. VI. Obs. 65. fol. 580. Johannes Georgius Schenckius in puella
 octiduana umbilicotenens vulnus manifestum, patulum, veluti
 pugione confossum, a prima conformatione, atque ab utero ma-
 tris congenitum deprehendit. Causam hujus inquirens inaudi-
 vit, maritum uxorem prægnantem circa initia gestationis, inter
 cæteros impetus, etiam gladio minaci stricto infecutum; cujus
 ictum femina hausta firmiter imagine apprehendens embryoni
 eum quoque deinceps ictum, veluti manu sicarii & ferro forma-
 tum, affinxit. vid. Johann Schenck. *Obs. medicin. Lib. IV. fol. 565.*
 Femina quædam gravida quatuor ultra menses templum conscen-
 dit, tumulum, cui ossa matronæ nobilis inferenda erant, cum mu-
 lierculis curiosis aliis visitatura. Adstans incidit in statuam Sal-
 vatoris crucifixi humi jacentem vulnusque insculptum lateri &
 cum sanguine emanante affabre depictum defixis oculis contre-
 ctat, ut a feminis, quas comites habebat, abstrahenda esset. Puer-
 perium destinato tempore instat, filium enititur vulnere sub pe-
 ctore quasi studio inflicto conspicuum, quod sanguinem lymphaticum
 humore mixtum (*als ein Fleischwasser*) stillabat, elapsis
 aliquot demum hebdomadibus consolidato, referente Christiano
 Ludovico Gœckelio *M. N. C. Dec. II. An. 6. Obs. 150. p. 313.* Ali-
 quot exempla ex aliis autoribus adducit etiam Georgius Frideri-
 cus Rallius *de Generation. Animal. Sect. V. §. 22. p. 231.* e.g. vulnus tho-
 raci infantis utero gestati inflictum, gladio tamen non pueri, sed
 prægnantis thoracem vulnerante. Alii foetui vulnus fronti illa-
 tum ab irato patre, matris fronti stricto gladio solum minitante.
 Item puer quidam aperto thorace, quod mater virum suum vul-
 neratum ibi conspexerat. Et *p. 230.* sequentem recenset histo-
 riam: Uxor lanionis Medioburgensis, postquam mendicum pro-
 no capite dorsoque super manus & genua incedentem, eum in
 modum, ut a tergo nil nisi lumbi, clunes pedesque ad decussim

inflexi viderentur, aliquoties conspicata fuisset, post sex imprægnationis menses ex præpostero lapsu, primo pueri rite formati, postea vero monstri, ad præmemorati mendici formam externam, capite scilicet & pectore carentis fecit abortum. vid. etiam §. 114.

§. 127.

Dantur adhuc alii gravidarum phantasia orta foetus monstrosi. v. g. Uxor cujusdam scriniarii Castellis die quadam dominica ^{Caput a-} ^{quilæ.} sacram concionem in aula frequentans, unum ex liberis ulnis gerens, alterum manu ducens ad angulum interioris aulæ areæ accessit, liberorum desiderio quasdam aves ibi videndi satisfacere volens, circa illud tempus utero concepit, & post sex septimanarum vel circiter spatium abortum passa fuit, & foetum avis capite exclusit: Quod cum Johanni Dolæo ab obstetrice eadem die renunciatum fuisset, ad scriniarii ædes se contulit, foetumque ante sex septimanas nequaquam conceptum, caput aquilinum habentem reperit. vid. *M.N.C. Dec. II. A. 8. Obs. 132. p. 291.* Pierre Damian, Archeveque de Ravenne, & Cardinal raconte, que Robert Roy de France ayant épousé une de ses proches parentes, en ût un ^{anseris.} fils qui avoit le cot & la tête d'une oye. vid. *Traité des monstres de Jean Palsyn p. m. 194 seq.* vid. etiam Fortun. Licet *de Monstr. Lib. II. p. 180.* ^{vituli.} Quindecim circiter a conceptione dies capitis vituli edendi desiderio tenebatur mulier quædam, humoque appetitum marito communicabat, qui ut uxori quamprimum satisfacere satagebat; at quamdiu hoc ollæ impositum excoquebatur, ideam rei expetitæ tam fortiter animo insculpebat, ut foetus cuncta cranii ossa carne spongiosa investita apparerent, quæ anfractus, membranas, quæcunque tandem capitis vituli cuncta forma præ se fert, intuentibus exhibebat; Cujus item oris interiora, rugas & circumscriptiones, quæ in illo animali animadvertuntur, obtinebat, juxta Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. 1. Mart. Obs. 5. p. 61.* vid. etiam Steph. Blancard. *Collect. med. ph. Cent. 1. Obs. 33. p. 61.* Mer-

Caput car-
pionis.

cenaria quædam Pragæ avide de capite carpionis piscis comedens, cum objurgaretur, pudore affecta in patinam rejecit ambesum piscem; & licet postea ad esum hortaretur, obstante pudore & doloris acerbitate noluit parere: Surrexit lacrymabunda, tristis & caput cubito innixa assiduo piscem illum cogitabat. In partu postmodum edidit infantulum, cujus caput non prorsus humanum, sed ex dimidio piscem referentem visum; illa nimirum parte, quæ cubito matre innitente fuerat compressa, ita ut ipsum quoque os in duo semiora, inque partes ori humano & quale carpioni, similes divideretur; quin & color cyaneus & squamarum similitudo eidem inesset; uti ex Marco Marci recenset Philippus Jacobus Sachs a Lewenheim *Schol. in Obs. 61. M.N.C. Dec. I. An. 2. p. 119.* Parisiis 1645. die S. Benedicti mulier sexto mense gravida marem enixa est, capite fere piscis carpionis, quanquam lingua major & reliqua in facie plana. vid. Thom. Bartholin. *Histor. anat.*

caput feli-
nam,

Cent. II. Histor. 44. p. 209. Lugduni Batavorum 1638. femina vulgaris conditionis prope templum D. Petri enixa est foetum capite felino, cætera elegantem. Monstri occasionem matris imaginatio dederat; prægnans enim felem in lecto suo cum horrore videbat. Et Amstelodami 1637. nata in platea vitulina sutoris uxori fi-

equinum,

suillum,

raninam,

lia capite equino grandi. Ibidem etiam alia ferebatur capite suillo edita; sed incerta fama. vid. ibidem Bartholin. *p. 210.* Monstrum facie ranina natum depingit Ambrosius Paræus *Oper. chirurg. Lib. XXIV. cap. 7. fol 555.* hujus scilicet mater gravida febre divexata, mulierculæ cujusdam consilio, ranam vivam manus palmæ affixerat, tamdiu detinendam, quoad immoreretur parti; eo habitu in viri amplexus venerat de nocte & conceperat ex viro suo, Amadæo parvo. Hanc Johannes Bellangerius chirurgus, perspicaci ingenio vir, monstrosæ deformitatis foetus causam esse arbitrabatur. Eslingæ ante aliquot annos cauponis filia, lanioni nupta & gravida, quia ovem, cujus jugulum maritus inter mactandum cultro punctim feriebat, inspexerat, sibi que imaginando altius im-

ovinum,

presse-

prefferat, infantem postea, capite ovino, edidit, teste Eberhardo Gockelio *Gallicin. med. pract. Cent. I. Consil. 39. p. 151.* De infante caninum. monstroso & horribili capite hirsuto, canis vel cati simillimo Basileæ nato, vid. Joh. Georg. Schenck. *Histor. Monstror. pag. 2 & 4.* ubi plura exempla reperies.

§. 128.

Notus fuit Johanni Nicolao Pechlino præclarissimus vir Simiæ vultus. magnisque eruditionis dotibus insignis, qui præter simiæ vultum, quem ex terrore mater conceperat, minas etiam gesticationesque, quibus id genus animalis ludere solet, ad unguem referebat. v. Pechlin. *Observ. phys. medic. Lib. III. Obs. 15. p. 431.* Ante unum vel duos annos, latrunculatoris servi (*Steckenknechts*) uxor infantem superiori corporis parte simiam referentem (quia sibi circumforanei cujusdam in foro ludentis simiam adhuc dum gravida presse imaginabatur) pariendo egeffit, uti scribit Eberhardus Gockelius *l. a. p. 151.* Nobilis quidam alebat simiam, quæ joci gratia Simia. mensam circumibat. Uxor illius gravida ludens cum ea frequentissime, post in partu infantem edebat cingulo tenus simiam, (quousque scilicet circa mensam saltans conspici potuerat) intra vero hominem, miserum spectaculum. vid. Philipp. Salmuth *Obs. med. Cent. II. Obs. 16. p. 66.* Mulier quædam quadrimestris gravida peperit puellum simiæ toga histrionica indutæ omnino similem, quem funambulum conspexerat, cujus videndi summo desiderio antea tenebatur. Res autem sic accidit: Mulier ante quadrimestre & semis prægnans invisit simiam toga histrionica vestitam, quanquam maritus admodum reniteretur. Bruti istius eo habitu donati imago animo tam alte infixæ fuit, ut excutere nunquam potuerit, quantum conaretur, adeo ut tempore statuto veram simiam pilo & toga histrionica indutam in lucem ediderit. Cucullus & panniculus admodum distincte fuerunt observati, subucula rubra fuit, brachia obvolvens, plicis & figura idonea donata fuit. Vultu puer simiam omnino retulit, brachia, crura & corporis trun-

truncus similia fuerunt brachiis, cruribus & trunco illius bruti: Paucis a simia nequaquam discrepavit, si pilos exceperis, quibus investitus non fuit. Item pollicibus in manibus caruit. vid. Nicol. Blegn. *Zodiac. med. Gallic. An. 4. Mart. Obs. 19. p. 96 seq.* Sic puer duodecim annorum duorum pedum longitudinem vix attingebat, facie simiam repræsentabat, vocem articulatam nullam edebat, sed tantum stridorem & cachinnos. Hirsutus valde ad femora. Gravida mater quinque mensium ex cercopithecæ accessu consternata fuerat. vid. Gerard. Blasii *Observat. anatom. p. m. 123 seq.* Quomodo foetus humanus in utero in simiam mutari possit, vid. Franc. Bayle *Dissert. physic. 3. Art. 7. §. 5. p. m. 122 seq.*

§. 129.

Satyrus.

Extraordinariam historiam recenset etiam modo allegatus Nicolaus de Blegny ibidem *p. 106.* Ante quinquaginta circiter annos, inquit, Normanni quidam ludicra agentes, comœdias alternis celebrabant. Cum aliquando comœdiam pastorem agerent, contigit, ut nobilis, qui domicilium præbuerat, ac satyri personam repræsentabat, concubitum cum uxore expeteret, quæ nymphæ habitum induerat, ac procul dubio novo illo habitu libidinem in marito excitaverat; imo forte ille satyri, quem induerat, passionis venereæ œstrum induxerat: Quicquid vero sit, peracta comœdia urgente libidine uxorem in locum abditum pertraxit, congressum iniit, imprægnavit, genuitque elegantem satyrum, quem uxor nono mense exacto peperit. Refert etiam dictus autor, eundem foetum in omnibus fuisse satyro similem, atque in omnibus scientiis & virtutibus educatum fuisse, in quibus tam insignes progressus fecit, ut cum fratres in partes hæreditatis paternæ ipsum admittere nollent, quod scilicet monstrum esset, juxta legem inhabile successioni, ipse pro se dixerit causamque propriam egerit tam prospere, ut in partes hæreditarias admissus sit. Scribit etiam Olaus Borrichius *Act. Hafniens. Vol. I. Obs. 94. p. 183.* chirurgum quendam obstetricium, Tamponettam, cujus lara-

lararium infantibus variis ex utero materno evulsis, & in spiritu Terebinthinæ vitreis vasculis exceptæ natantibus, venerabili horrore distinguebatur, monstrasse & satyrum humanum, hoc est, infantem a se extractum, justæ quidem magnitudinis, sed toto corpore hirsutum, deficiente collo, quippe cujus caput intra humeros se quodammodo contraxerat.

§. 130.

De cane ex matris impressione genito hanc observationem communicat Cornelius Stalpart van der Wiel *Observat. rarior. Cent. I. Obs. 72. p. 309.* Elisabetha Tombay, obstetrix, eduxit die 21. Septembris anno 1677. e cujusdam feminæ utero caniculam quandam membranis suis cinctam viventemque, sed pilis carentem, nec non omnibus rite formatis absolutam membris atque minori digito magnitudine parem. Ipsa autem mulier nihilominus gravida permanset ac post quatuordecim hebdomadas sanum admodum ac bene natum peperit filium. Hæc autem (quantum ex iis, qui nullo occupato præjudicio Stalpartio rem narrarunt, ipse intelligere potuit) ita contigere: Maritus homo plebejus, rudis & potui deditus, insolito plane, inverecundo ac prorsus inhumano modo uxorem, & quidem invitam a tergo subinde cognovit, fustibus & ferri acie ipsi minitatus, nisi perversæ veneri obsequi vellet; quin & vel canis procreationi se daturum operam, scelestissimo dictitabat ore. Quæ detestanda dicta, ut & coitus ille vere caninus tam alte & continue hæserunt animo ejus, ut imaginatrix vis assidua abominabilis hujus dicti factique reminiscencia adeo invaluerit, ut canis hinc tandem fuerit efformata.

Canis.

§. 131.

De matrona glirem pariente sequentia ex Luthero in Genesis, refert Martinus Weinrichius *Comment. de Ort. monstr. cap. 17. p. m. 160. b.* Memini, me puero, Isenaci formosam & pudicam matronam eniti glirem, quod eo accidit, quia ex vicinis aliquis gliri nolam suspenderat, ad cujus sonitum reliqui fugarentur; is

Glis.

mulieri gravidæ occurrit, quæ ignara rei subito accursu & aspectu gliris ita territa est, ut foetus in utero in bestiolæ formam degeneraret. Per glirem Lutheri autem nihil aliud intelligendum vult Christianus Franciscus Paullini, quam murem majorem, quem plebs *eine Ratze oder Ratte* appellat, uti ex aliis autoribus probat *M. N. C. Dec. II. An. 6. App. p. 70.*

§. 132.

*Demon
saltans.*

Memorabile imprimis est, quod Ludovicus Vives scribit, Margaritam, Maximiliani Imperatoris filiam, aliquando narrasse Lamuzæo, homini docto, & Ferdinandi Ungariæ regis oratori: Quemadmodum in Brabantia oppido, quod Boscum Ducis appellant, quum in supplicatione publica, quibusdam ex divorum numero constituta, nonnulli in ea pompa (ut ex veterum ceremoniarum traditione fieri solet) angelorum, alii cacodæmonum ornatu incederent, unus ex istis personatis, postquam diulascivisset, & tripudiasset, domum statim, pruritu percitus, excurrens uxorem corripuerit, atque in lectum coniectam velle se cacodæmone imprægnare dixerit, quod etiam perfecit. Filium siquidem procreavit, infelici genio similem, qui, simulac natus esset, exsilire ac cursitare coepit. vid. Phil. Camerar. *Horar. subcis. Cent. I. cap. 54. p. 240.* vid. etiam Martin. Weinrich. *de Monstr. Part. I. cap. 17. p. m. 160.* Kenelm. Digb. *de Immortalit. Anim. rational. cap. 38. p. m. 425.*

§. 133.

*Autores al-
legati.*

Possent hoc loco alia adhuc infantum, tam a gravidarum matrum impressione, quam ab aliis causis monstrorum exempla referri, quæ tamen benevolus lector, si plura desideret, ex his & aliis autoribus colligat, evolvendo Johann. Georg. Schenck. *Monstror. Histor.* Fortunii Liceti *Tract. de Monstris*, quem gallice edidit Jean Palfyn cum additione quorundam monstrorum recentiorum, vide insuper Joh. Schenck. *Obs. medic. Lib. IV. fol. 564 seq.* Partuum mon-

monstroforum aliquot exempla refert Eberhard Gockelius *Gall. cin. medic. pract. Cent. I. Conf. 39. p. 150.* Thom. Bartholin. *Act. Hafn. Vol. III. Obs. 59. p. 97 seq.* Casp. Bauhin. *de Hermaphrod. Lib. I. cap. 9. p. 115 seq.* Philipp. Camerar. *Hor. subciv. Cent. I. cap. 54. pag. 238 seq. Cent. II. cap. 67. p. 275 seq.* Simon. Majol. *Dier. canicular. Part. I. Coll. 2. f. 35. & Part. II. Colloqu. 4. fol. m. 523.* Monstrum anno 1654. repertum humanis septem capitibus dissimilibus constabat, quorum medium præstabat cæteris, uno oculo & facultate videnti in ipsa fronte super nares donatum; reliqua capita suis quoque oculis prædita erant, sed sine omni videndi usu. Solum caput medium per os cibos capiebat. Septem capitibus respondebant septem brachia, septemque manus, quæ suum singula peragebant officium &c. v. Ant. Deusing. *de Fæt. Mussipont. p. 20.*

§. 134.

Non autem hominum tantum, sed brutorum quoque femi- Brutorum
imaginatio.
Labia lepo-
rina in por-
cellis.
næ prægnantes imaginatione varios nævos atque præternaturales
fœtuum conformationes producere possunt. De labiis enim le-
porinis in porcellis sequentia refert Petrus Rommelius *M. N. C.*
Dec. II. An. 4. Obs. 84. p. 169. Nemo est, qui ignoret, quantum
imaginatio in hominibus sanis & morboſis, præprimis etiam in
gravidis valeat, licet modus, quomodo id fiat, plurimos lateat,
fereque omnes adhuc torqueat & sollicitos habeat: Non minus
tamen mirandum videri posset, imaginationem talia etiam in bru-
tis (quibus nonnulli etiam mentem & rationem, non omnino
brute, tribuunt) efficere posse. Præterita æstate civis Ulmenſis
ſcrofæ aliquot porcellos, ore leporino sive bifurcato labio nota-
tos, enixa est; quos, quia ob hanc causam fugere atque ita nutriri
non potuerunt, in præterfluentem Danubium abjicere necessari-
um fuit. Causam monstrosæ hujus efformationis porcæ domi-
nus aliique, rei pecuariæ gnari, dixerunt fuisse imaginationem &
terrorem, quo porca prægnans, in agris & campis pascens, a lepo-
re, de improvſo ex latibulo surgente fugaque se proripiente, per-

*Lepores
cum rostro
suillo.*

terrefacta fuit. Econtra in Westphalia non ita pridem lepores cum rostro suillo, ex eodem phantasiæ errore, fuisse natos refert Christianus Franciscus Paullini *Lagograph. curios. Sect. I. cap. 3. p. 114.*

*porcelli
cum auri-
bus lepori-
nis.*

Quo loco etiam refert, Meinhartum a Lühtringen, monachum Corbejæ Saxonicæ ad annum 1212. porcellos cum auribus leporinis nobis sistere addit. Ex Alexandro de insula Monachorum Corbejæ Saxonicæ de monstro caprino hæc refert idem Paullini *M. N. C. Dec. II. An. 4. App. p. 209.*

Anno 1185. parentis mei molitor in uno stabulo alebat asinos caprasque suas, e quibus una hædulum cum capella enixa est. Hæc nigerrima erat, auribus plane asininis, quas robusta armabant cornua; cauda proluxa & asinina: cætera matri suæ similia. Et anno 1174. agnus in monte Jacobi natus est auribus leporinis. De porcello monstroso & deformi capite, vid. Joh. Helwig. *Obs. 7. p. 20.* de monstro porcino elephantis quandam formam sistente observationem communicat Andreas Cleyerus *M. N. C. Cent. II. An. 8. Obs. 22. p. 70.* Evolvatur etiam Joh. Georgii Schenckii *Histor. monstros.* Licetus & Palfyn supra allegati.

Observatio.

In pago quodam, non procul a patria mea Hayna, distante, nomine Walda, anno 1682. apud præfectum illius loci, gravida quædam sus septem ediderat porcellos, quorum tres in statu erant naturali, quatuor vero proboscidem quasi elephantinam (uti in modo allegata Cleyeri observatione depictam videmus,) a fronte incipientem ultraque os propendentem habebant. Quam monstrosam figuram tunc temporis ipse præfectus a gravidæ suis impressione non immerito derivabat, siquidem ancilla quædam rustica, quæ suis ordinarie pabulum exhibere solebat, tempore conceptionis & graviditatis dictæ suis, ob commissum aliquod delictum, certum instrumentum ligneum, cui ferrum incurvatum cum appensa circa extremitatem nola erat infixum, (*eine Fiedel* dicebant) loco pœnæ per longum tempus spatium circa colum gestarat hacque occasione suis phantasiam depravarat. Quod aliquando etiam accidit in equis: Anno enim Domini 1254. Ve-

ronæ

ronæ equa pullum equinum peperit, cætera quidem equum, sed humana plane facie. vid. Ambros. Paræi *Oper. Lib. XXIV. cap. 1. fol. 541.* & Georg. Simon. Winter. *de Re equar. Part. II. cap. 16. fol. 102.* quo loco etiam alium pullum equinum, pedibus anterioribus inversis, anno 1623. in monasterio Sulz, ditionis Marchio-Brandenburgicæ editum depingit, cujus effigies in anticamera (ut ajunt) serenissimi Principis Alberti Ernesti Onolsbaci adhuc visitur.

Equus cum facie humana.

Equus cum pedibus inversis.

§. 135.

Ex imaginatione quoque animalium accidere solet, quod sæpius longe alterius coloris, quam ipsa per se habent, foetus excludere soleant; unde etiam equorum magistri, ubi equos coloris varii, ex nigro albicantis, exoptant, caballum ad aliquot dies in stabulo detinent, cujus parietes calce incrustati variis locis denigrati, nullam sic admittunt lucem, nisi quam candela suspensa præbet. Hinc ex obscuro ejusmodi loco equum, quem imprægnare equam desiderat, in lucidum producit. Hic equus clausis oculis, dum congreditur, non nisi variegata obversari sibi persuadens foetum variegatum generari efficit, juxta Jobi a Meckren *Obs. med. chirurg. posthum. I. p. 353.* Vel secundum verba Thomæ Bartholini *Histor. anatom. Cent. VI. Hist. 61. pag. 297.* mulomedici variis pro lubitu coloribus tabellam depictam ante oculos equarum detinent, quando ab equis ineuntur, ut tali pilo hinnulos edant, qualem quisque desideraverit. Ita & præcipit Constantinus Cæsar, ut asinus infiliens aut equus, aut aliquod animal aliud, tali amiciatur stragulo, quali foetum volumus nasci colore tinctum: siquidem qualis fuerit color operimenti, quo tegitur admissum animal, talis futurus est partus. Johannes Baptista Porta *Magiæ natural. Lib. II. p. m. 90.* ita inquit: Equi si vis varii nascantur, prævalet hoc, idque ut plurimum observant, qui ejusmodi curam habent, & ad coitum equas admittunt, ut equilia, ubi coitum explent, tapetis & variis pannis depictis coloribus exornent, unde discolores equos scutulatos, spadiceos diverseque co-

Equorum color.

loratos efficiunt. Docet quoque Abfyrus, equam colore aliquo contegas, qualem futuram pullulationem vis referre, siquidem qualem vestitu colorem ipsi mentiuntur, in talem enata progenies degenerabit, nam conscendens equus in coitu, colorum spectaculo detinetur, quod oculis obversabitur, & talem dabit foeturam, ut tergoris diversitas maculis evariet, totidemque visuntur colores, quot in exemplo fuere, plurimumque emaculato blandiuntur colore. Quandoque etiam equorum magistri in equarum grege generosos objiciunt equos visibus concipientium, quo similes eorum concipere ac creare possint, uti scribit Zacutus Lusitanus *de Medicor. princip. Histor. Lib. III. Hist. 12. fol. m. 487.*

§. 136.

Ovium.

De dolo Jacobeo seu de Jacobi artificio ope baculorum in aqualiculis ante oculos gregum positorum, pecudes discolores generandi scribit Porta *l. a.* Jacobus virgulta ac perticas populeas, amygdalinas, quæve facile corticibus spoliari possunt, edolatas corticibus interceptas, circulis redimitas & sinuatas, uti colubros, albo nigrove interstinctas colore, in canalibus juxta aquas, in pascuis & præsepibus fixit: ubi grex ovilli pecoris stabulabantur, ut coitum ineundo & oculos circumstrando nil nisi virgas aspicerent, ut quos darent foetus, diverse colorati & passim candida vellera pullis infuscarentur maculis, non injucundum visum. vid. *Genes. cap. 3. vers. 37.* Et juxta Sim. Majol. *Dier. Canicul. Coll. 3. f. 42.* quin Jacob cum Laban convenerat, ut oves variæ & maculosæ cederent sibi in mercedem, populeas virgas & amygdalinas, aut e platinis, detractis ex parte corticibus, ponebat in canalibus, quare potantes oves ibique coeuntes conspectis varii coloris virgis maculosos quoque foetus concipiebant.

§. 137.

Columbarum.

Idem etiam de columbis affirmat Zacutus *l. a.* illos scilicet, qui artem pastoritiam exercent columbarumque sunt ingenui dilecto-

lectores, ponere pulcherrimas columbas iisdem in locis, quibus illæ versantur, quo videlicet rapiente visu similes generent. Et si vis, columbæ depictæ nascantur, secundum Joh. Bapt. Port. *l. a. p. 91.* modo uteris, qui ab Oppiano docetur. Tempore quo uxores oscula maritis miscent, & veneris desiderio moventur, columbarius pulcherrimas varias, præsertim purpureas vestes, in conspectum earum exponat, quibus illæ delectatæ pullos etiam ejusdem coloris edunt.

Hæc eadem peragit, novit quoque callidus auceps,
Cui volucres curæ sunt, & lætalis arundo,
Atque columbarum pullos hac arte figurant,
Stragula flammeolis oculis rubrosque tapetes,
Et vestes ostro perfusas objicit auceps,
Sicque oculos pascens animos eludit amantes,
Et pullos edit rubeo discrimine misto,

Ibidem etiam dictus Porta de modo, quo pavones albi & canes ^{pavonum.} villosi ac jubati instar leonum fiant, pluribus agit, totam tamen operationem animalium impressioni adscribit. De pavonibus ita scribit: Erant olim Coloniae pavones albi tam rari, ut tanquam rem raram admirarentur, postea vero frequentiores ibi facti sunt, a mercatoribus e Norwegia: nam quum spectaculi causa nigri vel varii pavones in regionem istam inveci essent, omnes albi effecti sunt; quippe cum mares in ipso aere ova incubarent, nivosaque illa montium juga perpetuo ob oculos viderent, ex ovis jam animatis albos pullos excluderunt. Idem etiam de omnibus avibus faciendum suadet. Nam aviaria vel caveas, quibus concluduntur, eorumque cubilia tectorio inalbentur oportet, vel albis linteis & velaminibus protegantur, vel exiguis cancellis præpediantur, quo minus ex iis locis fugiant, quum coitum ineunt, excubant ovaque fovant, sic albicantem dabunt sobolem. Et Johannes Fernelius *Physiolog. Lib. VII. cap. 12. p. m. 189.* Si pavo, dum ovis suis incubat, linteis albis circumtegatur, albos omnino pullos,

pullos, non gemmantis coloris edet, quemadmodum etiam gallina colore varios emittet, si picta ova foveat.

§. 138.

Imaginatio quomodo operetur.

Quamvis autem plerique etiam recensitorum autorum dictos nævos aliosque naturæ in formandis foetibus errores imaginationis in gravidis lusui adscribant, qua tamen ratione ea, quæ prægnantes externe tantum tangunt & superficialiter afficiunt, vel earundem oculos ex improvviso incurrunt, vel solo etiam sono earundem aures penetrant, nihilominus in tenelli atque materno utero adhuc inclusi embryonis cute atque partibus sive membris, tam internis, quam externis, tantam alterationem & mutationem, nonnunquam etiam membrorum privationem causentur, mea quidem sententia nondum adeo clarum satisque perspicuum est, neque etiam fortasse in posterum, ad omnium consensum sufficienter explicabitur. Cum vero in tractatibus a me editis, & Deo volente, adhuc edendis, benevolo lectori collectanea tantum mea communicem, liceat etiam hoc loco quorundam autorum sententias & verba annectere, vel tantummodo autores allegare, ex quibus optimam sibi que verisimillimam quilibet eligere velit.

§. 139.

Sententia autorum: Kircheri.

De hac imaginationis vi, stigmata & nævos tanquam notas infantibus imprimendi, ita philosophatur Athanasius Kircherus in *Art. magn. de Luc. & Umbr. Lib. X. P. II. cap. 2.* Imaginatio est vis quædam in organo corporeo, unde ad speciem imaginatam mutatur spiritus corporeus, in quo vis formativa formatur, quæ operatur in semine, ideo subinde mutatio fit in prole propter imaginationem parentis. Tanta certe vis est spiritus plastici, ut ex vehemente imaginatione mirabiles producantur formæ, hinc tot stigmata, nævi & characterismi fructuum, vini rubri, carnium, animalium, in foetu impressa resultant. Quædam si in faciem, vel in sinum prægnantis vel cerasum, vel fragum, vel vinum projiciant,

jiciant, vel infundant, & mulier gravida ægre id tulerit, tunc rei nota in foetu impressa depictaque spectabitur. Idem accidit, si felis aut mus inopinato mulierem gravidam insilierit, confestim nota foetui imprimetur, rei specie radiante per phantasiam; spirituumque ope in loco foetus tactui correspondente devecta, nisi forsan mulier membrum ab animali contactum illico manu abstergat, eandemque manum alteri corporis parti abditæ admoveat: Et ut idem Kircherus *l. a.* pergit: Pictrix phantasia est in nævis producendis, penicillus est spiritus corporeus: colores, species ex phantasia radiantes: tela, corpus infantis tenerum: prototypon corporis infantilis corpus maternum, cujus partes cum partibus infantis singularem habent consensum. vid. Phil. Jacob. Sachf. a Lewenh. *Schol. in Obs. 135. M. N. C. Dec. I. An. 1. p. 300 seq.* Ad quæstionem: An imaginatio potentiam feminis effigiemque conceptus mutare valeat? utique seu affirmative respondet. Hermannus Frid. Teichmeyer *Instit. med. legal. cap. 6. pag. 45.* hoc enim variis probari argumentis potest, v. g. in posthumis major semper similitudo observatur, quam in aliis liberis, ob continuo ante oculos versantem patris defuncti ideam. 2) Nævi etiam materni ab impressione ideali, vel objecto quodam terrifico pendentes, id ipsum probant. 3) Imaginationis vis, etiam in brutis probari potest ex ovibus Jacobi in sacris. 4) Mira & fere incredibilis imaginationis gravidarum potentia elucet ex historia quadam, ubi mater a visa decollatione paulo post partum edidit capite truncatum. vid. Georg. Wolffg. Wedel. *Pathol. dogmat. Sect. II. cap. 9. pag. 319.*

§. 140.

Juxta Joh. Bapt. Portæ *Mag. natural. Lib. II. cap. 19. p. m. 89.* gerentes uterum mulieres, quando vehementissime cupiunt, vehementerque excogitant, spiritus immutant interiores, & in his excogitatæ rei pinguntur imagines, ii sanguinem movent, unde in mollissima foetus materia rei imaginem exprimunt; Sic par-

Portæ.

Sennerti. tus in perpetuum maculis variisque notis inficiunt, nisi desiderio refricato quiescunt. Daniel Sennertus *Tract. de Chymic. cum Aristotelic. Consens. cap. 14. p. 237.* inquit: quomodo ad foetus immutationem faciat imaginatio, ita obscurum est ut omnes doctissimi viri in causa reddenda hic hæreant. Hoc certum est, imaginationem per se, immediate atque per simplicem imaginationis actum, foetum non immutare, cum sit potentia cognoscens atque immanens; & quantitatis, figuræ, numeri, situs colorisque causa proxima sit facultas conformatrix. Neque etiam a specie phantastica foetus immutatur; cum ea per se nullam qualitatem realem producere possit, nec ullam vim habeat, nisi movendi potentiam imaginandi eique repræsentandi objectum suum. Et si species phantastica eam vim haberet, multo plures mutationes in foetibus acciderent: & imprimis melancholicæ mulieres & quæ de rebus aliquibus habent intensas cogitationes, foetum mutarent; quod tamen non accidit. Vero magis consentaneum est, foetum immutari ab imaginatione vel mediantibus animi affectibus per humorum & spirituum motum, vel dirigendo facultatem conformatricem. Mutationes & læsiones, quæ in foetu accidunt, sunt duplices, communes & determinatæ. Communes ut abortus, mors, partis alicuius parvitas vel magnitudo, determinatæ sunt eæ mutationes & signaturæ, quæ cum re aliqua externa determinatam habent similitudinem, v. g. cum cerasis &c. Prioribus contingere possunt a phantasia, mediantibus animi pathematis & motu humorum ac spirituum, non autem posteriores, notæ scilicet ac signaturæ &c.

§. 141.

Harderi. Juxta Johannis Jacobi Harderi verba sciendum est, maximam esse femellarum cum foetibus, quos in utero detinent, consensionem, adeo quidem, ut hi illis intime compatiantur, eoque facilius noxam accipiant, quo cum cerebri ipsorum, tum singulorum partium fibrillæ teneriores sunt, neque ejusmodi impetus
suf-

sufferre vel iis resistere possint. Absurditatis heic, sed temere accusatur a Galeni filiis, si infantes matrum intelligere suspiria, audire ejulatus, videre afflictiones, vel vulnera perpeti dixerō, cum tamen inficias ire nequeam, iisdem, quibus illas, animi pathematibus affici, & unionem hanc quam maxime necessariam esse, pro tenera ipsorum vita sustentanda: unde etiam admiranda fuit naturæ atque hujus autoris providentia, qua utrique harum, cum sanguinis pro aura vitali, tum spirituum pro sensu & motu influxum communem esse jussit, ita quidem ut ex eodem liquore vitali, quem vasa matris placentæ suppeditarunt, & particulæ nutritiæ partibus singulis apponerentur, & spiritus nitro-aereus, per delicatos cerebri poros secerneretur. Qui deinceps ex filamentis exiguis in nervos per sui propagines, versus singulas corpusculi partes protensas, pergeret, munia hic illic legitima obituras. Quod si ergo ex matris vitiosa imaginatione, quæ varie utcunque succrescit, nunc ab externis, motum vehementiorem plerumque concitantibus, nunc ab internis, recordatione pertinaci eorum, quæ aliquando vidimus, spiritus impetuose motitentur, ob recitatam partium teneritudinem generationis negotium facillime confunditur, ut foetus monstrosus, vel massa omnino deformis postmodum procudantur. vid. Jac. Harder. *Apiar. Obs.* 92. p. 344 sq.

§. 142.

Ad quæstionem, quomodo imaginatio in gravidis agat? ita respondet Johannes Dolæus. Quanta vi agat matris imaginatio in foetum, innumeris constat exemplis & quotidiana experientia confirmat, objectorum externorum a matre perceptotum imaginem tenellis embryonum corporibus imprimi; unumquodque siquidem objecti externi punctum lucis radiis a se reflexis in oppositum oculi punctum agit; iique ad retinam usque penetrantes singulas ipsius fibrillas, quibus applicantur, concutiunt, spiritusque animales in iis contentos in motum concitant. Quum autem ex universis objecti punctis profiscantur radii lucis, omnes

Dolæi.

retinæ fibrillæ motum, quem spiritibus communicant, ab ipsis mutuantur, & veram hac ratione objecti imaginem, quæ in retina depingi dicitur, suscipiunt: motus vero spirituum animalium, ad cerebrum usque pertransiens, iis, qui ipsum incolunt, communicatur. Quoniam enim objectum vel terrorem mulieri incutit, vel validum, ipsum possidendi, desiderium in ea creat, inde fit, ut spiritus facilius in motum eumque rapidiorem cieantur. Illi enim, qui per nervos ad uterum tendentes, in partem istam accurrunt, copiosioresque in eam affluunt, penetrata ipsius substantia, foetum, quocum intimum illi adest commercium, attingunt: & molliusculam ejus texturam subingressi fibras, quas subeunt, agitant & juxta peculiarem illum motum, quem in cerebro adoptarunt, eas disponunt, similemque iis conciliant ordinem, illi, quem obtinebant partes corporis, quod talem determinatum motum in retinæ fibrillis produxit. Quod vero videamus partis hujusce, quam mater cum terrore aut commiseratione conspexerit, signum in simili foetus parte imprimi, vel rei a matre flagrante desiderio frustra expetitæ effigiem pari in foetus parte, quam mater in proprio corpore contigerit, repræsentari; id evenire videtur ex eo, quod spiritus animales ita determinantur a speciali ipso motu ipsis in cerebro impresso, ut fibrarum partium illarum, quarum similium occasione motum hunc concepere, poris tantummodo adaptari queant, in iisque vim suam exercere valeant. vid. *M. N. C. Dec. II. An. 8. Obs. 132. p. 290.* quo loco tamen non semper requiri addit, ut imaginatio vehementius ab objecto commoveatur.

§. 143.

Wedelii.

Imaginatio & animi pathemata nullibi magis morbos producunt, quam in gravidis, inquit Georgius Wolffgangus Wedelius *Patholog. med. dogmat. Sect. II. cap. 9. p. 318 seq.* ita pergens: Rationes plures hujus rei passim notavit Helmontius, satis vero nobis laudat, archeum accurate intentum foetus fabricæ; ipse hic divisas quasi operas tunc habet, partim matris corpori, partim foetus inten-

intentus. Quando ergo turbatur in opere subtilissimo occupatus eo præsentius id fit. Ab ira, a terrore toto die fiunt abortus. A conceptis his ideis diversis, cum terrore junctis, sigillantur in fœtum consimiles effectus, unde nascuntur nævi diversissimi, imo stupenda hinc inde notata ab autoribus. Utut enim a sola quoque phantasia fortiori conceptus tales effingi & produci possint, ut plurimum tamen terror conjunctus est. Omnia hæc a spiritibus, qui actionum omnium sunt præsides in corpore, derivantur optime & unice, eorum tamen vis & in hoc vix potest satis concipi & exprimi, quomodo e. g. visa a matre decollatione hinc paulo post infans nasci potuerit truncato itidem capite. v. etiam Wedel. *Libr. de Morb. Infant. cap. 3. p. 8 seq.*

§. 144.

Sic Theodorus Craan *Oeconom. animal. Part. II. Quæst. 39. p. 177.* ad quæstionem: quomodo imagines rerum in gravidis transeant ad fœtum, & cur non ipsi matri, sed tantummodo præcise isti parti fœtus imprimantur, quam mater tetigit in proprio suo corpore? ita respondet: Hujus difficillimi problematis causam reddere hoc opus, hic labor est. Poterimus tamen hanc rem quodammodo adumbrare, si cogitemus, quod totum nostrum corpus sit perspirabile, ita ut radiationes spirituum undiquaque admittat. Si igitur jam gravida magno teneatur desiderio alicujus fructus, vel etiam summo terrore percutiatur, facile intelligimus, animam hisce unice esse intentam, & hasce imagines fructuum ita conjungere cum spiritibus per totum corpus diffusis adeoque & ipsum uterum pervadentibus, ut illæ imagines nullo negotio imprimi possint tenello corpusculo fœtus intra contenti. Observamus etiam, hasce figurarum signaturas non nisi gestationis mensibus fœtui communicari a matre: ratio autem cur in corpore matris non sequatur idem effectus, hæc est, quia illud est nimis solidum & durum, adeoque instar terræ exsiccatae sigillum respuit, cujus tamen impressionem facile recipit molle fœtus corpusculum,

lum, quod instar ceræ mollioris flecti potest. Cur autem illa imago præcise imprimatur illi foetus parti, quam mater in suo proprio corpore tetigit, ratio hæc est, quod anima eo tempore nullius amplius motus est conscia, quam tantummodo illius, quo mater certam sui corporis partem contrectavit, unde etiam huic unice inhærens ei junxit illam imaginem hujus vel illius fructus ardentè desiderati, vel animalis cujusdam abominati. Sed cum hæc spirituum determinatio ad hanc partem matris radiavit ad ipsum uterum, factum est, ut etiam tenderet ad simile membrum foetus, ei-que suam imaginem imprimeret. v. etiam ejusdem Theod. Craanen *Tract. de Homin. cap. 151. p. m. 751 seq.*

§. 145.

Lentilii.

Ut mentem suam aperiat Rosinus Lentilius, primo supponit, animalium omnium quædam germina in primæva creatione a summo conditore condita in auris vagari, cum aere per respirationem corporibus animalium communicari, in feminarum testiculos illabi, sed in nullis nisi suæ speciei hædere, radicari ibidem-que vegetari, & ovula ceu id, quod in ovo gallinaceo fecundo germen vocamus, adglutinari; 2) omnia membrorum stamina jamjam actu secundo istis germinibus, ac ita quidem inesse, ut Deus jam in primæva creatione sexus differentiam illis impresse-rit. 3) in homine præter rationalem illam immaterialem, etiam esse sensitivam animam corpori coextensam. 4) Matris animam sensitivam in germina per coitum virilem fecundata perpetuari, hæcque in uterum deferri illic perficienda. 5) adeoque inter binas hæc animas, matris scilicet & foetus tenelli, esse intimam consensionem & compassionem per experimentorum centurias demonstrabilem. 6) a terrore subitaneo percelli animam sensitivam matris. 7) idque pathema illico animæ sensitivæ foetus communicari. 8) & in hoc tenello rei externæ, quam mater expaverat, ideam exprimi. 9) quod non æque fit in corpore matris, quod
hoc

hoc jam sit firmitus & robustius, foetus autem tenellum; ejusque stamina flexibilia. 10) quod autem in determinata corporis parte fiat, hinc existimat Lentilius procedere, quod, quia matris anima sensitiva, quippe, ut dictum, materialis & corpori coextensa, in hac vel illa determinata parte territa afficiatur, vix aliter esse queat, quam foetus quotidie animam sensitivam, ceu ab anima sensitiva matris productam, cumque illa perpetuum atque continuum commercium habentem, eadem in parte affici. 11) illiusque, scilicet animæ sensitivæ foetus hinc negotium in formando foetu, in quo unice & solertissime occupatur, in ea parte perverti, aut pro re nata penitus aboleri. Quæ, quo melius intelligantur, Lentilius ibidem ad aliquot casus applicat. vid. *M. N. C. Dec. III. An. 2. Obs. 117. Schol. p. 179. 180.*

§. 146.

Secundum mentem Gustavi Casimiri Gahrlied *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 87.* non postremum prolis in utero, ut nutriendi & augendi, sic efformandi officium matri debetur, & quidem præcipue vi imaginativa mentis, phantasie nempe maternæ in foetum pro lubitu pene agentis. Qua etiam in perfecto fere jam foetu diversas operatur quasi metamorphoses, addit, detrahie, auget, minuit, figuram, colorem, aliaque accidentia mutat, mutilat, astruit, destruit, imo annihilat membra, omni procul dubio antea jam efformata & perfecta, &, quod majus, ipsius fere naturæ leges transgreditur & transcendit, & ἀδύνατα quasi patrat, dimensionem quadantenus penetrationes committendo. Et Johannes de Muralt. *Colleg. Anat. Lect. 12. p. 204.* inquit: *Wann die Frau empfangen hat, so arbeiten alle ihre Geister in der Bildung der jungen Frucht, ja sogar, daß sie im Anfang oft sinnlos, schwermüthig und verrückt sind, wann sie von obern Theilen müssen entlehnet werden. Diese Geister werden von allerhand Gestalten und Einbildungen starck bewegt und erschreckt, welche Bewegung und Schrecken zusamt dem eingebildeten in das Crystall-lautere Mutter-Eylein eingepreget wird,*
und

Gahrlied.

Muralt.

und weil solche schreckhafte, oder beliebte Gestalt steiff in den bildenden Geistern eingewurtzelt ist, formiret sie gleichen Abdruck in der Frucht.

§. 147.

Dobrozenski.

De his effectibus ita scribit Arnoldus Bachimius Denstonius (sive verus autor, Jacobus Wenceslaus Dobrozenski, de Nigroponte, medicus Pragensis) *Pansoph. Enchiret.* §. 216 seq. p. 176 seqq. Imprimuntur stigmata infantibus, mediante sensitiva anima matris. Nam quando mater v. g. fortiter apprehendit aliquam rem cum desiderio habendi, sic anima matris in se ipsa phantastice format sibi figuram rei desideratæ, ab illa cogitationes non removens, similem phantasiam in anima infantis suscitatur, & quia hæc phantasia infantis archæum informatione format & commovet, ab hac liberari se satagens, illam non potest, quamdiu mater simili cogitationi inhæret & infantis animæ insit adhuc brutalis appetitus. Idcirco si tum mater in cogitationibus hærens aliquam partem sui corporis tangat, (nam ex toto corpore matris anima sensitiva in uterum radios corporeos emittit, qui membris infantis correspondent, & proprietates, defectus, aliaque mala membris infantis invehit) in similem corpusculi sui partem anima infantuli formam istam excutit, & illa ita suam phantasiolam liberat, & corpus unum desiderii matris portat, ille vero pergit in suo opere. Ast mirabilius illud, quod mulier quædam foetum grandiusculum utero gerens, dum semel decapitari quendam hominem vidisset, valde territa in deliquium cecidit, enixa paulo post infantem, cui caput erat abscissum, caput autem ex utero non exivit, nec mulier molestiam in utero ullam habuit, signo certo, quod caput infantis, non restiterit in utero. O admiranda res! cujus rationem dare difficile. Dicimus tamen, vi nostræ doctrinæ facile id fieri potuisse. Nam cum mulier gerens utero in decapitatione facta a carnifice, fors summam habens complacentiam, desiderium (sicut prægnantibus nihil novi, absurdissima appetere) accepit aliquod decapitandi

tandi, etiam forte sui proprii in utero infantis: Quare in tali desiderio ideam gladii fabricavit, & tangens uterum, quo loco caput infantis erat, manu ideam gladialem collo infantis incussit, & caput demessuit, sicuti si pyrum desiderasset & pyri formam collo apposuisse. Quod vero caput absciderit, non vero gladii formam exprefferit, ratio est, quia desiderium erat infantis caput abscindendi, idcirco gladialis idea non solum ad collum, sed per collum transierit. Quod autem caput nullibi repertum, id quoque matris phantasie adscribi potest, quæ caput a se decollati infantis nolens reperiri nec nosci, cujus cadaver esset, caput in atomos resolvit, quæ cum lochiis mulieris exiverunt. Cum vero vix ulla mater concipi queat animo tam crudeli in foetum, ut eum in utero capite truncandi desiderio capi possit? & qualisnam sit illa ideæ gladii fabrica? Rosinus Lentilius loco paulo ante allegato potius circa hanc observationem arbitratur, animam sensitivam matris per terrefactæ terrorem suum adeo impressisse animæ sensitivæ tenelli foetus illi parti, qua collum est, ut inde semet subtrahens, dicta foetus anima sensitiva versus thoracem, caput omne deseruerit, quod propterea vita & nutritione orbem abscedere haud aliter coactum fuit, atque ligaturis intercipi steatomata, verrucæ aliique id generis tumores, ac inde emarcida decidere. Scipion. Mercur. *della Commare Lib. I. cap. 20. p. 121 seq.* edition. German. p. 215 seq. Quæ tamen Lentilii sententia pariter suas patitur difficultates. Proluxe de hac gravidarum imaginationis efficacia agunt adhuc alii autores v. g. Joh. Nicol. Pechlinus *Observ. Phys. med. Lib. III. Obs. 15. p. 426 seqq.* Franc. Bayle *Dissert. Physic. pag. 116 seqq. 122 seq.* Job a Meekren *Obs. med. posthum. cap. 1. p. 345 seqq.* Casp. a Reies *Elys. jucund. Quæst. Camp. Quæst. 50. p. 620 seqq.* Johannes Jacobus Waldschmid *Epistol. II. ad Joh. Doleum pag. 47.* ita scribit: Eo ipso, quo sub prælo sudat epistola ecce! Tuas accipio literas, n quibus quæris, quomodo in gravidis objecti alicujus horridi mago in foetum transire possit? & quare gravida, si hominem

parte aliqua mutilatum cum quadam alteratione & pavore intueatur, postmodum in lucem edat infantem eadem parte mutilum? Cui quæstioni ut ex parte satisfiat, fulcimenta quædam prius ponenda erunt, cum arduum hoc opus saltem adumbrari, & sublimioribus meditationibus facilius attingi, quam verbis explicari possit. Itaque observandum erit (1) quod fluida imagines rerum facile suscipiant, sicuti id in hydraulicis, & in aere luminoso, paulo ante speculum existente, videre licet. (2) quod stupendum illud flumen animale in nostro corpore æque certam aliquam radiationem & cursus formam, hoc est, imaginem, ab objecti & mentis determinationibus suscipiat, (3) quod in visione vera objecti imago in fundo oculi depingatur, & quod occasione hujus spiritus animales certam cursus formam nanciscantur, ipsi imagini, in oculo depictæ, similem. (4) Quod inter motus & alterationes matris & inter infantem in utero contentum adeo arcta sit connexio, ut hic omnibus vehementioribus animi passionibus matris non sine suo periculo sit expositus. E quibus apparet, quod mens ex aspectu horridi alicujus objecti conquassata, & vehementer afflictæ, spiritibus animalibus similem jungat imaginem, sive quod tunc mirabile illud cerebri & nervorum flumen a mente ad similem cursus formam determinetur, atque totum corpus matris cum appendice, hoc est, foetu, fulminis instar transeat, huicque ob mollitiem & flexibilitatem partium similem imprimat imaginem. Enim vero aliquam adhuc superesse difficultatem eminens etiam video, de qua forte alibi pluribus. Quænam autem ex his opinionibus veritati proxima sit, ego non inquiram, sed potius ingeniosioribus curiosorum animis hujus indaginem relinquam.

§. 148.

*animi vitia
ab imagina-
tione.*

A tali autem gravidarum imaginatione in embryonibus non modo nævi stigmata, mutationes, mutilationes atque privationes membrorum oriuntur, sed etiam animi errores variæque impressiones, unde in quibusdam interdum magnum variarum re-

rum

rum insolitarum desiderium, in aliis econtra insolitarum averfatio atque fastidium observatur, quorum illud a medicis pica, hoc autem nausea & antipathia vocari solet; de quibus, cum in Chylogiæ nostræ *Capite II & III*. plurima exempla adduxerim, prolixè hic agere superfedeo. Quo pertinent etiam varii affectus, item virtutes & vitia. v. g. Jacobus Magnæ Britanniae rex strictum ensẽ per totos vitæ suæ dies averfabatur, ut ad ejusdem aspectum tantum non obstupesceret, quod mater regina per aulicos quosdam, stricto ense ministrum quendam suum insectantes, perterrefacta fuisset, cum utero gereret, uti ex Digbæo refert Georgius Fridericus Rallius *de Generat. animal. Sect. V. p. 238*. Quibus Gustavus Casimirus Gahrlied. *M. N. C. Dec. III. An. 7 & 8. Obs. 56. p. 90*. addit characterem cupiditatum maternarum abominabilem foetui impressum, vitiorum, libidinum, malitiæ, furti similiumque desideriorum in prolem phantasiæ maternæ vitio transplantatum, cujus tragicum adducit exemplum mulieris, supplicium decollationis cum desiderio & gratiarum actione fortiter subeuntis, quo ab appetitu furandi, a quo temperare sibi nullo modo poterat, tandem liberaretur. Inquit etiam Petrus Müllerus *Disput. de Jure prægnant. cap. 2. p. 14*. multos furacitatem, qua matres gravidæ se foedarint, vitæ totius moribus retulisse.

§. 149.

Cum proinde gravidæ & quidem, absque dubio, ob spirituum, ordinarie ad foetus formationem non exigua copia concurrentium, inopiam & imbecillitatem, animi affectibus admodum sint obnoxiae, non mirum, quod illæ, etiam alioquin satis sanæ, variis & insolitis, levi data occasione, corripiantur imaginationibus, posteaque non modo varios atque monstrosos edant foetus, sed varios etiam ipsis imprimant affectus; ex quibus, intelligere licet, quanta esse debeat mulierum prægnantium temperantia, quam moderata victus ratio, quanta animi tranquillitas, ut liberos gignant & mente & corpore sanos. In quibus rebus cum, juxta

ratio.

Francisc. Bayle *Dissert. phys.* p. 114. passim mulieres delinquant, imo nonnullæ sui vix compotes omne genus intemperantiæ sedentur, & pathematis continuo, quibusdam veluti furiis, agitentur, nec pudori, nec foetui, quem in utero gerunt, consulentes, subit mirari, cur in humano partu monstra non sint frequentiora. Hinc admonet etiam Joannes Ludovicus Vives *de Christian. femin. Lib. II. pag. m. 464 seq.* ne interea, dum uterum gestant, indulgeant crapulæ, ne inebrientur. Multi, quæ a matribus acta sunt, dum gestabantur, vitæ totius moribus retulere. Et quatenus imaginationis vires magnæ ac validæ sunt in humano corpore, matres dum uterum gestant, dent operam, ne quam admittant vehementem cogitationem deformis rei, turpis, obscœnæ: pericula item devitent, in quibus foeda aliqua visu species possit occurrere. Quod si eas occasiones adeant, præcogitent, quicquid possit oculis offerri, ne ex inopinata novitate noceat, siquid subito adspexerint, unde contrahat noxam foetus. Hanc Vivis admonitionem salubrem esse patet, secundum Philipp. Camerar. *Horar. subciv. Cent. I. cap. 54. p. 238.* ex Empedoclis & physicorum opinione, qui etiam statuunt, imaginem, quæ animo mulieris in ipso concipiendi articulo occurrit, tantum habere virium in eum foetum, qui effigiatur, ut ipsius rei character quasi impressus perpetuo hæreat. Plura de gravidarum diæta supra diximus.

§. 150.

cur nævi
simul cum
fructibus
florescant?

Cur autem nævi supra citati variorum fructuum, v. g. cerasi, mori, pruni, mali punici, &c. figuram referentes uno eodemque veris tempore cum fructibus florescant, non ita facile dictum est, juxta Cornel. Stalpart van der Wiel *Observ. rar. Cent. post. Obs. 36. p. 383.* qui tamen, ne symbolam non conferat, statuit eandem hujus rei esse causam, quæ efficit, ut vina, statò anni tempore mense videlicet Majo, florecentibus vitibus, etiam ad fermentationem invitentur, hoc autem præcipue recentioribus, quæque nondum a facibus purgata, contingit vinis. Hujusmodi autem operatio juxta

juxta quosdam recentiores a circumgyratione telluris circa solem annua dependet, qua certis mensibus quibusdam propior fiat stellis, quæ ætherem quendam ad nos transmittendo efficiant, ut semina siccique nonnulli ad fermentationem concitentur. Eodem autem modo certum ætherem ad nos transferri putandum est, quando morus, cerasus &c. floret, qui nævos, quibus eadem pororum dispositio, quæ fructibus est, eodem anni tempore florescere facit.

§. 151.

In gravidarum etiam imaginatione nonnulli infantum quæ *pulchri fœtus.* runt pulchritudinem, si nimirum matres prægnantes tempore fœcundi coitus, vel a principio conceptionis, vel per totum gestationis spatium, pulchri & elegantis hominis, hujus vel illius sexus, imagines depictas, circa torum, vel in cameris & hypocaustis suspensas habent, vel etiam statuas vel effigies ex ligno, marmore, gypso vel cera confectas, sæpius intuentur, vel etiam si cum vivis hominibus pulchris conversantur & amorose cum ipsis fabulantur. Sicuti enim secundum superius dicta, ex Johannis Baptistæ ejusque vestimenti, item urforum depictorum eorumque pelli-um aspectu fœtus nascebantur villosi, cur non etiam ex pulchræ personæ ejusve effigiei aspectu ejusque crebra reminiscencia idem expectandum erit? Ut itaque mulieres pulchros pariant filios, Johannes Baptista Porta *Mag. natural. Lib. II. cap. 20. p. m. 92.* maxime salutare esse retur, ut in magnatum cubilibus & prospectu Cupidinis Adonidis & Ganimedidis imagines propendeant, vel ex materia parentur solida, unde venerem exercentes uxores animo eas versent, imo fortissima imaginatione animus rapiatur, & gravidæ diutius eas contemplantur, sic partus inde conceptus eam formam imitabitur, quam ipsæ coeuntes & utero gerentes mente conceperint. Id quod non parum prodesse se scire ait dictus Porta, atque exemplo probat. Fabulam de hominis rustica uxore recenset Philippus Camerarius *Horar. subcisiv. Cent. I. cap. 54. p.*

238. virum scilicet, cum illa esset deformi facie, metuentem, ne sibi consimiles liberi gignerentur, hoc remedium commentum esse, domi imagines egregie formosas ut collocaret, in easque aspicere uxorem quam minime conniventibus oculis assidue iussisse; Ita de se quam pulcherrimam sobolem propagasse. Sic Dionysium tyrannum, eo quod ipse deformis esset, nec tales habere filios vellet, uxori suæ in concubitu formosam proponere solitum fuisse picturam, cujus pulchritudinem concupiscendo quodammodo raperet, & in prolem, quam concipiebat, afficiendo transmitteret, uti ex Augustino recenset Simon Majolus *Dierum canicular. Colloqu. 3. fol. 42.* Huc pertinet etiam lepida historia Heliodori, de Theagenis Thessali reguli & Charidiæ regis Æthiopix filix amoribus, quam mater regina Persina ex intuitu statux Andromedæ elegantissimæ, prope torum genialem collocatæ, lacteo colore pulcherrimam, præter morem nigerrimæ gentis, conceperat & peperat, & ob diversitatem coloris infantem, metu infamix, elato partu transportari clam iusserat. Quæ superatis multis & gravissimis difficultatibus, tandem compertis certis indiciis & notis, pro filia & hærede agnita & Theageni, socio fideli calamitatum & exilii, quem sincero amore, in maritum elegerat, conjugali vinculo copulata fuit. vid. Phil. Camerar. *Hor. subcis. Cent. I. cap. 54. p.*

Observatio. 240. Sic femina mihi sat nota, circa graviditatis initium, a marito suo puellulum elegantissimæ faciei, ex cera artificiose elaboratum, accipiebat, quem ipsa fixis prius oculis intuita in armariolum, in quo res suas frequentioris usus reponere solebat, ita collocabat, ut statim, aperta janua, ipsius oculos incurreret, sicque talem puellulum dicta femina sæpissime de die, quandoque etiam per longum satis temporis spatium, attente inspiceret, tandemque accedente partus hora puerum quoque elegantem, cereoque illi artificiali simillimum pareret.

§. 152.

A tali gravidarum imaginatione, secundum quorundam aul-
torum

torum sententiam, dependet etiam externa faciei infantum, sive filiorum cum patribus & filiarum cum matribus similitudo vel dissimilitudo. Varias autem varii autores de hac parentum & liberorum similitudine fovent sententias, quorum alii hujus causam quærunt in abundantia vel majori copia feminis, ita ut si viri semen in generatione feminæ semen superet, tunc infans patri, econtra vero matri fiat similis. Alii hanc differentiam a dextra vel sinistra uteri parte petunt, quippe quod in dextro uteri latere nasceretur, patri, quod in sinistro, matri simile esset; alii casu id fieri, alii ab imaginatione matris, quam tempore conceptionis fovet, hoc evenire statuunt, uti Mercurius Scipio della Commare *Lib. I. cap. II.* della somiglianza, c'hamo i figlioli al padre, ò alla madre, ò ai parenti ed alle, cagioni di essa. *p. m. 76 seq.* refert, qui tamen *pag. 80.* ita pergit: Fra tante opinioni mi piace quella, che il pensiero della donna induce la somiglianza della creatura: imperoche se la donna con la forte imaginatione e col fisso pensiero penserà ad alcuno ò al proprio marito, ò al parente, ò à qualche altro nell'atto della concettione, al sicuro quella creatura porterà quella somiglianza; e maggiormente, quando affrontasse il padre ancora, che concorresse nella medesima imaginatione. A credere veramente questa opinione mi induce non solo il verisimile, mà la verita istessa. Juxta Michaelis Alberti *Introduct. in univ. medicin. cap. 2. §. 69 seq. p. 37.* in negotio generationis requiritur & observatur inter animam foetus & animam matris accuratus consensus: dissentiente enim anima matris, neque conceptio contingit, neque foetus continetur, sed iterum per abortum rejicitur. Unde hujus consensus per totum actum & tempus gestationis multa exempla & documenta occurrunt, quo consensu nititur distinctio foetus quoad sexum, mores & numerum, ut exinde rationes suppeditari possint, cur foetus aliquando vel corpore, vel animo sive patri sive matri assimiletur. Ob id in sexu, similitudine & moribus distinguendis multum valet sub cohabitatione prævalens

*Similitudo
liberorum
cum paren-
tibus.*

lens in parentibus major animi intensio & ad actum illum potentior, sensibilibior & intimior attentio. Ad quæstionem, quid sit causa similitudinis natorum? respondet Hermannus Fridericus Teichmeyerus *Institut. medicin. legal. cap. 7. Qu. 2. p. 43 seq.* de causa similitudinis natorum variæ autorum prostant opiniones atque sententiæ, quarum prima est Hippocratis, non sexum tantum, sed & ipsam natorum similitudinem a multitudine seminis exsuperantis fere provenire. Sed cum unica seminis virilis guttula sufficiens sit ad integrum imprægnationis opus absolvendum; ideo non in quantitate seminis hæc vis determinans delitescit, sed in qualitate potius, imprimis elasticitate, qua partes & stamina fœtus, in ovulo existentia, similiter extenduntur, adeoque ad formæ suæ perfectionem perducuntur. Secunda est Galeni arbitrantis, ubi major vis sit seminis masculini, fœtum nasci patri similem & contra. Sed dubia hæc est sententia, cum ita nullo modo posset contingere, ut natus alii personæ, quam uni parentum, assimilaretur; quod tamen ipsa experientia, ut falsum refellitur. Interdum enim natus avo similis deprehenditur, avunculo quandoque aut patruo &c. imo ignota nonnunquam personæ. Unde credibile potius ac concludendum videtur, similitudinem & dissimilitudinem ex matris imaginatione, phantasia, aut impressione præcipue dependere. Cæterum omni tempore graviditatis agere potest imaginatio, nunquam quiescens: primario vero tempore conceptionis, vel proximis ab illa diebus, antequam partium stamina a seminis virilis vi & efficacia fortius jam sint, explicata, agit quam efficacissime. Posse autem imaginationem seminis potentiam conceptusque effigiem mutare, idem autor ibidem probat.

§. 153.

Similitudinem filiorum ad matres non a materia sed ab efficiente oriri, ex mente Hippocratis inquit Regnerus de Graaf *de Mulier. Organ. cap. 13. p. 313.* Et juxta Joh. Barthol. Adam. Berin-
gor. *Institut. medic. Thes. 15. p. 38.* Similitudo patris sive matris in
filio

filio seu filia expressa non ab idæisante genitura, sed ab idæisante imaginatione matris dependet, nam sicut hæc fulmine terroris nævos & varias extraneas ideas tenero foetus corpusculo imprimere potis est, ita & jaculo amoris vel odii, quo mater prosequitur patrem, uti & sui ipsius complacentiæ vel displicentiæ, patris, vel sui similitudinem in, & exprimere in foetu suo potis erit. De quaestione quibus ex causis fiat, ut nati parentibus similes dissimilesve sint? agit Joannes Fernelius *Physiolog. Lib. VII. cap. 12. p. m. 189 sq.* cui inter alias sententias probabilius est, vehementi comprehensione & firma gravidarum cogitatione vim eam, quæ foetum conformat, duciatque gubernari. Hujus enim, quæ potissimum data est hominibus, tanta vis est & potestas, ut sicuti plerumque corpus cogitantis immutat, sic & in conceptum vim suam conferat. Hoc testimonio, quod dum mulieri, qua nuper utero conceperit, vel cerasum, vel fragum, vel vinum in sinum effundetur, si animo id graviter ferens vehementer apprehendat, ibidem infanti nota inuretur. Par ac similis est eorum ratio, quæ in malacia accidunt, si gravida eo, cujus flagrat desiderio, minime potiatur, infans illius signum geret. Veterum etiam literis proditum est, mulierem albam prolem nigram genuisse, hinc duntaxat, quod fixis oculis intentoque animo diu æthiopis imaginem comprehendisset. De tali similitudine ita scribit Plinius *Hist. nat. Lib. VII. cap. 12. fol. m. 109.* In Lepidorum gente tres, intermisso ordine, obducto membrana oculo, genitos accepimus: Similes quidem alios avo, & ex geminis quoque alterum patri, alterum matri, annoque post genitum, majori similem fuisse ut geminum. Quasdam sibi similes semper parere, quasdam viro, quasdam nulli, quasdam feminam patri, marem sibi. Indubitatum exemplum est Nicæi nobilis pyctæ Byzantii geniti, qui adulterio æthiopis nata matre, nihil a cæteris colore differente, ipse avum regeneravit æthiopem. Similitudinum quidem in mente reputatio est, & in qua

credantur multa fortuita pollere visus, auditus, memoria haustæque imagines sub ipso conceptu. Cogitatio etiam utriuslibet animum subito transvolans, effingere similitudinem aut miscere existimatur. Ideoque plures in homine, quam in cæteris omnibus animalibus differentiæ, quoniam velocitas cogitationum animique celeritas & ingenii varietas multiformes notas imprimit: cum cæteris animantibus immobiles sint animi, & similes omnibus singulisque in suo cuique genere. Juxta verba Aristotelis *de Histor. animal. Lib. VII. cap. 6. fol. m. 436.* gignuntur læsi ex læsis, claudi ex claudis, & cæci ex cæcis, denique similes sæpe numero in re, quæ præter naturam comitatur, & signa habentes sibi cognata hæreditaria: ut verrucas, ut nævos, aut cicatrices aut quid aliud generis ejusdem. Jam tale quid vel tertia prole post regeneratum est, ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quandam habens confusam prodit. Similes etiam aliqui parentibus aut avis suisque majoribus generantur: aliqui similitudinis nihil referunt. Redditur etiam vel post plures ejusdem profapiæ: ut in Sicilia, ejus, quæ adulterium cum æthiope commiserat, filia non colorem patris æthiopis retulit, sed qui natus ex hac est, is avum æthiopem regeneravit. Feminæ magna ex parte matri, mares patri proveniunt similes, sed fit etiam e diverso, ut feminæ patri, mares matri similes procreentur &c. Item *c. 4. fol. 435.* refert idem autor, adulteram quandam geminos peperisse, alterum marito, alterum adultero persimilem. Secundum C. Jul. Solin. *Polyhist. sive Collect. Rer. memorab. cap. 4. p. 17.* Proconesia ancilla e duplici adulterio geminos edidit, utrumque patri similem. Regem quendam, qui paulo antea de æthiope colloquia habuerat, uxori commistum eadem mente revolvisse imaginaria quadam repræsentatione, tametsi tum ipse, tum uxor albo colore essent, æthiopem genuisse, ex Galeno recenset Simon Majolus *Dier. canicu-*

nicular. Colloqu. 3. fol. m. 42. Huc pertinet etiam exemplum mulieris, quæ abjecto pudore, dum maritus abesset, alteri se submisit, infantem edidit non adultero similem, sed absentis mariti imaginem prorsus referentem. Cujus causam lepide Thomas Morus hoc Epigrammate describit:

Quos ante conjux quatuor
Natos, Sabine, protulit,
Multum ecce dissimiles tui,
Tuos nec ipse deputas.
Sed quem tibi puellulum
Enixa jam nuperrime est,
Solum tibi simillimum
Pro quatuor complecteris,
Adulterinos quatuor
Vocas, repellis, abdicas.
Atqui graves tradunt sopsi,
Quodcunque matres interim
Imaginantur fortiter,
Dum liberis datur opera
Ejus latenter, & notas
Certas & indelebiles
Modoque inexplicabili

In semen ipsum congeri.
Quibus receptis intime
Simulque concrefcentibus
A mente matris insitam
Natus refert imaginem.
Quum tot abesses milibus,
Dum gignit uxor quatuor,
Quod esset admodum tui
Secura, dissimiles parit.
Sed unus omnium hic puer
Tui refert imaginem
Quod mater hunc dum concipit
Sollicita de te plurimum,
Te tota cogitaverat,
Dum pertimescit anxia,
Ne tu, Sabine, incommodus
Velutque lupo in fabulam
Supervenires interim.

Uti refert Antonius le Grand *Histor. Natur. Part. VIII. Articul. 2. p. 361 seq.* Quid itaque mirum, quod ob talem infantum atque parentum dissimilitudinem quandoque inter conjuges variæ oriuntur rixæ & adulterii suspiciones, quod testatur Quintilianus, qui matronam defendit, quæ æthiopem enixa fuerat, quum ejus coloris icunculam haberet in thalamo. Eadem ratione Hippocrates mulierem suspicione adulterii laborantem, quod marito penitus dissimilem filium procreasset, liberavit, quod in cubiculo

picturam ea mulier habebat, cui similem infantem pepererat, vid. Phil. Camerar. *Hor. subcis. Cent. I. cap. 54. p. 238 seq.*

§. 154.

Casus.

Huc pertinet etiam casus & responsum de similitudine natorum ad parentes Baldassaris Timæi a *Güldenkee-Responf. 56. p. 1089 seq.* Femina scilicet quædam partum edidit marito suo plane dissimilem, juveni vero cuidam, cum quo familiariter conversabatur, per omnia similem; quæritur ergo an propterea adulterii sit arguenda? In responsione dictus autor causas similitudinis & dissimilitudinis ex variis scriptoribus recenset, v.g. multitudinem & copiam, & in paucitatem seu inopiam utriusque parentis geniturae, ita ut si viri semen sit semine mulieris uberius, juxta Hippocratem, natus patri assimiletur; & contra si exuberet genitura mulieris, foetus etiam ipsi similis nascatur. Alii autores partum ei similem reddi statuunt, cujus vis formatrix in semine prævaluerit; alii causam ad solum feminis motum & vim formatricem, alii ad feminis temperiem, variamque permixtionem, nec non ad robur formatricis facultatis, & astrologi ad astra referunt: Denique Timæus cum aliis autoribus eandem adscribit vehementi ac variæ imaginationi inter concipiendum vel in toto formationis tempore, quæ dominatur formatrici naturali feminis, imperatque ei eo modo, quo inferiores potentiae parent superioribus, & sic imprimatur potius idolum seu effigies imagine vehementer comprehensa, quam paternum idolum in semine adservatum. Hanc sententiam secutus allegatus autor pronunciat, feminam illam, quæ, secundum recensitum casum, non marito, sed familiari similem edidit prolem, adulterii ex hoc quidem capite argui non posse, cum similitudo individualis non semper & simpliciter, ex semine, sed quandoque ex imaginatione forti mulieris, non tantum tempore coitionis, sed etiam ex frequenti ac iterata & quotidiana imaginum sibi ob oculos obversantium contemplatione effigiem

figiem imagini similem natis imprimat; id quod manifestum est in posthumis, qui plerumque patribus magis sunt similes, quam reliqui liberi, non alia de causa, quam quod iterata ac frequentior viduæ matris imaginatio in demortui conjugis contemplatione plurimum ac enixe fixatur ac hæret. Est enim imaginatio tantæ efficaciam, ut ad speciem imaginatam mutetur spiritus corporeus, qui ad uterum proveniens, sit veluti facultatis formatricis fundamentum & subjectum, qui postmodum juxta imaginem imaginativæ impressam, foetum efformat, eo quod sit majoris efficaciam, quam spiritus genitivus, qui in semine paterno præfuerat. Hancque sententiam suam confirmat experientia de muliere alba, quæ fixis oculis æthiopis imaginem conspiciendo prolem nigram genuit, item de alia, quæ puellam peperit omnino hirsutam, quia imago S. Joannis cilicio induti in conceptus ei obversabatur; & de ovibus, quibus Jacob, ut gregem suum augeret, virgas amygdalinas variis coloribus incisas apud canales disposuit, ad quos ubi bibendi causa oves appellebant coeuntes, illas conspicerent, & foetus variorum colorum conciperent. Insuper novit Timæus feminam honestam, quæ utero gerens de industria fratrem, quem habebat elegantis formæ sæpius & intentis oculis contemplabatur, non alia de causa, quam ut similem ederet, id quod & factum est. Hinc etiam Jurisconsulti similitudinem externam per se filiationem neutiquam probare statuunt. Quamvis etiam similitudinem multum urgere & non levem præsumptionem filiationis facere videatur, quod scribit Zacchias his verbis: profecto apud me nunquam bene audiret mulier illa, quæ alteri similem, præsertim familiari alicui ac domestico vel suspecto viro filium generaret: ignoscendum tamen est homini Italo, qui adeo sunt suspicaces, ut nec aspici uxores ab alio patiantur, unde domi plerumque parietibus inclusas, vel in publicum prodeuntes velo tectas curiose custodiunt. Optimum est, ut prolis

Sit suo similis patri
 Manlio, & facile insciis
 Noscitur ab omnibus,
 Et pudicitiam suæ
 Matris indicet ore.

Quanquam & hoc interdum fallat, dum cum alio concumbens mulier metuit, ne maritus vel superveniat, vel factum postea resciscat & vindicet, unde ob oculos quasi ipsi versatur zelotypus; imo quædam adulteræ de industria effigiem mariti in perpetuo conspectu habent, eandemque fortiter sibi imaginantur, ut marito similem edant partum; adeo dubia sunt a similitudine quæ petuntur argumenta, ut exinde nec certa filiationis indicia haberi, nec mulier violatæ fidei conjugalis argui possit. Hæc Timæus.

§. 155.

de simili-
 tudine cum
 progenito-
 ribus.

De similitudine natorum cum progenitoribus ex matris imaginatione insuper videatur Levin. Lemn. *de Occult. Natur. miracul. Lib. I. cap. 4. p. m. 14 seqq.* Franc. Bayle *Dissert. physic. Art. 7. pag. 114.* Casp. a Reies *Camp. Elys. Quæst. 54. p. 670 seq.* Mich. Ettmüller. *Oper. Tom. I. fol. 170. & Tom. II fol. 1075. it. 1607.* de causis similitudinis & dissimilitudinis in foetu respectu parentum vid. Gregor. Horst. *Oper. medic. Tom. I. Dissert. 4. fol. 454 seq.* Paul. Zacch. *Quæst. med. legal. Lib. I. Tit. V. Qu. 1. sq. fol. m. 138 seq.* Et *Qu. 4. fol. 146.* quæstionem tractat, an similitudo conjecturam filiationis facere debeat? ubi respondet, similitudinem equidem debere maximam & urgentissimam facere præsumptionem filiationis, quia naturaliter insiti temperamenti convenientiam, quod in seminibus reperitur, simile non nisi a simili generatur, *fol. tamen 147. n. 18.* judicat idem, quod non sit standum soli similitudini in filiationis probatione, sed eam cum aliis præsumptionibus etiam levioribus junctam evidentissimam facere præsumptionem filiationis vel fraternitatis.

nitatis &c. Et juxta Herm. Frid. Teichmeyer. *l. a. p. 43.* similitudo quidem filiationem probat verifimiliter, sed diffimilitudo filiationem plane non negat. De quæstione, utrum infantes, qui patri vel matri sunt similes, sint spurii an legitimi, prolixè agit Nicolaus Venette *de la Generation de l'homme Part. III. cap. 7. p. 521 seq.* quo loco examinat, an imaginatio vera hujus similitudinis causa esse possit? & inter alia *pag. 525.* ex sententia juris consultorum ita loquitur: Si la femme pense vivement à son amant, à son oncle, ou à son grand-pere, lorsqu'elle conçoit, l'enfant, qu'elle engendrera, fera tout semblable à l'une de ces personnes. La ressemblance n'est pas une preuve de filiation, selon le sentiment des juris consultes. L'enfant, qui ressemble à son pere, n'est pas pour cela legitime. L'on ne sauroit sur cette conjecture de declarer heritier de son pere. Sa mere dans des embrassemens illegitimes a pû l'avoir engendré avec cette ressemblance par la force de son imagination, car en pensant toujours à son mary lorsqu'elle estoit entre les bras de son amant, elle a imprimé sur le corps tendre de l'enfant, qu'elle concevoit alors, les traits du corps & tous les caracteres de l'ame de celuy, sur le quel son imagination estoit fixement arrestée. Ipse tamen Venette post varias contra hanc maternæ, tam circa nævos, quam similitudinem, imaginationis virtutem seu potentiam adductas rationes, *pag. 529.* inquit: Pour moy, je me persuade aisément, que les femmes ont beaucoup contribué à introduire cette opinion sur la cause de la ressemblance des enfans, à fin de couvrir des fautes, qu'elles commettent tres-souvent, & qu'en-suite des personnes habiles & politiques ayant considéré, que ce sentiment estoit assez favorable, pour le bien & pour la tranquillité de l'estat, ont cherché des raisons pour l'appuyer. Mais, bien loin que l'imagination de la femme soit la cause de la ressemblance, il est mesme impossible, qu'elle puisse produire les effets, que l'on se persuade &c.

§. 156.

Imaginatio-
nis vis in
brutis.

Non autem gravidarum solum imaginationem in foetus proprios, sed quarundam etiam feminarum in bruta tantam habere efficaciam, sequentibus observationibus monstrat Johannes Casparus Westphalus *Ephem. Acad. N. C. Cent. X. App. p. 567.* inquit: Feminam juvenculam novi, honestæ conditionis & festivi ac ludicri animi, quæ sola cogitationum atque imaginationis directione muscarum cædem, quam alii instrumento coriaceo consueto (*einer Fliegenklatsche*) omni opera intendunt, impedire solet, atque sic earum conquassationem per merum cachinnum & animositatis illusionem nunc inhibet, nunc animando permittit. Consul quidam Bitterfeldensis, Christophorus Poyda, mihi cognatus, solo cachinno omnes se invadentes & latrantes canes subito submutescere fecit, propter firmam & a teneris annis sibi impressam persuasionem & imaginationem. Qua occasione reticere non possum uxoris meæ, nunc beate defunctæ conditionem, quæ, quoties olim per pagos, villas ac prædia, perambulabat, sola fiducia seriaque impressione, omnium adorientium canum sævissimo latratui obicem ponebat, eosque ad momentaneum silentium, summam tranquillitatem & familiaritatem coge-
bat, simul ac fimbriam perizomatis dentibus masticare inciperet, mihi contra timidulo ac incredulo irritus semper fuit effectus, utut loco perizomatis aut extremæ tunicæ, aut marginem pilei, illius suasu, ori admove-
rim ac masticaverim; Ad latus tamen illius, nihil tale quid agens sine ulla canum offensione semper tuto procedere potui.

§. 157.

Varia adhuc de gravidarum pica & nausea seu antipathia in liberos transplantata annecti possent, quarum tamen plurima exempla in Chylolog. nost. *Cap. 2. a p. 12. usque ad p. 96 & cap. 3. p. 98 seq.* allegavimus. v. insuper *M. N. C. Dec. III.*

An. 7 & 8. Append. 125.

SYLLABUS

SYLLABUS AUTORUM.

A.

- A**cta Eruditorum Lipsiensium 4. An. 1682. seq. Lipsiæ
 medica Hafniensia Thomæ Bartholini 4. Hafn. 1673. seq.
 Anglicana Philosophica Oldenburgii 4. Lips. 1674
 Æliani, Claud. Historia animalium. vid. Oper. fol. Tiguri
 Agricola, Georg. de Natura fossilium
 Alberti, Michaelis, Introductio in universam Medicinam 4. Halæ 1718
 Systema Jurisprudentiæ medicæ 4. Halæ 1625
 Albucasis
 Amati, Lusitani, Curationes medicæ fol.
 ab Amelunxen, Isibordi, Breviarium Rerum memorabilium v. M. N. C. Dec.
 II. An. 4. Append.
 Ammanni, Pauli, Medicina Critica 4. Stadæ 1677
 Irenicum Numæ Pompilii 8. Francof. Lips. 1689
 Praxis Vulnerum lethalium 8. Lips. 1690
 Aquapendens de Formatione Ovi, vid. Hieron. Fabric. ab Aquapendente
 Opera anatomica & Physiologica fol. Lips. 1687
 Aristotelis Opera, fol. Basil. 1542
 Augenius, Horatius, de Febribus, fol. Francof. 1605
 di Aurelio, Marco, l'Horologio de' Prencipi 4. in Venetia 1589
 Avicennæ Liber Canonis fol. Venet. 1544
 Auli Gellii Noctes Atticæ 8. Genev. 1621
 Axtius, Joh. Conr. de Partu septimestri 12. Jenæ 1679

B.

- Bachimi, Arnold. Pan sophia enchiretica 12. Norimb. 1682
 Barbatus, Hier. de Sangvine & ejus sero 12. 1667
 Baricelli, Jul. Cæs. Hortulus genialis 12. Colon. 1620
 Bartholdi, Gregor. Theod. Opera medica tripartita 4. Francof. 1717
 Bartholini, Caspari, Specimen Historiæ anatomicæ 4. Hafn. 1701
 de Ovariis mulierum 8. Norimb. 1679
 Thomæ Acta medica Hafniensia 4. Hafn. 1663
 Cista medica 8. Hafn. 1662
 Epistolæ medicæ 8. Hafn. 1662.
 Historiæ anatomicæ 8. Hagæ & Hafn. 1657. 1659
 de Flagrorum usu in re medica & venerea 8. Franc. 1670

- Bartholini, Thomæ, de insolitis partus viis 8. Hafn. 1664
Bauhini, Casp. Appendix in Roslerum 8
 de Hermaphroditorum natura 8. Oppenheimii 1614
Bauschius, Joh. Laur. de Ætite 8. Lips. 1665
Bayle, Th. Dissertationes physicæ 12. Hagæ 1678
Bayri, Petri, Enchiridion de medendis humani Corporis partibus 12. Frf. 1572
Behrens, Conr. Barth. de Constitutione Rei medicæ 8. Helmst. 1691
Bellefontaine, Louis, de la Medicine dogmatique mechanique 12. aAmst. 1712
Benedictus, Alexander, de Re medica fol. Basil. 1549
Benivenius, Antonius, de abditis Morborum causis. vid. Dodonæi Observationes
Bergeri, Joh. Gothofr. Physiologia medica, seu de Natura 4. Witteberg. 1702
Beringeri, Joh. Barth. Adami, Institutiones medicæ 8. Hermipol. 1708
Bibliotheca anatomica fol. Genev. 1688
Bickeri, Johann. Hermes redivivus 8. 1612
Bidloo, Anatomia fol. Amsterd. 1685
Bierlingii, Casp. Theop. Adversaria curiosa Jenæ 1679
 Thesaurus theoretico-practicus 1690
Binningeri, Joh. Nic. Observationes & Curationes 8. Montbelg. 1673
Bitterkraut, Joh. Christoph, Klag-Thranen der Arzney-Kunst 4. Nürnberg. 1686
Blancardi, Steph. Opera medico-theoretico-practica 4. Lugd. 1702
 Collectanea medico-physica 8. Lips. 1690
Blasii, Gerard. Observata anatomica 8. Lugd. 1674
 Observationes medicæ 8. Amsterdami 1677
 Annotationes in Veslingii Syntagma anatomicum 4. Patav. 1677
Blegny, Nicolai, Zodiacus Medico-Gallicus 4. Genev. 1680
Bohnius de Officio Medici duplici 4. Lips. 1704
 Circulus anatomico-physiologicus 4. Lips. 1686
 Exercitationes physiologicæ 4. Lips. 1668
Bonaciolus, Ludov. de foetus formatione, vid. Sever. Pinæus de Not. Virginit. 12
Boneti, Theoph. Sepulchretum seu Anatomia practica fol. Genev. 1679
 Medicina septentrionalis fol. Genev. 1686
 Mercurius compitalitius fol. Genev. 1683
 Polyalthes fol. Genev. 1691
Borelli, Petri, Historiæ & Observationes Medico-physicæ 8. Franc. & Lips. 1676
Bourgeois, Louyse, Hebammenbuch 4. Oppenheim 1619

Syllabus Autorum.

Bravo Casp. de Sobremonte Consultationes 4. Colon. 1671
Brendelii, Adami, Observationes anatomicæ 4. Wittenb. 1716. seq.
Brieffe remarquable 8
Brunonis, Jac. Panor. Lexicon medicum Castelli 4. Norimb. 1682

C.

Cælii Rhodig. Ludov. Lectiones antiquæ, fol. Basil. 1550
Camerarii, Joh. Rud. Memorabilia Medicinæ 8. Tubing. 1683
 Philippi, Horæ succisivæ 4. Francof. 1658
Capivaccii, Hieron. Practica Medicinæ 4. Francof. 1694
Cardanus, Hieron. de subtilitate, fol. Basil. 1694
a Castro, Rodericus, de Natura & Morbis Mulierum 4. Colon. 1689
 Medicus politicus 4. Hamburg. 1662
Charleton, Gualterus, de Oeconomia animali
 de Catameniiis & fluore albo 12. Lugdun. 1686
Claudini, Jul. Cæs. Responsiones & Consultationes 8. Francof. 1607
la Clef de Cabinet
Cockburn, Gust. Oeconomia Corporis animalis 12. August. 1696
Collectanea de diuturna Graviditate 24
Columbus, Realdus, de Re anatomica 8. Francof. 1593
Comitis, Nathan. Mythologia 8. Genev. 1651
Connor, Bernard. Evangelium Medici 8. Amstelæd. 1699
Cornarii, Diomed. Observationes & Historiæ admirandæ 4. Lips. 1599
 Jani, Versio latina Hippocratis 8. Basil. 1554
Cornelii, Thomæ, Consentini, Progymnasmatata physica 12. Francof. 1665
Craan, Theod. de Homine 4. Lugd. 1689
 Oeconomia animalis 8. Amsterd. 1703
Cremoninus, Cæsar, de calido innato & semine 24. Lugd. 1634
Cypriani, Abrah. Epistola de Fœtu tubario exciso 8. Lugd. 1700

D.

Daelmanns, Ægid. Praxis medica oder Heilkunst 8. Franckf. 1690
a Deventer, Henr. Operationes Chirurgicæ sive de Arte Obstetricaria, 4.
 Lugd. 1701
Deusingii, Antonii, Vindiciæ foetus Muscipontani, v. J. Ben. Sinibaldi Gene-
 anthropœia Append.
 de Lacte 12. Groeningæ 1655
de Diemerbroec, Isbrand. Opera anatomico-medica fol. Ultraj. 1685
Digby, Kenelm. de Immortalitate animæ 8. Francof. 1664
 de Sympathia 8. Hamburg 1684

Dionis, Petri, Anatomia Corporis humani 8. Genev. 1696

Traité des Accouchemens 8. a Paris 1724

Dodonæi, Remberti, Observationes 8. Colon. 1581

Dollæi, Joh. Encyclopædia medica 4. Francof. 1684

Donatus, Marcellus, de Historia medica mirabili 8. Francof. 1613

Drelincurtius, Carol. de Conceptione conceptus 12. Lugdun. 1685

de Conceptione adversaria 12. Lugdun. 1686

E.

Eisenmengerus, Joh. Christoph. de Foetu Muscipontano. vid. Sinibaldi Gene-
anthrop. Append.

Ephemerides Academiae Naturæ Curiosorum

Ettmülleri, Michaelis, Opera fol. Francof. 1695

Mich. Ernesti, Disputatio, de Monstro Hungarico 1718

Exercitationes Francofurtenses Tom. I.

F.

Fabricii, Guil. Hildan. Opera fol. Francof. 1656

Ab Aquapendente de formatione Ovi. vid. Hieron. Fabricii ab Aqua-
pend. Opera anatomica & physiologica fol. Lips. 1682

Fallopium, Gabrielis, Opera omnia fol. Francof. 1600

Fernelii, Joh. Universa Medicina 4. Trajecti 1656

Fidelis, Fortunatus, de Relationibus Medicorum 8. Lips. 1674

Foesii, Anutii Annotationes in Hippocratem fol. Basil. 1636

Foresti, Petri, Observationes medicinales fol. Francof. 1602

Fracastorius, Hieron. de Sympathia & Antipathia 8. Lugd. 1554

Francisci, Erasmi, *lustige Schaubühne* 8.

Franci, Georgii, Annotationes in Paulum Zacch. Quæstiones M. L. Satyræ
Medicæ 8. Lips. 1722

Freind, Joh. Emmenologia seu de fluxu muliebri menstruo 8. Roterod. &
Lugd. Batav. 1711

G.

Gabelchoveri, Wolffg. Curationes & Observationes 8. Tubing. 1611

Gaffarelli, Jacobi, Curiositates inauditæ 8. Hamburg. 1678

Galenii Opera, fol. Venet. 1562 seq.

Garmannus, Christ. Frid. de Miraculis mortuorum 4. Dresdæ & Lips. 1709

Oologia curiosa 4. Cygneæ

Epistolarum Centuria 8. Rostoch. Lips. 1715

Disputatio de Generat. Partus numeros. Lips. sub Præsidio Gottf.

Welsch, 1667. habita

- Gassendi, Petri, Descriptio Vitæ Peirescii
a Gehema, Jan. Abrah. Observationes medicæ 12. Bremæ 1686
Gellii, Auli, Noctes Atticæ 8. Genev. 1621
Gerbezii, Marci, Intricatum extricatum medicum 8. Laubach. 1692
Chronolog. medico-practica 4. Francof. 1713
Geuderus, Melch. Fr. de Fermentatione & Ortu animalium 8. Amst. 1680.
Gockelii, Everhard. Gallicinium seu Consilia & Observat. 4. Ulmæ 1700
Gœlicke, Andr. Ottom. Medicina Forensis 4. Francof. ad Viadr. 1723
Gofey de Generatione foetus. vid. Daniel Hoffmann
Gordonii, Bernhardi, Lilium Medicinæ 8. Francof. 1617
Gorræi, Joh. Definitiones medicæ, fol. Lutet. 1564
Graaf, Regneri de, Opera omnia de Organis Virorum, mulierum, de Succo
pancreatico & Clysteribus 8. Lug. 1677
Græbneri, David. Medicina vetus restituta 4. Lips. 1678
le Grand, Anton. Historia naturalis 8. Norimb. 1678
Grænlands Beschreibung 4. Nürnberg. 1679
a *Güldenkee*, Bald. Tim. Opera omnia medico-practica 4. Lips. 1677

H.

- Hagendornii, Ehrenfr. Historiæ medico-physicæ 8. Rudolphst. 1690
du Hamel, Joh. Bapt. Historia regię scientiarum Academiæ 4. Lips. 1700
Harderi, Joh. Jac. Apiarium seu Observationes 4. Basil. 1687
Prodromus physiologicus de Nutritione & Generatione Basil. 1679
Hartmanni, Joh. Opera omnia fol. Francof. 1687
Harvæus, Guil. de Generatione animalium 12. Hagæ 1680
de Puerperii tempore, ibidem
ab Heer, Henrici, Observationes medicæ 12. Lugd. 1685
Heisteri, Laur. Oratio de Incrementis Anatomix 8. Wolffenbütt. 1720
Hellwigii, Joh. Observationes physico-medice 4. August. 1680
van Helmont, Joh. Bapt. Opera omnia fol. Lugd. 1667
Franc. Mercurii, Observationes circa Hominem 12. Amst. 1682
Herfeld, G. H. de Origine morborum 8. Amsterd. 1706
Herlicius, Dav. de Purgationibus gravidarum 8. Stuttgart 1626
Heurnii, Joh. Interpretatio Aphorismorum Hippocratis 12. Lugd. 1638
Hippocratis Opera Fœsii Editio Fœsii, fol. Basil. 1536
Aphorismi 24
Historia Academiæ regię scientiarum Parisiensium 1699. 1700. 8. Lips. 1715
Morborum Vratislaviæ A. 1702. grassantium 4. Vratisl. & Lips. 1710
Höchstetteri, Phil. Observationes medicinales 8. Franc. Lips. 1634

Syllabus Autorum.

- Hoffmannus, Conr. Phil. de Puerperii temporibus 4. Regiomont. 1723
Hoffmanni, Danielis, Annotationes in Hypotheses Gofeyanas 8. Erf. 1719
Frid. Fundamenta Medicinæ 8. Halæ 1695
Medicinæ rationalis systematicæ Tom. I. 4. Halæ 1718
Medicina Consultatoria 4. Halle 1722
Joh. Mauric. Idea Machinæ humanæ anatomico - physiologica 4.
Altdorf. 1703. (dorf. 1713.
Disquisitio Corporis humani anatomico - pathologica 4. Alt-
Hollerii, Jac. de morborum internorum curatione 8. Paris. 1567.
van Horne, Joan. Opuscula anatomico-chirurgica c. annot. Pauli 8. Lips. 1707
Hornungii, Joh. Cista medica 4. Norimb. 1625
Horstii, Gregor. Opera medica, fol. Norimb. 1660
Hucher, Joan. de Sterilitate utriusque Sexus 8. 1599
I.
Janſon, Sam. *von Erzeugung der Menschen* 8. Franckf 1700
Jonſton, Joh. Thavmatographia naturalis 12. Antverp. 1633
le Journal des Sçavans de l'an 1665. seqq. 12. a Amſterd.
Joſephi, Flavii, Opera de Antiquitatibus Judaicis 8. Francof. 1617
Junckeri, Joh. Conſpectus medicinæ theoretico - practicæ 4. Halæ 1718
K.
Kerckringii, Theodor. Spicilegium anatomicum 4. Amſtelod. 1670
Anthropogeniæ Ichnographia 8. 1671
Kircherus, Athanaſius, de Luce
Kœnig, Emanuelis, Regnum animale 4. Baſ. 1698
Kornmannus, Henr. de Virginitate 12. Franc. 1629
Opera curioſa 8. Francof. 1696
Kozack, Joh. Sophron. de Sale 4. Francof. 1663
Kyperi, Alberti, Anthropologia 4. Lugd. 1660
L.
Laſtantii, L. Cœlii, Opera 8. Lugd. 1652
Lamzweerde, Joh. Bapt. a, Hiſtoria Molarum uteri 8. Lugd. 1686
Langii, Joh. Epistolæ medicinales 8. Hanov. 1605
Chriſt. Joh. Opera medica, fol. Lipſ. 1704
Laurenbergii, Petri, Acerra Philologica 8. Francof. & Lipſ. 1694
Laurentii, Andr. Hiſtoria anatomica, fol. Francof. 1601
Georg. Frid. Exercitationes in Hippocratis Aphorismos 4. Ham-
burg. 1647
Lemnius, Levinus, de occultis Naturæ miraculis 12, Franc. 1604

Syllabus Autorum.

- Lemnius de Complexionibus 12. Francof. 1604
Lentilii, Rosini, Miscellanea Medico-practica 4. Ulm. 1698
Iatromnemata theoretico-practica 8. Stutg. 1712
Libavii, Andreae, Epistolæ chymicæ 8. Francof. 1595
Licetus, Fortunius, de spontaneo viventium ortu, fol. Vicent. 1618
de Monstris, Gallice v. Jean Palfyn Traité de Monstres, 4. a Leyde
1708
Linsing, Petr. Ern. Institutiones Medicæ 8. Erlang. 1701
Lipsii, Justi, Commentarius in Corn. Tacitum, fol.
Lommii, Jodoci, Observationes medicinales 12. Fr. Lipsiæ 1688
M.
Majoli, Simonis, Dies Caniculares, fol. Francof. 1642
Malpighii, Marcell. Epistola ad Sponium, vid. Biblioth. anatom.
Mandelsloe, Joh. Albr. v. Persianische Reise, v. Olearii Orientalische Reise,
fol. Schleswig 1647
Mappus, Marcus, de Acephalis Historia medica, 4. Argent. 1687
Matthiæ, Dan. Mennonis, Experimenta & Observationes, 12. Frf. 1683
Matthioli, Petr. Andr. Epistolæ, vid. ejusdem Opera, fol. Basil. 1674
Mauriceau, François, Observations sur la Grossesse, 4. a Paris 1695
Maximus, Valerius
Mayerne, Theod. de, Praxis medica 8. August. 1691
a Meekren, Jobi, Observationes Medico-Chirurgicæ, 8. Amsterd. 1682
Mercurialis, Hieron. Medicina practica, fol. Francof. 1601
Prælectiones Pisanae, fol. Venet. 1597
de Morbis Mulierum, vid. Isr. Spacchii Gynæc.
Mercurio, di Scipione, la Commare Oriccoglitrice, 8. in Milano 1618
Michaelis, Joh. Opera medico-chirurgica, 4. Norimb. 1688
Miscellanea Naturæ Curiosorum
Mœbii, Gothofr. Physiologia 4. Jenæ 1661
a Moenichen, Henr. Observationes medico-chirurgicæ 12. Dresd. 1697
Montani, Arnold. *Gesandschafft an die Kayser von Japan*, fol. Amst. 1700
Moroni, Matthiæ, Directorium medico-practicum 4. Franc. 1663
de la Motte de Generatione & superfœtatione. vid. Heisteri Oratio de Incre-
mentis Anatomiae
Mülleri, Petri, Disputatio de Jure Prægnantium, 4. Jenæ
Munnicks, Joh. Anatomia nova, 8. Lugd. Batav. 1699
Muralt, Joh. von, Hippocrates Helveticus, 8. Basel 1692
Anatomisches Collegium, 8. Nürnberg. 1697

Syllabus Autorum.

Muralt, Joh. von, Vademecum seu Clavis Medicinæ, 12. Tigur. 1672
Mufitanus, Carolus, de Morbis Mulierum, 4. Colon. Allobrog. 1709
Muys, Joh. Prax. medico-Chirurgica, 12. Amsterd. 1695

N.

Nenteri, Georg. Phil. Physiologia medica, 8. Argent. 1614
Nicolai, Joh. Georg. de Repudiis & divortiis, 4. Dresd. 1685
Nitzschii, Frid. Journal des Sçavans seu Ephemerides Eruditorum, 8. Lips. 1671
Nova Literaria Germaniæ, 4. Hamburg. 1703
 Maris Balthici, 4. 1700

Nuck, Anton. Adenographia, 8. Lugd. 1692
Nymannus, Greg. de Vita foetus in utero, vid. Plazzon. de Partibus genitalibus 12

O.

Obsequens, Julius, de Prodigiiis, 8. Basil. 1552
Oldenburgii, Henr. Acta philosophica, 4. Lips. 1674
Olorinus, Johannes de Arboribus mirabilibus, 8. Magdeb. 1616
Ortlobii, Joh. Frid. Historia Partium seu Physiologia, 4. Lips. 1697

P.

Pachequi, Petri, Observationes, vid. Riverii Observat. 8.
Pæonis & Pythagoræ Exercitationes anatomicæ & medicæ, 8. Basil. 1682
Palfyn, Jean, de la description anatomique des parties de la femme, a Leide 1708

Panaroli, Dominici, Observationes medicinales, 4. Hanov. 1654
Pancirollus, Guil. de Rebus memorabilibus seu deperditis, 4. Franc. 1660
Paræi, Ambros. Thesaurus Chirurgiæ, fol. Francof. 1610
Paschalii, Petri, Methodus curandi cum Peredæ Scholiis, 8. Lugd. 1587.
Pauli, Joh. Guilh. Annotationes in Hornii Opera
Pauli, Sim. Quadripartitum Botanicum, 4. Argentor. 1666
Paullini, Christ. Franc. Cynographia curiosa, 4. Norimb. 1685
 Lagographia, 8. August. 1691
 Observationes medicæ, 8. Lips. 1706
 Zeitkürzende erbauliche Lust, 8. Franckf. 1695
 Philosophische Lust-Stunden, 8. Franckf. und Leipzig 1716
 de Talpa, 12. Francof. & Lips. 1689
 de Salvia, 8. Augustæ 1688

Pechlini, Joh. Nicol. Observationes physico-medicæ, 4. Hamb. 1691
Perdulcis, Barthol. Medicina universa 4. Lugdun. 1649
Peredæ, Petri Pauli, Scholia in Michaelis Paschalii Methodum curandi, 8. Lugd. 1587

Perescii

Syllabus Auctorum.

Perefcii Vita

Petermanni, Andr. Casus medicinales 8. Lips. 1708. sq.

Peyeri, Joh. Contr. Exercitationes de Glandulis Intestinatorum 8. Amst. 1681

Piens, Franciscus, de Febribus 8. Noviomag. 1669

Pinæus, Joh. Severin. de Notis Virginitatis 12. Amsterd. 1663

Pisonis, Caroli, Observationes & Consilia de Morbis serosis 8. Lugdun. 1650

Plateri, Felicis, Observationes 8. Basil. 1614

Quæstiones semioticæ, it. Praxis

Plauti, Marci Accil. Comoediæ 12. Witteb. 1652

Plempii, Vopisci Fortunati, Fundamenta Medicinæ contra Primerosium fol.
Lovan. 1644

Plinii Historia Mundi fol. Basil. 1654

Portæ, Joh. Baptistæ, Magia naturalis 12. Amsterd. 1664

Posneri, Caspar. Geneanthropologia fol.

a Pratis, Jason, de Uteris 12. Amstelod. 1657

Primerosius, Jacob. de Vulgi Erroribus in Medicina 12. Roterod. 1668

Destructio Fundamentorum Plempii 4. Roterod. 1657

Purmanns, Matth. Gottfr. *Chirurgischer Lorbeer-Crantz* 4. Halberst. 1684

R.

Rallius, Georg. Frid. de Generatione animalium 12. Stetin. 1669

a Reies, Caspar. Campus Elysus jucundarum Quæstionum 4. Francof. 1670

Relationes Lipsienses

Remigii, Nicolai, Dæmonolatria 4. Lugd. 1595

Rhodii, Joh. Observationes. vid. Petri Borelli Observationes.

Riedlini, Viti, Lineæ medicæ 8. Augustæ 1675. sq.

Observationes 12. Augustæ 1682. it. 1696.

Millenarius Curationum medicarum 4. Ulmæ 1709

Riolani, Joh. Ars bene medendi 8. Lips. 1601

Anthropographia s. Opera omnia anatomica fol. Lutet. 1649

de Monstro Parisiensi. vid. Anthropogr.

Riverii, Lazari, Observationes medicæ 8. Hagæ 1656

Rivini, Disputatio de Spiritu Hominis 4. Lipsiæ

Rolsincius, Guerner. de Partibus Generationi inservientibus 4. Jenæ

Rondeletii, Gulielmi, Methodus curandorum morborum 8. Paris. 1574.

Rossei, Bald. Epistolæ. vid. Opuscula medica 8. Lugd. 1618

Rossetus, Franc. de Partu Cæsareo s. de Exsectione foetus vivi 8. Francof. 1602

Ruysschii, Frid. Thesaurus anatomicus 4. Amsterd. 1701. sq.

Syllabus Auctorum.

Muralt, Joh. von, Vademecum seu Clavis Medicinæ, 12. Tigur. 1672
Musitanus, Carolus, de Morbis Mulierum, 4. Colon. Allobrog. 1709
Muys, Joh. Prax. medico-Chirurgica, 12. Amsterd. 1695

N.

Nenteri, Georg. Phil. Physiologia medica, 8. Argent. 1614
Nicolai, Joh. Georg. de Repudiis & divortiis, 4. Dresd. 1685
Nitzschii, Frid. Journal des Sçavans seu Ephemerides Eruditorum, 8. Lips. 1671
Nova Literaria Germaniæ, 4. Hamburg. 1703
 Maris Balthici, 4. 1700

Nuck, Anton. Adenographia, 8. Lugd. 1692
Nymannus, Greg. de Vita foetus in utero, vid. Plazzon. de Partibus genitalibus 12

O.

Obsequens, Julius, de Prodigis, 8. Basil. 1552
Oldenburgii, Henr. Acta philosophica, 4. Lips. 1674
Olorinus, Johannes de Arboribus mirabilibus, 8. Magdeb. 1616
Ortlobii, Joh. Frid. Historia Partium seu Physiologia, 4. Lips. 1697

P.

Pachequi, Petri, Observationes, vid. Riverii Observat. 8.
Pæonis & Pythagoræ Exercitationes anatomicæ & medicæ, 8. Basil. 1682
Palfyn, Jean, de la description anatomique des parties de la femme, a Leide 1708

Panaroli, Dominici, Observationes medicinales, 4. Hanov. 1654
Pancirollus, Guil. de Rebus memorabilibus seu deperditis, 4. Franc. 1660
Paræi, Ambros. Thesaurus Chirurgiæ, fol. Francof. 1610
Paschalii, Petri, Methodus curandi cum Peredæ Scholiis, 8. Lugd. 1587.
Pauli, Joh. Guilh. Annotationes in Hornii Opera
Pauli, Sim. Quadripartitum Botanicum, 4. Argentor. 1666
Paullini, Christ. Franc. Cynographia curiosa, 4. Norimb. 1685

 Lagographia, 8. August. 1691

 Observationes medicæ, 8. Lips. 1706

Zeitkürzende erbauliche Lust, 8. Franckf. 1695

Philosophische Lust-Stunden, 8. Franckf. und Leipzig 1716

 de Talpa, 12. Francof. & Lips. 1689

 de Salvia, 8. Augustæ 1688

Pechlini, Joh. Nicol. Observationes physico-mediciæ, 4. Hamb. 1691

Perdulcis, Barthol. Medicina universa 4. Lugdun. 1649

Peredæ, Petri Pauli, Scholia in Michaelis Paschalii Methodum curandi, 8. Lugd. 1587

Perefcii

Perefcii Vita

Petermanni, Andr. Casus medicinales 8. Lipf. 1708. fq.

Peyeri, Joh. Contr. Exercitationes de Glandulis Intestinatorum 8. Amft. 1681

Piens, Francifcus, de Febribus 8. Noviomag. 1669

Pinæus, Joh. Severin. de Notis Virginitatis 12. Amfterd. 1663

Pilonis, Caroli, Observationes & Confilia de Morbis ferofis 8. Lugdun. 1650

Plateri, Felicis, Observationes 8. Bafil. 1614

Quæftiones femioticæ, it. Praxis

Plauti, Marci Accil. Comoediæ 12. Witteb. 1652

Plempii, Vopifci Fortunati, Fundamenta Medicinæ contra Primerofium fol.
Lovan. 1644

Plinii Historia Mundi fol. Bafil. 1654

Portæ, Joh. Baptiftæ, Magia naturalis 12. Amfterd. 1664

Posneri, Cafpar. Geneanthropologia fol.

a Pratis, Jafon, de Uteris 12. Amftelod. 1657

Primerofius, Jacob. de Vulgi Erroribus in Medicina 12. Roterod. 1668

Deftitutio Fundamentorum Plempii 4. Roterod. 1657

Purmanns, Matth. Gottfr. *Chirurgifcher Lorbeer-Crantz* 4. Halberft. 1684

R.

Rallius, Georg. Frid. de Generatione animalium 12. Stétin. 1669

a Reies, Cafpar. Campus Elyfius jucundarum Quæftionum 4. Francof. 1670

Relationes Lipfienfes

Remigii, Nicolai, Dæmonolatria 4. Lugd. 1595

Rhodii, Joh. Observationes. vid. Petri Borelli Observationes.

Riedlini, Viti, Lineæ medicæ 8. Auguftæ 1675. fq.

Observationes 12. Auguftæ 1682. it. 1696.

Millenarius Curationum medicarum 4. Ulmæ 1709

Riolani, Joh. Ars bene medendi 8. Lipf. 1601

Anthropographia f. Opera omnia anatomica fol. Lutet. 1649

de Monftro Parifienfi. vid. Anthropogr.

Riverii Lazari, Observationes medicæ 8. Hagæ 1656

Rivini, Difputatio de Spiritu Hominis 4. Lipfiæ

Rolfincius, Guerner. de Partibus Generationi infervientibus 4. Jenæ

Rondeletii, Gulielmi, Methodus curandorum morborum 8. Parif. 1574.

Ronflei, Bald. Epiftolæ. vid. Opuscula medica 8. Lugd. 1618

Roffetus, Franc. de Partu Cæfareo f. de Exfectione foetus vivi 8. Francof. 1501

Ruyfchij, Frid. Thefaurus anatomicus 4. Amfterd. 1701. fq.

- Sachſii, Phil. Jac. Gammarologia ſ. de Cancris 8. Francof. & Lipſ. 1663.
de Lapidum natura vid. Majoris Epistoła de Cancris & Serpentibus
petrefactis 8. Jenæ 1664.
- Salmuthi, Phil. Observationes medicæ 4. Brunſwigæ 1648
- Saltzmanni, Joh. Rudolphi, observata anatomica 12. Amſtelod. 1669
- Sandris, Jac. de, de Sanguinis ſtatu 8. Francof. 1712
- Savanarolæ, Joh. Mich. Practica œconomica
- Schenckii, Joh. Observationes, fol. Francof. 1665.
- Joh. Georg. Hiſtoria Monſtrorum 4. Francof. 1609
- Schraderi, Juſti, Observationes & Hiſtoriæ 12. Amſterd. 1674
- Schrœckii, Luca, Additamenta ad Joh. Helwigii Observationes
- Schurigii, Martini, Chylologia 4. Dresdæ 1725
- Sialologia ſive de Saliva 4. Dresdæ 1723
- Spermatologia ſive de Semine humano 4. Francof. 1720
- Muliebria ſ. de Partibus genitalibus Mulierum 4. Dresdæ & Lipſ.
1729
- Parthenologia ſive de Virginitate 4. Dresdæ & Lipſ. 1729
- Gynæcologia ſive de Coitu ibid. 1730
- Schwenckfeld. Caſpar. Theriotrophæum Sileſiæ 4. Lignic. 1603
- Scriptura Sacra
- Sculteti, Joannis, Armamentarium Chirurgicum 4. Francof. 1666
- Sengverdus, Arnoldus, de Oſtento Doletano 24. Amſtelodami
- Sennerti, Dan. Practica 4. Wittebergæ 1654. ſq.
- Sennertus de Chymicorum cum Ariſtotelicis Conſenſu & Diſſenſu 4. Franc.
& Witt. 1655
- Siegemundin, Juſtina, Brandenb. Wehmutter 4. Cölln an der Spree 1690*
- Sinibaldi, Joh. Bened. Geneanthropœia ſive de Generatione Hominis 4.
Francof. 1669
- Snellen, Henr. Delineatio Theoriæ mechanicæ 8. Lugd. 1705
- Solenandri, Reineri, Conſilia medica fol. Hanov. 1605
- Solingen, Cornelii van, Embryulcia ofte Afhalinge eenes toden Vruchts 12.
Graven-Haag 1673
- Ampt ende Plicht der Vrœdvrouwen; Manuale Operatien 4. t.
Amſterd. 1684
- Solini, C. Julii, Polyhiſtor ſ. Colleſtanea Rerum memorabilium 8. Go-
thæ 1665
- Spacchii, Iſrael. Gynæciorum liber fol. Argent. 1597.

Syllabus Auctorum.

- Sperlingius, Joh. de Formatione foetus in utero 8. Witteb. 1641
Spindleri, Pauli, Observationes medicinales 4. Francof. 1691
Stalpart van der Wiel, Cornelii, Observationes rariores 8. Lugd. 1687
Petrus, de Nutritione foetus ibid.
Stockhammeri, Franc. Microcosmographia 12. Viennæ 1682
Straussius, Laur. de Foetu Muscipontano vid. Sinibaldi Geneanthrop.
Svetonius
Swammerdam de Utero muliebri vid. Bibliotheca anatomica Tom. I.
Sylvii, Franc. Opera medica fol. Avenione 1680. & 4. Amstelod. 1680
de Taranta, Valesci, Philonium pharmaceuticum & chirurgicum 4. Franc. 1680
Tauery, Danielis, Anatomia 8. Ulmæ 1694
Teichmeyeri, Herm. Frid. Institutiones Medicinæ legalis vel forensis 4.
Jenæ 1723
Temnick, Joh. Philosophia vera 8. Colon. 1706
de Tertre, Marguerite, Instruction de sage-femmes 12. a Paris 1677
Tilemanni, Joh. Aphorismi Hippocratis 24
Timæus a *Güldenkle* Baldaß. Opera medico-practica 4. Lipsi. 1677
Torreblanca, Franc. de Magia 4. Lugdun. 1678
Tulpium, Nicol. Observationes medicæ 8. Amsterd. 1652
U. V.
Valentini, Mich. Bernh. Novellæ medico-legales 4. Francof. 1711
Polychresta exotica 4. Francof. 1700
Pandectæ medico-legales 4. Francof. 1701
Valerius Maximus
Valleriosæ, Franc. Observationes medicinales 8. 1588
Vallesii, Franc. Controversiæ medicæ fol. Francof. 1590
Varandæi, Joh. Opera omnia fol. Lugd. 1658
a Vega, Christophori Opera fol. Lugdun. 1587
Velschii, Georg. Hier. Sylloge Curationum Episagmata 4. August. 1667
Hecatosteæ duæ Observati. 4. August. 1675
Velchuyfius, Lambertus, de Liene & Generatione 12. Traject. 1657
Venette, Niclas de la Generation de l'Homme ou Tableau de l'amour 12. Cologne 1696.
Venus Minsteecke Gasthuis J. V. E. 8. a Amsterd. 1687
Verduc, Jean Bapt. de l'Usage des Parties 12. a Paris 1696
Vesalii, Andréæ, Anatomia fol. Venet. 1614
Veslingii, Joh. Syntagma anatomicum 4. Patavii 1647

Syllabus Auctorum.

- Veslingii, Joh. Observationes anatomicæ 8. Hafniæ 1664
 Viardel, Cosmus, *von der weiblichen Geburt*
 Vicarii, Joh. Jac. Franc. Basis universæ medicinæ 8. Ulmæ 1700.
 Vives, Joh. Lud. de Christianis feminis 8. Basil.
 Ulmi, Marci Ant. Physiologia Barbæ fol. Bonon. 1603
Unterredung, Monatl. von allerhand Historien 8. 1690
 W.
 Waldschmidii, Joh. Jac. Institutiones medicinæ 8. Lugd. 1689
 Epistolæ de Rebus medicis 4. Francof. 1689
 Wilh. Huld. de Superfoetatione 4.
 Waldungi, Wolffg. Lagographia 4. Amberg. 1619
 Warlizius, Christianus de morbis biblicis 8. Witteberg. 1714
 Wedelii, Georg. Wolffg. Physiologia medica 4. Jenæ 1682
 Pathologia medico-dogmatica 4. Jenæ 1692
 de morbis infantum 4. Jenæ 1706
 Weinrichius, Mart. de Ortu monstrorum 8. 1597
 Whartoni, Thomæ, Adenographia sive de Glandulis 12
 Winteri, Georg. Sim. Tractatio de Re equaria *oder Stutterey* fol. Norib. 1672
 Wolffii, Ido, Observationes Chirurgico-medicæ 4. Quedlinb. 1704
 Christiani Musæum 4.
 Wormii, Olai, Musæum seu Historia Rerum naturalium fol. Lugd. 1655
 Z.
 Zacchiæ, Paul. Quæstiones medico-legales fol. Francof. 1688
 Zacutus, Lusitanus, de Praxi medica vid. Opera omnia fol. Lugd. 1649
 Zittmanni, Joh. Frid. Medicina forensis 4. Francof. 1706
 Zwingeri, Theodori, Theatrum Praxeos medicæ 4. Basil. 1710
 Zypæi, Franc. Fundamenta medica 8. Bruxellis 1684

I N D E X R E R U M.

A.

A Bdominis intumescencia an signum graviditatis?	380. neg. 417	Animi vitia ab imaginatione	642. ratio 643
in Abdominis cavitate ovula	91	Antipathia anguillarum	429
Ætites prægnans	353	ab Aqua ingravidatio falsa	450
Agrypnia gravidarum	512	Aura loco feminis in coitu	141
ab Alumine sterilitas	174	Auram seminis per tubam ascendere ad ovarium	23
Amnios gemellorum	215	Autoris sententia de Embryotokia	324
ab Amnio sterilitas	175	de gemellorum tunicis	216
Anima gemellorum coalitorum	252	placentis	227
per Animam conceptionem fieri	58	Auto-	

Index Rerum.

Autorum variorum sententiæ de imaginationis operatione		632	Conceptio an integra virginitate fieri possit?		138
de conceptione		1. sq.	an in tubis Fallopiæ?		42
B.			an in utero?		44
Baptismus geminorum		242	in ventriculo		99
coalitorum		248	an unico coitu fiat?		139
Bombyx in bombyce		340	an sine semine?		ibid.
Bruta an superfoetent		301	sine coitu		144
Brutorum imaginatio		627	an a flatu?		141
in Brutis Embryotokia		329	in somno an detur?		136
C.			marium & feminarum		147. sq.
Calculus humanus prægnans		356	Conceptio foetus in foetu an ad gemel-		
Cancer in cancro		333	lationem, an superfoetationem sit re-		
Canicula prægnans		331	ferenda?		322
Canis mas lactans catulos		411	Conceptionis ætas		115
felem		412	locus		17
Caper in mammis lac habens		413	in ovario		44
Capite truncatus foetus ex matris ima-			signa		164. sq. fallacia 166
ginatione	633. 640. sq.		Conceptionem an femina impedire		
Caryophylli proliferi		350	possit?		169
Casus de superfoetatione	310. 313. sq.		de Conceptione variæ opiniones		1
Cerasus prolifera		351	Conceptus tubarius		84 seq.
Citrum in Citro		344	Cornu in Cornu		340
Clausura orificii uteri an signum gravi-			Corona imperialis prolifica seu præ-		
ditatis?		365	gnans		352
Coitus gravidarum		533	Corpus glandulosum		63. sq.
ante partum		538	Craanii sententia de imaginationis ope-		
Color equorum ab imaginatione	629		ratione		637
columbarum		630	Cypriani Observatio de foetu		87
pavonum		631	D.		
Conceptio est opus abstrusum		1	Dæmon lactans ab imaginatione		626
quomodo fiat?	28. sq.		Decollatio foetus a matris imaginatio-		
per feminum commiscelam			ne		633
falsa		9	Dens in dente		340
vermicularis	10. 34		Dentium dolor signum graviditatis		430
vetularum		116	Diarrhœa signum graviditatis		427
hermaphroditica		145	Didymotokia		154
sine prævia menstruatione		118	Dobrozenski sententia de imaginatio-		
tempore menstruationis	120		nis operatione		640
an a liquore vaginalium?	123		Dolæi sententia de operatione imagi-		
an a flagrorum usu?	123		nationis		635
an sine voluptate?	124. 128. 133		Draconum specie Ethnicorum Deos		
sine penis immissione	131		feminas iniisse		144
imperforatarum absque vo-			Dubia contra graviditatem		383
luptate	133		E.		
			Embryo prægnans		321. 324
			P p p p 3		Embryo-

Index Rerum.

Embryotokia	321	Fœtus an a femine virili?	1
Embryotokiæ exempla	326. sq.	pulchri	145
in brutis	329	quomodo parandi?	ibid.
in canicula	331	Foramen in ovario unde?	70
in gliribus	332	Fustigatio gravidarum	500
in muribus	ibid.	G.	
in mula	329	Gallina superfoetans	305
in vitulo	ibid.	Garliep sententia de imaginationis	
Epilepsia signum graviditatis	429	operatione	639
in gravidis	513	Gemellatio	184
Equa superfoetans	305	frequens	196
Equus cum facie humana	629	quomodo differat a superfoe-	
cum pedibus inversis	ibid.	tatione	253
Equorum color ex imaginatione	ibid.	Gemellationis modus	188
F.		ex binis vitellis	189
Femina an in coitu semen conferat?	108	staminibus	ibid.
Feminæ an habeant semen proprium?		ex duobus ovulis sibi annexis	191
	3. seq.	ex uno vel duobus ovaris	193
Feminarum conceptio	147	ex pluribus congressibus	194
fraudes ratione graviditatis	357	Gemelli quid proprie sint?	195
Fimbriæ tubarum	79	cur non semper nascantur?	197
Flagrorum usus an conceptionem pro-		in abdominis cavitate	96. 252
moveat?	123	ab interfecta gravida editi	200.
Flatus loco feminis in coitu	141		242
an a flatu sine femine conceptio?		a suspensa nati	200. 504
	142	duplices	203
a Flatibus ingravidatio falsa	445	diversæ magnitudinis an sint su-	
Flores floriferi seu prægnantes	347	perfoetati?	217
Fluor albus causa sterilitatis	173	monstruosi	233
Fœcundationis modus	54	coaliti & separati	238
Fœtus in ovaris	51. 83	in brutis	239
Dolanus	94	in mola	240
Musipontanus	95. 487	humani a vacca editi	241
Tolosanus	95	peregrino sermone loquentes	
extra uterum	92		242
in abdomine gr. a ruptura ute-		coaliti an unicam habeant ani-	
ri	97	mam?	250
in inguine	98	coaliti an unicum habeant cor?	
in ventriculo	99		251
in fœtu	321	Gemellorum denominatio	184
in secundinis latens	296	definitio	185
in utero vagiens	483	causa	ibid.
in utero diu delitescens	484. sq.	exempla	199. 206
	487	signa 207. ante partum sunt in-	
prægnans & pariens	321	certa	208
materia ex ovo	10	coalitus	233. 245
		Gemel-	

Index Rerum

Gemellorum placentæ	212	Graviditatis signa a mulsa	375. 396
similitudo	229	signa ab oculis	371
tunicæ	212	ab orificii interni clausura	365. 383
baptismus	242	a siccitate partium genita-	363. 384
coalitorum discrepantia	246	lium	378
jus primogenituræ	252	a varicibus	376
Generatio a vermiculis an fiat?	10	ab urina	380
ex ovo a quibusdam negatur	11. seq.	ab uteri intumescencia	H.
defenditur	16. sq.	Harderi sententia de imaginatione gra-	
mariæ & feminarum an pro lu-		vidarum	634
bitu sit possibilis?	158	Hernia uterina signum graviditatis	429
an a phantasia?	161	Horror an signum graviditatis?	368
in Gliribus embryotokia	332	ab Hydatidibus ingravidatio falsa	453.
Gravida suspensa pariens	503		458
Gravidarum coitus	533	I.	
diæta	525	Imaginatio gravidarum	542. sq.
incarceratio	497	brutorum	627
mensium fluxus	527	quomodo operetur?	632
phantasia	542	Imperforatas absque voluptate concipi-	
pica	526	pere	133
pœna	499	Imprægnatio vid. Graviditas.	
pœna differenda	500	Infans recens natus gradiens & loquens	483
circa fustigationem	ibid.	Infantes lac habentes	399
privilegia	493	Ingravidatio falsa ab aqua	450. 458
circa juramenta	494	falsa a flatibus	445. 463
circa torturam	498	ab hydatidibus	453
sepultura	507	a mola	457. 458
symptomata	511	ab ovario	463
Graviditas	357	Ingravidationis falsæ exempla	458. sq.
simulata	360. 476	in Inguine fœtus	98
diuturna	480. seq.	Intumescencia uteri an signum graviditatis?	380
duplex	509	Iudicis cautela circa gravidarum pœ-	
occulta seu ignorata	470	nas	504
astutia detecta	431	K.	
falsa v. Ingravidatio falsa ab		Kircheri sententia de operatione ima-	
ovario	463	ginationis	632
per septem annos	96	L.	
Graviditatis signa	357	Labia leporina in porcellis	627
signa sunt incerta	361	Lac an signum graviditatis?	379. 399
a conjugum constitutione	362	in infantibus	399
ab horrore	368	in vetulis	404
a lassitudine	ibid.	in virginibus	400
a lacte	379. 399. 414. seq.	Lac	
a mensium suppressione	370. 386		

Index Rerum.

Lac in viris	406	Nævi v. g. Abdomen pertusum	604
nullum in gravida	415	Æthiops trium Regum	607
Lapides prægnantes	355	ani fistula	585
Lasitudo an signum graviditatis?	368	anseris caput	621
Lentilii sententia de imaginationis		avellanæ	547
operatione	638	aranea	557
Lepores cum rostro suillo	627	aures asininæ	581
an superfoetent?	303. sq.	leporinæ	ibid.
Lepusculi extra uterum	97	brachiorum defectus	612. 615
Liberorum cum parentibus similitudo		brassica	552
	647	canis	625
de Limone in Limone	341	capilli varii	563
Liquor prostaticus	6	cani ibid. ruffi	ibid.
a Liquore vaginalium an conceptio?		nigri & crispi	ibid.
M.	123	caput anseris	621
Malum aurantium prægnans	344	carpionis	622
sinense in malo sinensi	345	vituli	621
Marium conceptio	158	transfossus	599
Melancholia gravidarum	511	capita coalita	608
Mensium fluxus in gravidis 527. per		capitis defectus	616
quas vias?	528. 529	carnis portiuncula	601
Menses non nisi in gravidis	393	carpionis caput	622
Mensium suppressio an signum graviditatis?	370. 386 389	caryophyllum	547
Menstruationis tempore Conceptio 120		cataracta	603
sine Menstruatione prævia Conceptio	118	cerasum	544
Mola pro gemellis superfoetatis habita		cerebri defectus	616
	312	chelæ cancrinæ	573
a Mola in gravidatio falsa	457	ciceres	547
Monstra gemellorum coalitorum 233.		cohæsió gemellorum	605
	245. sq.	color niger penis	561
Morbilli in gravidis	517	albus 561. in nigro	562
Morsus canis rabidi in gravida	520	cornua	564
Motus in utero an signum graviditatis?	382. 420. 459	cranii defectus	608
Mula in mula	329	crista galli	575
a Mulsa an signum graviditatis?	375. 396	cutis flava	559
Muralti sententia de imaginationis		decedens	581
operatione	639	dentes ovini	590
Mures in muribus	332	digiti cheliformes	573
N.		coaliti	574
Nabothi ovarium	47	racemosi	ibid.
Nausea an signum graviditatis 373. 395		raniformes	575
Nævi materni & varia a gravidarum		digitorum defectus	612
imaginatione	542. 581. 633	signum	555
		equi figura	557
		Erynacei aculeati in modum asperitas circa muliebria	577
		Nævi	

Index Rerum.

Nævi &c. facies horrida 605. pallida	606	Nævi &c. penis defectus	617
ficus	547	pes anserinus	615
fistula ani	585	pili	592
flammeus color	554	pilosa puella	565
flexibilitas mira	601	pisa	547
fœtus mortuus & niger	607	piscis	572
perforatus	604	plaga dorsi	619
foramen ani parvum	585	pomum	548
fragum	543. 547	proboscis suilla	556
frons discissa	569	loco nasi	572
frontis tumor	566	præputium incisum	577
fungus	551	puer squamosus	589
gaminarus	558	rapa	547
gangræna	583	ribesia	546
glis	579. 625	ronchus caninus	594
hernia	586	rosa	549
hydrocephalus	592	satyrus	624
imago Christi crucifixi	551. 590	scrotum vacuum	577
infans sine brachiis & pedibus	615	serpens	572
infantes villosi	593. 565	sertum florum	547
intestinorum prolapsus	586	simiæ vultus	623
labia coalita	570	spica	549
leporina	ibid.	spina dorsi bifida	591
labrum superius abstersum	571	squamosus puer	589
lactuca	551	sternutatio	599
lardum	556	struma	567
lentes	546	tremor	592
limax	575	testes in fronte	598
macula rubra	554	tumor frontis	566
sanguinea	553	in lumbis	ibid.
malum punicum	548	tumores varii	567. seq.
mammæ magnæ	583	vesica sanguinea plena	603
manus curvæ	584	verbera	556
manus defectus	609	virgarum ictus	ibid.
menes in infante	583	vituli caput	621
morum	544	umbra	552
motus lascivus	600	ungues aquilini	581
murænula	558	decedentes	ibid.
mus	578	vulnera	598
musca nigra	557	vulva intus hirsuta	605
nictatio	582	uvula duplex	596
obesitas stupenda	602	divisa	570
oculus vitulinus	580	uvulæ defectus	597
oculi privatio	597	Nævi an simul cum fructibus florescant?	644
olus	549	O.	
ossa diffracta	617	Obesitas stupenda a matris imaginatione	602
osis occipitis absentia	608	Occipitis osis absentia	608
passulæ	550	Oculus vitulinus a matris imaginatione	580
pedes curvi	567. 584	Oculi privatio ex impressione matris	597
penis & testes in fronte	558		ex
niger in puero albo	561		
albus in nigro	562		

ex Oculis an detur signum graviditatis?	371	Pomum sinense prægnaus	345
Odontalgia signum graviditatis	430	Porcelli cum auribus leporinis	628
Ophthalmia in gravidis	512	J. B. Portæ sententia de gravidarum imaginatione	633
Orificii uteri interni clausura an signum graviditatis?	365	in Posthumis major similitudo	ibid.
Ossa diffracta a matris imaginatione	617	Priapolithus prægnaus	355
Ostentum Dolanum	94 484	Proboscis suilla a matris impressione	556
Ova in tubis	8	Ptyalismus signum graviditatis	428
an a virginibus deponantur?	113	Puer squamosus	589
Ovarium Nabothi	47	Pulchritudo quomodo fœtibus comparanda?	645
Ovaria post coitum fœcundum mutantur	47. 49	Pyrum prægnaus	346
in Ovariis fit conceptio	15. 17. seq. 47. sq.	Q.	
fœtus	58. 83	Quadrimestri	203
in Ovario foramen remanens	70	in Quadrimestris an unica placenta?	225. 226
Ovariorum læsio causa sterilitatis	180	R.	
ad Ovarium quomodo semen feratur?	23. sq.	Rosæ floriferæ	347
Ovuli ex ovario secessus	59. 63. 67	Ronchus caninus a matris impressione	594
Ovula in abdominis cavitate	91	a Ruptura uteri fœtus in abdomine	97
Ovula per tubas descendunt	74	S.	
an ad uterum perveniant integra?	102. 104. seq.	Sanguis ex bregmate stillans signum graviditatis	427
disrumpi	102. sq.	in Secundinis latens fœtus	296
cur non omnia simul fœcundentur?	109	Semen muliebre quid sit veteribus?	3. 6
perfecta	111	virile an materia fœtus?	1
subventanea	112. seq.	Seminis virilis via ad ovarium	23
Ovulum an statim in coitu ad uterum perveniat?	60. negatur	aura per tubas	27
quomodo ex ovario protrudatur?	63	a Seminis spiritu conceptionem fieri	30
Ovum prægnaus	334	Seminis utriusque commiscela aliqualis conceditur	107
in ovo	ibid.	Seminis loco aura vel flatus	141
P.		an sine semine conceptio?	139
Partus gemellorum	199	Seminum commiscela an fiat?	2 seq.
in interfecta	ibid.	Sennerti sententia de gravidarum imaginatione	634
a matre suspensa	200	Sepultura gravidarum	507
quatuor liberorum	203	Sexus signa in utero an dentur? affirm.	434.
quinque liberorum	205	negatur	440
septem filiorum	206	propria	444
in superfœtatione	310	Signa graviditatis	357
Pavones albi unde?	631	incerta	361
Penis intromissione conceptio	131	certa propria	427
Phantasia gravidarum	542	Similitudo gemellorum	229
Pica gravidarum	526	ejus causa	231
Picturæ gravidis vitandæ	540	liberorum cum parentibus	647
a Pinguedine nimia sterilitas	178	Somnus meridianus signum graviditatis	428
Placentæ gemellorum	212. 220	in Sommo an conceptio fieri possit?	136
Pœna gravidarum	495. sq.	Spina dorsî bifida a matris imaginatione	591
Pomum aurantium	344	Spiritus genitalis causa conceptionis	30. sq. 35
citrium prægnaus	ibid.	an per tubas ad ovarium feratur	23. sq.
commune prægnaus	345	Spiri-	
limonium prægnaus	345		

Index Rerum.

Spiritus an per uteri porositate?	38	Tubarum usus	25
an per uteri vasa sanguinea?	36	ad ovaria applicatio	14. 82
Spiritus an a femina in coitu conferantur?	108	angustia	78
Squamofus puer	519	fimbriæ	79
Steatoma uteri causa sterilitatis	177	motus	75
Sterilitas ab alumine	174	per Tubas semen ad ovarium ascendere	23. seq.
ab amnio	175	in Tubis an conceptio fiat?	42
a calculo	176	Tulipa prolifera	351
a fluore albo	173	Tunicæ gemellorum	212
ab ovariorum læsione	180	trimellorum	218
a pinguedine nimia	177	U.	
an causa divortii?	182	ab Urina an signum graviditatis?	376
Sterilitatis causæ	170. 175	ab Uteri ruptura foetus in abdomine?	97
exempla	171	motu an signum graviditatis	382
Sternutatio signum graviditatis	429	intumescencia an?	380
Sudor unius lateris	428	in Utero an fiat conceptio?	44
Superfoetatio	253	Uvula duplex	596
an detur neg.	257	V.	
affirm.	260	Vultus simiæ a matris imaginatione	623
fit ab uno coitu	274	Vaginarum liquor an causa conceptionis?	123
reiterata	290	Vacca superfoetans	304
falsa	300	Vagitus uteri	483
in brutis an detur?	301	Varices an signum graviditatis?	378
equæ	305	Variolæ in gravidis	518
gallinæ	ibid.	Venæ sectio gravidarum	531
leporum	303	Vermes prægnantes	330
falso prætensa	315	a Vermibus an fiat conceptio	10. 34
Superfoetationis definitio	254	Vermiculi an per tubas ad ovarium ascen-	
denominatio	256	dant?	34
descriptio	ibid.	Vetulæ lac habentes	404
modus	266	Vetularum conceptio	116
exempla	278. 310. seq.	Virgines an ova ponant?	113
tempus	276	lac habentes	400
sceleta	296	Virginitas simulata	358
diagnofis	305	an Virginitate integra conceptio fiat?	138
prognofis	309	Viri lac habentes	406
fufpicio	317	lactantes infantes	399
frequentis causa	313	Vitia animi ab imaginatione	642
de Superfoetatione casus	310. fq. 314. 317. fq.	Vitulus in vitulo	329
Superfoetatorum involucra	307	sine Voluptate an conceptio fiat?	124
T.		alii negant	ibid.
Tortura gravidarum	495. fq.	alii affirmant	125
Trigemini	198	W.	
Trimelli	201	Waldschmidii fententia de imaginationis	
Trimellorum tunicæ	218	operatione	641
Tubæ Fallopiæ ovariis applicatæ	82. fq.	Wedelii fententia de operatione imagi-	
	84	nationis	636

C O R R I G E N D A.

p. 9. l. 7. copiosissimas damas l. 19. tactu p. 10. l. 12. Rallius p. 11. l. 12. loco mulieri lege muneris p. 20. l. 5. maturum l. 19. ovulis p. 18. l. 19. fuerint p. 25. l. 22. reperisse p. 37. l. 12. conquass. p. 38. l. 22. ovulis p. 42. l. 15. nulla est lic l. 20. cui p. 43. l. 7. contractæ l. 14. dele &c. l. 15. facundat p. 45. l. 30. quaquaversum p. 51. l. 10. die, canem cultro p. 53. l. ult. orificia p. 54. l. 17. contractione p. 56. l. 30. concipiunt l. ult. existant p. 61. ult. quam p. 72. l. 16. repræsentans p. 87. l. 9. & 10. loco mihi lege inibi p. 88. l. 15. lecto p. 93. l. 29. toute p. 94. l. 15. an 1661. p. 99. l. 29. inusitatæ l. ult. dele in p. 100. l. 2. solum p. 105. l. 18. aliquod p. 109. l. 26. cur à p. 114. l. 20. liculam p. 120. l. 9. adducta p. 123. l. 17. usui p. 140. l. 1. uteretur, ver. l. ult. varias causas p. 150. l. 10. debile a p. 152. l. ult. Commare p. 160. lin. antep. regles p. 162. l. 4. Utrum p. 180. l. 12. p. 234. l. 4. gemelli p. 308. l. penult. Teich. l. ult. p. 313. l. penult. loco ab lege ob, p. 314. l. 1. concubitu p. 315. l. 11. loco amo lege anno p. 316. l. 28. vicinis p. 342. l. 5. istius p. 387. l. 1. loco & lege ex p. 388. l. 8. id ipsum p. 392. l. 18. ac unq. l. 21. Epist. 13. l. 25. partui p. 394. l. 17. nunquam p. 397. l. 11. leg. 371. p. 400. l. 22. se vidisse in lin. antep. alita est p. 405. l. 20. post Diemerbroc adde Anatom. Lib. II. cap. 2. fol. m. 249. p. 409. l. 27. huic p. 417. l. 2. excandescentiis l. 17. dubitabant l. 19. tactu lin. ult. talem p. 418. l. 1. tiam p. 419. l. 10. hydropico-ascit p. 419. imprægnationis signis p. 420. l. 17. tombe comme p. 444. l. 5. Tertre p. 446 l. ult. inesse p. 444 l. 3. rotundæ p. 458. l. 22. dele in p. 460. l. 4. mansit p. 464. l. 14. adhuc sequut. p. 469. l. 26. Slegel p. 475. l. 4. foupis p. 476. l. 17. simple l. 26. parler l. 26. derobé p. 483. l. 16. iterato p. 485. l. 29. rosatum p. 487. l. 17. seq. historia p. 489. l. 5. abdominis p. 507. l. 21. aliquod p. 523. l. 14. pateretur p. 543. l. 8. imprimi p. 553. l. 20. sanguineo p. 555. l. 1. incend. p. 568. l. 16. Franco p. 570. l. 13. in margine lege Labia p. 571. l. 26. pendi jubet: id ei p. 573. l. 19. magnitudine cancrum p. 575. l. 10. abundantiam p. 596. l. 16. laxatam p. 597. l. 16. infantum p. 598. l. 25. emanante p. 599. l. 26. labio p. 605. l. 8. adstitem p. 611. l. 25. annos p. 621. l. 6. alii a l. 22. huncque l. 23. satisfieret. p. 623. l. 19. infra p. 625. l. 15. permansit p. 628. l. antepen. temporis p. 633. lin. 15. dele punctum p. 634. l. 2. quiescant p. 641. l. pen. in l. ult. imago p. 646. l. 16. pepererat p. 647. l. 12. c'hanno p. 653. l. penult. velo.

I. 812.

